日薬連発第 779 号
2026 年 10 月 27 日

加盟団体 殿

日本製薬団体連合会

「薬局製造販売医薬品の取扱いについて」の一部改正について

標記について，令和 8 年 10 月 27 日付け医薬薬審発 1027 第 1 号にて厚生労働省 医薬局 医薬品審査管理課長より通知がありました.（日薬連宛て：医薬薬審発 1027 第 2 号）

つきましては，本件につき貴会会員に周知徹底いただきたく，ご配慮の程よろしくお願い申しあげます.

医薬薬審発 1027 第２号
令和８年 10 月 27 日

（別　記）　殿

厚生労働省医薬局医薬品審査管理課長
（　公　　印　　省　　略　）

「薬局製造販売医薬品の取扱いについて」の一部改正について

標記について、別添写しのとおり、各都道府県、各保健所設置市及び各特別区の衛生主管部（局）長宛てに通知しましたので、貴会会員への周知をお願いいたします。

（別　記）

日本製薬団体連合会　会長

公益社団法人日本薬剤師会　会長

一般社団法人日本チェーンドラッグストア協会　会長

一般社団法人日本保険薬局協会　会長

写

医薬薬審発 1027 第１号
令和８年 10 月 27 日

各 都道府県 保健所設置市 特別区 衛生主管部（局）長　殿

厚生労働省医薬局医薬品審査管理課長
（　公　　印　　省　　略　）

「薬局製造販売医薬品の取扱いについて」の一部改正について

薬局製造販売医薬品の取扱いについては、「薬局製造販売医薬品の取扱いについて」（平成 17 年３月 25 日付け薬食審査発第 0325009 号厚生労働省医薬食品局審査管理課長通知。以下「薬局製剤通知」という。）により示してきたところですが、今般、令和７年度厚生労働科学特別研究事業「薬局製造販売医薬品（漢方・生薬製剤）の改正に資する研究」（研究代表者：伊藤美千穂）及び薬局製剤指針に関する検討連絡会議における検討結果を踏まえ、下記のとおり薬局製剤通知の一部を改正することとしたので、薬局製造販売医薬品の取扱いに際して留意されるよう貴管内関係各者及び関係団体に対して周知方よろしく御配慮お願いします。

記

１　薬局製剤通知の改正

（１）「「薬局製造販売医薬品の取扱いについて」の一部改正について」（平成 28 年３月 28 日薬生審査発 0328 第 15 号厚生労働省医薬・生活衛生局審査管理課長通知）の別添「薬局製剤指針」に別紙の処方を追加すること。

（２）ダイオウ、カンゾウ、マオウ、ブシ又はサンシシを含む処方について、「成分及び分量又は本質」欄に記載されている当該成分の分量が幅で記載されている場合においては、最大分量を基本とし、最小分量までの範囲で分量を選択することを可能としたこと。

（３）漢方製剤、生薬製剤の確認試験のうち、日本薬局方等における確認試験を準用することとされていたものについて、必要に応じて実施することで良い旨の規定に変更したこと。
（４）その他、所要の記載整備をしたこと。

２　適用時期等
（１）本通知の発出日以降に申請されるものに適用する。
（２）既承認品目の取扱いについて
　薬局製剤製造販売承認書の「成分及び分量又は本質」欄に「薬局製剤指針による」等、薬局製剤指針を参照する旨が記載されているものについては、本通知の発出日以降に製造販売されるものに適用されること。
（３）追加された処方について
　薬局製剤指針に分量が幅で記載されている処方については、製造販売承認申請においても「成分及び分量又は本質」欄を「薬局製剤指針による」と記載して差し支えないこと。
（４）その他
　本通知の発出に伴い、令和７年 11 月 26 日付け厚生労働省医薬局医薬品審査管理課事務連絡「薬局製剤指針に関する質疑応答集（Ｑ＆Ａ）について」は廃止すること。

別紙

一連番号	処方番号	備考
424	K217	烏苓通気散料
425	K218	越婢加朮湯
426	K218-①	越婢加朮湯
427	K219	加減涼膈散（浅田）料
428	K220	加減涼膈散（龔廷賢）料
429	K221	甘草乾姜湯
430	K222	甘草附子湯
431	K223	九味檳榔湯
432	K223-①	九味檳榔湯
433	K224	桂姜棗草黄辛附湯
434	K225	桂枝芍薬知母湯
435	K225-①	桂枝芍薬知母湯
436	K226	外台四物湯加味
437	K227	柴葛解肌湯
438	K228	柴胡枳桔湯
439	K229	四逆湯
440	K230	梔子柏皮湯
441	K231	滋腎通耳湯
442	K232	真武湯
443	K232-①	真武湯
444	K233	清熱補気湯
445	K234	清熱補血湯
446	K235	千金内托散料
447	K235-①	千金内托散料
448	K236	続命湯
449	K237	大黄附子湯
450	K238	大防風湯
451	K238-①	大防風湯
452	K238-②	大防風湯
453	K238-③	大防風湯
454	K239	半夏散及湯
455	K240	白朮附子湯
456	K241	茯苓杏仁甘草湯
457	K242	茯苓四逆湯
458	K243	附子粳米湯
459	K244	扶脾生脈散料
460	K245	奔豚湯（肘後方）
461	K246	麻黄附子細辛湯
462	K247	木防已湯

別紙

463	K247-①	木防已湯（竹参）
464	K248	苓甘姜味辛夏仁湯
465	K249	苓桂味甘湯
466	K250	越婢加朮附湯
467	K250-①	越婢加朮附湯
468	K251	桂枝越婢湯
469	K252	桂枝二越婢一湯
470	K253	桂枝二越婢一湯加朮附
471	K253-①	桂枝二越婢一湯加朮附
472	K254	小続命湯
473	K255	大柴胡湯去大黄
474	K256	治頭瘡一方去大黄
475	K257	当帰芍薬散料加附子
476	K257-①	当帰芍薬散料加附子
477	K258	附子理中湯
478	K258-①	附子理中湯
479	K259	乙字湯去大黄
480	K260	安中散料加茯苓
481	K261	柴葛湯加川芎辛夷
482	K262	四逆加人参湯
483	K263	芍薬甘草附子湯

○　薬局製剤指針　新旧対照表

（通知本文１（２）関係）

（傍線部分は改正部分）

	改正後	改正前
通則	１．～10.　（略） 11．本書の医薬品のうち、生薬を主たる有効成分として含む漢方製剤及び生薬製剤について、「成分及び分量又は本質」欄に記載されている配合成分の分量が幅で記載されている場合においては、最大分量を基本とし、最小分量までの範囲で分量を選択することが可能である。	１．～10.　（略） （新設）

一連番号（旧）	処方番号	処方名	成分及び分量又は本質	
			改正後	改正前
188	K1	安中散料	カンゾウ　1.0～2.0g 全量　15.0～16.0g	カンゾウ　2.0g 全量　16.0g
189	K1-①	安中散	カンゾウ　1.0～2.0g 全量　15.0～16.0g	カンゾウ　2.0g 全量　16.0g
192	K4	茵蔯蒿湯	サンシシ　1.4～2.0g ダイオウ 1.0～2.0g 全量　8.4～10.0g	サンシシ　2.0g ダイオウ 2.0g 全量　10.0g
196	K7	温清飲	サンシシ　1.5～2.0g 全量　21.5～22.0g	サンシシ　2.0g 全量　22.0g
198	K9	黄耆建中湯	カンゾウ　2.0～3.0g 全量　16.5～17.5g	カンゾウ　3.0g 全量　17.5g
199	K10	黄芩湯	カンゾウ　2.0～3.0g 全量　13.0～14.0g	カンゾウ　3.0g 全量　14.0g
203	K13	黄連解毒湯	サンシシ　2.0～3.0g 全量　9.5～10.5g	サンシシ　3.0g 全量　10.5g
206	K15	乙字湯	カンゾウ　1.5～2.0g 全量　17.5～18.0g	カンゾウ　2.0g 全量　18.0g
211	K20	葛根湯	マオウ　3.0～4.0g 全量　24.0～25.0g	マオウ　4.0g 全量　25.0g

212	K21	葛根湯加川芎辛夷	マオウ　3.0～4.0g 全量　22.3～23.3g	マオウ　4.0g 全量　23.3g
213	K22	加味温胆湯	カンゾウ　1.0～2.0g 全量　32.0～33.0g	カンゾウ　2.0g 全量　33.0g
219	K27	甘草瀉心湯	カンゾウ　2.5～3.5g 全量　18.5～19.5g	カンゾウ　3.5g 全量　19.5g
220	K28	甘草湯	カンゾウ　2.0～5.0g 全量　2.0～5.0g	カンゾウ　5.0g 全量　5.0g
221	K29	甘麦大棗湯	カンゾウ　3.0～5.0g 全量　29.0～31.0g	カンゾウ　5.0g 全量　31.0g
222	K30	桔梗湯	カンゾウ　2.0～3.0g 全量　4.0～5.0g	カンゾウ　3.0g 全量　5.0g
235	K42	桂枝加葛根湯	カンゾウ　1.6～2.0g 全量　17.6～18.0g	カンゾウ　2.0g 全量　18.0g
236	K43	桂枝加厚朴杏仁湯	カンゾウ　1.6～2.0g 全量　16.6～17.0g	カンゾウ　2.0g 全量　17.0g
237	K44	桂枝加芍薬生姜人参湯	カンゾウ　1.6～2.0g 全量　16.1～16.5g	カンゾウ　2.0g 全量　16.5g
249	K55	荊防敗毒散料	カンゾウ　1.0～1.5g 全量　21.5～22.0g	カンゾウ　1.5g 全量　22.0g
252	K58	堅中湯	カンゾウ　1.0～1.5g 全量　22.0～22.5g	カンゾウ　1.5g 全量　22.5g
266	K71	五淋散料	サンシシ　1.0～2.0g 全量　16.0～17.0g	サンシシ　2.0g 全量　17.0g
269	K73	柴陥湯	カンゾウ　1.5～2.0g 全量　28.0～28.5g	カンゾウ　2.0g 全量　28.5g
273	K76	柴胡桂枝湯	カンゾウ　1.0～1.5g 全量　21.0～21.5g	カンゾウ　1.5g 全量　21.5g
279	K82	三黄瀉心湯	ダイオウ　1.0～2.0g 全量　3.0～4.0g	ダイオウ　2.0g 全量　4.0g
282	K85	滋陰降火湯	カンゾウ　1.0～1.5g 全量　22.0～22.5g	カンゾウ　1.5g 全量　22.5g
291	K93	炙甘草湯	カンゾウ　3.0～4.0g 全量　27.0～28.0g	カンゾウ　4.0g 全量　28.0g
292	K94	芍薬甘草湯	カンゾウ　3.0～4.0g 全量　7.0～8.0g	カンゾウ　4.0g 全量　8.0g

293	K95	鶺鴒菜湯	ダイオウ　1.0～1.5g カンゾウ　1.0～1.5g 全量　7.0～8.0g	ダイオウ　1.5g カンゾウ　1.5g 全量　8.0g
294	K96	十全大補湯	カンゾウ　1.0～1.5g 全量　28.0～28.5g	カンゾウ　1.5g 全量　28.5g
295	K97	十味敗毒湯	カンゾウ　1.0～2.0g 全量　24.0～25.0g	カンゾウ　2.0g 全量　25.0g
296	K98	潤腸湯	ダイオウ　1.0～2.0g カンゾウ　1.0～1.5g 全量　23.0～24.5g	ダイオウ　2.0g カンゾウ　1.5g 全量　24.5g
299	K101	小柴胡湯	カンゾウ　1.0～2.0g 全量　22.0～23.0g	カンゾウ　2.0g 全量　23.0g
300	K101－①	小柴胡湯（竹参）	カンゾウ　1.0～2.0g 全量　23.0～24.0g	カンゾウ　2.0g 全量　24.0g
303	K104	小青竜湯	マオウ　2.0～3.0g カンゾウ　2.0～3.0g 全量　25.0～27.0g	マオウ　3.0g カンゾウ　3.0g 全量　27.0g
304	K105	小青竜湯加石膏	カンゾウ　2.0～3.0g 全量　31.0～32.0g	カンゾウ　3.0g 全量　32.0g
305	K106	小青竜湯加杏仁石膏（小青竜湯合麻杏甘石湯）	マオウ　2.0～4.0g カンゾウ　2.0～3.0g 全量　39.0～42.0g	マオウ　4.0g カンゾウ　3.0g 全量　42.0g
313	K114	神秘湯	マオウ　3.0～5.0g 全量　18.0～20.0g	マオウ　5.0g 全量　20.0g
314	K115	参苓白朮散料	カンゾウ　0.8～1.5g 全量　33.3～34.0g	カンゾウ　1.5g 全量　34.0g
317	K117	清暑益気湯	カンゾウ　1.0～2.0g 全量　22.0～23.0g	カンゾウ　2.0g 全量　23.0g
319	K119	清上防風湯	サンシシ　1.5～2.5g 全量　21.5～22.5g	サンシシ　2.5g 全量　22.5g
323	K123	千金鶏鳴散料	ダイオウ　1.0～2.0g 全量　11.0～12.0g	ダイオウ　2.0g 全量　12.0g
328	K128	大黄牡丹皮湯	ダイオウ　1.0～2.0g 全量　14.7～15.7g	ダイオウ　2.0g 全量　15.7g
334	K134	治頭瘡一方	カンゾウ　0.5～1.0g 全量　16.0～16.5g	カンゾウ　1.0g 全量　16.5g
346	K145	当帰四逆加呉茱萸生姜湯	カンゾウ　1.5～2.0g 全量　23.5～24.0g	カンゾウ　2.0g 全量　24.0g

347	K146	当帰四逆湯	カンゾウ　1.2～2.0g 全量　20.2～21.0g	カンゾウ　2.0g 全量　21.0g
354	K152	二朮湯	カンゾウ　1.0～1.5g 全量　17.1～17.6g	カンゾウ　1.5g 全量　17.6g
356	K154	女神散料	カンゾウ　1.0～1.5g ダイオウ　0～0.5g 全量　24.5～25.5g	カンゾウ　1.5g ダイオウ　0.5g 全量　25.5g
362	K158	排膿湯	カンゾウ　1.5～3.0g 全量　12.8～14.3g	カンゾウ　3.0g 全量　14.3g
364	K160	八味地黄丸料	ブシ　0.5～1.0g 全量　21.5～22.0g	ブシ　1.0g 全量　22.0g
376	K171	茯苓沢瀉湯	カンゾウ　1.0～1.5g 全量　15.5～16.0g	カンゾウ　1.5g 全量　16.0g
379	K174	防已黄耆湯	カンゾウ　1.5～2.0g 全量　18.5～19.0g	カンゾウ　2.0g 全量　19.0g
380	K175	防已茯苓湯	カンゾウ　1.5～2.0g 全量　16.5～17.0g	カンゾウ　2.0g 全量　17.0g
383	K178	補中益気湯	カンゾウ　1.0～1.5g 全量　22.0～22.5g	カンゾウ　1.5g 全量　22.5g
384	K179	麻黄湯	マオウ　3.0～4.0g カンゾウ　1.0～1.5g 全量　11.0～12.5g	マオウ　4.0g カンゾウ　1.5g 全量　12.5g
387	K182	麻子仁丸料	ダイオウ　3.5～4.0g 全量　16.5～17.0g	ダイオウ　4.0g 全量　17.0g
388	K182-①	麻子仁丸	ダイオウ　3.5～4.0g 全量　16.5～17.0g	ダイオウ　4.0g 全量　17.0g
417	K210	加味解毒湯	ダイオウ　0～1.5g 全量　23.5～25.0g	ダイオウ　1.5g 全量　25.0g

※分量を改正する成分以外は省略

○　薬局製剤指針　新旧対照表

（通知本文１（３）関係）

（傍線部分は改正部分）

一連番号	処方番号	処方名	確認試験	
			改正後	改正前
188	K1	安中散料	（２）ボレイ　（略）必要に応じて,「ボレイ」の確認試験を準用する。 （４）エンゴサク　（略）必要に応じて,「エンゴサク」の確認試験を準用する。 （５）リョウキョウ　（略）必要に応じて,「リョウキョウ」の確認試験を準用する。	（２）ボレイ　（略）また,「ボレイ」の確認試験を準用する。 （４）エンゴサク　（略）また,「エンゴサク」の確認試験を準用する。 （５）リョウキョウ　（略）また,「リョウキョウ」の確認試験を準用する。
190	K2	胃風湯	（２）シャクヤク　（略）必要に応じて,「シャクヤク」の確認試験を準用する。 （４）ニンジン　（略）必要に応じて,「ニンジン」の確認試験を準用する。 （５）ビャクジュツ　（略）必要に応じて,「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。 （６）ブクリョウ　（略）必要に応じて,「ブクリョウ」の確認試験を準用する。	（２）シャクヤク　（略）また,「シャクヤク」の確認試験を準用する。 （４）ニンジン　（略）また,「ニンジン」の確認試験を準用する。 （５）ビャクジュツ　（略）また,「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。 （６）ブクリョウ　（略）また,「ブクリョウ」の確認試験を準用する。
191	K3	胃苓湯	（２）チンピ　（略）必要に応じて,「チンピ」の確認試験を準用する。 （４）ビャクジュツ　（略）必要に応じて,「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。 （５）コウボク　（略）必要に応じて,「コウボク」の確認試験を準用する。	（２）チンピ　（略）また,「チンピ」の確認試験を準用する。 （４）ビャクジュツ　（略）また,「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。 （５）コウボク　（略）また,「コウボク」の確認試験を準用する。

			（６）チョレイ　（略）必要に応じて,「チョレイ」の確認試験を準用する。 （７）シャクヤク　（略）必要に応じて,「シャクヤク」の確認試験を準用する。 （８）ブクリョウ　（略）必要に応じて,「ブクリョウ」の確認試験を準用する。	（６）チョレイ　（略）また,「チョレイ」の確認試験を準用する。 （７）シャクヤク　（略）また,「シャクヤク」の確認試験を準用する。 （８）ブクリョウ　（略）また,「ブクリョウ」の確認試験を準用する。
192	K4	茵蔯蒿湯	（１）インチンコウ　（略）必要に応じて,「インチンコウ」の確認試験を準用する。 （２）サンシシ　（略）必要に応じて,「サンシシ」の確認試験を準用する。 （３）ダイオウ　（略）必要に応じて,「ダイオウ」の確認試験を準用する。	（１）インチンコウ　（略）また,「インチンコウ」の確認試験を準用する。 （２）サンシシ　（略）また,「サンシシ」の確認試験を準用する。 （３）ダイオウ　（略）また,「ダイオウ」の確認試験を準用する。
193	K5	茵蔯五苓散料	（２）チョレイ　（略）必要に応じて,「チョレイ」の確認試験を準用する。 （４）ブクリョウ　（略）必要に応じて,「ブクリョウ」の確認試験を準用する。 （５）ビャクジュツ　（略）必要に応じて,「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。 （６）インチンコウ　（略）必要に応じて,「インチンコウ」の確認試験を準用する。	（２）チョレイ　（略）また,「チョレイ」の確認試験を準用する。 （４）ブクリョウ　（略）また,「ブクリョウ」の確認試験を準用する。 （５）ビャクジュツ　（略）また,「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。 （６）インチンコウ　（略）また,「インチンコウ」の確認試験を準用する。
195	K6	温経湯	（５）シャクヤク　（略）必要に応じて,「シャクヤク」の確認試験を準用する。 （６）ニンジン　（略）必要に応じて,「ニンジン」の確認試験を準用する。 （８）ボタンピ　（略）必要に応じて,「ボタンピ」の確	（５）シャクヤク　（略）また,「シャクヤク」の確認試験を準用する。 （６）ニンジン　（略）また,「ニンジン」の確認試験を準用する。 （８）ボタンピ　（略）また,「ボタンピ」の確認試験

			認試験を準用する。 （11）ゴシュユ　（略）必要に応じて,「ゴシュユ」の確認試験を準用する。	を準用する。 （11）ゴシュユ　（略）また,「ゴシュユ」の確認試験を準用する。
196	K7	温清飲	（3）シャクヤク　（略）必要に応じて,「シャクヤク」の確認試験を準用する。 （5）オウゴン　（略）必要に応じて,「オウゴン」の確認試験を準用する。 （6）サンシシ　（略）必要に応じて,「サンシシ」の確認試験を準用する。 （7）オウレン　（略）必要に応じて,「オウレン」の確認試験を準用する。 （8）オウバク　（略）必要に応じて,「オウバク」の確認試験を準用する。	（3）シャクヤク　（略）また,「シャクヤク」の確認試験を準用する。 （5）オウゴン　（略）また,「オウゴン」の確認試験を準用する。 （6）サンシシ　（略）また,「サンシシ」の確認試験を準用する。 （7）オウレン　（略）また,「オウレン」の確認試験を準用する。 （8）オウバク　（略）また,「オウバク」の確認試験を準用する。
197	K8	温胆湯	（3）チンピ　（略）必要に応じて,「チンピ」の確認試験を準用する。 （4）キジツ　（略）必要に応じて,「キジツ」の確認試験を準用する。 （5）ブクリョウ　（略）必要に応じて,「ブクリョウ」の確認試験を準用する。 （6）チクジョ　（略）必要に応じて，局外生規「チクジョ」の確認試験を準用する。	（3）チンピ　（略）また,「チンピ」の確認試験を準用する。 （4）キジツ　（略）また,「キジツ」の確認試験を準用する。 （5）ブクリョウ　（略）また,「ブクリョウ」の確認試験を準用する。 （6）チクジョ　（略）また，局外生規「チクジョ」の確認試験を準用する。
198	K9	黄耆建中湯	（3）シャクヤク　（略）必要に応じて,「シャクヤク」の確認試験を準用する。	（3）シャクヤク　（略）また,「シャクヤク」の確認試験を準用する。

199	K10	黄芩湯	（1）オウゴン　（略）必要に応じて,「オウゴン」の確認試験を準用する。 （2）シャクヤク　（略）必要に応じて,「シャクヤク」の確認試験を準用する。	（1）オウゴン　（略）また,「オウゴン」の確認試験を準用する。 （2）シャクヤク　（略）また,「シャクヤク」の確認試験を準用する。
200	K11	応鐘散料	（1）ダイオウ　（略）必要に応じて,「ダイオウ」の確認試験を準用する。	（1）ダイオウ　（略）また,「ダイオウ」の確認試験を準用する。
202	K12	黄連阿膠湯	（1）オウレン　（略）必要に応じて,「オウレン」の確認試験を準用する。 （2）オウゴン　（略）必要に応じて,「オウゴン」の確認試験を準用する。 （3）シャクヤク　（略）必要に応じて,「シャクヤク」の確認試験を準用する。	（1）オウレン　（略）また,「オウレン」の確認試験を準用する。 （2）オウゴン　（略）また,「オウゴン」の確認試験を準用する。 （3）シャクヤク　（略）また,「シャクヤク」の確認試験を準用する。
203	K13	黄連解毒湯	（1）オウレン　（略）必要に応じて,「オウレン」の確認試験を準用する。 （2）オウゴン　（略）必要に応じて,「オウゴン」の確認試験を準用する。 （3）オウバク　（略）必要に応じて,「オウバク」の確認試験を準用する。 （4）サンシシ　（略）必要に応じて,「サンシシ」の確認試験を準用する。	（1）オウレン　（略）また,「オウレン」の確認試験を準用する。 （2）オウゴン　（略）また,「オウゴン」の確認試験を準用する。 （3）オウバク　（略）また,「オウバク」の確認試験を準用する。 （4）サンシシ　（略）また,「サンシシ」の確認試験を準用する。
205	K14	黄連湯	（1）オウレン　（略）必要に応じて,「オウレン」の確認試験を準用する。 （2）カンキョウ　（略）必要に応じて,「カンキョウ」の確認試験を準用する。 （6）ニンジン　（略）必要に応じて,「ニンジン」の確	（1）オウレン　（略）また,「オウレン」の確認試験を準用する。 （2）カンキョウ　（略）また,「カンキョウ」の確認試験を準用する。 （6）ニンジン　（略）また,「ニンジン」の確認試験

			認試験を準用する。	を準用する。
206	K15	乙字湯	（2）サイコ　（略）必要に応じて,「サイコ」の確認試験を準用する。 （3）オウゴン　（略）必要に応じて,「オウゴン」の確認試験を準用する。 （5）ダイオウ　（略）必要に応じて,「ダイオウ」の確認試験を準用する。	（2）サイコ　（略）また,「サイコ」の確認試験を準用する。 （3）オウゴン　（略）また,「オウゴン」の確認試験を準用する。 （5）ダイオウ　（略）また,「ダイオウ」の確認試験を準用する。
207	K16	化食養脾湯	（1）ニンジン　（略）必要に応じて,「ニンジン」の確認試験を準用する。 （2）ビャクジュツ　（略）必要に応じて,「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。 （3）ブクリョウ　（略）必要に応じて,「ブクリョウ」の確認試験を準用する。 （5）チンピ　（略）必要に応じて,「チンピ」の確認試験を準用する。 （8）バクガ　（略）必要に応じて,「バクガ」の確認試験を準用する。 （9）サンザシ　（略）必要に応じて,「サンザシ」の確認試験を準用する。	（1）ニンジン　（略）また,「ニンジン」の確認試験を準用する。 （2）ビャクジュツ　（略）また,「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。 （3）ブクリョウ　（略）また,「ブクリョウ」の確認試験を準用する。 （5）チンピ　（略）また,「チンピ」の確認試験を準用する。 （8）バクガ　（略）また,「バクガ」の確認試験を準用する。 （9）サンザシ　（略）また,「サンザシ」の確認試験を準用する。
208	K17	藿香正気散料	（1）ビャクジュツ　（略）必要に応じて,「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。 （2）ブクリョウ　（略）必要に応じて,「ブクリョウ」の確認試験を準用する。 （3）チンピ　（略）必要に応じて,「チンピ」の確認試験を準用する。	（1）ビャクジュツ　（略）また,「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。 （2）ブクリョウ　（略）また,「ブクリョウ」の確認試験を準用する。 （3）チンピ　（略）また,「チンピ」の確認試験を準用する。

			（４）ビャクシ　（略）必要に応じて，「ビャクシ」の確認試験を準用する。 （５）カッコウ　（略）必要に応じて，「カッコウ」の確認試験を準用する。 （９）コウボク　（略）必要に応じて，「コウボク」の確認試験を準用する。 （10）キキョウ　（略）必要に応じて，「キキョウ」の確認試験を準用する。 （11）ソヨウ　（略）必要に応じて，「ソヨウ」の確認試験を準用する。 （12）ダイフクヒ　（略）必要に応じて，局外生規「ダイフクヒ」の確認試験を準用する。	（４）ビャクシ　（略）また，「ビャクシ」の確認試験を準用する。 （５）カッコウ　（略）また，「カッコウ」の確認試験を準用する。 （９）コウボク　（略）また，「コウボク」の確認試験を準用する。 （10）キキョウ　（略）また，「キキョウ」の確認試験を準用する。 （11）ソヨウ　（略）また，「ソヨウ」の確認試験を準用する。 （12）ダイフクヒ　（略）また，局外生規「ダイフクヒ」の確認試験を準用する。
209	K18	葛根黄連黄苓湯	（２）オウレン　（略）必要に応じて，「オウレン」の確認試験を準用する。 （３）オウゴン　（略）必要に応じて，「オウゴン」の確認試験を準用する。	（２）オウレン　（略）また，「オウレン」の確認試験を準用する。 （３）オウゴン　（略）また，「オウゴン」の確認試験を準用する。
210	K19	葛根紅花湯	（３）シャクヤク　（略）必要に応じて，「シャクヤク」の確認試験を準用する。 （４）オウレン　（略）必要に応じて，「オウレン」の確認試験を準用する。 （５）サンシシ　（略）必要に応じて，「サンシシ」の確認試験を準用する。	（３）シャクヤク　（略）また，「シャクヤク」の確認試験を準用する。 （４）オウレン　（略）また，「オウレン」の確認試験を準用する。 （５）サンシシ　（略）また，「サンシシ」の確認試験を準用する。

			（６）コウカ　（略）必要に応じて,「コウカ」の確認試験を準用する。 （８）ダイオウ　（略）必要に応じて,「ダイオウ」の確認試験を準用する。	（６）コウカ　（略）また,「コウカ」の確認試験を準用する。 （８）ダイオウ　（略）また,「ダイオウ」の確認試験を準用する。
211	K20	葛根湯	（２）マオウ　（略）必要に応じて,「マオウ」の確認試験を準用する。 （６）シャクヤク　（略）必要に応じて,「シャクヤク」の確認試験を準用する。	（２）マオウ　（略）また,「マオウ」の確認試験を準用する。 （６）シャクヤク　（略）また,「シャクヤク」の確認試験を準用する。
212	K21	葛根湯加川芎辛夷	（２）マオウ　（略）必要に応じて,「マオウ」の確認試験を準用する。 （６）シャクヤク　（略）必要に応じて,「シャクヤク」の確認試験を準用する。 （９）シンイ　（略）必要に応じて,「シンイ」の確認試験を準用する。	（２）マオウ　（略）また,「マオウ」の確認試験を準用する。 （６）シャクヤク　（略）また,「シャクヤク」の確認試験を準用する。 （９）シンイ　（略）また,「シンイ」の確認試験を準用する。
213	K22	加味温胆湯	（２）ブクリョウ　（略）必要に応じて,「ブクリョウ」の確認試験を準用する。 （３）チンピ　（略）必要に応じて,「チンピ」の確認試験を準用する。 （４）チクジョ　（略）必要に応じて，局外生規「チクジョ」の確認試験を準用する。 （５）サンソウニン　（略）必要に応じて,「サンソウニン」の確認試験を準用する。 （６）ゲンジン　（略）必要に応じて，局外生規「ゲンジン」の確認試験を準用する。 （７）オンジ　（略）必要に応じて,「オンジ」の確認試	（２）ブクリョウ　（略）また,「ブクリョウ」の確認試験を準用する。 （３）チンピ　（略）また,「チンピ」の確認試験を準用する。 （４）チクジョ　（略）また，局外生規「チクジョ」の確認試験を準用する。 （５）サンソウニン　（略）また,「サンソウニン」の確認試験を準用する。 （６）ゲンジン　（略）また，局外生規「ゲンジン」の確認試験を準用する。 （７）オンジ　（略）また,「オンジ」の確認試験を準

			験を準用する。 （８）ニンジン　（略）必要に応じて,「ニンジン」の確認試験を準用する。 （11）キジツ　（略）必要に応じて,「キジツ」の確認試験を準用する。	用する。 （８）ニンジン　（略）また,「ニンジン」の確認試験を準用する。 （11）キジツ　（略）また,「キジツ」の確認試験を準用する。
214	K23	加味帰脾湯	（１）ニンジン　（略）必要に応じて,「ニンジン」の確認試験を準用する。 （２）ブクリョウ　（略）必要に応じて,「ブクリョウ」の確認試験を準用する。 （３）リュウガンニク　（略）必要に応じて,「リュウガンニク」の確認試験を準用する。 （５）サイコ　（略）必要に応じて,「サイコ」の確認試験を準用する。 （９）ビャクジュツ　（略）必要に応じて,「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。 （10）サンソウニン　（略）必要に応じて,「サンソウニン」の確認試験を準用する。 （12）オンジ　（略）必要に応じて,「オンジ」の確認試験を準用する。 （13）サンシシ　（略）必要に応じて,「サンシシ」の確認試験を準用する。	（１）ニンジン　（略）また,「ニンジン」の確認試験を準用する。 （２）ブクリョウ　（略）また,「ブクリョウ」の確認試験を準用する。 （３）リュウガンニク　（略）また,「リュウガンニク」の確認試験を準用する。 （５）サイコ　（略）また,「サイコ」の確認試験を準用する。 （９）ビャクジュツ　（略）また,「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。 （10）サンソウニン　（略）また,「サンソウニン」の確認試験を準用する。 （12）オンジ　（略）また,「オンジ」の確認試験を準用する。 （13）サンシシ　（略）また,「サンシシ」の確認試験を準用する。

			（15）ボタンピ　（略）必要に応じて,「ボタンピ」の確認試験を準用する。	（15）ボタンピ　（略）また,「ボタンピ」の確認試験を準用する。
215	K24	加味逍遙散料	（2）ビャクジュツ　（略）必要に応じて,「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。 （3）サイコ　必要に応じて,「サイコ」の確認試験を準用する。 （4）サンシシ　（略）必要に応じて,「サンシシ」の確認試験を準用する。 （6）シャクヤク　（略）必要に応じて,「シャクヤク」の確認試験を準用する。 （7）ブクリョウ　（略）必要に応じて,「ブクリョウ」の確認試験を準用する。 （8）ボタンピ　（略）必要に応じて,「ボタンピ」の確認試験を準用する。 （10）ハッカ　（略）必要に応じて,「ハッカ」の確認試験を準用する。	（2）ビャクジュツ　（略）また,「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。 （3）サイコ　（略）また,「サイコ」の確認試験を準用する。 （4）サンシシ　（略）また,「サンシシ」の確認試験を準用する。 （6）シャクヤク　（略）また,「シャクヤク」の確認試験を準用する。 （7）ブクリョウ　（略）また,「ブクリョウ」の確認試験を準用する。 （8）ボタンピ　（略）また,「ボタンピ」の確認試験を準用する。 （10）ハッカ　（略）また,「ハッカ」の確認試験を準用する。
216	K25	加味逍遥散料加川芎地黄（加味逍遙散合四物湯）	（2）シャクヤク　（略）必要に応じて,「シャクヤク」の確認試験を準用する。 （3）サイコ　（略）必要に応じて,「サイコ」の確認試験を準用する。 （4）ブクリョウ　（略）必要に応じて,「ブクリョウ」の確認試験を準用する。 （5）ビャクジュツ　（略）必要に応じて,「ビャクジュ	（2）シャクヤク　（略）また,「シャクヤク」の確認試験を準用する。 （3）サイコ　（略）また,「サイコ」の確認試験を準用する。 （4）ブクリョウ　（略）また,「ブクリョウ」の確認試験を準用する。 （5）ビャクジュツ　（略）また,「ビャクジュツ」の

			ツ」の確認試験を準用する。 （9）ボタンピ　（略）必要に応じて,「ボタンピ」の確認試験を準用する。 （10）サンシシ　（略）必要に応じて,「サンシシ」の確認試験を準用する。 （12）ハッカ　（略）必要に応じて,「ハッカ」の確認試験を準用する。	確認試験を準用する。 （9）ボタンピ　（略）また,「ボタンピ」の確認試験を準用する。 （10）サンシシ　（略）また,「サンシシ」の確認試験を準用する。 （12）ハッカ　（略）また,「ハッカ」の確認試験を準用する。
217	K26	乾姜人参半夏丸料	（1）カンキョウ　（略）必要に応じて,「カンキョウ」の確認試験を準用する。 （2）ニンジン　（略）必要に応じて,「ニンジン」の確認試験を準用する。	（1）カンキョウ　（略）また,「カンキョウ」の確認試験を準用する。 （2）ニンジン　（略）また,「ニンジン」の確認試験を準用する。
219	K27	甘草瀉心湯	（1）オウレン　（略）必要に応じて,「オウレン」の確認試験を準用する。 （3）オウゴン　（略）必要に応じて,「オウゴン」の確認試験を準用する。 （5）ニンジン　（略）必要に応じて,「ニンジン」の確認試験を準用する。 （6）カンキョウ　（略）必要に応じて,「カンキョウ」の確認試験を準用する。	（1）オウレン　（略）また,「オウレン」の確認試験を準用する。 （3）オウゴン　（略）また,「オウゴン」の確認試験を準用する。 （5）ニンジン　（略）また,「ニンジン」の確認試験を準用する。 （6）カンキョウ　（略）また,「カンキョウ」の確認試験を準用する。
222	K30	桔梗湯	（1）キキョウ　（略）必要に応じて,「キキョウ」の確認試験を準用する。	（1）キキョウ　（略）また,「キキョウ」の確認試験を準用する。
223	K31	帰耆建中湯	（5）シャクヤク　（略）必要に応じて,「シャクヤク」の確認試験を準用する。	（5）シャクヤク　（略）また,「シャクヤク」の確認試験を準用する。

224	K32	帰脾湯	（1）ニンジン　（略）必要に応じて,「ニンジン」の確認試験を準用する。 （2）ブクリョウ　（略）必要に応じて,「ブクリョウ」の確認試験を準用する。 （6）ビャクジュツ　（略）必要に応じて,「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。 （8）オンジ　（略）必要に応じて,「オンジ」の確認試験を準用する。 (11) リュウガンニク　（略）必要に応じて,「リュウガンニク」の確認試験を準用する。 (12) サンソウニン　（略）必要に応じて,「サンソウニン」の確認試験を準用する。	（1）ニンジン　（略）また,「ニンジン」の確認試験を準用する。 （2）ブクリョウ　（略）また,「ブクリョウ」の確認試験を準用する。 （6）ビャクジュツ　（略）また,「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。 （8）オンジ　（略）また,「オンジ」の確認試験を準用する。 (11) リュウガンニク　（略）また,「リュウガンニク」の確認試験を準用する。 (12) サンソウニン　（略）また,「サンソウニン」の確認試験を準用する。
225	K33	芎帰膠艾湯	（4）シャクヤク　（略）必要に応じて,「シャクヤク」の確認試験を準用する。 （6）ガイヨウ　（略）必要に応じて,「ガイヨウ」の確認試験を準用する。	（4）シャクヤク　（略）また,「シャクヤク」の確認試験を準用する。 （6）ガイヨウ　（略）また,「ガイヨウ」の確認試験を準用する。
226	K34	芎帰調血飲	（4）ビャクジュツ　（略）必要に応じて,「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。 （5）ブクリョウ　（略）必要に応じて,「ブクリョウ」の確認試験を準用する。 （6）チンピ　（略）必要に応じて,「チンピ」の確認試験を準用する。 （8）ボタンピ　（略）必要に応じて,「ボタンピ」の確	（4）ビャクジュツ　（略）また,「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。 （5）ブクリョウ　（略）また,「ブクリョウ」の確認試験を準用する。 （6）チンピ　（略）また,「チンピ」の確認試験を準用する。 （8）ボタンピ　（略）また,「ボタンピ」の確認試験

			認試験を準用する。 （12）ウヤク　（略）必要に応じて,「ウヤク」の確認試験を準用する。 （13）ヤクモソウ　（略）必要に応じて,「ヤクモソウ」の確認試験を準用する。	を準用する。 （12）ウヤク　（略）また,「ウヤク」の確認試験を準用する。 （13）ヤクモソウ　（略）また,「ヤクモソウ」の確認試験を準用する。
227	K35	芎帰調血飲第一加減	（３）ブクリョウ　（略）必要に応じて,「ブクリョウ」の確認試験を準用する。 （４）ウヤク　（略）必要に応じて,「ウヤク」の確認試験を準用する。 （５）ボタンピ　（略）必要に応じて,「ボタンピ」の確認試験を準用する。 （９）ビャクジュツ　（略）必要に応じて,「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。 （10）チンピ　（略）必要に応じて,「チンピ」の確認試験を準用する。 （12）ヤクモソウ　（略）必要に応じて,「ヤクモソウ」の確認試験を準用する。 （14）トウニン　（略）必要に応じて,「トウニン」の確認試験を準用する。	（３）ブクリョウ　（略）また,「ブクリョウ」の確認試験を準用する。 （４）ウヤク　（略）また,「ウヤク」の確認試験を準用する。 （５）ボタンピ　（略）また,「ボタンピ」の確認試験を準用する。 （９）ビャクジュツ　（略）また,「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。 （10）チンピ　（略）また,「チンピ」の確認試験を準用する。 （12）ヤクモソウ　（略）また,「ヤクモソウ」の確認試験を準用する。 （14）トウニン　（略）また,「トウニン」の確認試験を準用する。

			（15）コウカ　（略）必要に応じて,「コウカ」の確認試験を準用する。 （16）キジツ　（略）必要に応じて,「キジツ」の確認試験を準用する。 （18）ゴシツ　（略）必要に応じて,「ゴシツ」の確認試験を準用する。 （20）エンゴサク　（略）必要に応じて,「エンゴサク」の確認試験を準用する。 （21）シャクヤク　（略）必要に応じて,「シャクヤク」の確認試験を準用する。	（15）コウカ　（略）また,「コウカ」の確認試験を準用する。 （16）キジツ　（略）また,「キジツ」の確認試験を準用する。 （18）ゴシツ　（略）また,「ゴシツ」の確認試験を準用する。 （20）エンゴサク　（略）また,「エンゴサク」の確認試験を準用する。 （21）シャクヤク　（略）また,「シャクヤク」の確認試験を準用する。
228	K36	響声破笛丸料	（１）レンギョウ　（略）必要に応じて,「レンギョウ」の確認試験を準用する。 （３）キキョウ　（略）必要に応じて,「キキョウ」の確認試験を準用する。 （４）ハッカ　（略）必要に応じて,「ハッカ」の確認試験を準用する。 （５）アセンヤク　（略）必要に応じて,「アセンヤク」の確認試験を準用する。 （８）ダイオウ　（略）必要に応じて,「ダイオウ」の確認試験を準用する。	（１）レンギョウ　（略）また,「レンギョウ」の確認試験を準用する。 （３）キキョウ　（略）また,「キキョウ」の確認試験を準用する。 （４）ハッカ　（略）また,「ハッカ」の確認試験を準用する。 （５）アセンヤク　（略）また,「アセンヤク」の確認試験を準用する。 （８）ダイオウ　（略）また,「ダイオウ」の確認試験を準用する。

230	K37	杏蘇散料	（1）ソヨウ　（略）必要に応じて,「ソヨウ」の確認試験を準用する。 （3）キョウニン　（略）必要に応じて,「キョウニン」の確認試験を準用する。 （4）ダイフクヒ　（略）必要に応じて, 局外生規「ダイフクヒ」の確認試験を準用する。 （5）ウバイ　（略）必要に応じて, 局外生規「ウバイ」の確認試験を準用する。 （6）シオン　（略）必要に応じて, 局外生規「シオン」の確認試験を準用する。 （7）キキョウ　（略）必要に応じて,「キキョウ」の確認試験を準用する。 （8）ソウハクヒ　（略）必要に応じて,「ソウハクヒ」の確認試験を準用する。 (10) チンピ　（略）必要に応じて,「チンピ」の確認試験を準用する。 (11) マオウ　（略）必要に応じて,「マオウ」の確認試験を準用する。	（1）ソヨウ　（略）また,「ソヨウ」の確認試験を準用する。 （3）キョウニン　（略）また,「キョウニン」の確認試験を準用する。 （4）ダイフクヒ　（略）また, 局外生規「ダイフクヒ」の確認試験を準用する。 （5）ウバイ　（略）また, 局外生規「ウバイ」の確認試験を準用する。 （6）シオン　（略）また, 局外生規「シオン」の確認試験を準用する。 （7）キキョウ　（略）また,「キキョウ」の確認試験を準用する。 （8）ソウハクヒ　（略）また,「ソウハクヒ」の確認試験を準用する。 (10) チンピ　（略）また,「チンピ」の確認試験を準用する。 (11) マオウ　（略）また,「マオウ」の確認試験を準用する。
232	K39	駆風解毒湯	（2）ゴボウシ　（略）必要に応じて,「ゴボウシ」の確認試験を準用する。 （3）レンギョウ　（略）必要に応じて,「レンギョウ」の確認試験を準用する。 （4）ケイガイ　（略）必要に応じて,「ケイガイ」の確	（2）ゴボウシ　（略）また,「ゴボウシ」の確認試験を準用する。 （3）レンギョウ　（略）また,「レンギョウ」の確認試験を準用する。 （4）ケイガイ　（略）また,「ケイガイ」の確認試験

			認試験を準用する。 （５）キョウカツ　（略）必要に応じて,「キョウカツ」の確認試験を準用する。 （７）キキョウ　（略）必要に応じて,「キキョウ」の確認試験を準用する。 （８）セッコウ　（略）必要に応じて,「セッコウ」の確認試験を準用する。	を準用する。 （５）キョウカツ　（略）また,「キョウカツ」の確認試験を準用する。 （７）キキョウ　（略）また,「キキョウ」の確認試験を準用する。 （８）セッコウ　（略）また,「セッコウ」の確認試験を準用する。
233	K40	荊芥連翹湯	（２）ケイガイ　（略）必要に応じて,「ケイガイ」の確認試験を準用する。 （３）シャクヤク　（略）必要に応じて,「シャクヤク」の確認試験を準用する。 （６）ハッカ　（略）必要に応じて,「ハッカ」の確認試験を準用する。 （８）キジツ　（略）必要に応じて,「キジツ」の確認試験を準用する。 （９）オウレン　（略）必要に応じて,「オウレン」の確認試験を準用する。 （11）オウゴン　（略）必要に応じて,「オウゴン」の確認試験を準用する。 （12）ビャクシ　（略）必要に応じて,「ビャクシ」の確認試験を準用する。 （13）オウバク　（略）必要に応じて,「オウバク」の確	（２）ケイガイ　（略）また,「ケイガイ」の確認試験を準用する。 （３）シャクヤク　（略）また,「シャクヤク」の確認試験を準用する。 （６）ハッカ　（略）また,「ハッカ」の確認試験を準用する。 （８）キジツ　（略）また,「キジツ」の確認試験を準用する。 （９）オウレン　（略）また,「オウレン」の確認試験を準用する。 （11）オウゴン　（略）また,「オウゴン」の確認試験を準用する。 （12）ビャクシ　（略）また,「ビャクシ」の確認試験を準用する。 （13）オウバク　（略）また,「オウバク」の確認試験

			認試験を準用する。 （14）キキョウ　（略）必要に応じて,「キキョウ」の確認試験を準用する。 （15）サンシシ　（略）必要に応じて,「サンシシ」の確認試験を準用する。 （16）サイコ　（略）必要に応じて,「サイコ」の確認試験を準用する。 （17）レンギョウ　（略）必要に応じて,「レンギョウ」の確認試験を準用する。	を準用する。 （14）キキョウ　（略）また,「キキョウ」の確認試験を準用する。 （15）サンシシ　（略）また,「サンシシ」の確認試験を準用する。 （16）サイコ　（略）また,「サイコ」の確認試験を準用する。 （17）レンギョウ　（略）また,「レンギョウ」の確認試験を準用する。
234	K41	桂枝加黄耆湯	（２）シャクヤク　（略）必要に応じて,「シャクヤク」の確認試験を準用する。	（２）シャクヤク　（略）また,「シャクヤク」の確認試験を準用する。
235	K42	桂枝加葛根湯	（２）シャクヤク　（略）必要に応じて,「シャクヤク」の確認試験を準用する。	（２）シャクヤク　（略）また,「シャクヤク」の確認試験を準用する。
236	K43	桂枝加厚朴杏仁湯	（２）シャクヤク　（略）必要に応じて,「シャクヤク」の確認試験を準用する。 （５）コウボク　（略）必要に応じて,「コウボク」の確認試験を準用する。 （６）キョウニン　（略）必要に応じて,「キョウニン」の確認試験を準用する。	（２）シャクヤク　（略）また,「シャクヤク」の確認試験を準用する。 （５）コウボク　（略）また,「コウボク」の確認試験を準用する。 （６）キョウニン　（略）また,「キョウニン」の確認試験を準用する。
237	K44	桂枝加芍薬生姜人参湯	（３）シャクヤク　（略）必要に応じて,「シャクヤク」の確認試験を準用する。	（３）シャクヤク　（略）また,「シャクヤク」の確認試験を準用する。

			（６）ニンジン　（略）必要に応じて,「ニンジン」の確認試験を準用する。	（６）ニンジン　（略）また,「ニンジン」の確認試験を準用する。
238	K45	桂枝加芍薬大黄湯	（２）シャクヤク　（略）必要に応じて,「シャクヤク」の確認試験を準用する。 （６）ダイオウ　（略）必要に応じて,「ダイオウ」の確認試験を準用する。	（２）シャクヤク　（略）また,「シャクヤク」の確認試験を準用する。 （６）ダイオウ　（略）また,「ダイオウ」の確認試験を準用する。
239	K46	桂枝加芍薬湯	（４）　（略）必要に応じて,「シャクヤク」の確認試験を準用する。	（４）シャクヤク　（略）また,「シャクヤク」の確認試験を準用する。
240	K47	桂枝加朮附湯	（２）シャクヤク　（略）必要に応じて,「シャクヤク」の確認試験を準用する。 （６）ビャクジュツ　（略）必要に応じて,「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。 （７）ブシ　（略）必要に応じて,「ブシ」の確認試験を準用する。	（２）シャクヤク　（略）また,「シャクヤク」の確認試験を準用する。 （６）ビャクジュツ　（略）また,「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。 （７）ブシ　（略）また,「ブシ」の確認試験を準用する。
241	K48	桂枝加竜骨牡蛎湯	（２）シャクヤク　（略）必要に応じて,「シャクヤク」の確認試験を準用する。 （６）リュウコツ　（略）必要に応じて,「リュウコツ」の確認試験を準用する。 （７）ボレイ　（略）必要に応じて,「ボレイ」の確認試験を準用する。	（２）シャクヤク　（略）また,「シャクヤク」の確認試験を準用する。 （６）リュウコツ　（略）また,「リュウコツ」の確認試験を準用する。 （７）ボレイ　（略）また,「ボレイ」の確認試験を準用する。
242	K49	桂枝加苓朮附湯	（２）シャクヤク　（略）必要に応じて,「シャクヤク」の確認試験を準用する。 （６）ビャクジュツ　（略）必要に応じて,「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。 （７）ブシ　（略）必要に応じて,「ブシ」の確認試験を	（２）シャクヤク　（略）また,「シャクヤク」の確認試験を準用する。 （６）ビャクジュツ　（略）また,「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。 （７）ブシ　（略）また,「ブシ」の確認試験を準用す

			準用する。 （８）ブクリョウ　（略）必要に応じて,「ブクリョウ」の確認試験を準用する。	る。 （８）ブクリョウ　（略）また,「ブクリョウ」の確認試験を準用する。
243	K50	桂枝湯	（２）シャクヤク　（略）必要に応じて,「シャクヤク」の確認試験を準用する。	（２）シャクヤク　（略）また,「シャクヤク」の確認試験を準用する。
244	K51	桂枝人参湯	（２）ニンジン　（略）必要に応じて,「ニンジン」の確認試験を準用する。 （３）ビャクジュツ　（略）必要に応じて,「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。 （５）カンキョウ　（略）必要に応じて,「カンキョウ」の確認試験を準用する。	（２）ニンジン　（略）また,「ニンジン」の確認試験を準用する。 （３）ビャクジュツ　（略）また,「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。 （５）カンキョウ　（略）また,「カンキョウ」の確認試験を準用する。
245	K52	桂枝茯苓丸料	（２）ブクリョウ　（略）必要に応じて,「ブクリョウ」の確認試験を準用する。 （３）ボタンピ　（略）必要に応じて,「ボタンピ」の確認試験を準用する。 （４）トウニン　（略）必要に応じて,「トウニン」の確認試験を準用する。 （５）シャクヤク　（略）必要に応じて,「シャクヤク」の確認試験を準用する。	（２）ブクリョウ　（略）また,「ブクリョウ」の確認試験を準用する。 （３）ボタンピ　（略）また,「ボタンピ」の確認試験を準用する。 （４）トウニン　（略）また,「トウニン」の確認試験を準用する。 （５）シャクヤク　（略）また,「シャクヤク」の確認試験を準用する。
247	K53	桂枝茯苓丸料加薏苡仁	（２）ブクリョウ　（略）必要に応じて,「ブクリョウ」の確認試験を準用する。 （３）ボタンピ　（略）必要に応じて,「ボタンピ」の確認試験を準用する。 （４）トウニン　（略）必要に応じて,「トウニン」の確認試験を準用する。	（２）ブクリョウ　（略）また,「ブクリョウ」の確認試験を準用する。 （３）ボタンピ　（略）また,「ボタンピ」の確認試験を準用する。 （４）トウニン　（略）また,「トウニン」の確認試験を準用する。

			（５）シャクヤク　（略）必要に応じて,「シャクヤク」の確認試験を準用する。 （６）ヨクイニン　（略）必要に応じて,「ヨクイニン」の確認試験を準用する。	（５）シャクヤク （６）ヨクイニン　（略）また,「ヨクイニン」の確認試験を準用する。
248	K54	啓脾湯	（１）ニンジン　（略）必要に応じて,「ニンジン」の確認試験を準用する。 （２）ビャクジュツ　（略）必要に応じて,「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。 （３）ブクリョウ　（略）必要に応じて,「ブクリョウ」の確認試験を準用する。 （４）レンニク　（略）必要に応じて,「レンニク」の確認試験を準用する。 （５）サンヤク　（略）必要に応じて,「サンヤク」の確認試験を準用する。 （６）サンザシ　（略）必要に応じて,「サンザシ」の確認試験を準用する。 （７）チンピ　（略）必要に応じて,「チンピ」の確認試験を準用する。	（１）ニンジン　（略）また,「ニンジン」の確認試験を準用する。 （２）ビャクジュツ　（略）また,「ビ（略）また,「シャクヤク」の確認試験を準用する。ャクジュツ」の確認試験を準用する。 （３）ブクリョウ　（略）また,「ブクリョウ」の確認試験を準用する。 （４）レンニク　（略）また,「レンニク」の確認試験を準用する。 （５）サンヤク　（略）また,「サンヤク」の確認試験を準用する。 （６）サンザシ　（略）また,「サンザシ」の確認試験を準用する。 （７）チンピ　（略）また,「チンピ」の確認試験を準用する。
249	K55	荊防敗毒散料	（１）ブクリョウ　（略）必要に応じて,「ブクリョウ」の確認試験を準用する。 （２）ニンジン　（略）必要に応じて,「ニンジン」の確認試験を準用する。 （３）ケイガイ　（略）必要に応じて,「ケイガイ」の確認試験を準用する。	（１）ブクリョウ　（略）また,「ブクリョウ」の確認試験を準用する。 （２）ニンジン　（略）また,「ニンジン」の確認試験を準用する。 （３）ケイガイ　（略）また,「ケイガイ」の確認試験を準用する。

			（５）サイコ　（略）必要に応じて,「サイコ」の確認試験を準用する。 （６）レンギョウ　（略）必要に応じて,「レンギョウ」の確認試験を準用する。 （７）キキョウ　（略）必要に応じて,「キキョウ」の確認試験を準用する。 （８）キジツ　（略）必要に応じて,「キジツ」の確認試験を準用する。 （12）キョウカツ　（略）必要に応じて,「キョウカツ」の確認試験を準用する。 （13）ドクカツ　（略）必要に応じて,「ドクカツ」の確認試験を準用する。 （14）ゼンコ　（略）必要に応じて,「ゼンコ」の確認試験を準用する。 （15）キンギンカ　（略）必要に応じて,「局外生規キンギンカ」の確認試験を準用する。	（５）サイコ　（略）また,「サイコ」の確認試験を準用する。 （６）レンギョウ　（略）また,「レンギョウ」の確認試験を準用する。 （７）キキョウ　（略）また,「キキョウ」の確認試験を準用する。 （８）キジツ　（略）また,「キジツ」の確認試験を準用する。 （12）キョウカツ　（略）また,「キョウカツ」の確認試験を準用する。 （13）ドクカツ　（略）また,「ドクカツ」の確認試験を準用する。 （14）ゼンコ　（略）また,「ゼンコ」の確認試験を準用する。 （15）キンギンカ　（略）また, 局外生規「キンギンカ」の確認試験を準用する。
250	K56	桂麻各半湯	（２）シャクヤク　（略）必要に応じて,「シャクヤク」の確認試験を準用する。 （５）マオウ　（略）必要に応じて,「マオウ」の確認試験を準用する。 （７）キョウニン　（略）必要に応じて,「キョウニン」	（２）シャクヤク　（略）また,「シャクヤク」の確認試験を準用する。 （５）マオウ　（略）また,「マオウ」の確認試験を準用する。 （７）キョウニン　（略）また,「キョウニン」の確認

			の確認試験を準用する。	試験を準用する。
251	K57	鶏鳴散料加茯苓	（1）ビンロウジ　（略）必要に応じて,「ビンロウジ」の確認試験を準用する。 （2）ブクリョウ　（略）必要に応じて,「ブクリョウ」の確認試験を準用する。 （3）モッカ　（略）必要に応じて，局外生規「モッカ」の確認試験を準用する。 （4）キッピ　（略）必要に応じて，局外生規「キッピ」の確認試験を準用する。 （5）キキョウ　（略）必要に応じて,「キキョウ」の確認試験を準用する。 （6）ゴシュユ　（略）必要に応じて,「ゴシュユ」の確認試験を準用する。 （7）ソヨウ　（略）必要に応じて,「ソヨウ」の確認試験を準用する。	（1）ビンロウジ　（略）また,「ビンロウジ」の確認試験を準用する。 （2）ブクリョウ　（略）また,「ブクリョウ」の確認試験を準用する。 （3）モッカ　（略）また，局外生規「モッカ」の確認試験を準用する。 （4）キッピ　（略）また，局外生規「キッピ」の確認試験を準用する。 （5）キキョウ　（略）また,「キキョウ」の確認試験を準用する。 （6）ゴシュユ　（略）また,「ゴシュユ」の確認試験を準用する。 （7）ソヨウ　（略）また,「ソヨウ」の確認試験を準用する。
252	K58	堅中湯	（2）ブクリョウ　（略）必要に応じて,「ブクリョウ」の確認試験を準用する。 （5）シャクヤク　（略）必要に応じて,「シャクヤク」の確認試験を準用する。 （7）カンキョウ　（略）必要に応じて,「カンキョウ」の確認試験を準用する。	（2）ブクリョウ　（略）また,「ブクリョウ」の確認試験を準用する。 （5）シャクヤク　（略）また,「シャクヤク」の確認試験を準用する。 （7）カンキョウ　（略）また,「カンキョウ」の確認試験を準用する。
253	K59	甲字湯	（2）ブクリョウ　（略）必要に応じて,「ブクリョウ」の確認試験を準用する。 （3）ボタンピ　（略）必要に応じて,「ボタンピ」の確認試験を準用する。	（2）ブクリョウ　（略）また,「ブクリョウ」の確認試験を準用する。 （3）ボタンピ　（略）また,「ボタンピ」の確認試験を準用する。

			（4）トウニン　（略）必要に応じて,「トウニン」の確認試験を準用する。 （5）シャクヤク　（略）必要に応じて,「シャクヤク」の確認試験を準用する。	（4）トウニン　（略）また,「トウニン」の確認試験を準用する。 （5）シャクヤク　（略）また,「シャクヤク」の確認試験を準用する。
254	K60	香砂平胃散料	（2）コウボク　（略）必要に応じて,「コウボク」の確認試験を準用する。 （3）チンピ　（略）必要に応じて,「チンピ」の確認試験を準用する。 （9）カッコウ　（略）必要に応じて,「カッコウ」の確認試験を準用する。	（2）コウボク　（略）また,「コウボク」の確認試験を準用する。 （3）チンピ　（略）また,「チンピ」の確認試験を準用する。 （9）カッコウ　（略）また,「カッコウ」の確認試験を準用する。
255	K61	香砂平胃散料	（1）ビャクジュツ　（略）必要に応じて,「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。 （2）ブクリョウ　（略）必要に応じて,「ブクリョウ」の確認試験を準用する。 （4）コウボク　（略）必要に応じて,「コウボク」の確認試験を準用する。 （5）チンピ　（略）必要に応じて,「チンピ」の確認試験を準用する。 （8）ニンジン　（略）必要に応じて,「ニンジン」の確認試験を準用する。	（1）ビャクジュツ　（略）また,「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。 （2）ブクリョウ　（略）また,「ブクリョウ」の確認試験を準用する。 （4）コウボク　（略）また,「コウボク」の確認試験を準用する。 （5）チンピ　（略）また,「チンピ」の確認試験を準用する。 （8）ニンジン　（略）また,「ニンジン」の確認試験を準用する。
256	K62	香砂六君子湯	（1）ニンジン　（略）必要に応じて,「ニンジン」の確認試験を準用する。 （2）ビャクジュツ　（略）必要に応じて,「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。 （3）ブクリョウ　（略）必要に応じて,「ブクリョウ」	（1）ニンジン　（略）また,「ニンジン」の確認試験を準用する。 （2）ビャクジュツ　（略）また,「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。 （3）ブクリョウ　（略）また,「ブクリョウ」の確認

			の確認試験を準用する。 （５）チンピ　（略）必要に応じて,「チンピ」の確認試験を準用する。 （11）カッコウ　（略）必要に応じて,「カッコウ」の確認試験を準用する。	試験を準用する。 （５）チンピ　（略）また,「チンピ」の確認試験を準用する。 （11）カッコウ　（略）また,「カッコウ」の確認試験を準用する。
257	K63	香蘇散料	（２）ソヨウ　（略）必要に応じて,「ソヨウ」の確認試験を準用する。 （３）チンピ　（略）必要に応じて,「チンピ」の確認試験を準用する。	（２）ソヨウ　（略）また,「ソヨウ」の確認試験を準用する。 （３）チンピ　（略）また,「チンピ」の確認試験を準用する。
259	K64	厚朴生姜半夏人参甘草湯	（１）コウボク　（略）必要に応じて,「コウボク」の確認試験を準用する。 （４）ニンジン　（略）必要に応じて,「ニンジン」の確認試験を準用する。	（１）コウボク　（略）また,「コウボク」の確認試験を準用する。 （４）ニンジン　（略）また,「ニンジン」の確認試験を準用する。
260	K65	五虎湯	（１）マオウ　（略）必要に応じて,「マオウ」の確認試験を準用する。 （２）キョウニン　（略）必要に応じて,「キョウニン」の確認試験を準用する。 （３）セッコウ　（略）必要に応じて,「セッコウ」の確認試験を準用する。 （５）ソウハクヒ　（略）必要に応じて,「ソウハクヒ」の確認試験を準用する。	（１）マオウ　（略）また,「マオウ」の確認試験を準用する。 （２）キョウニン　（略）また,「キョウニン」の確認試験を準用する。 （３）セッコウ　（略）また,「セッコウ」の確認試験を準用する。 （５）ソウハクヒ　（略）また,「ソウハクヒ」の確認試験を準用する。
261	K66	牛膝散料	（１）ゴシツ　（略）必要に応じて,「ゴシツ」の確認試験を準用する。 （３）シャクヤク　（略）必要に応じて,「シャクヤク」の確認試験を準用する。	（１）ゴシツ　（略）また,「ゴシツ」の確認試験を準用する。 （３）シャクヤク　（略）また,「シャクヤク」の確認試験を準用する。

			（4）トウニン　（略）必要に応じて,「トウニン」の確認試験を準用する。 （6）ボタンピ　（略）必要に応じて,「ボタンピ」の確認試験を準用する。 （7）エンゴサク　（略）必要に応じて,「エンゴサク」の確認試験を準用する。	（4）トウニン　（略）また,「トウニン」の確認試験を準用する。 （6）ボタンピ　（略）また,「ボタンピ」の確認試験を準用する。 （7）エンゴサク　（略）また,「エンゴサク」の確認試験を準用する。
262	K67	五積散料	（1）ブクリョウ　（略）必要に応じて,「ブクリョウ」の確認試験を準用する。 （2）ビャクジュツ　（略）必要に応じて,「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。 （3）チンピ　（略）必要に応じて,「チンピ」の確認試験を準用する。 （6）シャクヤク　（略）必要に応じて,「シャクヤク」の確認試験を準用する。 （8）コウボク　（略）必要に応じて,「コウボク」の確認試験を準用する。 （9）ビャクシ　（略）必要に応じて,「ビャクシ」の確認試験を準用する。 （10）キジツ　（略）必要に応じて,「キジツ」の確認試験を準用する。 （11）キキョウ　（略）必要に応じて,「キキョウ」の確認試験を準用する。	（1）ブクリョウ　（略）また,「ブクリョウ」の確認試験を準用する。 （2）ビャクジュツ　（略）また,「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。 （3）チンピ　（略）また,「チンピ」の確認試験を準用する。 （6）シャクヤク　（略）また,「シャクヤク」の確認試験を準用する。 （8）コウボク　（略）また,「コウボク」の確認試験を準用する。 （9）ビャクシ　（略）また,「ビャクシ」の確認試験を準用する。 （10）キジツ　（略）また,「キジツ」の確認試験を準用する。 （11）キキョウ　（略）また,「キキョウ」の確認試験を準用する。

			（14）マオウ　（略）必要に応じて,「マオウ」の確認試験を準用する。	（14）マオウ　（略）また,「マオウ」の確認試験を準用する。
263	K68	牛車腎気丸料	（３）サンヤク　（略）必要に応じて,「サンヤク」の確認試験を準用する。 （５）ブクリョウ　（略）必要に応じて,「ブクリョウ」の確認試験を準用する。 （６）ボタンピ　（略）必要に応じて,「ボタンピ」の確認試験を準用する。 （８）ゴシツ　（略）必要に応じて,「ゴシツ」の確認試験を準用する。 （９）シャゼンシ　（略）必要に応じて,「シャゼンシ」の確認試験を準用する。 （10）ブシ　（略）必要に応じて,「ブシ」の確認試験を準用する。	（３）サンヤク　（略）また,「サンヤク」の確認試験を準用する。 （５）ブクリョウ　（略）また,「ブクリョウ」の確認試験を準用する。 （６）ボタンピ　（略）また,「ボタンピ」の確認試験を準用する。 （８）ゴシツ　（略）また,「ゴシツ」の確認試験を準用する。 （９）シャゼンシ　（略）また,「シャゼンシ」の確認試験を準用する。 （10）ブシ　（略）また,「ブシ」の確認試験を準用する。
264	K69	呉茱萸湯	（１）ゴシュユ　（略）必要に応じて,「ゴシュユ」の確認試験を準用する。 （２）ニンジン　（略）必要に応じて,「ニンジン」の確認試験を準用する。	（１）ゴシュユ　（略）また,「ゴシュユ」の確認試験を準用する。 （２）ニンジン　（略）また,「ニンジン」の確認試験を準用する。
265	K70	五物解毒散料	（２）ジュウヤク　（略）必要に応じて,「ジュウヤク」の確認試験を準用する。 （３）ケイガイ　（略）必要に応じて,「ケイガイ」の確認試験を準用する。 （４）ダイオウ　（略）必要に応じて,「ダイオウ」の確	（２）ジュウヤク　（略）また,「ジュウヤク」の確認試験を準用する。 （３）ケイガイ　（略）また,「ケイガイ」の確認試験を準用する。 （４）ダイオウ　（略）また,「ダイオウ」の確認試験

			認試験を準用する。 （５）キンギンカ　（略）必要に応じて，局外生規「キンギンカ」の確認試験を準用する。	を準用する。 （５）キンギンカ　（略）また，局外生規「キンギンカ」の確認試験を準用する。
266	K71	五淋散料	（１）ブクリョウ　（略）必要に応じて，「ブクリョウ」の確認試験を準用する。 （３）オウゴン　（略）必要に応じて，「オウゴン」の確認試験を準用する。 （５）シャクヤク　（略）必要に応じて，「シャクヤク」の確認試験を準用する。 （６）サンシシ　（略）必要に応じて，「サンシシ」の確認試験を準用する。	（１）ブクリョウ　（略）また，「ブクリョウ」の確認試験を準用する。 （３）オウゴン　（略）また，「オウゴン」の確認試験を準用する。 （５）シャクヤク　（略）また，「シャクヤク」の確認試験を準用する。 （６）サンシシ　（略）また，「サンシシ」の確認試験を準用する。
267	K72	五苓散料	（１）チョレイ　（略）必要に応じて，「チョレイ」の確認試験を準用する。 （２）ブクリョウ　（略）必要に応じて，「ブクリョウ」の確認試験を準用する。 （５）ビャクジュツ　（略）必要に応じて，「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。	（１）チョレイ　（略）また，「チョレイ」の確認試験を準用する。 （２）ブクリョウ　（略）また，「ブクリョウ」の確認試験を準用する。 （５）ビャクジュツ　（略）また，「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。
269	K73	柴陥湯	（１）サイコ　（略）必要に応じて，「サイコ」の確認試験を準用する。 （３）オウゴン　（略）必要に応じて，「オウゴン」の確認試験を準用する。 （５）ニンジン　（略）必要に応じて，「ニンジン」の確認試験を準用する。 （８）オウレン　（略）必要に応じて，「オウレン」の確認試験を準用する。	（１）サイコ　（略）また，「サイコ」の確認試験を準用する。 （３）オウゴン　（略）また，「オウゴン」の確認試験を準用する。 （５）ニンジン　（略）また，「ニンジン」の確認試験を準用する。 （８）オウレン　（略）また，「オウレン」の確認試験を準用する。

			（9）カロニン　（略）必要に応じて，局外生規「カロニン」の確認試験を準用する。	（9）カロニン　（略）また，局外生規「カロニン」の確認試験を準用する。
270	K74	柴胡加竜骨牡蛎湯	（1）サイコ　（略）必要に応じて，「サイコ」の確認試験を準用する。 （3）ブクリョウ　（略）必要に応じて，「ブクリョウ」の確認試験を準用する。 （6）ニンジン　（略）必要に応じて，「ニンジン」の確認試験を準用する。 （7）リュウコツ　（略）必要に応じて，「リュウコツ」の確認試験を準用する。 （8）ボレイ　（略）必要に応じて，「ボレイ」の確認試験を準用する。 （10）ダイオウ　（略）必要に応じて，「ダイオウ」の確認試験を準用する。	（1）サイコ　（略）また，「サイコ」の確認試験を準用する。 （3）ブクリョウ　（略）また，「ブクリョウ」の確認試験を準用する。 （6）ニンジン　（略）また，「ニンジン」の確認試験を準用する。 （7）リュウコツ　（略）また，「リュウコツ」の確認試験を準用する。 （8）ボレイ　（略）また，「ボレイ」の確認試験を準用する。 （10）ダイオウ　（略）また，「ダイオウ」の確認試験を準用する。
271	K74-①	柴胡加竜骨牡蛎湯（黄芩）	（1）サイコ　（略）必要に応じて，「サイコ」の確認試験を準用する。 （3）ブクリョウ　（略）必要に応じて，「ブクリョウ」の確認試験を準用する。 （5）オウゴン　（略）必要に応じて，「オウゴン」の確認試験を準用する。 （7）ニンジン　（略）必要に応じて，「ニンジン」の確認試験を準用する。 （8）リュウコツ　（略）必要に応じて，「リュウコツ」の確認試験を準用する。	（1）サイコ　（略）また，「サイコ」の確認試験を準用する。 （3）ブクリョウ　（略）また，「ブクリョウ」の確認試験を準用する。 （5）オウゴン　（略）また，「オウゴン」の確認試験を準用する。 （7）ニンジン　（略）また，「ニンジン」の確認試験を準用する。 （8）リュウコツ　（略）また，「リュウコツ」の確認試験を準用する。

			（9）ボレイ　（略）必要に応じて,「ボレイ」の確認試験を準用する。 （11）ダイオウ　（略）必要に応じて,「ダイオウ」の確認試験を準用する。	（9）ボレイ　（略）また,「ボレイ」の確認試験を準用する。 （11）ダイオウ　（略）また,「ダイオウ」の確認試験を準用する。
272	K75	柴胡桂枝乾姜湯	（1）サイコ　（略）必要に応じて,「サイコ」の確認試験を準用する。 （4）オウゴン　（略）必要に応じて,「オウゴン」の確認試験を準用する。 （5）ボレイ　（略）必要に応じて,「ボレイ」の確認試験を準用する。 （6）カンキョウ　（略）必要に応じて,「カンキョウ」の確認試験を準用する。	（1）サイコ　（略）また,「サイコ」の確認試験を準用する。 （4）オウゴン　（略）また,「オウゴン」の確認試験を準用する。 （5）ボレイ　（略）また,「ボレイ」の確認試験を準用する。 （6）カンキョウ　（略）また,「カンキョウ」の確認試験を準用する。
273	K76	柴胡桂枝湯	（1）サイコ　（略）必要に応じて,「サイコ」の確認試験を準用する。 （4）シャクヤク　（略）必要に応じて,「シャクヤク」の確認試験を準用する。 （5）オウゴン　（略）必要に応じて,「オウゴン」の確認試験を準用する。 （6）ニンジン　（略）必要に応じて,「ニンジン」の確認試験を準用する。	（1）サイコ　（略）また,「サイコ」の確認試験を準用する。 （4）シャクヤク　（略）また,「シャクヤク」の確認試験を準用する。 （5）オウゴン　（略）また,「オウゴン」の確認試験を準用する。 （6）ニンジン　（略）また,「ニンジン」の確認試験を準用する。
274	K77	柴胡清肝湯	（1）サイコ　（略）必要に応じて,「サイコ」の確認試験を準用する。 （3）シャクヤク　（略）必要に応じて,「シャクヤク」の確認試験を準用する。	（1）サイコ　（略）また,「サイコ」の確認試験を準用する。 （3）シャクヤク　（略）また,「シャクヤク」の確認試験を準用する。

			（６）オウレン　（略）必要に応じて,「オウレン」の確認試験を準用する。 （７）オウゴン　（略）必要に応じて,「オウゴン」の確認試験を準用する。 （８）オウバク　（略）必要に応じて,「オウバク」の確認試験を準用する。 （９）サンシシ　（略）必要に応じて,「サンシシ」の確認試験を準用する。 （11）ハッカ　（略）必要に応じて,「ハッカ」の確認試験を準用する。 （13）レンギョウ　（略）必要に応じて,「レンギョウ」の確認試験を準用する。 （14）キキョウ　（略）必要に応じて,「キキョウ」の確認試験を準用する。 （15）ゴボウシ　（略）必要に応じて,「ゴボウシ」の確認試験を準用する。	（６）オウレン　（略）また,「オウレン」の確認試験を準用する。 （７）オウゴン　（略）また,「オウゴン」の確認試験を準用する。 （８）オウバク　（略）また,「オウバク」の確認試験を準用する。 （９）サンシシ　（略）また,「サンシシ」の確認試験を準用する。 （11）ハッカ　（略）また,「ハッカ」の確認試験を準用する。 （13）レンギョウ　（略）また,「レンギョウ」の確認試験を準用する。 （14）キキョウ　（略）また,「キキョウ」の確認試験を準用する。 （15）ゴボウシ　（略）また,「ゴボウシ」の確認試験を準用する。
275	K78	柴苓六君子湯	（１）ニンジン　（略）必要に応じて,「ニンジン」の確認試験を準用する。 （２）ビャクジュツ　（略）必要に応じて,「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。 （３）ブクリョウ　（略）必要に応じて,「ブクリョウ」の確認試験を準用する。 （５）チンピ　（略）必要に応じて,「チンピ」の確認試験を準用する。 （９）サイコ　（略）必要に応じて,「サイコ」の確認試	（１）ニンジン　（略）また,「ニンジン」の確認試験を準用する。 （２）ビャクジュツ　（略）また,「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。 （３）ブクリョウ　（略）また,「ブクリョウ」の確認試験を準用する。 （５）チンピ　（略）また,「チンピ」の確認試験を準用する。 （９）サイコ　（略）また,「サイコ」の確認試験を準

			験を準用する。 （10）シャクヤク　（略）必要に応じて,「シャクヤク」の確認試験を準用する。	用する。 （10）シャクヤク　（略）また,「シャクヤク」の確認試験を準用する。
276	K79	柴朴湯	（1）サイコ　（略）必要に応じて,「サイコ」の確認試験を準用する。 （4）オウゴン　（略）必要に応じて,「オウゴン」の確認試験を準用する。 （6）ニンジン　（略）必要に応じて,「ニンジン」の確認試験を準用する。 （8）ブクリョウ　（略）必要に応じて,「ブクリョウ」の確認試験を準用する。 （9）コウボク　（略）必要に応じて,「コウボク」の確認試験を準用する。 （10）ソヨウ　（略）必要に応じて,「ソヨウ」の確認試験を準用する。	（1）サイコ　（略）また,「サイコ」の確認試験を準用する。 （4）オウゴン　（略）また,「オウゴン」の確認試験を準用する。 （6）ニンジン　（略）また,「ニンジン」の確認試験を準用する。 （8）ブクリョウ　（略）また,「ブクリョウ」の確認試験を準用する。 （9）コウボク　（略）また,「コウボク」の確認試験を準用する。 （10）ソヨウ　（略）また,「ソヨウ」の確認試験を準用する。
277	K80	柴苓湯	（1）サイコ　（略）必要に応じて,「サイコ」の確認試験を準用する。 （4）オウゴン　（略）必要に応じて,「オウゴン」の確認試験を準用する。 （6）ニンジン　（略）必要に応じて,「ニンジン」の確認試験を準用する。 （9）チョレイ　（略）必要に応じて,「チョレイ」の確認試験を準用する。	（1）サイコ　（略）また,「サイコ」の確認試験を準用する。 （4）オウゴン　（略）また,「オウゴン」の確認試験を準用する。 （6）ニンジン　（略）また,「ニンジン」の確認試験を準用する。 （9）チョレイ　（略）また,「チョレイ」の確認試験を準用する。

			（10）ブクリョウ　（略）必要に応じて,「ブクリョウ」の確認試験を準用する。 （11）ビャクジュツ　（略）必要に応じて,「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。	（10）ブクリョウ　（略）また,「ブクリョウ」の確認試験を準用する。 （11）ビャクジュツ　（略）また,「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。
279	K82	三黄瀉心湯	（1）ダイオウ　（略）必要に応じて,「ダイオウ」の確認試験を準用する。 （2）オウゴン　（略）必要に応じて,「オウゴン」の確認試験を準用する。 （3）オウレン　（略）必要に応じて,「オウレン」の確認試験を準用する。	（1）ダイオウ　（略）また,「ダイオウ」の確認試験を準用する。 （2）オウゴン　（略）また,「オウゴン」の確認試験を準用する。 （3）オウレン　（略）また,「オウレン」の確認試験を準用する。
280	K83	酸棗仁湯	（1）サンソウニン　（略）必要に応じて,「サンソウニン」の確認試験を準用する。 （2）チモ　（略）必要に応じて,「チモ」の確認試験を準用する。 （4）ブクリョウ　（略）必要に応じて,「ブクリョウ」の確認試験を準用する。	（1）サンソウニン　（略）また,「サンソウニン」の確認試験を準用する。 （2）チモ　（略）また,「チモ」の確認試験を準用する。 （4）ブクリョウ　（略）また,「ブクリョウ」の確認試験を準用する。
281	K84	三物黄芩湯	（1）オウゴン　（略）必要に応じて,「オウゴン」の確認試験を準用する。 （2）クジン　（略）必要に応じて,「クジン」の確認試験を準用する。	（1）オウゴン　（略）また,「オウゴン」の確認試験を準用する。 （2）クジン　（略）また,「クジン」の確認試験を準用する。
282	K85	滋陰降火湯	（2）シャクヤク　（略）必要に応じて,「シャクヤク」の確認試験を準用する。 （4）テンモンドウ　（略）必要に応じて,「テンモンドウ」の確認試験を準用する。 （6）チンピ　（略）必要に応じて,「チンピ」の確認試	（2）シャクヤク　（略）また,「シャクヤク」の確認試験を準用する。 （4）テンモンドウ　（略）また,「テンモンドウ」の確認試験を準用する。 （6）チンピ　（略）また,「チンピ」の確認試験を準

			験を準用する。 （7）ビャクジュツ　（略）必要に応じて,「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。 （8）チモ　（略）必要に応じて,「チモ」の確認試験を準用する。 （9）オウバク　（略）必要に応じて,「オウバク」の確認試験を準用する。	用する。 （7）ビャクジュツ　（略）また,「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。 （8）チモ　（略）また,「チモ」の確認試験を準用する。 （9）オウバク　（略）また,「オウバク」の確認試験を準用する。
283	K86	滋陰至宝湯	（2）シャクヤク　（略）必要に応じて,「シャクヤク」の確認試験を準用する。 （3）ビャクジュツ　（略）必要に応じて,「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。 （4）ブクリョウ　（略）必要に応じて,「ブクリョウ」の確認試験を準用する。 （5）チンピ　（略）必要に応じて,「チンピ」の確認試験を準用する。 （6）サイコ　（略）必要に応じて,「サイコ」の確認試験を準用する。 （7）チモ　（略）必要に応じて,「チモ」の確認試験を準用する。 （9）ジコッピ　（略）必要に応じて,「ジコッピ」の確認試験を準用する。 （11）バイモ　（略）必要に応じて,「バイモ」の確認試験を準用する。	（2）シャクヤク　（略）また,「シャクヤク」の確認試験を準用する。 （3）ビャクジュツ　（略）また,「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。 （4）ブクリョウ　（略）また,「ブクリョウ」の確認試験を準用する。 （5）チンピ　（略）また,「チンピ」の確認試験を準用する。 （6）サイコ　（略）また,「サイコ」の確認試験を準用する。 （7）チモ　（略）また,「チモ」の確認試験を準用する。 （9）ジコッピ　（略）また,「ジコッピ」の確認試験を準用する。 （11）バイモ　（略）また,「バイモ」の確認試験を準用する。

			（12）ハッカ　（略）必要に応じて,「ハッカ」の確認試験を準用する。	（12）ハッカ　（略）また,「ハッカ」の確認試験を準用する。
285	K88	四逆散料	（1）サイコ　（略）必要に応じて,「サイコ」の確認試験を準用する。 （2）シャクヤク　（略）必要に応じて,「シャクヤク」の確認試験を準用する。 （3）キジツ　（略）必要に応じて,「キジツ」の確認試験を準用する。	（1）サイコ　（略）また,「サイコ」の確認試験を準用する。 （2）シャクヤク　（略）また,「シャクヤク」の確認試験を準用する。 （3）キジツ　（略）また,「キジツ」の確認試験を準用する。
287	K89	四君子湯	（1）ニンジン　（略）必要に応じて,「ニンジン」の確認試験を準用する。 （2）ビャクジュツ　（略）必要に応じて,「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。 （3）ブクリョウ　（略）必要に応じて,「ブクリョウ」の確認試験を準用する。	（1）ニンジン　（略）また,「ニンジン」の確認試験を準用する。 （2）ビャクジュツ　（略）また,「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。 （3）ブクリョウ　（略）また,「ブクリョウ」の確認試験を準用する。
288	K90	七物降下湯	（2）シャクヤク　（略）必要に応じて,「シャクヤク」の確認試験を準用する。 （6）オウバク　（略）必要に応じて,「オウバク」の確認試験を準用する。 （7）チョウトウコウ　（略）必要に応じて,「チョウトウコウ」の確認試験を準用する。	（2）シャクヤク　（略）また,「シャクヤク」の確認試験を準用する。 （6）オウバク　（略）また,「オウバク」の確認試験を準用する。 （7）チョウトウコウ　（略）また,「チョウトウコウ」の確認試験を準用する。
289	K91	柿蒂湯	（1）チョウジ　（略）必要に応じて,「チョウジ」の確認試験を準用する。 （3）シテイ　（略）必要に応じて, 局外生規「シテイ」の確認試験を準用する。	（1）チョウジ　（略）また,「チョウジ」の確認試験を準用する。 （3）シテイ　（略）また, 局外生規「シテイ」の確認試験を準用する。

290	K92	四物湯	（2）シャクヤク　（略）必要に応じて,「シャクヤク」の確認試験を準用する。	（2）シャクヤク　（略）また,「シャクヤク」の確認試験を準用する。
291	K93	炙甘草湯	（5）ニンジン　（略）必要に応じて,「ニンジン」の確認試験を準用する。 （8）マシニン　（略）必要に応じて,「マシニン」の確認試験を準用する。	（5）ニンジン　（略）また,「ニンジン」の確認試験を準用する。 （8）マシニン　（略）また,「マシニン」の確認試験を準用する。
292	K94	芍薬甘草湯	（1）シャクヤク　（略）必要に応じて,「シャクヤク」の確認試験を準用する。	（1）シャクヤク　（略）また,「シャクヤク」の確認試験を準用する。
293	K95	鷓鴣菜湯	（1）マクリ　（略）必要に応じて,「マクリ」の確認試験を準用する。 （2）ダイオウ　（略）必要に応じて,「ダイオウ」の確認試験を準用する。	（1）マクリ　（略）また,「マクリ」の確認試験を準用する。 （2）ダイオウ　（略）また,「ダイオウ」の確認試験を準用する。
294	K96	十全大補湯	（1）ニンジン　（略）必要に応じて,「ニンジン」の確認試験を準用する。 （3）ビャクジュツ　（略）必要に応じて,「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。 （4）ブクリョウ　（略）必要に応じて,「ブクリョウ」の確認試験を準用する。 （6）シャクヤク　（略）必要に応じて,「シャクヤク」の確認試験を準用する。	（1）ニンジン　（略）また,「ニンジン」の確認試験を準用する。 （3）ビャクジュツ　（略）また,「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。 （4）ブクリョウ　（略）また,「ブクリョウ」の確認試験を準用する。 （6）シャクヤク　（略）また,「シャクヤク」の確認試験を準用する。
295	K97	十味敗毒湯	（1）サイコ　（略）必要に応じて,「サイコ」の確認試験を準用する。 （2）オウヒ　（略）必要に応じて,「オウヒ」の確認試験を準用する。 （3）キキョウ　（略）必要に応じて,「キキョウ」の確	（1）サイコ　（略）また,「サイコ」の確認試験を準用する。 （2）オウヒ　（略）また,「オウヒ」の確認試験を準用する。 （3）キキョウ　（略）また,「キキョウ」の確認試験

			認試験を準用する。 （５）ブクリョウ　（略）必要に応じて,「ブクリョウ」の確認試験を準用する。 （６）ドクカツ　（略）必要に応じて,「ドクカツ」の確認試験を準用する。 （10）ケイガイ　（略）必要に応じて,「ケイガイ」の確認試験を準用する。	を準用する。 （５）ブクリョウ　（略）また,「ブクリョウ」の確認試験を準用する。 （６）ドクカツ　（略）また,「ドクカツ」の確認試験を準用する。 （10）ケイガイ　（略）また,「ケイガイ」の確認試験を準用する。
296	K98	潤腸湯	（３）トウニン　（略）必要に応じて,「トウニン」の確認試験を準用する。 （４）キョウニン　（略）必要に応じて,「キョウニン」の確認試験を準用する。 （５）キジツ　（略）必要に応じて,「キジツ」の確認試験を準用する。 （６）オウゴン　（略）必要に応じて,「オウゴン」の確認試験を準用する。 （７）コウボク　（略）必要に応じて,「コウボク」の確認試験を準用する。 （８）ダイオウ　（略）必要に応じて,「ダイオウ」の確認試験を準用する。 （10）マシニン　（略）必要に応じて,「マシニン」の確認試験を準用する。	（３）トウニン　（略）また,「トウニン」の確認試験を準用する。 （４）キョウニン　（略）また,「キョウニン」の確認試験を準用する。 （５）キジツ　（略）また,「キジツ」の確認試験を準用する。 （６）オウゴン　（略）また,「オウゴン」の確認試験を準用する。 （７）コウボク　（略）また,「コウボク」の確認試験を準用する。 （８）ダイオウ　（略）また,「ダイオウ」の確認試験を準用する。 （10）マシニン　（略）また,「マシニン」の確認試験を準用する。
297	K99	生姜瀉心湯	（２）ニンジン　（略）必要に応じて,「ニンジン」の確認試験を準用する。	（２）ニンジン　（略）また,「ニンジン」の確認試験を準用する。

			（３）オウゴン　（略）必要に応じて,「オウゴン」の確認試験を準用する。 （６）オウレン　（略）必要に応じて,「オウレン」の確認試験を準用する。 （７）カンキョウ　（略）必要に応じて,「カンキョウ」の確認試験を準用する。	（３）オウゴン　（略）また,「オウゴン」の確認試験を準用する。 （６）オウレン　（略）また,「オウレン」の確認試験を準用する。 （７）カンキョウ　（略）また,「カンキョウ」の確認試験を準用する。
298	K100	小建中湯	（４）シャクヤク　（略）必要に応じて,「シャクヤク」の確認試験を準用する。	（４）シャクヤク　（略）また,「シャクヤク」の確認試験を準用する。
299	K101	小柴胡湯	（１）サイコ　（略）必要に応じて,「サイコ」の確認試験を準用する。 （３）オウゴン　（略）必要に応じて,「オウゴン」の確認試験を準用する。 （４）ニンジン　（略）必要に応じて,「ニンジン」の確認試験を準用する。	（１）サイコ　（略）また,「サイコ」の確認試験を準用する。 （３）オウゴン　（略）また,「オウゴン」の確認試験を準用する。 （４）ニンジン　（略）また,「ニンジン」の確認試験を準用する。
300	K101-①	小柴胡湯（竹参）	（１）サイコ　（略）必要に応じて,「サイコ」の確認試験を準用する。 （３）オウゴン　（略）必要に応じて,「オウゴン」の確認試験を準用する。 （４）チクセツニンジン　（略）必要に応じて,「チクセツニンジン」の確認試験を準用する。	（１）サイコ　（略）また,「サイコ」の確認試験を準用する。 （３）オウゴン　（略）また,「オウゴン」の確認試験を準用する。 （４）チクセツニンジン　（略）また,「チクセツニンジン」の確認試験を準用する。
301	K102	小柴胡湯加桔梗石膏	（１）サイコ　（略）必要に応じて,「サイコ」の確認試験を準用する。 （３）オウゴン　（略）必要に応じて,「オウゴン」の確認試験を準用する。 （５）ニンジン　（略）必要に応じて,「ニンジン」の確	（１）サイコ　（略）また,「サイコ」の確認試験を準用する。 （３）オウゴン　（略）また,「オウゴン」の確認試験を準用する。 （５）ニンジン　（略）また,「ニンジン」の確認試験

			認試験を準用する。 （８）キキョウ　（略）必要に応じて,「キキョウ」の確認試験を準用する。 （９）セッコウ　（略）必要に応じて,「セッコウ」の確認試験を準用する。	を準用する。 （８）キキョウ　（略）また,「キキョウ」の確認試験を準用する。 （９）セッコウ　（略）また,「セッコウ」の確認試験を準用する。
302	K103	小承気湯	（１）ダイオウ　（略）必要に応じて,「ダイオウ」の確認試験を準用する。 （２）キジツ　（略）必要に応じて,「キジツ」の確認試験を準用する。 （３）コウボク　（略）必要に応じて,「コウボク」の確認試験を準用する。	（１）ダイオウ　（略）また,「ダイオウ」の確認試験を準用する。 （２）キジツ　（略）また,「キジツ」の確認試験を準用する。 （３）コウボク　（略）また,「コウボク」の確認試験を準用する。
303	K104	小青竜湯	（１）マオウ　（略）必要に応じて,「マオウ」の確認試験を準用する。 （２）シャクヤク　（略）必要に応じて,「シャクヤク」の確認試験を準用する。 （３）カンキョウ　（略）必要に応じて,「カンキョウ」の確認試験を準用する。	（１）マオウ　（略）また,「マオウ」の確認試験を準用する。 （２）シャクヤク　（略）また,「シャクヤク」の確認試験を準用する。 （３）カンキョウ　（略）また,「カンキョウ」の確認試験を準用する。
304	K105	小青竜湯加石膏	（１）マオウ　（略）必要に応じて,「マオウ」の確認試験を準用する。 （２）シャクヤク　（略）必要に応じて,「シャクヤク」の確認試験を準用する。 （３）カンキョウ　（略）必要に応じて,「カンキョウ」の確認試験を準用する。 （９）セッコウ　（略）必要に応じて,「セッコウ」の確認試験を準用する。	（１）マオウ　（略）また,「マオウ」の確認試験を準用する。 （２）シャクヤク　（略）また,「シャクヤク」の確認試験を準用する。 （３）カンキョウ　（略）また,「カンキョウ」の確認試験を準用する。 （９）セッコウ　（略）また,「セッコウ」の確認試験を準用する。

305	K106	小青竜湯加杏仁石膏（小青竜湯合麻杏甘石湯）	（1）マオウ　（略）必要に応じて，「マオウ」の確認試験を準用する。 （2）シャクヤク　（略）必要に応じて，「シャクヤク」の確認試験を準用する。 （3）カンキョウ　（略）必要に応じて，「カンキョウ」の確認試験を準用する。 （9）キョウニン　（略）必要に応じて，「キョウニン」の確認試験を準用する。 （10）セッコウ　（略）必要に応じて，「セッコウ」の確認試験を準用する。	（1）マオウ　（略）また，「マオウ」の確認試験を準用する。 （2）シャクヤク　（略）また，「シャクヤク」の確認試験を準用する。 （3）カンキョウ　（略）また，「カンキョウ」の確認試験を準用する。 （9）キョウニン　（略）また，「キョウニン」の確認試験を準用する。 （10）セッコウ　（略）また，「セッコウ」の確認試験を準用する。
306	K107	小半夏加茯苓湯	（2）ブクリョウ　（略）必要に応じて，「ブクリョウ」の確認試験を準用する。	（2）ブクリョウ　（略）また，「ブクリョウ」の確認試験を準用する。
307	K108	消風散料	（3）セッコウ　（略）必要に応じて，「セッコウ」の確認試験を準用する。 （6）モクツウ　（略）必要に応じて，「モクツウ」の確認試験を準用する。 （7）ゴボウシ　（略）必要に応じて，「ゴボウシ」の確認試験を準用する。 （8）チモ　（略）必要に応じて，「チモ」の確認試験を準用する。 （9）ゴマ　（略）必要に応じて，「ゴマ」の確認試験を準用する。 （10）センタイ　（略）必要に応じて，局外生規「センタ	（3）セッコウ　（略）また，「セッコウ」の確認試験を準用する。 （6）モクツウ　（略）また，「モクツウ」の確認試験を準用する。 （7）ゴボウシ　（略）また，「ゴボウシ」の確認試験を準用する。 （8）チモ　（略）また，「チモ」の確認試験を準用する。 （9）ゴマ　（略）また，「ゴマ」の確認試験を準用する。 （10）センタイ　（略）また，局外生規「センタイ」の

			イ」の確認試験を準用する。 （11）クジン　（略）必要に応じて,「クジン」の確認試験を準用する。 （12）ケイガイ　（略）必要に応じて,「ケイガイ」の確認試験を準用する。	確認試験を準用する。 （11）クジン　（略）また,「クジン」の確認試験を準用する。 （12）ケイガイ　（略）また,「ケイガイ」の確認試験を準用する。
308	K109	升麻葛根湯	（2）シャクヤク　（略）必要に応じて,「シャクヤク」の確認試験を準用する。	（2）シャクヤク　（略）また,「シャクヤク」の確認試験を準用する。
309	K110	逍遙散料	（2）シャクヤク　（略）必要に応じて,「シャクヤク」の確認試験を準用する。 （3）サイコ　（略）必要に応じて,「サイコ」の確認試験を準用する。 （4）ビャクジュツ　（略）必要に応じて,「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。 （5）ブクリョウ　（略）必要に応じて,「ブクリョウ」の確認試験を準用する。 （8）ハッカ　（略）必要に応じて,「ハッカ」の確認試験を準用する。	（2）シャクヤク　（略）また,「シャクヤク」の確認試験を準用する。 （3）サイコ　（略）また,「サイコ」の確認試験を準用する。 （4）ビャクジュツ　（略）また,「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。 （5）ブクリョウ　（略）また,「ブクリョウ」の確認試験を準用する。 （8）ハッカ　（略）また,「ハッカ」の確認試験を準用する。
310	K111	四苓湯	（2）ブクリョウ　（略）必要に応じて,「ブクリョウ」の確認試験を準用する。 （3）ビャクジュツ　（略）必要に応じて,「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。 （4）チョレイ　（略）必要に応じて,「チョレイ」の確認試験を準用する。	（2）ブクリョウ　（略）また,「ブクリョウ」の確認試験を準用する。 （3）ビャクジュツ　（略）また,「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。 （4）チョレイ　（略）また,「チョレイ」の確認試験を準用する。

311	K112	辛夷清肺湯	（1）チモ　（略）必要に応じて,「チモ」の確認試験を準用する。 （2）オウゴン　（略）必要に応じて,「オウゴン」の確認試験を準用する。 （3）サンシシ　（略）必要に応じて,「サンシシ」の確認試験を準用する。 （5）セッコウ　（略）必要に応じて,「セッコウ」の確認試験を準用する。 （7）シンイ　（略）必要に応じて,「シンイ」の確認試験を準用する。 （8）ビャクゴウ　（略）必要に応じて,「ビャクゴウ」の確認試験を準用する。 （9）ビワヨウ　（略）必要に応じて,「ビワヨウ」の確認試験を準用する。	（1）チモ　（略）また,「チモ」の確認試験を準用する。 （2）オウゴン　（略）また,「オウゴン」の確認試験を準用する。 （3）サンシシ　（略）また,「サンシシ」の確認試験を準用する。 （5）セッコウ　（略）また,「セッコウ」の確認試験を準用する。 （7）シンイ　（略）また,「シンイ」の確認試験を準用する。 （8）ビャクゴウ　（略）また,「ビャクゴウ」の確認試験を準用する。 （9）ビワヨウ　（略）また,「ビワヨウ」の確認試験を準用する。
312	K113	参蘇飲	（1）ソヨウ　（略）必要に応じて,「ソヨウ」の確認試験を準用する。 （2）キジツ　（略）必要に応じて,「キジツ」の確認試験を準用する。 （3）チンピ　（略）必要に応じて,「チンピ」の確認試験を準用する。 （6）ブクリョウ　（略）必要に応じて,「ブクリョウ」の確認試験を準用する。 （7）ニンジン　（略）必要に応じて,「ニンジン」の確認試験を準用する。 （9）カンキョウ　（略）必要に応じて,「カンキョウ」	（1）ソヨウ　（略）また,「ソヨウ」の確認試験を準用する。 （2）キジツ　（略）また,「キジツ」の確認試験を準用する。 （3）チンピ　（略）また,「チンピ」の確認試験を準用する。 （6）ブクリョウ　（略）また,「ブクリョウ」の確認試験を準用する。 （7）ニンジン　（略）また,「ニンジン」の確認試験を準用する。 （9）カンキョウ　（略）また,「カンキョウ」の確認

			の確認試験を準用する。 （12）キキョウ　（略）必要に応じて,「キキョウ」の確認試験を準用する。 （13）ゼンコ　（略）必要に応じて,「ゼンコ」の確認試験を準用する。	試験を準用する。 （12）キキョウ　（略）また,「キキョウ」の確認試験を準用する。 （13）ゼンコ　（略）また,「ゼンコ」の確認試験を準用する。
313	K114	神秘湯	（１）マオウ　（略）必要に応じて,「マオウ」の確認試験を準用する。 （２）キョウニン　（略）必要に応じて,「キョウニン」の確認試験を準用する。 （３）コウボク　（略）必要に応じて,「コウボク」の確認試験を準用する。 （４）チンピ　（略）必要に応じて,「チンピ」の確認試験を準用する。 （６）サイコ　（略）必要に応じて,「サイコ」の確認試験を準用する。 （７）ソヨウ　（略）必要に応じて,「ソヨウ」の確認試験を準用する。	（１）マオウ　（略）また,「マオウ」の確認試験を準用する。 （２）キョウニン　（略）また,「キョウニン」の確認試験を準用する。 （３）コウボク　（略）また,「コウボク」の確認試験を準用する。 （４）チンピ　（略）また,「チンピ」の確認試験を準用する。 （６）サイコ　（略）また,「サイコ」の確認試験を準用する。 （７）ソヨウ　（略）また,「ソヨウ」の確認試験を準用する。
314	K115	参苓白朮散料	（１）ニンジン　（略）必要に応じて,「ニンジン」の確認試験を準用する。 （２）サンヤク　（略）必要に応じて,「サンヤク」の確認試験を準用する。 （３）ビャクジュツ　（略）必要に応じて,「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。	（１）ニンジン　（略）また,「ニンジン」の確認試験を準用する。 （２）サンヤク　（略）また,「サンヤク」の確認試験を準用する。 （３）ビャクジュツ　（略）また,「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。

			（4）ブクリョウ　（略）必要に応じて,「ブクリョウ」の確認試験を準用する。 （5）ヨクイニン　（略）必要に応じて,「ヨクイニン」の確認試験を準用する。 （6）ヘンズ　（略）必要に応じて,「ヘンズ」の確認試験を準用する。 （7）レンニク　（略）必要に応じて,「レンニク」の確認試験を準用する。 （8）キキョウ　（略）必要に応じて,「キキョウ」の確認試験を準用する。	（4）ブクリョウ　（略）また,「ブクリョウ」の確認試験を準用する。 （5）ヨクイニン　（略）また,「ヨクイニン」の確認試験を準用する。 （6）ヘンズ　（略）また,「ヘンズ」の確認試験を準用する。 （7）レンニク　（略）また,「レンニク」の確認試験を準用する。 （8）キキョウ　（略）また,「キキョウ」の確認試験を準用する。
316	K116	清肌安蛔湯	（1）サイコ　（略）必要に応じて,「サイコ」の確認試験を準用する。 （3）オウゴン　（略）必要に応じて,「オウゴン」の確認試験を準用する。 （4）マクリ　（略）必要に応じて,「マクリ」の確認試験を準用する。 （6）ニンジン　（略）必要に応じて,「ニンジン」の確認試験を準用する。	（1）サイコ　（略）また,「サイコ」の確認試験を準用する。 （3）オウゴン　（略）また,「オウゴン」の確認試験を準用する。 （4）マクリ　（略）また,「マクリ」の確認試験を準用する。 （6）ニンジン　（略）また,「ニンジン」の確認試験を準用する。
317	K117	清暑益気湯	（1）ニンジン　（略）必要に応じて,「ニンジン」の確認試験を準用する。 （2）ビャクジュツ　（略）必要に応じて,「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。 （6）チンピ　（略）必要に応じて,「チンピ」の確認試験を準用する。 （8）オウバク　（略）必要に応じて,「オウバク」の確	（1）ニンジン　（略）また,「ニンジン」の確認試験を準用する。 （2）ビャクジュツ　（略）また,「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。 （6）チンピ　（略）また,「チンピ」の確認試験を準用する。 （8）オウバク　（略）また,「オウバク」の確認試験

			認試験を準用する。	を準用する。
318	K118	清上蠲痛湯	（1）オウゴン　（略）必要に応じて,「オウゴン」の確認試験を準用する。 （3）ビャクシ　（略）必要に応じて,「ビャクシ」の確認試験を準用する。 （8）キョウカツ　（略）必要に応じて,「キョウカツ」の確認試験を準用する。 （9）ドクカツ　（略）必要に応じて,「ドクカツ」の確認試験を準用する。 （10）マンケイシ（略）必要に応じて，局外生規「マンケイシ」の確認試験を準用する。 （11）キクカ　（略）必要に応じて,「キクカ」の確認試験を準用する。	（1）オウゴン　（略）また,「オウゴン」の確認試験を準用する。 （3）ビャクシ　（略）また,「ビャクシ」の確認試験を準用する。 （8）キョウカツ　（略）また,「キョウカツ」の確認試験を準用する。 （9）ドクカツ　（略）また,「ドクカツ」の確認試験を準用する。 （10）マンケイシ（略）また，局外生規「マンケイシ」の確認試験を準用する。 （11）キクカ　（略）また,「キクカ」の確認試験を準用する。
319	K119	清上防風湯	（1）ケイガイ　（略）必要に応じて,「ケイガイ」の確認試験を準用する。 （2）オウレン　（略）必要に応じて,「オウレン」の確認試験を準用する。 （3）ハッカ　（略）必要に応じて,「ハッカ」の確認試験を準用する。 （4）キジツ　（略）必要に応じて,「キジツ」の確認試験を準用する。 （6）サンシシ　（略）必要に応じて,「サンシシ」の確認試験を準用する。 （8）オウゴン　（略）必要に応じて,「オウゴン」の確認試験を準用する。	（1）ケイガイ　（略）また,「ケイガイ」の確認試験を準用する。 （2）オウレン　（略）また,「オウレン」の確認試験を準用する。 （3）ハッカ　（略）また,「ハッカ」の確認試験を準用する。 （4）キジツ　（略）また,「キジツ」の確認試験を準用する。 （6）サンシシ　（略）また,「サンシシ」の確認試験を準用する。 （8）オウゴン　（略）また,「オウゴン」の確認試験を準用する。

			（9）レンギョウ　（略）必要に応じて,「レンギョウ」の確認試験を準用する。 （10）ビャクシ　（略）必要に応じて,「ビャクシ」の確認試験を準用する。 （11）キキョウ　（略）必要に応じて,「キキョウ」の確認試験を準用する。	（9）レンギョウ　（略）また,「レンギョウ」の確認試験を準用する。 （10）ビャクシ　（略）また,「ビャクシ」の確認試験を準用する。 （11）キキョウ　（略）また,「キキョウ」の確認試験を準用する。
320	K120	清心蓮子飲	（2）ブクリョウ　（略）必要に応じて,「ブクリョウ」の確認試験を準用する。 （3）ニンジン　（略）必要に応じて,「ニンジン」の確認試験を準用する。 （4）シャゼンシ　（略）必要に応じて,「シャゼンシ」の確認試験を準用する。 （5）オウゴン　（略）必要に応じて,「オウゴン」の確認試験を準用する。 （8）レンニク　（略）必要に応じて,「レンニク」の確認試験を準用する。 （9）ジコッピ　（略）必要に応じて,「ジコッピ」の確認試験を準用する。	（2）ブクリョウ　（略）また,「ブクリョウ」の確認試験を準用する。 （3）ニンジン　（略）また,「ニンジン」の確認試験を準用する。 （4）シャゼンシ　（略）また,「シャゼンシ」の確認試験を準用する。 （5）オウゴン　（略）また,「オウゴン」の確認試験を準用する。 （8）レンニク　（略）また,「レンニク」の確認試験を準用する。 （9）ジコッピ　（略）また,「ジコッピ」の確認試験を準用する。
321	K121	清肺湯	（1）オウゴン　（略）必要に応じて,「オウゴン」の確認試験を準用する。 （2）キキョウ　（略）必要に応じて,「キキョウ」の確認試験を準用する。 （3）ソウハクヒ　（略）必要に応じて,「ソウハクヒ」の確認試験を準用する。 （4）キョウニン　（略）必要に応じて,「キョウニン」	（1）オウゴン　（略）また,「オウゴン」の確認試験を準用する。 （2）キキョウ　（略）また,「キキョウ」の確認試験を準用する。 （3）ソウハクヒ　（略）また,「ソウハクヒ」の確認試験を準用する。 （4）キョウニン　（略）また,「キョウニン」の確認

			の確認試験を準用する。 （５）サンシシ　（略）必要に応じて,「サンシシ」の確認試験を準用する。 （６）テンモンドウ　（略）必要に応じて,「テンモンドウ」の確認試験を準用する。 （７）バイモ　（略）必要に応じて,「バイモ」の確認試験を準用する。 （８）チンピ　（略）必要に応じて,「チンピ」の確認試験を準用する。 （10）チクジョ　（略）必要に応じて, 局外生規「チクジョ」の確認試験を準用する。 （11）ブクリョウ　（略）必要に応じて,「ブクリョウ」の確認試験を準用する。	試験を準用する。 （５）サンシシ　（略）また,「サンシシ」の確認試験を準用する。 （６）テンモンドウ　（略）また,「テンモンドウ」の確認試験を準用する。 （７）バイモ　（略）また,「バイモ」の確認試験を準用する。 （８）チンピ　（略）また,「チンピ」の確認試験を準用する。 （10）チクジョ　（略）また, 局外生規「チクジョ」の確認試験を準用する。 （11）ブクリョウ　（略）また,「ブクリョウ」の確認試験を準用する。
322	K122	折衝飲	（１）ボタンピ　（略）必要に応じて,「ボタンピ」の確認試験を準用する。 （３）シャクヤク　（略）必要に応じて,「シャクヤク」の確認試験を準用する。 （５）トウニン　（略）必要に応じて,「トウニン」の確認試験を準用する。 （７）エンゴサク　（略）必要に応じて,「エンゴサク」の確認試験を準用する。 （８）ゴシツ　（略）必要に応じて,「ゴシツ」の確認試験を準用する。 （９）コウカ　（略）必要に応じて,「コウカ」の確認試験を準用する。	（１）ボタンピ　（略）また,「ボタンピ」の確認試験を準用する。 （３）シャクヤク　（略）また,「シャクヤク」の確認試験を準用する。 （５）トウニン　（略）また,「トウニン」の確認試験を準用する。 （７）エンゴサク　（略）また,「エンゴサク」の確認試験を準用する。 （８）ゴシツ　（略）また,「ゴシツ」の確認試験を準用する。 （９）コウカ　（略）また,「コウカ」の確認試験を準用する。

323	K123	千金鶏鳴散料	（1）ダイオウ　（略）必要に応じて,「ダイオウ」の確認試験を準用する。 （2）トウニン　（略）必要に応じて,「トウニン」の確認試験を準用する。	（1）ダイオウ　（略）また,「ダイオウ」の確認試験を準用する。 （2）トウニン　（略）また,「トウニン」の確認試験を準用する。
324	K124	銭氏白朮散料	（1）ビャクジュツ　（略）必要に応じて,「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。 （2）ブクリョウ　（略）必要に応じて,「ブクリョウ」の確認試験を準用する。 （4）ニンジン　（略）必要に応じて,「ニンジン」の確認試験を準用する。 （7）カッコウ　（略）必要に応じて,「カッコウ」の確認試験を準用する。	（1）ビャクジュツ　（略）また,「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。 （2）ブクリョウ　（略）また,「ブクリョウ」の確認試験を準用する。 （4）ニンジン　（略）また,「ニンジン」の確認試験を準用する。 （7）カッコウ　（略）また,「カッコウ」の確認試験を準用する。
325	K125	疎経活血湯	（4）ビャクジュツ　（略）必要に応じて,「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。 （5）ブクリョウ　（略）必要に応じて,「ブクリョウ」の確認試験を準用する。 （6）トウニン　（略）必要に応じて,「トウニン」の確認試験を準用する。 （7）シャクヤク　（略）必要に応じて,「シャクヤク」の確認試験を準用する。 （8）ゴシツ　（略）必要に応じて,「ゴシツ」の確認試験を準用する。 （9）ボウイ　（略）必要に応じて,「ボウイ」の確認試験を準用する。 （11）リュウタン　（略）必要に応じて,「リュウタン」	（4）ビャクジュツ　（略）また,「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。 （5）ブクリョウ　（略）また,「ブクリョウ」の確認試験を準用する。 （6）トウニン　（略）また,「トウニン」の確認試験を準用する。 （7）シャクヤク　（略）また,「シャクヤク」の確認試験を準用する。 （8）ゴシツ　（略）また,「ゴシツ」の確認試験を準用する。 （9）ボウイ　（略）また,「ボウイ」の確認試験を準用する。 （11）リュウタン　（略）また,「リュウタン」の確認

			の確認試験を準用する。 （13）チンピ　（略）必要に応じて,「チンピ」の確認試験を準用する。 （14）ビャクシ　（略）必要に応じて,「ビャクシ」の確認試験を準用する。 （16）イレイセン　（略）必要に応じて,「イレイセン」の確認試験を準用する。 （17）キョウカツ　（略）必要に応じて,「キョウカツ」の確認試験を準用する。	試験を準用する。 （13）チンピ　（略）また,「チンピ」の確認試験を準用する。 （14）ビャクシ　（略）また,「ビャクシ」の確認試験を準用する。 （16）イレイセン　（略）また,「イレイセン」の確認試験を準用する。 （17）キョウカツ　（略）また,「キョウカツ」の確認試験を準用する。
326	K126	蘇子降気湯	（１）シソシ　（略）必要に応じて，局外生規「シソシ」の確認試験を準用する。 （２）コウボク　（略）必要に応じて,「コウボク」の確認試験を準用する。 （８）チンピ　（略）必要に応じて,「チンピ」の確認試験を準用する。 （９）ゼンコ　（略）必要に応じて,「ゼンコ」の確認試験を準用する。	（１）シソシ　（略）また，局外生規「シソシ」の確認試験を準用する。 （２）コウボク　（略）また,「コウボク」の確認試験を準用する。 （８）チンピ　（略）また,「チンピ」の確認試験を準用する。 （９）ゼンコ　（略）また,「ゼンコ」の確認試験を準用する。
327	K127	大黄甘草湯	（１）ダイオウ　（略）必要に応じて,「ダイオウ」の確認試験を準用する。	（１）ダイオウ　（略）また,「ダイオウ」の確認試験を準用する。
328	K128	大黄牡丹皮湯	（１）ダイオウ　（略）必要に応じて,「ダイオウ」の確認試験を準用する。 （２）ボタンピ　（略）必要に応じて,「ボタンピ」の確認試験を準用する。 （３）トウニン　（略）必要に応じて,「トウニン」の確認試験を準用する。	（１）ダイオウ　（略）また,「ダイオウ」の確認試験を準用する。 （２）ボタンピ　（略）また,「ボタンピ」の確認試験を準用する。 （３）トウニン　（略）また,「トウニン」の確認試験を準用する。

			（５）トウガシ　（略）必要に応じて,「トウガシ」の確認試験を準用する。	（５）トウガシ　（略）また,「トウガシ」の確認試験を準用する。
329	K129	大建中湯	（２）ニンジン　（略）必要に応じて,「ニンジン」の確認試験を準用する。 （３）カンキョウ　（略）必要に応じて,「カンキョウ」の確認試験を準用する。	（２）ニンジン　（略）また,「ニンジン」の確認試験を準用する。 （３）カンキョウ　（略）また,「カンキョウ」の確認試験を準用する。
330	K130	大柴胡湯	（１）サイコ　（略）必要に応じて,「サイコ」の確認試験を準用する。 （３）オウゴン　（略）必要に応じて,「オウゴン」の確認試験を準用する。 （４）シャクヤク　（略）必要に応じて,「シャクヤク」の確認試験を準用する。 （６）キジツ　（略）必要に応じて,「キジツ」の確認試験を準用する。 （８）ダイオウ　（略）必要に応じて,「ダイオウ」の確認試験を準用する。	（１）サイコ　（略）また,「サイコ」の確認試験を準用する。 （３）オウゴン　（略）また,「オウゴン」の確認試験を準用する。 （４）シャクヤク　（略）また,「シャクヤク」の確認試験を準用する。 （６）キジツ　（略）また,「キジツ」の確認試験を準用する。 （８）ダイオウ　（略）また,「ダイオウ」の確認試験を準用する。
331	K131	大半夏湯	（２）ニンジン　（略）必要に応じて,「ニンジン」の確認試験を準用する。	（２）ニンジン　（略）また,「ニンジン」の確認試験を準用する。
332	K132	竹茹温胆湯	（１）サイコ　（略）必要に応じて,「サイコ」の確認試験を準用する。 （２）チクジョ　（略）必要に応じて，局外生規「チクジョ」の確認試験を準用する。 （３）ブクリョウ　（略）必要に応じて,「ブクリョウ」の確認試験を準用する。 （８）キキョウ　（略）必要に応じて,「キキョウ」の確	（１）サイコ　（略）また,「サイコ」の確認試験を準用する。 （２）チクジョ　（略）また，局外生規「チクジョ」の確認試験を準用する。 （３）ブクリョウ　（略）また,「ブクリョウ」の確認試験を準用する。 （８）キキョウ　（略）また,「キキョウ」の確認試験

			認試験を準用する。 （9）チンピ　（略）必要に応じて,「チンピ」の確認試験を準用する。 （10）キジツ　（略）必要に応じて,「キジツ」の確認試験を準用する。 （11）オウレン　（略）必要に応じて,「オウレン」の確認試験を準用する。 （13）ニンジン　（略）必要に応じて,「ニンジン」の確認試験を準用する。	を準用する。 （9）チンピ　（略）また,「チンピ」の確認試験を準用する。 （10）キジツ　（略）また,「キジツ」の確認試験を準用する。 （11）オウレン　（略）また,「オウレン」の確認試験を準用する。 （13）ニンジン　（略）また,「ニンジン」の確認試験を準用する。
333	K133	治打撲一方	（2）ボクソク　（略）必要に応じて,「ボクソク」の確認試験を準用する。 （3）センコツ　（略）必要に応じて,「センコツ」の確認試験を準用する。 （6）チョウジ　（略）必要に応じて,「チョウジ」の確認試験を準用する。 （7）ダイオウ　（略）必要に応じて,「ダイオウ」の確認試験を準用する。	（2）ボクソク　（略）また,「ボクソク」の確認試験を準用する。 （3）センコツ　（略）また,「センコツ」の確認試験を準用する。 （6）チョウジ　（略）また,「チョウジ」の確認試験を準用する。 （7）ダイオウ　（略）また,「ダイオウ」の確認試験を準用する。
334	K134	治頭瘡一方	（1）レンギョウ　（略）必要に応じて,「レンギョウ」の確認試験を準用する。 （5）ニンドウ　（略）必要に応じて,「ニンドウ」の確認試験を準用する。 （6）ケイガイ　（略）必要に応じて,「ケイガイ」の確認試験を準用する。 （8）コウカ　（略）必要に応じて,「コウカ」の確認試験を準用する。	（1）レンギョウ　（略）また,「レンギョウ」の確認試験を準用する。 （5）ニンドウ　（略）また,「ニンドウ」の確認試験を準用する。 （6）ケイガイ　（略）また,「ケイガイ」の確認試験を準用する。 （8）コウカ　（略）また,「コウカ」の確認試験を準用する。

			（9）ダイオウ　（略）必要に応じて,「ダイオウ」の確認試験を準用する。	（9）ダイオウ　（略）また,「ダイオウ」の確認試験を準用する。
336	K136	調胃承気湯	（1）ダイオウ　（略）必要に応じて,「ダイオウ」の確認試験を準用する	（1）ダイオウ　（略）また,「ダイオウ」の確認試験を準用する。
337	K137	釣藤散料	（1）チョウトウコウ　（略）必要に応じて,「チョウトウコウ」の確認試験を準用する。 （2）キッピ　（略）必要に応じて，局外生規「キッピ」の確認試験を準用する。 （3）キクカ　（略）必要に応じて,「キクカ」の確認試験を準用する。 （7）ブクリョウ　（略）必要に応じて,「ブクリョウ」の確認試験を準用する。 （8）ニンジン　（略）必要に応じて,「ニンジン」の確認試験を準用する。 （11）セッコウ　（略）必要に応じて,「セッコウ」の確認試験を準用する。	（1）チョウトウコウ　（略）また,「チョウトウコウ」の確認試験を準用する。 （2）キッピ　（略）また，局外生規「キッピ」の確認試験を準用する。 （3）キクカ　（略）また,「キクカ」の確認試験を準用する。 （7）ブクリョウ　（略）また,「ブクリョウ」の確認試験を準用する。 （8）ニンジン　（略）また,「ニンジン」の確認試験を準用する。 （11）セッコウ　（略）また,「セッコウ」の確認試験を準用する。
338	K138	猪苓湯	（1）チョレイ　（略）必要に応じて,「チョレイ」の確認試験を準用する。 （2）ブクリョウ　（略）必要に応じて,「ブクリョウ」の確認試験を準用する。 （4）カッセキ　（略）必要に応じて,「カッセキ」の確認試験を準用する。	（1）チョレイ　（略）また,「チョレイ」の確認試験を準用する。 （2）ブクリョウ　（略）また,「ブクリョウ」の確認試験を準用する。 （4）カッセキ　（略）また,「カッセキ」の確認試験を準用する。
339	K139	猪苓湯合四物湯	（2）シャクヤク　（略）必要に応じて,「シャクヤク」の確認試験を準用する。	（2）シャクヤク　（略）また,「シャクヤク」の確認試験を準用する。

			（５）チョレイ　（略）必要に応じて,「チョレイ」の確認試験を準用する。 （６）ブクリョウ　（略）必要に応じて,「ブクリョウ」の確認試験を準用する。 （８）カッセキ　（略）必要に応じて,「カッセキ」の確認試験を準用する。	（５）チョレイ　（略）また,「チョレイ」の確認試験を準用する。 （６）ブクリョウ　（略）また,「ブクリョウ」の確認試験を準用する。 （８）カッセキ　（略）また,「カッセキ」の確認試験を準用する。
340	K140	通導散料	（２）ダイオウ　（略）必要に応じて,「ダイオウ」の確認試験を準用する。 （４）キジツ　（略）必要に応じて,「キジツ」の確認試験を準用する。 （５）コウボク　（略）必要に応じて,「コウボク」の確認試験を準用する。 （６）チンピ　（略）必要に応じて,「チンピ」の確認試験を準用する。 （７）モクツウ　（略）必要に応じて,「モクツウ」の確認試験を準用する。 （８）コウカ　（略）必要に応じて,「コウカ」の確認試験を準用する。 （10）ソボク　（略）必要に応じて,「ソボク」の確認試験を準用する。	（２）ダイオウ　（略）また,「ダイオウ」の確認試験を準用する。 （４）キジツ　（略）また,「キジツ」の確認試験を準用する。 （５）コウボク　（略）また,「コウボク」の確認試験を準用する。 （６）チンピ　（略）また,「チンピ」の確認試験を準用する。 （７）モクツウ　（略）また,「モクツウ」の確認試験を準用する。 （８）コウカ　（略）また,「コウカ」の確認試験を準用する。 （10）ソボク　（略）また,「ソボク」の確認試験を準用する。
341	K141	桃核承気湯	（１）トウニン　（略）必要に応じて,「トウニン」の確認試験を準用する。 （４）硫酸マグネシウム　（略）必要に応じて,「硫酸マグネシウム」の確認試験を準用する。	（１）トウニン　（略）また,「トウニン」の確認試験を準用する。 （４）硫酸マグネシウム　（略）また,「硫酸マグネシウム」の確認試験を準用する。

			（５）ダイオウ　（略）必要に応じて,「ダイオウ」の確認試験を準用する。	（５）ダイオウ　（略）また,「ダイオウ」の確認試験を準用する。
342	K142	当帰飲子	（２）シャクヤク　（略）必要に応じて,「シャクヤク」の確認試験を準用する。 （６）ケイガイ　（略）必要に応じて,「ケイガイ」の確認試験を準用する。 （９）シツリシ　（略）必要に応じて,「シツリシ」の確認試験を準用する。 （10）カシュウ　（略）必要に応じて,「カシュウ」の確認試験を準用する。	（２）シャクヤク　（略）また,「シャクヤク」の確認試験を準用する。 （６）ケイガイ　（略）また,「ケイガイ」の確認試験を準用する。 （９）シツリシ　（略）また,「シツリシ」の確認試験を準用する。 （10）カシュウ　（略）また,「カシュウ」の確認試験を準用する。
343	K143	当帰建中湯	（５）シャクヤク　（略）必要に応じて,「シャクヤク」の確認試験を準用する。	（５）シャクヤク　（略）また,「シャクヤク」の確認試験を準用する。
344	K144	当帰散料	（２）シャクヤク　（略）必要に応じて,「シャクヤク」の確認試験を準用する。 （４）オウゴン　（略）必要に応じて,「オウゴン」の確認試験を準用する。 （５）ビャクジュツ　（略）必要に応じて,「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。	（２）シャクヤク　（略）また,「シャクヤク」の確認試験を準用する。 （４）オウゴン　（略）また,「オウゴン」の確認試験を準用する。 （５）ビャクジュツ　（略）また,「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。
346	K145	当帰四逆加呉茱萸生姜湯	（３）シャクヤク　（略）必要に応じて,「シャクヤク」の確認試験を準用する。 （４）モクツウ　（略）必要に応じて,「モクツウ」の確認試験を準用する。 （８）ゴシュユ　（略）必要に応じて,「ゴシュユ」の確認試験を準用する。	（３）シャクヤク　（略）また,「シャクヤク」の確認試験を準用する。 （４）モクツウ　（略）また,「モクツウ」の確認試験を準用する。 （８）ゴシュユ　（略）また,「ゴシュユ」の確認試験を準用する。

347	K146	当帰四逆湯	（３）シャクヤク　（略）必要に応じて,「シャクヤク」の確認試験を準用する。 （４）モクツウ　（略）必要に応じて,「モクツウ」の確認試験を準用する。	（３）シャクヤク　（略）また,「シャクヤク」の確認試験を準用する。 （４）モクツウ　（略）また,「モクツウ」の確認試験を準用する。
348	K147	当帰芍薬散料	（２）シャクヤク　（略）必要に応じて,「シャクヤク」の確認試験を準用する。 （３）ブクリョウ　（略）必要に応じて,「ブクリョウ」の確認試験を準用する。 （６）ビャクジュツ　（略）必要に応じて,「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。	（２）シャクヤク　（略）また,「シャクヤク」の確認試験を準用する。 （３）ブクリョウ　（略）また,「ブクリョウ」の確認試験を準用する。 （６）ビャクジュツ　（略）また,「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。
350	K148	当帰湯	（３）シャクヤク　（略）必要に応じて,「シャクヤク」の確認試験を準用する。 （４）コウボク　（略）必要に応じて,「コウボク」の確認試験を準用する。 （６）ニンジン　（略）必要に応じて,「ニンジン」の確認試験を準用する。 （７）カンキョウ　（略）必要に応じて,「カンキョウ」の確認試験を準用する。	（３）シャクヤク　（略）また,「シャクヤク」の確認試験を準用する。 （４）コウボク　（略）また,「コウボク」の確認試験を準用する。 （６）ニンジン　（略）また,「ニンジン」の確認試験を準用する。 （７）カンキョウ　（略）また,「カンキョウ」の確認試験を準用する。
351	K149	当帰貝母苦参丸料	（２）クジン　（略）必要に応じて,「クジン」の確認試験を準用する。 （３）バイモ　（略）必要に応じて,「バイモ」の確認試験を準用する。	（２）クジン　（略）また,「クジン」の確認試験を準用する。 （３）バイモ　（略）また,「バイモ」の確認試験を準用する。
352	K150	独活葛根湯	（３）シャクヤク　（略）必要に応じて,「シャクヤク」の確認試験を準用する。 （４）マオウ　（略）必要に応じて,「マオウ」の確認試	（３）シャクヤク　（略）また,「シャクヤク」の確認試験を準用する。 （４）マオウ　（略）また,「マオウ」の確認試験を準

			験を準用する。 （9）ドクカツ　（略）必要に応じて,「ドクカツ」の確認試験を準用する。	用する。 （9）ドクカツ　（略）また,「ドクカツ」の確認試験を準用する。
353	K151	独活湯	（1）ドクカツ　（略）必要に応じて,「ドクカツ」の確認試験を準用する。 （2）キョウカツ　（略）必要に応じて,「キョウカツ」の確認試験を準用する。 （5）ダイオウ　（略）必要に応じて,「ダイオウ」の確認試験を準用する。 （8）トウニン　（略）必要に応じて,「トウニン」の確認試験を準用する。 （9）レンギョウ　（略）必要に応じて,「レンギョウ」の確認試験を準用する。 （10）ボウイ　（略）必要に応じて,「ボウイ」の確認試験を準用する。 （11）オウバク　（略）必要に応じて,「オウバク」の確認試験を準用する。	（1）ドクカツ　（略）また,「ドクカツ」の確認試験を準用する。 （2）キョウカツ　（略）また,「キョウカツ」の確認試験を準用する。 （5）ダイオウ　（略）また,「ダイオウ」の確認試験を準用する。 （8）トウニン　（略）また,「トウニン」の確認試験を準用する。 （9）レンギョウ　（略）また,「レンギョウ」の確認試験を準用する。 （10）ボウイ　（略）また,「ボウイ」の確認試験を準用する。 （11）オウバク　（略）また,「オウバク」の確認試験を準用する。
354	K152	二朮湯	（1）ビャクジュツ　（略）必要に応じて,「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。 （2）ブクリョウ　（略）必要に応じて,「ブクリョウ」の確認試験を準用する。 （3）チンピ　（略）必要に応じて,「チンピ」の確認試験を準用する。	（1）ビャクジュツ　（略）また,「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。 （2）ブクリョウ　（略）また,「ブクリョウ」の確認試験を準用する。 （3）チンピ　（略）また,「チンピ」の確認試験を準用する。

			（５）オウゴン　（略）必要に応じて,「オウゴン」の確認試験を準用する。 （７）テンナンショウ　（略）必要に応じて, 局外生規「テンナンショウ」の確認試験を準用する。 （８）イレイセン　（略）必要に応じて,「イレイセン」の確認試験を準用する。 （９）キョウカツ　（略）必要に応じて,「キョウカツ」の確認試験を準用する。	（５）オウゴン　（略）また,「オウゴン」の確認試験を準用する。 （７）テンナンショウ　（略）また, 局外生規「テンナンショウ」の確認試験を準用する。 （８）イレイセン　（略）また,「イレイセン」の確認試験を準用する。 （９）キョウカツ　（略）また,「キョウカツ」の確認試験を準用する。
355	K153	二陳湯	（２）ブクリョウ　（略）必要に応じて,「ブクリョウ」の確認試験を準用する。 （３）チンピ　（略）必要に応じて,「チンピ」の確認試験を準用する。	（２）ブクリョウ　（略）また,「ブクリョウ」の確認試験を準用する。 （３）チンピ　（略）また,「チンピ」の確認試験を準用する。
356	K154	女神散料	（３）ビャクジュツ　（略）必要に応じて,「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。 （６）オウゴン　（略）必要に応じて,「オウゴン」の確認試験を準用する。 （７）ニンジン　（略）必要に応じて,「ニンジン」の確認試験を準用する。 （８）ビンロウジ　（略）必要に応じて,「ビンロウジ」の確認試験を準用する。 （９）オウレン　（略）必要に応じて,「オウレン」の確認試験を準用する。 (11) チョウジ　（略）必要に応じて,「チョウジ」の確認試験を準用する。	（３）ビャクジュツ　（略）また,「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。 （６）オウゴン　（略）また,「オウゴン」の確認試験を準用する。 （７）ニンジン　（略）また,「ニンジン」の確認試験を準用する。 （８）ビンロウジ　（略）また,「ビンロウジ」の確認試験を準用する。 （９）オウレン　（略）また,「オウレン」の確認試験を準用する。 (11) チョウジ　（略）また,「チョウジ」の確認試験を準用する。

			（13）ダイオウ　（略）必要に応じて,「ダイオウ」の確認試験を準用する。	（13）ダイオウ　（略）また,「ダイオウ」の確認試験を準用する。
357	K155	人参湯	（１）ニンジン　（略）必要に応じて,「ニンジン」の確認試験を準用する。 （３）ビャクジュツ　（略）必要に応じて,「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。 （４）カンキョウ　（略）必要に応じて,「カンキョウ」の確認試験を準用する。	（１）ニンジン　（略）また,「ニンジン」の確認試験を準用する。 （３）ビャクジュツ　（略）また,「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。 （４）カンキョウ　（略）また,「カンキョウ」の確認試験を準用する。
359	K156	人参養栄湯	（１）ニンジン　（略）必要に応じて,「ニンジン」の確認試験を準用する。 （３）シャクヤク　（略）必要に応じて,「シャクヤク」の確認試験を準用する。 （５）ビャクジュツ　（略）必要に応じて,「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。 （６）ブクリョウ　（略）必要に応じて,「ブクリョウ」の確認試験を準用する。 （９）チンピ　（略）必要に応じて,「チンピ」の確認試験を準用する。 （10）オンジ　（略）必要に応じて,「オンジ」の確認試験を準用する。	（１）ニンジン　（略）また,「ニンジン」の確認試験を準用する。 （３）シャクヤク　（略）また,「シャクヤク」の確認試験を準用する。 （５）ビャクジュツ　（略）また,「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。 （６）ブクリョウ　（略）また,「ブクリョウ」の確認試験を準用する。 （９）チンピ　（略）また,「チンピ」の確認試験を準用する。 （10）オンジ　（略）また,「オンジ」の確認試験を準用する。
360	K157	排膿散料	（１）キジツ　（略）必要に応じて,「キジツ」の確認試験を準用する。 （２）シャクヤク　（略）必要に応じて,「シャクヤク」	（１）キジツ　（略）また,「キジツ」の確認試験を準用する。 （２）シャクヤク　（略）また,「シャクヤク」の確認

			の確認試験を準用する。 （３）キキョウ　（略）必要に応じて,「キキョウ」の確認試験を準用する。	試験を準用する。 （３）キキョウ　（略）また,「キキョウ」の確認試験を準用する。
362	K158	排膿湯	（２）キキョウ　（略）必要に応じて,「キキョウ」の確認試験を準用する。	（２）キキョウ　（略）また,「キキョウ」の確認試験を準用する。
363	K159	麦門冬湯	（４）ニンジン　（略）必要に応じて,「ニンジン」の確認試験を準用する。 （６）コウベイ　（略）必要に応じて,「コウベイ」の確認試験を準用する。	（４）ニンジン　（略）また,「ニンジン」の確認試験を準用する。 （６）コウベイ　（略）また,「コウベイ」の確認試験を準用する。
364	K160	八味地黄丸料	（３）サンヤク　（略）必要に応じて,「サンヤク」の確認試験を準用する。 （５）ブクリョウ　（略）必要に応じて,「ブクリョウ」の確認試験を準用する。 （６）ボタンピ　（略）必要に応じて,「ボタンピ」の確認試験を準用する。 （８）ブシ　（略）必要に応じて,「ブシ」の確認試験を準用する。	（３）サンヤク　（略）また,「サンヤク」の確認試験を準用する。 （５）ブクリョウ　（略）また,「ブクリョウ」の確認試験を準用する。 （６）ボタンピ　（略）また,「ボタンピ」の確認試験を準用する。 （８）ブシ　（略）また,「ブシ」の確認試験を準用する。
366	K161	半夏厚朴湯	（２）ブクリョウ　（略）必要に応じて,「ブクリョウ」の確認試験を準用する。 （３）コウボク　（略）必要に応じて,「コウボク」の確認試験を準用する。 （４）ソヨウ　（略）必要に応じて,「ソヨウ」の確認試験を準用する。	（２）ブクリョウ　（略）また,「ブクリョウ」の確認試験を準用する。 （３）コウボク　（略）また,「コウボク」の確認試験を準用する。 （４）ソヨウ　（略）また,「ソヨウ」の確認試験を準用する。
367	K162	半夏瀉心湯	（２）オウゴン　（略）必要に応じて,「オウゴン」の確認試験を準用する。	（２）オウゴン　（略）また,「オウゴン」の確認試験を準用する。

			（３）カンキョウ　（略）必要に応じて,「カンキョウ」の確認試験を準用する。 （４）ニンジン　（略）必要に応じて,「ニンジン」の確認試験を準用する。 （７）オウレン　（略）必要に応じて,「オウレン」の確認試験を準用する。	（３）カンキョウ　（略）また,「カンキョウ」の確認試験を準用する。 （４）ニンジン　（略）また,「ニンジン」の確認試験を準用する。 （７）オウレン　（略）また,「オウレン」の確認試験を準用する。
368	K163	半夏白朮天麻湯	（２）ビャクジュツ　（略）必要に応じて,「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。 （４）チンピ　（略）必要に応じて,「チンピ」の確認試験を準用する。 （５）ブクリョウ　（略）必要に応じて,「ブクリョウ」の確認試験を準用する。 （６）バクガ　（略）必要に応じて,「バクガ」の確認試験を準用する。 （７）テンマ　（略）必要に応じて,「テンマ」の確認試験を準用する。 （11）ニンジン　（略）必要に応じて,「ニンジン」の確認試験を準用する。 （13）オウバク　（略）必要に応じて,「オウバク」の確認試験を準用する。 （14）カンキョウ　（略）必要に応じて,「カンキョウ」の確認試験を準用する。	（２）ビャクジュツ　（略）また,「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。 （４）チンピ　（略）また,「チンピ」の確認試験を準用する。 （５）ブクリョウ　（略）また,「ブクリョウ」の確認試験を準用する。 （６）バクガ　（略）また,「バクガ」の確認試験を準用する。 （７）テンマ　（略）また,「テンマ」の確認試験を準用する。 （11）ニンジン　（略）また,「ニンジン」の確認試験を準用する。 （13）オウバク　（略）また,「オウバク」の確認試験を準用する。 （14）カンキョウ　（略）また,「カンキョウ」の確認試験を準用する。

369	K164	白虎加桂枝湯	（1）チモ　（略）必要に応じて,「チモ」の確認試験を準用する。 （2）セッコウ　（略）必要に応じて,「セッコウ」の確認試験を準用する。 （5）コウベイ　（略）必要に応じて,「コウベイ」の確認試験を準用する。	（1）チモ　（略）また,「チモ」の確認試験を準用する。 （2）セッコウ　（略）また,「セッコウ」の確認試験を準用する。 （5）コウベイ　（略）また,「コウベイ」の確認試験を準用する。
370	K165	白虎加人参湯	（1）チモ　（略）必要に応じて,「チモ」の確認試験を準用する。 （2）セッコウ　（略）必要に応じて,「セッコウ」の確認試験を準用する。 （4）ニンジン　（略）必要に応じて,「ニンジン」の確認試験を準用する。 （5）コウベイ　（略）必要に応じて,「コウベイ」の確認試験を準用する。	（1）チモ　（略）また,「チモ」の確認試験を準用する。 （2）セッコウ　（略）また,「セッコウ」の確認試験を準用する。 （4）ニンジン　（略）また,「ニンジン」の確認試験を準用する。 （5）コウベイ　（略）また,「コウベイ」の確認試験を準用する。
371	K166	白虎湯	（1）チモ　（略）必要に応じて,「チモ」の確認試験を準用する。 （2）セッコウ　（略）必要に応じて,「セッコウ」の確認試験を準用する。 （4）コウベイ　（略）必要に応じて,「コウベイ」の確認試験を準用する。	（1）チモ　（略）また,「チモ」の確認試験を準用する。 （2）セッコウ　（略）また,「セッコウ」の確認試験を準用する。 （4）コウベイ　（略）また,「コウベイ」の確認試験を準用する。
372	K167	不換金正気散料	（1）ビャクジュツ　（略）必要に応じて,「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。 （2）コウボク　（略）必要に応じて,「コウボク」の確認試験を準用する。 （3）チンピ　（略）必要に応じて,「チンピ」の確認試	（1）ビャクジュツ　（略）また,「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。 （2）コウボク　（略）また,「コウボク」の確認試験を準用する。 （3）チンピ　（略）また,「チンピ」の確認試験を準

			験を準用する。 （８）カッコウ　（略）必要に応じて,「カッコウ」の確認試験を準用する。	用する。 （８）カッコウ　（略）また,「カッコウ」の確認試験を準用する。
373	K168	茯苓飲	（１）ブクリョウ　（略）必要に応じて,「ブクリョウ」の確認試験を準用する。 （２）ビャクジュツ　（略）必要に応じて,「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。 （３）ニンジン　（略）必要に応じて,「ニンジン」の確認試験を準用する。 （５）チンピ　（略）必要に応じて,「チンピ」の確認試験を準用する。 （６）キジツ　（略）必要に応じて,「キジツ」の確認試験を準用する。	（１）ブクリョウ　（略）また,「ブクリョウ」の確認試験を準用する。 （２）ビャクジュツ　（略）また,「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。 （３）ニンジン　（略）また,「ニンジン」の確認試験を準用する。 （５）チンピ　（略）また,「チンピ」の確認試験を準用する。 （６）キジツ　（略）また,「キジツ」の確認試験を準用する。
374	K169	茯苓飲加半夏	（１）ブクリョウ　（略）必要に応じて,「ブクリョウ」の確認試験を準用する。 （２）ビャクジュツ　（略）必要に応じて,「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。 （３）ニンジン　（略）必要に応じて,「ニンジン」の確認試験を準用する。 （５）チンピ　（略）必要に応じて,「チンピ」の確認試験を準用する。 （６）キジツ　（略）必要に応じて,「キジツ」の確認試験を準用する。	（１）ブクリョウ　（略）また,「ブクリョウ」の確認試験を準用する。 （２）ビャクジュツ　（略）また,「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。 （３）ニンジン　（略）また,「ニンジン」の確認試験を準用する。 （５）チンピ　（略）また,「チンピ」の確認試験を準用する。 （６）キジツ　（略）また,「キジツ」の確認試験を準用する。
375	K170	茯苓飲合半夏厚朴湯	（１）ブクリョウ　（略）必要に応じて,「ブクリョウ」の確認試験を準用する。	（１）ブクリョウ　（略）また,「ブクリョウ」の確認試験を準用する。

			（2）ビャクジュツ　（略）必要に応じて,「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。 （3）ニンジン　（略）必要に応じて,「ニンジン」の確認試験を準用する。 （5）チンピ　（略）必要に応じて,「チンピ」の確認試験を準用する。 （6）キジツ　（略）必要に応じて,「キジツ」の確認試験を準用する。 （8）コウボク　（略）必要に応じて,「コウボク」の確認試験を準用する。 （9）ソヨウ　（略）必要に応じて,「ソヨウ」の確認試験を準用する。	（2）ビャクジュツ　（略）また,「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。 （3）ニンジン　（略）また,「ニンジン」の確認試験を準用する。 （5）チンピ　（略）また,「チンピ」の確認試験を準用する。 （6）キジツ　（略）また,「キジツ」の確認試験を準用する。 （8）コウボク　（略）また,「コウボク」の確認試験を準用する。 （9）ソヨウ　（略）また,「ソヨウ」の確認試験を準用する。
376	K171	茯苓沢瀉湯	（1）ブクリョウ　（略）必要に応じて,「ブクリョウ」の確認試験を準用する。 （3）ビャクジュツ　（略）必要に応じて,「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。	（1）ブクリョウ　（略）また,「ブクリョウ」の確認試験を準用する。 （3）ビャクジュツ　（略）また,「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。
377	K172	分消湯	（2）ビャクジュツ　（略）必要に応じて,「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。 （3）ブクリョウ　（略）必要に応じて,「ブクリョウ」の確認試験を準用する。 （4）チンピ　（略）必要に応じて,「チンピ」の確認試験を準用する。 （5）コウボク　（略）必要に応じて,「コウボク」の確認試験を準用する。 （7）チョレイ　（略）必要に応じて,「チョレイ」の確	（2）ビャクジュツ　（略）また,「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。 （3）ブクリョウ　（略）また,「ブクリョウ」の確認試験を準用する。 （4）チンピ　（略）また,「チンピ」の確認試験を準用する。 （5）コウボク　（略）また,「コウボク」の確認試験を準用する。 （7）チョレイ　（略）また,「チョレイ」の確認試験

			認試験を準用する。 （9）キジツ　（略）必要に応じて,「キジツ」の確認試験を準用する。 （10）ダイフクヒ　（略）必要に応じて，局外生規「ダイフクヒ」の確認試験を準用する。 （12）モッコウ　（略）必要に応じて,「モッコウ」の確認試験を準用する。 （14）トウシンソウ　（略）必要に応じて，局外生規「トウシンソウ」の確認試験を準用する。	を準用する。 （9）キジツ　（略）また,「キジツ」の確認試験を準用する。 （10）ダイフクヒ　（略）また，局外生規「ダイフクヒ」の確認試験を準用する。 （12）モッコウ　（略）また,「モッコウ」の確認試験を準用する。 （14）トウシンソウ　（略）また，局外生規「トウシンソウ」の確認試験を準用する。
378	K173	平胃散料	（1）ビャクジュツ　（略）必要に応じて,「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。 （2）コウボク　（略）必要に応じて,「コウボク」の確認試験を準用する。 （3）チンピ　（略）必要に応じて,「チンピ」の確認試験を準用する。	（1）ビャクジュツ　（略）また,「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。 （2）コウボク　（略）また,「コウボク」の確認試験を準用する。 （3）チンピ　（略）また,「チンピ」の確認試験を準用する。
379	K174	防已黄耆湯	（1）ボウイ　（略）必要に応じて,「ボウイ」の確認試験を準用する。 （3）ビャクジュツ　（略）必要に応じて,「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。	（1）ボウイ　（略）また,「ボウイ」の確認試験を準用する。 （3）ビャクジュツ　（略）また,「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。
380	K175	防已茯苓湯	（1）ボウイ　（略）必要に応じて,「ボウイ」の確認試験を準用する。 （4）ブクリョウ　（略）必要に応じて,「ブクリョウ」の確認試験を準用する。	（1）ボウイ　（略）また,「ボウイ」の確認試験を準用する。 （4）ブクリョウ　（略）また,「ブクリョウ」の確認試験を準用する。
381	K176	防風通聖散料	（2）シャクヤク　（略）必要に応じて,「シャクヤク」の確認試験を準用する。	（2）シャクヤク　（略）また,「シャクヤク」の確認試験を準用する。

			（4）サンシシ　（略）必要に応じて,「サンシシ」の確認試験を準用する。 （5）レンギョウ　（略）必要に応じて,「レンギョウ」の確認試験を準用する。 （6）ハッカ　（略）必要に応じて,「ハッカ」の確認試験を準用する。 （8）ケイガイ　（略）必要に応じて,「ケイガイ」の確認試験を準用する。 （10）マオウ　（略）必要に応じて,「マオウ」の確認試験を準用する。 （11）ダイオウ　（略）必要に応じて,「ダイオウ」の確認試験を準用する。 （13）ビャクジュツ　（略）必要に応じて,「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。 （14）キキョウ　（略）必要に応じて,「キキョウ」の確認試験を準用する。 （15）オウゴン　（略）必要に応じて,「オウゴン」の確認試験を準用する。 （17）セッコウ　（略）必要に応じて,「セッコウ」の確認試験を準用する。 （18）カッセキ　（略）必要に応じて,「カッセキ」の確認試験を準用する。	（4）サンシシ　（略）また,「サンシシ」の確認試験を準用する。 （5）レンギョウ　（略）また,「レンギョウ」の確認試験を準用する。 （6）ハッカ　（略）また,「ハッカ」の確認試験を準用する。 （8）ケイガイ　（略）また,「ケイガイ」の確認試験を準用する。 （10）マオウ　（略）また,「マオウ」の確認試験を準用する。 （11）ダイオウ　（略）また,「ダイオウ」の確認試験を準用する。 （13）ビャクジュツ　（略）また,「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。 （14）キキョウ　（略）また,「キキョウ」の確認試験を準用する。 （15）オウゴン　（略）また,「オウゴン」の確認試験を準用する。 （17）セッコウ　（略）また,「セッコウ」の確認試験を準用する。 （18）カッセキ　（略）また,「カッセキ」の確認試験を準用する。
382	K177	補気建中湯	（1）ビャクジュツ　（略）必要に応じて,「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。 （2）ブクリョウ　（略）必要に応じて,「ブクリョウ」	（1）ビャクジュツ　（略）また,「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。 （2）ブクリョウ　（略）また,「ブクリョウ」の確認

			の確認試験を準用する。 （３）チンピ　（略）必要に応じて,「チンピ」の確認試験を準用する。 （４）ニンジン　（略）必要に応じて,「ニンジン」の確認試験を準用する。 （５）オウゴン　（略）必要に応じて,「オウゴン」の確認試験を準用する。 （６）コウボク　（略）必要に応じて,「コウボク」の確認試験を準用する。	試験を準用する。 （３）チンピ　（略）また,「チンピ」の確認試験を準用する。 （４）ニンジン　（略）また,「ニンジン」の確認試験を準用する。 （５）オウゴン　（略）また,「オウゴン」の確認試験を準用する。 （６）コウボク　（略）また,「コウボク」の確認試験を準用する。
383	K178	補中益気湯	（１）ニンジン　（略）必要に応じて,「ニンジン」の確認試験を準用する。 （２）ビャクジュツ　（略）必要に応じて,「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。 （５）チンピ　（略）必要に応じて,「チンピ」の確認試験を準用する。 （７）サイコ　（略）必要に応じて,「サイコ」の確認試験を準用する。	（１）ニンジン　（略）また,「ニンジン」の確認試験を準用する。 （２）ビャクジュツ　（略）また,「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。 （５）チンピ　（略）また,「チンピ」の確認試験を準用する。 （７）サイコ　（略）また,「サイコ」の確認試験を準用する。
384	K179	麻黄湯	（１）マオウ　（略）必要に応じて,「マオウ」の確認試験を準用する。 （２）キョウニン　（略）必要に応じて,「キョウニン」の確認試験を準用する。	（１）マオウ　（略）また,「マオウ」の確認試験を準用する。 （２）キョウニン　（略）また,「キョウニン」の確認試験を準用する。
385	K180	麻杏甘石湯	（１）マオウ　（略）必要に応じて,「マオウ」の確認試験を準用する。 （２）キョウニン　（略）必要に応じて,「キョウニン」の確認試験を準用する。	（１）マオウ　（略）また,「マオウ」の確認試験を準用する。 （２）キョウニン　（略）また,「キョウニン」の確認試験を準用する。

			（4）セッコウ　（略）必要に応じて,「セッコウ」の確認試験を準用する。	（4）セッコウ　（略）また,「セッコウ」の確認試験を準用する。
386	K181	麻杏薏甘湯	（1）マオウ　（略）必要に応じて,「マオウ」の確認試験を準用する。 （2）キョウニン　（略）必要に応じて,「キョウニン」の確認試験を準用する。 （3）ヨクイニン　（略）必要に応じて,「ヨクイニン」の確認試験を準用する。	（1）マオウ　（略）また,「マオウ」の確認試験を準用する。 （2）キョウニン　（略）また,「キョウニン」の確認試験を準用する。 （3）ヨクイニン　（略）また,「ヨクイニン」の確認試験を準用する。
387	K182	麻子仁丸料	（1）マシニン　（略）必要に応じて,「マシニン」の確認試験を準用する。 （2）シャクヤク　（略）必要に応じて,「シャクヤク」の確認試験を準用する。 （3）キジツ　（略）必要に応じて,「キジツ」の確認試験を準用する。 （4）コウボク　（略）必要に応じて,「コウボク」の確認試験を準用する。 （6）キョウニン　（略）必要に応じて,「キョウニン」の確認試験を準用する。	（1）マシニン　（略）また,「マシニン」の確認試験を準用する。 （2）シャクヤク　（略）また,「シャクヤク」の確認試験を準用する。 （3）キジツ　（略）また,「キジツ」の確認試験を準用する。 （4）コウボク　（略）また,「コウボク」の確認試験を準用する。 （6）キョウニン　（略）また,「キョウニン」の確認試験を準用する。
389	K183	薏苡仁湯	（1）マオウ　（略）必要に応じて,「マオウ」の確認試験を準用する。 （3）ビャクジュツ　（略）必要に応じて,「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。 （4）ヨクイニン　（略）必要に応じて,「ヨクイニン」の確認試験を準用する。 （6）シャクヤク　（略）必要に応じて,「シャクヤク」	（1）マオウ　（略）また,「マオウ」の確認試験を準用する。 （3）ビャクジュツ　（略）また,「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。 （4）ヨクイニン　（略）また,「ヨクイニン」の確認試験を準用する。 （6）シャクヤク　（略）また,「シャクヤク」の確認

			の確認試験を準用する。	試験を準用する。
390	K184	抑肝散料	（3）ブクリョウ　（略）必要に応じて,「ブクリョウ」の確認試験を準用する。 （4）ビャクジュツ　（略）必要に応じて,「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。 （5）サイコ　（略）必要に応じて,「サイコ」の確認試験を準用する。 （7）チョウトウコウ　（略）必要に応じて,「チョウトウコウ」の確認試験を準用する。	（3）ブクリョウ　（略）また,「ブクリョウ」の確認試験を準用する。 （4）ビャクジュツ　（略）また,「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。 （5）サイコ　（略）また,「サイコ」の確認試験を準用する。 （7）チョウトウコウ　（略）また,「チョウトウコウ」の確認試験を準用する。
391	K185	抑肝散料加陳皮半夏	（3）ブクリョウ　（略）必要に応じて,「ブクリョウ」の確認試験を準用する。 （4）ビャクジュツ　（略）必要に応じて,「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。 （5）サイコ　（略）必要に応じて,「サイコ」の確認試験を準用する。 （8）チンピ　（略）必要に応じて,「チンピ」の確認試験を準用する。 （9）チョウトウコウ　（略）必要に応じて,「チョウトウコウ」の確認試験を準用する。	（3）ブクリョウ　（略）また,「ブクリョウ」の確認試験を準用する。 （4）ビャクジュツ　（略）また,「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。 （5）サイコ　（略）また,「サイコ」の確認試験を準用する。 （8）チンピ　（略）また,「チンピ」の確認試験を準用する。 （9）チョウトウコウ　（略）また,「チョウトウコウ」の確認試験を準用する。
392	K186	六君子湯	（1）ニンジン　（略）必要に応じて,「ニンジン」の確認試験を準用する。 （2）ビャクジュツ　（略）必要に応じて,「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。 （3）ブクリョウ　（略）必要に応じて,「ブクリョウ」の確認試験を準用する。	（1）ニンジン　（略）また,「ニンジン」の確認試験を準用する。 （2）ビャクジュツ　（略）また,「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。 （3）ブクリョウ　（略）また,「ブクリョウ」の確認試験を準用する。

			（５）チンピ　（略）必要に応じて,「チンピ」の確認試験を準用する。	（５）チンピ　（略）また,「チンピ」の確認試験を準用する。
393	K187	立効散料	（５）リュウタン　（略）必要に応じて,「リュウタン」の確認試験を準用する。	（５）リュウタン　（略）また,「リュウタン」の確認試験を準用する。
394	K188	竜胆瀉肝湯	（３）モクツウ　（略）必要に応じて,「モクツウ」の確認試験を準用する。 （４）オウゴン　（略）必要に応じて,「オウゴン」の確認試験を準用する。 （６）シャゼンシ　（略）必要に応じて,「シャゼンシ」の確認試験を準用する。 （７）リュウタン　（略）必要に応じて,「リュウタン」の確認試験を準用する。 （８）サンシシ　（略）必要に応じて,「サンシシ」の確認試験を準用する。	（３）モクツウ　（略）また,「モクツウ」の確認試験を準用する。 （４）オウゴン　（略）また,「オウゴン」の確認試験を準用する。 （６）シャゼンシ　（略）また,「シャゼンシ」の確認試験を準用する。 （７）リュウタン　（略）また,「リュウタン」の確認試験を準用する。 （８）サンシシ　（略）また,「サンシシ」の確認試験を準用する。
395	K189	苓姜朮甘湯	（１）ブクリョウ　（略）必要に応じて,「ブクリョウ」の確認試験を準用する。 （２）カンキョウ　（略）必要に応じて,「カンキョウ」の確認試験を準用する。 （３）ビャクジュツ　（略）必要に応じて,「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。	（１）ブクリョウ　（略）また,「ブクリョウ」の確認試験を準用する。 （２）カンキョウ　（略）また,「カンキョウ」の確認試験を準用する。 （３）ビャクジュツ　（略）また,「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。
396	K190	苓桂甘棗湯	（１）ブクリョウ　（略）必要に応じて,「ブクリョウ」の確認試験を準用する。	（１）ブクリョウ　（略）また,「ブクリョウ」の確認試験を準用する。
397	K191	苓桂朮甘湯	（１）ブクリョウ　（略）必要に応じて,「ブクリョウ」の確認試験を準用する。 （４）ビャクジュツ　（略）必要に応じて,「ビャクジュ	（１）ブクリョウ　（略）また,「ブクリョウ」の確認試験を準用する。 （４）ビャクジュツ　（略）また,「ビャクジュツ」の

			ツ」の確認試験を準用する。	確認試験を準用する。
398	K192	六味地黄丸料	（3）サンヤク　（略）必要に応じて,「サンヤク」の確認試験を準用する。 （5）ブクリョウ　（略）必要に応じて,「ブクリョウ」の確認試験を準用する。 （6）ボタンピ　（略）必要に応じて,「ボタンピ」の確認試験を準用する。	（3）サンヤク　（略）また,「サンヤク」の確認試験を準用する。 （5）ブクリョウ　（略）また,「ブクリョウ」の確認試験を準用する。 （6）ボタンピ　（略）また,「ボタンピ」の確認試験を準用する。
400	K193	黄耆桂枝五物湯	（2）シャクヤク　（略）必要に応じて,「シャクヤク」の確認試験を準用する。	（2）シャクヤク　（略）また,「シャクヤク」の確認試験を準用する。
401	K194	解労散料	（1）シャクヤク　（略）必要に応じて,「シャクヤク」の確認試験を準用する。 （2）サイコ　（略）必要に応じて,「サイコ」の確認試験を準用する。 （4）キジツ　（略）必要に応じて,「キジツ」の確認試験を準用する。 （6）ブクリョウ　（略）必要に応じて,「ブクリョウ」の確認試験を準用する。	（1）シャクヤク　（略）また,「シャクヤク」の確認試験を準用する。 （2）サイコ　（略）また,「サイコ」の確認試験を準用する。 （4）キジツ　（略）また,「キジツ」の確認試験を準用する。 （6）ブクリョウ　（略）また,「ブクリョウ」の確認試験を準用する。
402	K195	加味四物湯	（3）シャクヤク　（略）必要に応じて,「シャクヤク」の確認試験を準用する。 （7）ニンジン　（略）必要に応じて,「ニンジン」の確認試験を準用する。 （8）ゴシツ　（略）必要に応じて,「ゴシツ」の確認試験を準用する。 （9）オウバク　（略）必要に応じて,「オウバク」の確認試験を準用する。	（3）シャクヤク　（略）また,「シャクヤク」の確認試験を準用する。 （7）ニンジン　（略）また,「ニンジン」の確認試験を準用する。 （8）ゴシツ　（略）また,「ゴシツ」の確認試験を準用する。 （9）オウバク　（略）また,「オウバク」の確認試験を準用する。

			（11）オウレン　（略）必要に応じて,「オウレン」の確認試験を準用する。 （12）チモ　（略）必要に応じて,「チモ」の確認試験を準用する。 （13）トチュウ　（略）必要に応じて,「トチュウ」の確認試験を準用する。	（11）オウレン　（略）また,「オウレン」の確認試験を準用する。 （12）チモ　（略）また,「チモ」の確認試験を準用する。 （13）トチュウ　（略）また,「トチュウ」の確認試験を準用する。
403	K196	杞菊地黄丸料	（３）サンヤク　（略）必要に応じて,「サンヤク」の確認試験を準用する。 （５）ブクリョウ　（略）必要に応じて,「ブクリョウ」の確認試験を準用する。 （６）ボタンピ　（略）必要に応じて,「ボタンピ」の確認試験を準用する。 （７）クコシ　（略）必要に応じて,「クコシ」の確認試験を準用する。 （８）キクカ　（略）必要に応じて,「キクカ」の確認試験を準用する。	（３）サンヤク　（略）また,「サンヤク」の確認試験を準用する。 （５）ブクリョウ　（略）また,「ブクリョウ」の確認試験を準用する。 （６）ボタンピ　（略）また,「ボタンピ」の確認試験を準用する。 （７）クコシ　（略）また,「クコシ」の確認試験を準用する。 （８）キクカ　（略）また,「キクカ」の確認試験を準用する。
404	K197	柴蘇飲	（１）サイコ　（略）必要に応じて,「サイコ」の確認試験を準用する。 （３）オウゴン　（略）必要に応じて,「オウゴン」の確認試験を準用する。 （４）ニンジン　（略）必要に応じて,「ニンジン」の確認試験を準用する。 （９）チンピ　（略）必要に応じて,「チンピ」の確認試験を準用する。	（１）サイコ　（略）また,「サイコ」の確認試験を準用する。 （３）オウゴン　（略）また,「オウゴン」の確認試験を準用する。 （４）ニンジン　（略）また,「ニンジン」の確認試験を準用する。 （９）チンピ　（略）また,「チンピ」の確認試験を準用する。

405	K198	沢瀉湯	（2）ビャクジュツ　（略）必要に応じて,「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。	（2）ビャクジュツ　（略）また,「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。
406	K199	知柏地黄丸料	（3）サンヤク　（略）必要に応じて,「サンヤク」の確認試験を準用する。 （5）ブクリョウ　（略）必要に応じて,「ブクリョウ」の確認試験を準用する。 （6）ボタンピ　（略）必要に応じて,「ボタンピ」の確認試験を準用する。 （7）チモ　（略）必要に応じて,「チモ」の確認試験を準用する。 （8）オウバク　（略）必要に応じて,「オウバク」の確認試験を準用する。	（3）サンヤク　（略）また,「サンヤク」の確認試験を準用する。 （5）ブクリョウ　（略）また,「ブクリョウ」の確認試験を準用する。 （6）ボタンピ　（略）また,「ボタンピ」の確認試験を準用する。 （7）チモ　（略）また,「チモ」の確認試験を準用する。 （8）オウバク　（略）また,「オウバク」の確認試験を準用する。
407	K200	中建中湯	（2）シャクヤク　（略）必要に応じて,「シャクヤク」の確認試験を準用する。 （6）カンキョウ　（略）必要に応じて,「カンキョウ」の確認試験を準用する。 （7）ニンジン　（略）必要に応じて,「ニンジン」の確認試験を準用する。	（2）シャクヤク　（略）また,「シャクヤク」の確認試験を準用する。 （6）カンキョウ　（略）また,「カンキョウ」の確認試験を準用する。 （7）ニンジン　（略）また,「ニンジン」の確認試験を準用する。
408	K201	当帰芍薬散料加黄耆釣藤	（4）シャクヤク　（略）必要に応じて,「シャクヤク」の確認試験を準用する。 （5）ブクリョウ　（略）必要に応じて,「ブクリョウ」の確認試験を準用する。 （6）ビャクジュツ　（略）必要に応じて,「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。 （8）チョウトウコウ　（略）必要に応じて,「チョウト	（4）シャクヤク　（略）また,「シャクヤク」の確認試験を準用する。 （5）ブクリョウ　（略）また,「ブクリョウ」の確認試験を準用する。 （6）ビャクジュツ　（略）また,「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。 （8）チョウトウコウ　（略）また,「チョウトウコウ」

			ウコウ」の確認試験を準用する。	の確認試験を準用する。
409	K202	当帰芍薬散料加人参	（４）シャクヤク　（略）必要に応じて,「シャクヤク」の確認試験を準用する。 （５）ブクリョウ　（略）必要に応じて,「ブクリョウ」の確認試験を準用する。 （６）ビャクジュツ　（略）必要に応じて,「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。 （７）ニンジン　（略）必要に応じて,「ニンジン」の確認試験を準用する。	（４）シャクヤク　（略）また,「シャクヤク」の確認試験を準用する。 （５）ブクリョウ　（略）また,「ブクリョウ」の確認試験を準用する。 （６）ビャクジュツ　（略）また,「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。 （７）ニンジン　（略）また,「ニンジン」の確認試験を準用する。
410	K203	排膿散及湯	（１）キキョウ　（略）必要に応じて,「キキョウ」の確認試験を準用する。 （４）シャクヤク　（略）必要に応じて,「シャクヤク」の確認試験を準用する。 （６）キジツ　（略）必要に応じて,「キジツ」の確認試験を準用する。	（１）キキョウ　（略）また,「キキョウ」の確認試験を準用する。 （４）シャクヤク　（略）また,「シャクヤク」の確認試験を準用する。 （６）キジツ　（略）また,「キジツ」の確認試験を準用する。
411	K204	八解散料	（２）ブクリョウ　（略）必要に応じて,「ブクリョウ」の確認試験を準用する。 （３）チンピ　（略）必要に応じて,「チンピ」の確認試験を準用する。 （６）コウボク　（略）必要に応じて,「コウボク」の確認試験を準用する。 （７）ニンジン　（略）必要に応じて,「ニンジン」の確認試験を準用する。 （８）カッコウ　（略）必要に応じて,「カッコウ」の確認試験を準用する。	（２）ブクリョウ　（略）また,「ブクリョウ」の確認試験を準用する。 （３）チンピ　（略）また,「チンピ」の確認試験を準用する。 （６）コウボク　（略）また,「コウボク」の確認試験を準用する。 （７）ニンジン　（略）また,「ニンジン」の確認試験を準用する。 （８）カッコウ　（略）また,「カッコウ」の確認試験を準用する。

			（9）ビャクジュツ　（略）必要に応じて,「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。	（9）ビャクジュツ　（略）また,「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。
412	K205	味麦地黄丸料	（3）サンヤク　（略）必要に応じて,「サンヤク」の確認試験を準用する。 （5）ブクリョウ　（略）必要に応じて,「ブクリョウ」の確認試験を準用する。 （6）ボタンピ　（略）必要に応じて,「ボタンピ」の確認試験を準用する。	（3）サンヤク　（略）また,「サンヤク」の確認試験を準用する。 （5）ブクリョウ　（略）また,「ブクリョウ」の確認試験を準用する。 （6）ボタンピ　（略）また,「ボタンピ」の確認試験を準用する。
413	K206	明朗飲	（1）ブクリョウ　（略）必要に応じて,「ブクリョウ」の確認試験を準用する。 （4）オウレン　（略）必要に応じて,「オウレン」の確認試験を準用する。 （5）ビャクジュツ　（略）必要に応じて,「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。 （7）シャゼンシ　（略）必要に応じて,「シャゼンシ」の確認試験を準用する。	（1）ブクリョウ　（略）また,「ブクリョウ」の確認試験を準用する。 （4）オウレン　（略）また,「オウレン」の確認試験を準用する。 （5）ビャクジュツ　（略）また,「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。 （7）シャゼンシ　（略）また,「シャゼンシ」の確認試験を準用する。
414	K207	抑肝散料加芍薬黄連	（2）チョウトウコウ　（略）必要に応じて,「チョウトウコウ」の確認試験を準用する。 （4）ビャクジュツ　（略）必要に応じて,「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。 （5）ブクリョウ　（略）必要に応じて,「ブクリョウ」の確認試験を準用する。 （6）サイコ　（略）必要に応じて,「サイコ」の確認試験を準用する。 （8）シャクヤク　（略）必要に応じて,「シャクヤク」	（2）チョウトウコウ　（略）また,「チョウトウコウ」の確認試験を準用する。 （4）ビャクジュツ　（略）また,「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。 （5）ブクリョウ　（略）また,「ブクリョウ」の確認試験を準用する。 （6）サイコ　（略）また,「サイコ」の確認試験を準用する。 （8）シャクヤク　（略）また,「シャクヤク」の確認

			の確認試験を準用する。 （9）オウレン　（略）必要に応じて,「オウレン」の確認試験を準用する。	試験を準用する。 （9）オウレン　（略）また,「オウレン」の確認試験を準用する。
415	K208	連珠飲	（2）ビャクジュツ　（略）必要に応じて,「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。 （5）シャクヤク　（略）必要に応じて,「シャクヤク」の確認試験を準用する。 （7）ブクリョウ　（略）必要に応じて,「ブクリョウ」の確認試験を準用する。	（2）ビャクジュツ　（略）また,「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。 （5）シャクヤク　（略）また,「シャクヤク」の確認試験を準用する。 （7）ブクリョウ　（略）また,「ブクリョウ」の確認試験を準用する。
416	K209	延年半夏湯	（2）サイコ　（略）必要に応じて,「サイコ」の確認試験を準用する。 （4）キキョウ　（略）必要に応じて,「キキョウ」の確認試験を準用する。 （5）ビンロウジ　（略）必要に応じて,「ビンロウジ」の確認試験を準用する。 （6）ニンジン　（略）必要に応じて,「ニンジン」の確認試験を準用する。 （8）キジツ　（略）必要に応じて,「キジツ」の確認試験を準用する。 （9）ゴシュユ　（略）必要に応じて,「ゴシュユ」の確認試験を準用する。	（2）サイコ　（略）また,「サイコ」の確認試験を準用する。 （4）キキョウ　（略）また,「キキョウ」の確認試験を準用する。 （5）ビンロウジ　（略）また,「ビンロウジ」の確認試験を準用する。 （6）ニンジン　（略）また,「ニンジン」の確認試験を準用する。 （8）キジツ　（略）また,「キジツ」の確認試験を準用する。 （9）ゴシュユ　（略）また,「ゴシュユ」の確認試験を準用する。
417	K210	加味解毒湯	（1）オウレン　（略）必要に応じて,「オウレン」の確認試験を準用する。 （2）オウゴン　（略）必要に応じて,「オウゴン」の確認試験を準用する。	（1）オウレン　（略）また,「オウレン」の確認試験を準用する。 （2）オウゴン　（略）また,「オウゴン」の確認試験を準用する。

			（3）オウバク　（略）必要に応じて,「オウバク」の確認試験を準用する。 （4）サンシシ　（略）必要に応じて,「サンシシ」の確認試験を準用する。 （5）サイコ　（略）必要に応じて,「サイコ」の確認試験を準用する。 （6）インチンコウ　（略）必要に応じて,「インチンコウ」の確認試験を準用する。 （7）リュウタン　（略）必要に応じて,「リュウタン」の確認試験を準用する。 （8）モクツウ　（略）必要に応じて,「モクツウ」の確認試験を準用する。 （9）カッセキ　（略）必要に応じて,「カッセキ」の確認試験を準用する。 (12) トウシンソウ　（略）必要に応じて, 局外生規「トウシンソウ」の確認試験を準用する。 (13) ダイオウ　（略）必要に応じて,「ダイオウ」の確認試験を準用する。	（3）オウバク　（略）また,「オウバク」の確認試験を準用する。 （4）サンシシ　（略）また,「サンシシ」の確認試験を準用する。 （5）サイコ　（略）また,「サイコ」の確認試験を準用する。 （6）インチンコウ　（略）また,「インチンコウ」の確認試験を準用する。 （7）リュウタン　（略）また,「リュウタン」の確認試験を準用する。 （8）モクツウ　（略）また,「モクツウ」の確認試験を準用する。 （9）カッセキ　（略）また,「カッセキ」の確認試験を準用する。 (12) トウシンソウ　（略）また, 局外生規「トウシンソウ」の確認試験を準用する。 (13) ダイオウ　（略）また,「ダイオウ」の確認試験を準用する。
418	K211	加味平胃散料	（1）ビャクジュツ　（略）必要に応じて,「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。 （2）チンピ　（略）必要に応じて,「チンピ」の確認試験を準用する。 （5）サンザシ　（略）必要に応じて,「サンザシ」の確	（1）ビャクジュツ　（略）また,「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。 （2）チンピ　（略）また,「チンピ」の確認試験を準用する。 （5）サンザシ　（略）また,「サンザシ」の確認試験

			認試験を準用する。 （6）コウボク　（略）必要に応じて,「コウボク」の確認試験を準用する。	を準用する。 （6）コウボク　（略）また,「コウボク」の確認試験を準用する。
419	K212	蛇床子湯	（1）ジャショウシ　（略）必要に応じて,「ジャショウシ」の確認試験を準用する。 （3）イレイセン　（略）必要に応じて,「イレイセン」の確認試験を準用する。 （4）クジン　（略）必要に応じて,「クジン」の確認試験を準用する。	（1）ジャショウシ　（略）また,「ジャショウシ」の確認試験を準用する。 （3）イレイセン　（略）また,「イレイセン」の確認試験を準用する。 （4）クジン　（略）また,「クジン」の確認試験を準用する。
420	K213	蒸眼一方	（1）硫酸アルミニウムカリウム水和物　（略）必要に応じて,「硫酸アルミニウムカリウム水和物」の確認試験を準用する。 （3）オウレン　（略）必要に応じて,「オウレン」の確認試験を準用する。 （4）オウバク　（略）必要に応じて,「オウバク」の確認試験を準用する。 （5）コウカ　（略）必要に応じて,「コウカ」の確認試験を準用する。	（1）硫酸アルミニウムカリウム水和物　（略）また,「硫酸アルミニウムカリウム水和物」の確認試験を準用する。 （3）オウレン　（略）また,「オウレン」の確認試験を準用する。 （4）オウバク　（略）また,「オウバク」の確認試験を準用する。 （5）コウカ　（略）また,「コウカ」の確認試験を準用する。
421	K214	椒梅湯	（1）ウバイ　（略）必要に応じて，局外生規「ウバイ」の確認試験を準用する。 （3）ビンロウジ　（略）必要に応じて,「ビンロウジ」の確認試験を準用する。 （4）キジツ　（略）必要に応じて,「キジツ」の確認試験を準用する。 （9）センレンシ　（略）必要に応じて，局外生規「セン	（1）ウバイ　（略）また，局外生規「ウバイ」の確認試験を準用する。 （3）ビンロウジ　（略）また,「ビンロウジ」の確認試験を準用する。 （4）キジツ　（略）また,「キジツ」の確認試験を準用する。 （9）センレンシ　（略）また，局外生規「センレンシ」

			レンシ」の確認試験を準用する。 （10）コウボク　（略）必要に応じて,「コウボク」の確認試験を準用する。 （12）カンキョウ　（略）必要に応じて,「カンキョウ」の確認試験を準用する。	の確認試験を準用する。 （10）コウボク　（略）また,「コウボク」の確認試験を準用する。 （12）カンキョウ　（略）また,「カンキョウ」の確認試験を準用する。
422	K215	秦艽羌活湯	（1）ジンギョウ　（略）必要に応じて,局外生規「ジンギョウ」の確認試験を準用する。 （2）キョウカツ　（略）必要に応じて,「キョウカツ」の確認試験を準用する。 （7）マオウ　（略）必要に応じて,「マオウ」の確認試験を準用する。 （8）サイコ　（略）必要に応じて,「サイコ」の確認試験を準用する。 （9）コウホン　（略）必要に応じて,局外生規「コウホン」の確認試験を準用する。 （11）コウカ　（略）必要に応じて,「コウカ」の確認試験を準用する。	（1）ジンギョウ　（略）また,局外生規「ジンギョウ」の確認試験を準用する。 （2）キョウカツ　（略）また,「キョウカツ」の確認試験を準用する。 （7）マオウ　（略）また,「マオウ」の確認試験を準用する。 （8）サイコ　（略）また,「サイコ」の確認試験を準用する。 （9）コウホン　（略）また,局外生規「コウホン」の確認試験を準用する。 （11）コウカ　（略）また,「コウカ」の確認試験を準用する。
423	K216	秦艽防風湯	（1）ジンギョウ　（略）必要に応じて,局外生規「ジンギョウ」の確認試験を準用する。 （3）チンピ　（略）必要に応じて,「チンピ」の確認試験を準用する。 （4）サイコ　（略）必要に応じて,「サイコ」の確認試験を準用する。 （9）オウバク　（略）必要に応じて,「オウバク」の確認試験を準用する。	（1）ジンギョウ　（略）また,局外生規「ジンギョウ」の確認試験を準用する。 （3）チンピ　（略）また,「チンピ」の確認試験を準用する。 （4）サイコ　（略）また,「サイコ」の確認試験を準用する。 （9）オウバク　（略）また,「オウバク」の確認試験を準用する。

			（11）ダイオウ　（略）必要に応じて,「ダイオウ」の確認試験を準用する。 （12）トウニン　（略）必要に応じて,「トウニン」の確認試験を準用する。 （13）コウカ　（略）必要に応じて,「コウカ」の確認試験を準用する。	（11）ダイオウ　（略）また,「ダイオウ」の確認試験を準用する。 （12）トウニン　（略）また,「トウニン」の確認試験を準用する。 （13）コウカ　（略）また,「コウカ」の確認試験を準用する。

※改正する生薬に関する確認試験のみ記載

○　薬局製剤指針　新旧対照表

（通知本文１（４）関係）

（傍線部分は改正部分）

一連番号	処方番号	処方名	改正後	改正前
30	鎮咳去痰薬３―①	-	確認試験（１）　（略）ノスカピン 10mg をメタノール 4mL に溶かし，標準溶液(4)とする。（略）	確認試験（１）　（略）ノスカピン 10mg をメタノール 4mg に溶かし，標準溶液(4)とする。（略）
31	鎮咳去痰薬４―②	-	確認試験（１）　（略）ノスカピン 10mg をメタノール 5mL に溶かし、標準溶液(4)とする。（略）	確認試験（１）　（略）ノスカピン 10mg をメタノール 5mg に溶かし、標準溶液(4)とする。（略）
256	K62	香砂六君子湯	確認試験 （10）**シュクシャ**　ほぼ球形又はだ円形を呈し，長さ 1～1.5cm，径 0.8～1cm，外面は灰褐色～暗褐色を呈し，石灰を散布して乾燥したものは白粉を付けている。種子塊は薄い膜で三部に分かれ，各部には仮種皮によって接合する 10～20 粒の種子がある。種子は多角形の粒状で，長さ 0.3～0.5cm，径約 0.3cm，外面には暗褐色で多数の細かい突起があり，質は堅い。種子を縫線に沿って縦断し，ルーペ視するとき，切面は細長く，へそは深くくぼみ，合点はややくぼんでいる。外乳は白色で，淡黄色の内乳及び胚を包み，胚は細長い。かめば特異な芳香があり，味は辛い。	確認試験 （10）**シャクヤク**　外面は褐色～淡灰褐色を呈し，横断面はち密で淡灰褐色を呈し，木部には淡褐色の放射状の線がある。わずかに特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後に渋くてわずかに苦い。 また，「シャクヤク」の確認し件を準用する。
284	K87	紫雲膏	成分及び分量又は本質 （略） 豚脂　20g（ない場合も可） 全量　1540g（1520g※） ※豚脂がない場合	成分及び分量又は本質 （略） 豚脂　20g 全量　1540g

薬　局　製　剤　指　針

令和８年 10 月 27 日

厚生労働省医薬局医薬品審査管理課

通　　則

１．本書を薬局製剤指針と称する。

２．薬局製剤指針の医薬品とは，医薬品各条に規定するものをいう。医薬品各条の品目を特定する場合には，医薬品各条に掲げられた処方番号（例えば，催眠鎮静薬〇〇）を用いる。

３．　薬局製剤指針の医薬品の品質の適否は，通則及び医薬品各条の規定によって判定する。

４．薬局製剤指針においては，別に規定するもののほか，薬局製剤の特性に応じて，日本薬局方通則，製剤総則，生薬総則及び一般試験法の規定を準用する。

５．分包散剤にあっては，医薬品各条に定める規格及び試験方法によるほか，次の重量偏差試験に適合しなければならない。

　重量偏差試験　本剤 20 包をとり，その重量を精密に量り，平均重量を計算するとき，この値と個々の重量との偏差（%）が 10%以下のときは適合とする。偏差（%）が 10%を超えるものがあるときは，内容物について，その重量偏差試験を行う。

　本剤 20 包をとり，個々の重量を精密に量る。このとき，個々の番号をひかえるなど識別して，各散剤（分包）とその重量との対応に留意する。包装を開き，内容物を小さなはけなどを用いて除去し，個々の空の包装の重量を精密に量る。個々の散剤（分包）の重量から対応する空の包装の重量を差し引いて，その散剤（分包）の内容物の重量とする。20 包について，個々の内容物の重量を求め，平均重量を計算するとき，この値と個々の重量との偏差（%）が 10%を超えるものが２包以下で，かつ 25%を超えるものがないときは適合とする。

６．本書の医薬品には，原則として，各条に規定する以外の成分（安定剤，その他）を加えることができない。ただし，賦形剤及び基剤については，製剤学的な観点から適切と考えられる場合は，各条に規定する以外の成分に変更することができる。

７．本書の医薬品に用いる原末について，その代替として倍散等を用いる場合には，原則として，各条において定める。ただし，原薬が入手困難な場合においては，この限りではない。

８．医薬品各条の「成分及び分量又は本質」欄に記載されている配合成分の規格として，「局外規」,「局外生規」又は「薬添規」の記載があるものは，日本薬局方外医薬品規格，日本薬局方外生薬規格，医薬品添加物規格の規格に適合するものであることを意味する。

９．医薬品各条に規定する医薬品が動物に由来するものを原料として製造されるものであるときは，別に規定する場合を除き，当該動物は，原則として，健康なものでなければならない。

10．医薬品各条の「規格及び試験方法」において定量法に用いる標準物質は，特に規定のない限り，日本薬局方各条に適合するもの，あるいは，日本工業規格特級の試薬を用いるものとする。

11．本書の医薬品のうち、生薬を主たる有効成分として含む漢方製剤及び生薬製剤について、「成分及び分量又は本質」欄に記載されている配合成分の分量が幅で記載されている場合においては、最大分量を基本とし、最小分量までの範囲で分量を選択することが可能である。

【 1 】　催眠鎮静薬 1—①

成分及び分量 又 は 本 質	日本薬局方　ブロモバレリル尿素　0.5g 賦形剤　〃　デンプン，乳糖水和物又はこれらの混合物　適　量 全　　量　1.0g
製 造 方 法	以上をとり，散剤の製法により製する。なお，分包散剤とする場合もある。
用法及び用量	大人（15 才以上）1 回 1.0g，1 日 1 回，就寝前に服用する。
効能又は効果	催　眠
貯蔵方法及び 有 効 期 間	密閉容器
規格及び試験方法	別記のとおり。
備　　考	

規 格 及 び 試 験 方 法

本品は定量するとき，ブロモバレリル尿素（$C_6H_{11}BrN_2O_2$：223.07）45.0～55.0%を含む。

性　　状　本品は白色の粉末である。

確認試験　本品 0.4g にメタノール 3mL を加えて振り混ぜた後，ろ過し，ろ液を試料溶液とする。別にブロモバレリル尿素 0.2g をメタノール 3mL に溶かし，標準溶液とする。これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び標準溶液 5μL ずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲル（蛍光剤入り）を用いて調製した薄層板にスポットする。次に酢酸エチル・ヘキサン混液（4：1）を展開溶媒として約 10cm 展開した後，薄層板を風乾する。これに紫外線（主波長 254nm）を照射するとき，試料溶液から得たスポットは，標準溶液から得たスポットと色調及び *Rf* 値が等しい。

定 量 法　本品約 0.1g を精密に量り，メタノール 30mL を加え，10 分間振り混ぜた後，内標準溶液 5mL を正確に加え，更にメタノールを加えて 50mL とする。この液をろ過し，初めのろ液 10mL を除き，次のろ液を試料溶液とする。別に定量用ブロモバレリル尿素 0.05g を精密に量り，内標準溶液 5mL を正確に加え，更にメタノールを加えて溶かし 50mL とし，標準溶液とする。試料溶液及び標準溶液 10μL につき，次の条件で液体クロマトグラフ法により試験を行い，内標準物質のピーク面積に対するブロモバレリル尿素のピーク面積の比 Q_T 及び Q_S を求める。

ブロモバレリル尿素（$C_6H_{11}BrN_2O_2$）の量（mg）

＝定量用ブロモバレリル尿素の量（mg）$\times \dfrac{Q_T}{Q_S}$

内標準溶液　パラオキシ安息香酸エチルのメタノール溶液（1→5000）

操作条件

検出器：紫外吸光光度計（測定波長：254nm）

カラム：内径約 4mm，長さ 15～25cm のステンレス管に 5～10μm の液体クロマトグラフ用オクタデシルシリル化シリカゲルを充てんする。

カラム温度：40℃付近の一定温度

移動相：薄めたリン酸（1→1000）・メタノール混液（3：2）

流量：ブロモバレリル尿素の保持時間が約 6 分になるように調整する。

カラムの選定：標準溶液 10μL につき，上記の条件で操作するとき，ブロモバレリル尿素，パラオキシ安息香酸エチルの順に溶出し，それぞれのピークが完全に分離するものを用いる。

【 2 】　催眠鎮静薬 2—①

成分及び分量又は本質	日本薬局方　ブロモバレリル尿素　0.6g 賦形剤　〃　デンプン，乳糖水和物又はこれらの混合物　適　量 全　量　3.0g
製造方法	以上をとり，散剤の製法により製する。なお，分包散剤とする場合もある。
用法及び用量	大人（15 才以上）1 回 1.0g，1 日 3 回を限度とする。 服用間隔は 4 時間以上おくこと。
効能又は効果	鎮　静
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器
規格及び試験方法	別記のとおり。
備　考	

規 格 及 び 試 験 方 法

本品は定量するとき，ブロモバレリル尿素（$C_6H_{11}BrN_2O_2$：223.07）18.0～22.0%を含む。

性　状　本品は白色の粉末である。

確認試験　本品 1.0g にメタノール 3mL を加えて振り混ぜた後，ろ過し，ろ液を試料溶液とする。別にブロモバレリル尿素 0.2g をメタノール 3mL に溶かし，標準溶液とする。これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び標準溶液 5μL ずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲル（蛍光剤入り）を用いて調製した薄層板にスポットする。次に酢酸エチル・ヘキサン混液（4：1）を展開溶媒として約 10cm 展開した後，薄層板を風乾する。これに紫外線（主波長 254nm）を照射するとき，試料溶液から得たスポットは，標準溶液から得たスポットと色調及び *Rf* 値が等しい。

定 量 法　本品約 0.25g を精密に量り，メタノール 30mL を加え，10 分間振り混ぜた後，内標準溶液 5mL を正確に加え，更にメタノールを加えて 50mL とする。この液をろ過し，初めのろ液 10mL を除き，次のろ液を試料溶液とする。別に定量用ブロモバレリル尿素 0.05g を精密に量り，内標準溶液 5mL を正確に加え，更にメタノールを加えて溶かし 50mL とし，標準溶液とする。試料溶液及び標準溶液 10μL につき，次の条件で液体クロマトグラフ法により試験を行い，内標準物質のピーク面積に対するブロモバレリル尿素のピーク面積の比 Q_T 及び Q_S を求める。

ブロモバレリル尿素（$C_6H_{11}BrN_2O_2$）の量（mg）

＝定量用ブロモバレリル尿素の量（mg）$\times \dfrac{Q_T}{Q_S}$

内標準溶液　パラオキシ安息香酸エチルのメタノール溶液（1→5000）

操作条件

検出器：紫外吸光光度計（測定波長：254nm）

カラム：内径約 4mm，長さ 15～25cm のステンレス管に 5～10μm の液体クロマトグラフ用オクタデシルシリル化シリカゲルを充てんする。

カラム温度：40℃付近の一定温度

移動相：薄めたリン酸（1→1000）・メタノール混液（3：2）

流量：ブロモバレリル尿素の保持時間が約 6 分になるように調整する。

カラムの選定：標準溶液 10μL につき，上記の条件で操作するとき，ブロモバレリル尿素，パラオキシ安息香酸エチルの順に溶出し，それぞれのピークが完全に分離するものを用いる。

【 3 】　催眠鎮静薬 3—①

成分及び分量 又 は 本 質	日本薬局方	タンニン酸ジフェンヒドラミン	9.0g
	〃	ブロモバレリル尿素	50.0g
	賦形剤　〃	デンプン，乳糖水和物又はこれらの混合物	適　量
		全　　量	100g
製 造 方 法	以上をとり，散剤の製法により製する。ただし，分包散剤とする。		
用法及び用量	大人（15 才以上）1 回 1 包 1.0g，1 日 1 回，就寝前に服用する。		
効能又は効果	催　眠		
貯蔵方法及び 有 効 期 間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備　　考	ジフェンヒドラミン・バレリル尿素散		

規 格 及 び 試 験 方 法

本品は定量するとき，ジフェンヒドラミン（$C_{17}H_{21}NO$：255.36）2.2～3.2%及びブロモバレリル尿素（$C_6H_{11}BrN_2O_2$：223.07）45.0～55.0%を含む。

性　　状　本品はわずかに灰色を帯びた白色である。

確認試験　（1）　本品 0.1g に希塩酸 5mL，エタノール(95)1mL 及び水 10mL を加えて振り混ぜた後，ろ過する。ろ液に水酸化ナトリウム試液 10mL 及びクロロホルム 10mL を加えて抽出する。クロロホルム層を分取し，ブロモフェノールブルー試液 1mL を加えて振り混ぜるとき，クロロホルム層は黄色を呈する（タンニン酸ジフェンヒドラミン）。

（2）　本品 0.02g にジエチルエーテル 10mL を加えて振り混ぜ，ろ過する。ろ液を水浴上で蒸発乾固し，残留物を水酸化ナトリウム試液 2mL に溶かし，ジメチルグリオキシム・チオセミカルバジド試液 5mL を加えて水浴中で 30 分間加熱するとき，液は赤色を呈する（ブロモバレリル尿素）。

（3）　本品 0.3g にメタノール 5mL を加えて振り混ぜた後，ろ過し，ろ液を試料溶液とする。別にブロモバレリル尿素 0.15g 及びタンニン酸ジフェンヒドラミン 0.03g をそれぞれメタノール 5mL に溶かし，標準溶液（1）及び標準溶液（2）とする。これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び標準溶液 5μL ずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲル（蛍光剤入り）を用いて調製した薄層板にスポットする。次に酢酸エチル・エタノール（99.5）・アンモニア水（28）混液（50：5：1）を展開溶媒として約 10cm 展開した後，薄層板を風乾する。これに紫外線（主波長：254nm）を照射するとき，試料溶液から得た 3 個のスポットの *Rf* 値は，標準溶液（1）及び標準溶液（2）から得たそれぞれのスポットの *Rf* 値に等しい。また，この薄層板に噴霧用ドラーゲンドルフ試液を均等に噴霧するとき，標準溶液（2）から得たスポット及びそれに対応する位置の試料溶液から得たスポットは，だいだい色を呈する。

定 量 法　（1）　本品約 0.5g を精密に量り，メタノール 30mL を加え，10 分間振り混ぜた後，内標準溶液 5mL を正確に加え，更にメタノールを加えて 50mL とする。この液をろ過し，初めのろ液 10mL を除き，次のろ液を試料溶液とする。別に定量用タンニン酸ジフェンヒドラミンを 105℃で 5 時間乾燥し，その約 0.045g を精密に量り，内標準溶液 5mL を正確に加え，更にメタノールを加えて溶かし 50mL とし，標準溶液とする。試料溶液及び標準溶液 10μL につき，次の条件で液体クロマトグラフ法により試験を行い，内標準物質のピーク面積に対するタンニン酸ジフェンヒドラミンのピーク面積の比 Q_T 及び Q_S を求める。

タンニン酸ジフェンヒドラミンの量（mg）

＝定量用タンニン酸ジフェンヒドラミンの量（mg）$\times\frac{Q_T}{Q_S}$

内標準溶液　パラオキシ安息香酸ヘプチルのメタノール溶液（1→200）

操作条件

検出器：紫外吸光光度計（測定波長：230nm）

カラム：内径約 4mm，長さ 15～25cm のステンレス管に 5～10μm の液体クロマトグラフ用オクタデシルシリル化シリカゲルを充てんする。

カラム温度：40℃付近の一定温度

移動相：ドデシル硫酸ナトリウム 5g を薄めたリン酸（1→1000）に溶かして 1000mL とする。この液 250mL にメタノール 750mL を加える。

流量：タンニン酸ジフェンヒドラミンの保持時間が約 6 分になるように調整する。

カラムの選定：標準溶液 10μL につき，上記の条件で操作するとき，タンニン酸ジフェンヒドラミン，パラオキシ安息香酸ヘプチルの順に溶出し，それぞれのピークが完全に分離するものを用いる。

（2）　本品約 0.1g を精密に量り，メタノール 30mL を加え，10 分間振り混ぜた後，内標準溶液 5mL を正確に加え，更にメタノールを加えて 50mL とする。この液をろ過し，初めのろ液 10mL を除き，次のろ液を試料溶液とする。別に定量用ブロモバレリル尿素を 80℃で 2 時間乾燥し，その約 0.05g を精密に量り，内標準溶液 5mL を正確に加え，更にメタノールを加えて溶かし 50mL とし，標準溶液とする。試料溶液及び標準溶液 10μL につき，次の条件で液体クロマトグラフ法により試験を行い，内標準物質のピーク面積に対するブロモバレリル尿素のピーク面積の比 Q_T 及び Q_S を求める。

ブロモバレリル尿素（$C_6H_{11}BrN_2O_2$）の量（mg）

＝定量用ブロモバレリル尿素の量（mg）$\times\frac{Q_T}{Q_S}$

内標準溶液　パラオキシ安息香酸エチルのメタノール溶液（1→5000）

操作条件

検出器：紫外吸光光度計（測定波長：254nm）

カラム：内径約 4mm，長さ 15～25cm のステンレス管に 5～10μm の液体クロマトグラフ用オクタデシルシリル化シリカゲルを充てんする。

カラム温度：40℃付近の一定温度

移動相：薄めたリン酸（1→1000）・メタノール混液（55：45）

流量：ブロモバレリル尿素の保持時間が約 6 分になるように調整する。

カラムの選定：標準溶液 10μL につき，上記の条件で操作するとき，ブロモバレリル尿素，パラオキシ安息香酸エチルの順に溶出し，それぞれのピークが完全に分離するものを用いる。

【 4 】　鎮暈薬 1—①

成分及び分量又は本質	日本薬局方	ジフェニドール塩酸塩	0.025g
	〃	ブロモバレリル尿素	0.2g
	〃	*l*- メントール	0.03g
	〃	炭酸水素ナトリウム	1.0g
	賦形剤　〃	デンプン，乳糖水和物又はこれらの混合物	適　量
		全　　量	2.0g
製造方法	以上をとり，散剤の製法により製する。ただし，分包製剤とする。 ジフェニドール塩酸塩に替えて，ジフェニドール塩酸塩散 10%を用いてもよい。		
用法及び用量	1 回量を次のとおりとし，乗物酔いの予防には乗車船 30 分前に服用する。ただし，追加服用する場合は，4 時間以上の間をおいて服用する。なお，1 日の服用回数は 3 回までとする。 大人（15 才以上）1 包 2.0g，11 才以上 15 才未満　大人の 2/3，7 才以上 11 才未満　大人の 1/2，3 才以上 7 才未満　大人の 1/3		
効能又は効果	乗物酔いによるめまい・吐き気・頭痛の予防及び緩和		
貯蔵方法及び有効期間	遮光した密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考			

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は白色の粉末で，ハッカのにおいがある。

確認試験　（1）　本品 2.0g にメタノール 5mL を加えて振り混ぜた後，ろ過し，ろ液を試料溶液とする。別にジフェニドール塩酸塩 0.025g 及びブロモバレリル尿素 0.2g をそれぞれメタノール 5mL に溶かし，標準溶液（1）及び標準溶液（2）とする。これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び標準溶液 10μL ずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲル（蛍光剤入り）を用いて調製した薄層板にスポットする。次に酢酸エチル・メタノール・酢酸（100）混液（10：10：1）を展開溶媒として約 10cm 展開した後，薄層板を風乾する。これに紫外線（主波長 254nm）を照射するとき，試料溶液から得た 2 個のスポットは，標準溶液（1）及び標準溶液（2）から得たスポットと色調及び *Rf* 値が等しい。

（2）　本品 1g に石油エーテル 10mL を加えて振り混ぜた後，ろ過する。ろ液を蒸発乾固し，残留物にエタノール(95)5mL を加えた後，硫酸 3mL を加えて振り混ぜるとき，液は黄赤色を呈する（*l*- メントール）。

（３）　本品 1g に希塩酸 3mL を加えるとき，発泡する（炭酸水素ナトリウム）。

【 5 】　解熱鎮痛薬 1—②

成分及び分量又は本質	日本薬局方	アセトアミノフェン	0.9g
	〃	ケイヒ末	0.3g
	〃	ショウキョウ末	0.1g
	〃	カンゾウ末	0.3g
	賦形剤　〃	デンプン，乳糖水和物又はこれらの混合物	適　量
		全　　量	3.0g
製造方法	以上をとり，散剤の製法により製する。ただし，分包散剤とする。		
用法及び用量	1回量を次のとおりとし，1日3回を限度とする。なるべく空腹時をさけて服用する。服用間隔は4時間以上おくこと。 大人（15才以上）1包1.0g，11才以上15才未満　大人の2/3		
効能又は効果	○頭痛・歯痛・抜歯後の疼痛・咽喉痛・耳痛・関節痛・神経痛・腰痛・筋肉痛・肩こり痛・打撲痛・骨折痛・ねんざ痛・月経痛（生理痛）・外傷痛の鎮痛 ○悪寒・発熱時の解熱		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考			

規 格 及 び 試 験 方 法

本品は定量するとき，アセトアミノフェン（$C_8H_9NO_2$：151.17）27～33%を含む。

性　　状　本品は淡褐色の粉末で，特異なにおいがある。

確認試験　（1）　本品0.1gにメタノール5mLを加えて振り混ぜた後，ろ過し，ろ液を試料溶液とする。別にアセトアミノフェン0.03gをそれぞれメタノール5mLに溶かし，標準溶液とする。これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び標準溶液5μLずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲル（蛍光剤入り）を用いて調製した薄層板にスポットする。次に酢酸エチル・ヘキサン混液（4：1）を展開溶媒として約10cm展開した後，薄層板を風乾する。これに紫外線（主波長254nm）を照射するとき，試料溶液から得たスポットは，標準溶液から得たスポットと色調及び*Rf*値が等しい。

（2）　本品3.0gにジエチルエーテル20mLを加えて振り混ぜた後，ろ過し，ろ液を蒸発乾固する。残留物をジエチルエーテル2mLに溶かし，試料溶液とする。別にケイヒ末0.3gをとり，試料溶液と同様に操作し，標準溶液とする。これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び標準溶液10μLを薄層クロマトグラフ用シリカゲルを用いて調製した薄層板にスポットする。次にヘキサン・クロロホルム・酢酸エチ

ル混液（4：4：1）を展開溶媒とし約 10cm 展開した後，薄層板を風乾する。これに 2，4 - ジニトロフェニルヒドラジン試液を均一に噴霧するとき，試料溶液から得た数個のスポットのうち 1 個のスポットは，標準溶液から得た黄だいだい色のスポットと色調及び *Rf* 値が等しい。

（3） 本品 6.0g にメタノール 20mL を加えて振り混ぜた後，遠心分離する。上澄液を除き，残留物にジエチルエーテル 30mL を加えて振り混ぜた後，遠心分離する。上澄液を蒸発乾固し，残留物をジエチルエーテル 2mL に溶かし，試料溶液とする。別にショウキョウ末 0.5g にジエチルエーテル 5mL を加えて振り混ぜた後，ろ過し，ろ液を標準溶液とする。これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び標準溶液 10μL を薄層クロマトグラフ用シリカゲルを用いて調製した薄層板にスポットする。次にクロロホルム・アセトン混液（5：1）を展開溶媒とし約 10cm 展開した後，薄層板を風乾する。これにバニリン・硫酸溶液*を均等に噴霧し，105℃で 5 分間加熱するとき，試料溶液から得た数個のスポットのうち 1 個のスポットは，標準溶液から得た紫色の主スポットと色調及び *Rf* 値が等しい。

［注］*バニリン・硫酸溶液：バニリン 0.5g にメタノール 25mL 及び希硫酸 25mL を加える。

（4） 本品 1.0g にメタノール 5mL を加えて振り混ぜた後，ろ過し，ろ液を試料溶液とする。別にグリチルリチン酸 5mg をメタノール 10mL に溶かし，標準溶液とする。これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び標準溶液 5μL ずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲル（蛍光剤入り）を用いて調製した薄層板にスポットする。次に 1 - ブタノール・水・酢酸（100）混液（7：2：1）を展開溶媒とし約 10cm 展開した後，薄層板を風乾する。これに紫外線（主波長 254nm）を照射するとき，試料溶液から得た数個のスポットのうち 1 個のスポットは，標準溶液から得た暗紫色のスポットと色調及び *Rf* 値が等しい。

定 量 法 本品約 0.05g を精密に量り，メタノール 30mL を加えて 10 分間振り混ぜた後，内標準溶液 5mL を正確に加え，更にメタノールを加えて 50mL とし，ろ過する。初めのろ液 10mL を除き，次のろ液を試料溶液とする。別に定量用アセトアミノフェン約 0.015g を精密に量り，内標準溶液 5mL を正確に加え，更にメタノールを加えて 50mL とし，標準溶液とする。試料溶液及び標準溶液 10μL につき，次の条件で液体クロマトグラフ法により試験を行い，内標準物質のピーク面積に対するアセトアミノフェンのピーク面積の比 Q_T 及び Q_S を求める。

アセトアミノフェン（$C_8H_9NO_2$）の量（mg）

＝定量用アセトアミノフェンの量（mg）$\times \frac{Q_T}{Q_S}$

内標準溶液　パラオキシ安息香酸のメタノール溶液（1→1000）

操作条件

検出器：紫外吸光光度計（測定波長：275nm）

カラム：内径約 4mm，長さ 15～25cm のステンレス管に 5～10μm の液体クロマトグラフ用オクタデシルシリル化シリカゲルを充てんする。

カラム温度：40℃

移動相：薄めたリン酸（1→1000）・アセトニトリル混液（93：7）

流量：パラオキシ安息香酸の保持時間が約 10 分になるように調整する。

カラムの選定：標準溶液 10μL につき，上記の条件で操作するとき，アセトアミノフェン，パラオキシ安息香酸の順に溶出し，それぞれのピークが完全に分離するものを用いる。

【 6 】　解熱鎮痛薬 2—③

成分及び分量 又 は 本 質	日本薬局方　アセトアミノフェン　0.9g 〃　カンゾウ末　0.5g 〃　シャクヤク末　0.5g 賦形剤　〃　デンプン，乳糖水和物又はこれらの混合物　適　量 全　量　3.0g
製 造 方 法	以上をとり，散剤の製法により製する。ただし，分包散剤とする。
用法及び用量	1 回量を次のとおりとし，1 日 2 回を限度とする。なるべく空腹時をさけて服用する。服用間隔は 6 時間以上おくこと。 大人（15 才以上）1 包 1.5g，11 才以上 15 才未満　大人の 2/3
効能又は効果	○頭痛・歯痛・抜歯後の疼痛・咽喉痛・耳痛・関節痛・神経痛・腰痛・筋肉痛・肩こり痛・打撲痛・骨折痛・ねんざ痛・月経痛（生理痛）・外傷痛の鎮痛 ○悪寒・発熱時の解熱
貯蔵方法及び 有 効 期 間	密閉容器
規格及び試験方法	別記のとおり。
備　考	

規 格 及 び 試 験 方 法

本品は定量するとき，アセトアミノフェン（$C_8H_9NO_2$：151.17）27～33%を含む。

性　状　本品は淡褐色の粉末で，特異なにおいがある。

確認試験　（1）　本品 0.1g にメタノール 5mL を加えて振り混ぜた後，ろ過し，ろ液を試料溶液とする。別にアセトアミノフェン 0.03g をそれぞれメタノール 5mL に溶かし，標準溶液とする。これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び標準溶液 5μL ずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲル（蛍光剤入り）を用いて調製した薄層板にスポットする。次に酢酸エチル・ヘキサン混液（4：1）を展開溶媒として約 10cm 展開した後，薄層板を風乾する。これに紫外線（主波長 254nm）を照射するとき，試料溶液から得たスポットは，標準溶液から得たスポットと色調及び *Rf* 値が等しい。

（2）　本品 1.0g にメタノール 5mL を加えて振り混ぜた後，ろ過し，ろ液を試料溶液とする。別にグリチルリチン酸 5mg をメタノール 10mL に溶かし，標準溶液とする。これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び標準溶液 5μL ずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲル（蛍光剤入り）を用いて調製した薄層板にスポットする。次に l - ブタノール・水・酢酸(100)混液（7：2：1）を展開溶媒とし約 10cm 展開した後，薄層板を風乾する。これに紫外線（主波長 254nm）を照射するとき，試料溶液から得

た数個のスポットのうち1個のスポットは，標準溶液から得たスポットと色調及び *Rf* 値が等しい。

（3） 本品 0.6g にメタノール 10mL を加えて水浴上で 10 分間加温し，冷後，ろ過する。ろ液を蒸発乾固し，残留物にメタノール 1mL を加えて溶かし，試料溶液とする。別にシャクヤク末 0.1g にメタノール 10mL を加え，試料溶液と同様に操作し，標準溶液とする。これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び標準溶液 5μL ずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲル（蛍光剤入り）を用いて調製した薄層板にスポットする。次にクロロホルム・メタノール・水混液（26：14：5）の下層を展開溶媒として約 10cm 展開した後，薄層板を風乾する。これに 4-メトキシベンズアルデヒド・硫酸試液を均等に噴霧し，105℃で 5 分間加熱するとき，試料溶液から得た数個のスポットのうち1個のスポットは，標準溶液から得た赤紫色のスポットと色調及び *Rf* 値が等しい。

定 量 法 本品約 0.05g を精密に量り，メタノール 30mL を加えて 10 分間振り混ぜた後，内標準溶液 5mL を正確に加え，更にメタノールを加えて 50mL とし，ろ過する。初めのろ液 10mL を除き，次のろ液を試料溶液とする。別に定量用アセトアミノフェン約 0.015g を精密に量り，内標準溶液 5mL を正確に加え，更にメタノールを加えて 50mL とし，標準溶液とする。試料溶液及び標準溶液 10μL につき，次の条件で液体クロマトグラフ法により試験を行い，内標準物質のピーク面積に対するアセトアミノフェンのピーク面積の比 Q_T 及び Q_S を求める。

アセトアミノフェン（$C_8H_9NO_2$）の量（mg）

＝定量用アセトアミノフェンの量（mg）$\times \dfrac{Q_T}{Q_S}$

内標準溶液　パラオキシ安息香酸のメタノール溶液（1→1000）

操作条件

検出器：紫外吸光光度計（測定波長：275nm）

カラム：内径約 4mm，長さ 15～25cm のステンレス管に 5～10μm の液体クロマトグラフ用オクタデシルシリル化シリカゲルを充てんする。

カラム温度：40℃

移動相：薄めたリン酸（1→1000）・アセトニトリル混液（93：7）

流量：パラオキシ安息香酸の保持時間が約 10 分になるように調整する。

カラムの選定：標準溶液 10μL につき，上記の条件で操作するとき，アセトアミノフェン，パラオキシ安息香酸の順に溶出し，それぞれのピークが完全に分離するものを用いる。

【 7 】　解熱鎮痛薬 4—②

成分及び分量又は本質	日本薬局方　アスピリン　0.5g 〃　エテンザミド　1.0g 〃　アセトアミノフェン　0.4g 賦形剤　〃　デンプン，乳糖水和物又はこれらの混合物　適　量 全　量　3.0g
製造方法	以上をとり，散剤の製法により製する。ただし，分包散剤とする。
用法及び用量	1回量を次のとおりとし，1日3回を限度とする。なるべく空腹時をさけて服用する。服用間隔は4時間以上おくこと。 大人（15才以上）1包 1.0g
効能又は効果	○頭痛・歯痛・抜歯後の疼痛・咽喉痛・耳痛・関節痛・神経痛・腰痛・筋肉痛・肩こり痛・打撲痛・骨折痛・ねんざ痛・月経痛（生理痛）・外傷痛の鎮痛 ○悪寒・発熱時の解熱
貯蔵方法及び有効期間	遮光した密閉容器
規格及び試験方法	別記のとおり。
備考	

規 格 及 び 試 験 方 法

本品は定量するとき，アスピリン（$C_9H_8O_4$：180.16）15.0～18.3%，エテンザミド（$C_9H_{11}NO_2$：165.19）30.0～36.7%及びアセトアミノフェン（$C_8H_9NO_2$：151.17）12.0～14.7%を含む。

性　　状　本品は白色の粉末である。

確認試験　本品 0.15g にメタノール 5mL を加えて振り混ぜた後，ろ過し，ろ液を試料溶液とする。別にアスピリン 0.025g，エテンザミド 0.05g 及びアセトアミノフェン 0.02g をそれぞれメタノール 5mL に溶かし，標準溶液（1），標準溶液（2），標準溶液（3）とする。これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び標準溶液 5μL ずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲル（蛍光剤入り）を用いて調製した薄層板にスポットする。次に酢酸クロロホルム・メタノール・水・酢酸(100)混液（26：14：4：1）の下層を展開溶媒として約 10cm 展開した後，薄層板を風乾する。これに紫外線（主波長 254nm）を照射するとき，試料溶液から得た 3 個のスポットは，標準溶液（1），標準溶液（2）及び標準溶液（3）から得たそれぞれのスポットと色調及び *Rf* 値が等しい。

定 量 法　本品約 0.15g を精密に量り，メタノール 30mL を加え，10 分間振り混ぜた後，内標準溶液 5mL を正確に加え，更にメタノールを加えて 50mL とし，ろ過する。初めのろ液 10mL を除き，次のろ液を試料溶液とする。別に定量用アスピリン約 0.025g，エ

テンザミド約 0.05g 及びアセトアミノフェン約 0.02g を精密に量り，内標準溶液 5mL を正確に加え，更にメタノールを加えて溶かし 50mL とし，標準溶液とする。試料溶液及び標準溶液 10 μ L につき，次の条件で液体クロマトグラフ法により試験を行い，内標準物質のピーク面積に対するアスピリン，エテンザミド及びアセトアミノフェンのピーク面積の比 Q_{Ta}，Q_{Tb}，Q_{Tc}，Q_{Sa}，Q_{Sb} 及び Q_{Sc} を求める。

アスピリン（$C_9H_8O_4$）の量（mg）

＝定量用アスピリンの量（mg）$\times \frac{Q_{Ta}}{Q_{Sa}}$

エテンザミド（$C_9H_{11}NO_2$）の量（mg）

＝定量用エテンザミドの量（mg）$\times \frac{Q_{Tb}}{Q_{Sb}}$

アセトアミノフェン（$C_8H_9NO_2$）の量（mg）

＝定量用アセトアミノフェンの量（mg）$\times \frac{Q_{Tc}}{Q_{Sc}}$

内標準溶液　サリチルアミドのメタノール溶液（1→250）

操作条件

検出器：紫外吸光光度計（測定波長：230nm）

カラム：内径約 4mm，長さ 15～25cm のステンレス管に 5～10μm の液体クロマトグラフ用オクタデシルシリル化シリカゲルを充てんする。

カラム温度：40℃

移動相：薄めたリン酸（1→1000）・メタノール混液（7：3）

流量：サリチルアミドの保持時間が約 7 分になるように調整する。

カラムの選定：標準溶液 10μL につき，上記の条件で操作するとき，アセトアミノフェン，サリチルアミド，アスピリン，エテンザミドの順に溶出し，それぞれのピークが完全に分離するものを用いる。

【 8 】　かぜ薬 1—②

成分及び分量又は本質	日本薬局方	アスピリン	0.75g
	〃	アセトアミノフェン	0.45g
	〃	カフェイン水和物	0.15g
	〃	クロルフェニラミンマレイン酸塩	0.0075g
	賦形剤	〃	デンプン，乳糖水和物又はこれらの混合物	適　量
			全　　量	3.0g
製造方法	以上をとり，散剤の製法により製する。ただし，分包散剤とする。クロルフェニラミンマレイン酸塩に替えて，クロルフェニラミンマレイン酸塩散１％を用いてもよい。			
用法及び用量	1回量を次のとおりとし，1日3回，食後服用する。 大人（15才以上）1包 1.0g			
効能又は効果	かぜの諸症状（鼻水，鼻づまり，くしゃみ，のどの痛み，悪寒，発熱，頭痛，関節の痛み，筋肉の痛み）の緩和			
貯蔵方法及び有効期間	遮光した密閉容器			
規格及び試験方法	別記のとおり。			
備考				

規 格 及 び 試 験 方 法

本品は定量するとき，アスピリン（$C_9H_8O_4$：180.16）22.5～27.5%，アセトアミノフェン（$C_8H_9NO_2$：151.17）13.5～16.5%，カフェイン水和物（$C_8H_{10}N_4O_2 \cdot H_2O$：212.21）4.5～5.5%及びクロルフェニラミンマレイン酸塩（$C_{16}H_{19}ClN_2 \cdot C_4H_4O_4$：390.87）0.23～0.28%を含む。

性　　状　本品は白色の粉末である。

確認試験　（1）　本品 0.1g にメタノール 5mL を加えて振り混ぜた後，ろ過し，ろ液を試料溶液とする。別にアスピリン 0.025g，アセトアミノフェン 0.015g 及びカフェイン水和物 0.01g をそれぞれメタノール 5mL，5mL 及び 10mL に溶かし，標準溶液（1），標準溶液（2）及び標準溶液（3）とする。これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び標準溶液 5μL ずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲル（蛍光剤入り）を用いて調製した薄層板にスポットする。次に酢酸エチル・ヘキサン・酢酸(100)混液（10：5：1）を展開溶媒として約 10cm 展開した後，薄層板を風乾する。これに紫外線（主波長 254nm）を照射するとき，試料溶液から得た 3 個のスポットは，標準溶液（1），標準溶液（2）及び標準溶液（3）から得たそれぞれのスポットと色調及び *Rf* 値が等しい。

（２）　本品 0.5g にクロロホルム 5mL を加えて振り混ぜた後，ろ過し，ろ液を試料溶液とする。別にクロルフェニラミンマレイン酸塩 5mg をクロロホルム 20mL に溶かし，標準溶液とする。これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び標準溶液 5μL ずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲルを用いて調製した薄層板にスポットする。次に酢酸エチル・エタノール(95)・アンモニア水(28)混液（15：5：1）を展開溶媒として約 10cm 展開した後，薄層板を風乾する。この薄層板に噴霧用ドラーゲンドルフ試液を均等に噴霧するとき，試料溶液から得たスポットは，標準溶液から得た黄赤色のスポットと色調及び *Rf* 値が等しい。

定 量 法　**（１）**　本品約 0.2g を精密に量り，メタノール 30mL を加え，10 分間振り混ぜた後，内標準溶液 5mL を正確に加え，更にメタノールを加えて 50mL とする。この液をろ過し，初めのろ液 10mL を除き，次のろ液を試料溶液とする。別に定量用アスピリン約 0.05g を精密に量り，内標準溶液 5mL を正確に加え，更にメタノールを加えて溶かし 50mL とし，標準溶液とする。試料溶液及び標準溶液 10μL につき，次の条件で液体クロマトグラフ法により試験を行い，内標準物質のピーク面積に対するアスピリンのピーク面積の比 Q_T 及び Q_S を求める。

アスピリン（$C_9H_8O_4$）の量（mg）

＝定量用アスピリンの量（mg）$\times\dfrac{Q_T}{Q_S}$

内標準溶液　パラオキシ安息香酸メチルのメタノール溶液（1→2000）

操作条件

検出器：紫外吸光光度計（測定波長：254nm）

カラム：内径約 4mm，長さ 15～25cm のステンレス管に 5～10μm の液体クロマトグラフ用オクタデシルシリル化シリカゲルを充てんする。

カラム温度：40℃付近の一定温度

移動相：薄めたリン酸（1→1000）・メタノール混液（65：35）

流量：アスピリンの保持時間が約 7 分になるように調整する。

カラムの選定：標準溶液 10μL につき，上記の条件で操作するとき，アスピリン，パラオキシ安息香酸メチルの順に溶出し，それぞれのピークが完全に分離するものを用いる。

（２）　本品約 0.1g を精密に量り，メタノール 30mL を加え，10 分間振り混ぜた後，内標準溶液 5mL を正確に加え，更にメタノールを加えて 50mL とする。この液をろ過し，初めのろ液 10mL を除き，次のろ液を試料溶液とする。別に定量用アセトアミノフェン約 0.15g 及び定量用カフェイン水和物約 0.05g をそれぞれ精密に量り，メタノールに溶かし，正確に 50mL とする。この液 5mL を正確に量り，内標準溶液 5mL を正確に加え，更にメタノールを加えて 50mL とし，標準溶液とする。試料溶液及び標準溶液 10μL につき，次の条件で液体クロマトグラフ法により試験を行い，内標準物質のピーク面積に対するアセトアミノフェン及びカフェイン水和物のピーク面積の比 Q_{Ta}，Q_{Tb}，Q_{Sa} 及び Q_{Sb} を求める。

アセトアミノフェン（$C_8H_9NO_2$）の量（mg）

＝定量用アセトアミノフェンの量（mg）$\times\dfrac{Q_{Ta}}{Q_{Sa}}\times\dfrac{1}{10}$

カフェイン水和物（$C_8H_{10}N_4O_2 \cdot H_2O$）の量（mg）

＝定量用カフェイン水和物の量（mg）$\times \frac{Q_{Tb}}{Q_{Sb}} \times \frac{1}{10}$

内標準溶液　パラオキシ安息香酸のメタノール溶液（1→1000）

操作条件

検出器：紫外吸光光度計（測定波長：275nm）

カラム：内径約 4mm，長さ 15～25cm のステンレス管に 5～10μm のオクタデシルシリル化シリカゲルを充てんする。

カラム温度：40℃付近の一定温度

移動相：薄めたリン酸（1→1000）・アセトニトリル混液（93：7）

流量：アセトアミノフェンの保持時間が約 5 分になるように調整する。

カラムの選定：標準溶液 10μL につき，上記の条件で操作するとき，アセトアミノフェン，パラオキシ安息香酸，カフェイン水和物の順に溶出し，それぞれのピークが完全に分離するものを用いる。

（３）　本品約 0.6g を精密に量り，薄めたアセトニトリル（1→2）30mL を加え，10 分間振り混ぜた後，内標準溶液 5mL を正確に加え，更に薄めたアセトニトリル（1→2）を加えて 50mL とする。この液をろ過し，初めのろ液 10mL を除き，次のろ液を試料溶液とする。別に定量用クロルフェニラミンマレイン酸塩約 0.03g を精密に量り，薄めたアセトニトリル（1→2）に溶かし，正確に 100mL とする。この液 5mL を正確に量り，内標準溶液 5mL を正確に加え，更に薄めたアセトニトリル（1→2）を加えて 50mL とし，標準溶液とする。試料溶液及び標準溶液 10μL につき，次の条件で液体クロマトグラフ法により試験を行い，内標準物質のピーク面積に対するクロルフェニラミンマレイン酸塩のピーク面積の比 Q_T 及び Q_S を求める。

クロルフェニラミンマレイン酸塩（$C_{16}H_{19}ClN_2 \cdot C_4H_4O_4$）の量（mg）

＝定量用クロルフェニラミンマレイン酸塩の量（mg）$\times \frac{Q_T}{Q_S} \times \frac{1}{20}$

内標準溶液　パラオキシ安息香酸イソアミルの薄めたアセトニトリル（1→2）溶液（1→15000）

操作条件

検出器：紫外吸光光度計（測定波長：260nm）

カラム：内径約 4mm，長さ 15～25cm のステンレス管に 5～10μm の液体クロマトグラフ用オクタデシルシリル化シリカゲルを充てんする。

カラム温度：40℃付近の一定温度

移動相：ドデシル硫酸ナトリウム 2.0g を薄めたリン酸（1→1000）1000mL に溶かす。この液 500mL にアセトニトリル 500mL を加える。

流量：クロルフェニラミンマレイン酸塩の保持時間が約 7 分になるように調整する。

カラムの選定：標準溶液 10μL につき，上記の条件で操作するとき，クロルフェニラミンマレイン酸塩，パラオキシ安息香酸イソアミルの順に溶出し，それぞれのピークが完全に分離するものを用いる。

【 9 】　かぜ薬 6—①

成分及び分量又は本質	日本薬局方	クロルフェニラミンマレイン酸塩	0.00375g
	〃	アセトアミノフェン	0.45g
	〃	カフェイン水和物	0.075g
	賦形剤　〃	白糖，乳糖水和物又はこれらの混合物	適　量
		全　　量	3.0g
製造方法	以上をとり，散剤の製法により製する。ただし，分包散剤とする。クロルフェニラミンマレイン酸塩に替えて，クロルフェニラミンマレイン酸塩散1%を用いてもよい。		
用法及び用量	1回量を次のとおりとし，1日3回，食後服用する。 7才以上11才未満　1包1.0g，3才以上7才未満　1包の2/3，1才以上3才未満　1包の1/2		
効能又は効果	かぜの諸症状（鼻水，鼻づまり，くしゃみ，のどの痛み，悪寒，発熱，頭痛，関節の痛み，筋肉の痛み）の緩和		
貯蔵方法及び有効期間	遮光した密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考			

規 格 及 び 試 験 方 法

本品は定量するとき，クロルフェニラミンマレイン酸塩（$C_{16}H_{19}ClN_2$・$C_4H_4O_4$：390.87）0.11～0.14%，アセトアミノフェン（$C_8H_9NO_2$：151.17）13.5～16.5%及びカフェイン水和物（$C_8H_{10}N_4O_2$・H_2O：212.21）2.25～2.75%を含む。

性　　状　本品は白色の粉末である。

確認試験　（1）　本品1gにメタノール5mLを加えて振り混ぜた後，ろ過し，ろ液を試料溶液とする。別にクロルフェニラミンマレイン酸塩5mgをメタノール20mLに溶かし，標準溶液とする。これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び標準溶液5μLずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲルを用いて調製した薄層板にスポットする。次に酢酸エチル・エタノール(95)・アンモニア水(28)混液（15：5：1）を展開溶媒として約10cm展開した後，薄層板を風乾する。この薄層板に噴霧用ドラーゲンドルフ試液を均等に噴霧するとき，試料溶液から得た主スポットは，標準溶液から得た黄赤色のスポットと色調及び*Rf*値が等しい。

（2）　本品0.2gにメタノール5mLを加えて振り混ぜた後，ろ過し，ろ液を試料溶液とする。別にアセトアミノフェン0.03g及びカフェイン水和物5mgをそれぞれメタノール5mLに溶かし，標準溶液（1）及び標準溶液（2）とする。これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び標準溶液5μLずつを薄層クロマトグラフ用シ

リカゲル（蛍光剤入り）を用いて調製した薄層板にスポットする。次に酢酸エチル・ヘキサン混液（4：1）を展開溶媒として約 10cm 展開した後，薄層板を風乾する。これに紫外線（主波長 254nm）を照射するとき，試料溶液から得た 2 個のスポットは，標準溶液（1）及び標準溶液（2）から得たそれぞれのスポットと色調及び *Rf* 値が等しい。

定 量 法　（1）　本品約 1.2g を精密に量り，薄めたアセトニトリル（1→2）30mL を加え，10 分間振り混ぜた後，内標準溶液 5mL を正確に加え，更に薄めたアセトニトリル（1→2）を加えて 50mL とし，ろ過する。初めのろ液 10mL を除き，次のろ液を試料溶液とする。別に定量用クロルフェニラミンマレイン酸塩約 0.015g を精密に量り，薄めたアセトニトリル（1→2）を加えて溶かし正確に 50mL とする。この液 5mL を正確に量り，内標準溶液 5mL を正確に加え，更に薄めたアセトニトリル（1→2）を加えて 50mL とし，標準溶液とする。試料溶液及び標準溶液 10μL につき，次の条件で液体クロマトグラフ法により試験を行い，内標準物質のピーク面積に対するクロルフェニラミンマレイン酸塩のピーク面積の比 Q_T 及び Q_S を求める。

クロルフェニラミンマレイン酸塩の量（$C_{16}H_{19}ClN_2 \cdot C_4H_4O_4$）の量（mg）

＝定量用クロルフェニラミンマレイン酸の量（mg）$\times \frac{Q_T}{Q_S} \times \frac{1}{10}$

内標準溶液　パラオキシ安息香酸イソアミルの薄めたアセトニトリル（1→2）溶液（1→15000）

操作条件

検出器：紫外吸光光度計（測定波長：260nm）

カラム：内径約 4mm，長さ 15～25cm のステンレス管に 5～10μm の液体クロマトグラフ用オクタデシルシリル化シリカゲルを充てんする。

カラム温度：40℃

移動相：ドデシル硫酸ナトリウム 2.0g を薄めたリン酸（1→1000）1000mL に溶かす。この液 500mL にアセトニトリル 500mL を加える。

流量：パラオキシ安息香酸イソアミルの保持時間が約 8 分になるように調整する。

カラムの選定：標準溶液 10μL につき，上記の条件で操作するとき，クロルフェニラミンマレイン酸塩，パラオキシ安息香酸イソアミルの順に溶出し，それぞれのピークが完全に分離するものを用いる。

（2）　本品約 0.1g を精密に量り，メタノール 30mL を加えて 10 分間振り混ぜた後，内標準溶液 5mL を正確に加え，更にメタノールを加えて 50mL とし，ろ過する。初めのろ液 10mL を除き，次のろ液を試料溶液とする。別に定量用アセトアミノフェン約 0.15g 及び定量用カフェイン水和物約 0.025g を精密に量り，内標準溶液 5mL を正確に加え，更にメタノールを加えて 50mL とし，標準溶液とする。試料溶液及び標準溶液 10μL につき，次の条件で液体クロマトグラフ法により試験を行い，内標準物質のピーク面積に対するアセトアミノフェン，カフェイン水和物のピーク面積の比 Q_{Ta}，Q_{Tb}，Q_{Sa} 及び Q_{Sb} を求める。

アセトアミノフェン（$C_8H_9NO_2$）の量（mg）

＝定量用アセトアミノフェンの量（mg）$\times \frac{Q_{Ta}}{Q_{Sa}} \times \frac{1}{10}$

カフェイン水和物（$C_8H_{10}N_4O_2 \cdot H_2O$）の量（mg）

＝定量用カフェイン水和物の量（mg）$\times\frac{Q_{\mathrm{Tb}}}{Q_{\mathrm{Sb}}}\times\frac{1}{10}$

内標準溶液　パラオキシ安息香酸エチルのメタノール溶液（1→1500）

操作条件

検出器：紫外吸光光度計（測定波長：275nm）

カラム：内径約 4mm，長さ 15～25cm のステンレス管に 5～10μm の液体クロマトグラフ用オクタデシルシリル化シリカゲルを充てんする。

カラム温度：40℃

移動相：薄めたリン酸（1→1000）・アセトニトリル混液（93：7）

流量：パラオキシ安息香酸の保持時間が約 10 分になるように調整する。

カラムの選定：標準溶液 10μL につき，上記の条件で操作するとき，アセトアミノフェン，パラオキシ安息香酸エチルの順に溶出し，それぞれのピークが完全に分離するものを用いる。

【 10 】　解熱鎮痛薬 6—②

成分及び分量又は本質	日本薬局方	イソプロピルアンチピリン	0.15g
	〃	エテンザミド	0.25g
	〃	カフェイン水和物	0.05g
	賦形剤　〃	デンプン，乳糖水和物又はこれらの混合物	適　量
		全　　量	1.0g
製造方法	以上をとり，散剤の製法により製する。ただし，分包散剤とする。		
用法及び用量	大人（15 才以上）1 回 1 包 1.0g，1 日 3 回を限度とする。 なるべく空腹時をさけて服用する。服用間隔は 4 時間以上おくこと。		
効能又は効果	○頭痛・歯痛・抜歯後の疼痛・咽喉痛・耳痛・関節痛・神経痛・腰痛・筋肉痛・肩こり痛・打撲痛・骨折痛・ねんざ痛・月経痛（生理痛）・外傷痛の鎮痛 ○悪寒・発熱時の解熱		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考			

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は白色の粉末で，味はわずかに苦い。

確認試験　本品 0.2g にメタノール 10mL を加えて振り混ぜた後，ろ過し，ろ液を試料溶液とする。別にイソプロピルアンチピリン 0.015g，エテンザミド 0.025g，カフェイン水和物 5mg をそれぞれメタノール 5mL に溶かして，標準溶液（1），標準溶液（2）及び標準溶液（3）とする。これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び標準溶液 5μL ずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲル（蛍光剤入り）を用いて調製した薄層板にスポットする。次にクロロホルム・アセトン・アンモニア水（28）混液（30：5：1）を展開溶媒として約 10cm 展開した後，薄層板を風乾する。これに紫外線（主波長 254nm）を照射するとき，試料溶液から得た 3 個のスポットは，標準溶液（1），標準溶液（2）及び標準溶液（3）から得たそれぞれのスポットと色調及び *Rf* が等しい。

【 11 】　解熱鎮痛薬 7—①

成分及び分量又は本質	日本薬局方	アセトアミノフェン	0.68g
	〃	エテンザミド	1.02g
	〃	カフェイン水和物	0.25g
	〃	ブロモバレリル尿素	0.6g
	賦形剤　〃	デンプン，乳糖水和物又はこれらの混合物	適　量
		全　　量	4.5g
製造方法	以上をとり，散剤の製法により製する。ただし，分包散剤とする。		
用法及び用量	1回量を次のとおりとし，1日3回を限度とする。なるべく空腹時をさけて服用する。服用間隔は4時間以上おくこと。 大人（15才以上）1包1.5g，11才以上15才未満　大人の2/3，7才以上11才未満　大人の1/2，3才以上7才未満　大人の1/3，1才以上3才未満大人の1/4		
効能又は効果	○頭痛・歯痛・抜歯後の疼痛・咽喉痛・耳痛・関節痛・神経痛・腰痛・筋肉痛・肩こり痛・打撲痛・骨折痛・ねんざ痛・月経痛（生理痛）・外傷痛の鎮痛 ○悪寒・発熱時の解熱		
貯蔵方法及び有効期間	遮光した密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考			

規 格 及 び 試 験 方 法

本品は定量するとき，アセトアミノフェン（$C_8H_9NO_2$：151.17）13.6～16.6%，エテンザミド（$C_9H_{11}NO_2$：165.19）20.4～24.9%，カフェイン水和物（$C_8H_{10}N_4O_2・H_2O$：212.21）5.0～6.1%及びブロモバレリル尿素（$C_6H_{11}BrN_2O_2$：223.07）12.0～14.7%を含む。

性　　状　本品は白色の粉末である。

確認試験　本品0.3gにメタノール5mLを加えて振り混ぜた後，ろ過し，ろ液を試料溶液とする。別にアセトアミノフェン0.04g，エテンザミド0.07g，カフェイン水和物0.02g及びブロモバレリル尿素0.04gをそれぞれメタノール5mLに溶かし，標準溶液（1），標準溶液（2），標準溶液（3）及び標準溶液（4）とする。これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び標準溶液5μLずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲル（蛍光剤入り）を用いて調製した薄層板にスポットする。次に酢酸エチル・ヘキサン混液（4：1）を展開溶媒として約10cm展開した後，薄層板を風乾する。これに紫外線（主波長254nm）を照射するとき，試料溶液から得た4個のスポットは，標準溶液

（1），標準溶液（2），標準溶液（3）及び標準溶液（4）から得たそれぞれのスポットと色調及び *Rf* 値が等しい。

定 量 法 （1） 本品約 0.2g を精密に量り，メタノール 30mL を加え，10 分間振り混ぜた後，内標準溶液 5mL を正確に加え，更にメタノールを加えて 50mL とする。この液をろ過し，初めのろ液 10mL を除き，次のろ液 5mL を量り，メタノールを加えて 25mL とし，試料溶液とする。別に定量用アセトアミノフェン約 0.030g，定量用エテンザミド 0.045g 及び定量用カフェイン水和物約 0.01g をそれぞれ精密に量り，内標準溶液 5mL を正確に加えた後，メタノールを加えて溶かし 50mL とする。この液 5mL を量り，メタノールを加えて 25mL とし，標準溶液とする。試料溶液及び標準溶液 10μL につき，次の条件で液体クロマトグラフ法により試験を行い，内標準物質のピーク面積に対するアセトアミノフェン，エテンザミド及びカフェイン水和物のピーク面積の比 Q_{Ta}，Q_{Tb}，Q_{Tc}，Q_{Sa}，Q_{Sb} 及び Q_{Sc} を求める。

アセトアミノフェン（$C_8H_9NO_2$）の量（mg）

＝定量用アセトアミノフェンの量（mg）$\times\frac{Q_{Ta}}{Q_{Sa}}$

エテンザミド（$C_9H_{11}NO_2$）の量（mg）

＝定量用エテンザミドの量（mg）$\times\frac{Q_{Tb}}{Q_{Sb}}$

カフェイン水和物（$C_8H_{10}N_4O_2 \cdot H_2O$）の量（mg）

＝定量用カフェイン水和物の量（mg）$\times\frac{Q_{Tc}}{Q_{Sc}}$

内標準溶液　サリチルアミドのメタノール溶液（1→80）

操作条件

検出器：紫外吸光光度計（測定波長：275nm）

カラム：内径約 4mm，長さ 15～25cm のステンレス管に 5～10μm の液体クロマトグラフ用オクタデシルシリル化シリカゲルを充てんする。

カラム温度：40℃付近の一定温度

移動相：薄めたリン酸（1→1000）・メタノール混液（7：3）

流量：アセトアミノフェンの保持時間が約 3 分になるように調整する。

カラムの選定：標準溶液 10μL につき，上記の条件で操作するとき，アセトアミノフェン，カフェイン水和物，サリチルアミド，エテンザミドの順に溶出し，それぞれのピークが完全に分離するものを用いる。

（2） 本品約 0.45g を精密に量り，メタノール 30mL を加えて 10 分間振り混ぜた後，内標準溶液 5mL を正確に加え，更にメタノールを加えて 50mL とする。この液をろ過し，初めのろ液 10mL を除き，次のろ液を試料溶液とする。別に定量用ブロモバレリル尿素 0.06g を精密に量り，内標準溶液 5mL を正確に加えた後，メタノールを加えて溶かし 50mL とし，標準溶液とする。試料溶液及び標準溶液 10μL につき，次の条件で液体クロマトグラフ法により試験を行い，内標準物質のピーク面積に対するブロモバレリル尿素のピーク面積の比 Q_T 及び Q_S を求める。

ブロモバレリル尿素（$C_6H_{11}BrN_2O_2$）の量（mg）

＝定量用ブロモバレリル尿素の量（mg）$\times \frac{Q_T}{Q_S}$

内標準溶液　パラオキシ安息香酸エチルのメタノール溶液（1→5000）

操作条件

検出器：紫外吸光光度計（測定波長：254nm）

カラム：内径約 4mm，長さ 15～25cm のステンレス管に 5～10μm の液体クロマトグラフ用オクタデシルシリル化シリカゲルを充てんする。

カラム温度：40℃付近の一定温度

移動相：薄めたリン酸（1→1000）・メタノール混液（3：2）

流量：ブロモバレリル尿素の保持時間が約 7 分になるように調整する。

カラムの選定：標準溶液 10μL につき，上記の条件で操作するとき，ブロモバレリル尿素，パラオキシ安息香酸エチルの順に溶出し，それぞれのピークが完全に分離するものを用いる。

【 12 】　解熱鎮痛薬 8—①

成分及び分量 又は本質	日本薬局方　アセトアミノフェン　0.6g 〃　エテンザミド　1.0g 〃　ブロモバレリル尿素　0.4g 賦形剤　〃　デンプン，乳糖水和物又はこれらの混合物　適　量 全　量　3.0g
製造方法	以上をとり，散剤の製法により製する。ただし，分包散剤とする。
用法及び用量	1 回量を次のとおりとし，1 日 2 回を限度とする。なるべく空腹時をさけて服用する。服用間隔は 6 時間以上おくこと。 大人（15 才以上）1 包 1.5g，11 才以上 15 才未満　大人の 2/3，7 才以上 11 才未満　大人の 1/2，3 才以上 7 才未満　大人の 1/3，1 才以上 3 才未満　大人の 1/4
効能又は効果	○頭痛・歯痛・抜歯後の疼痛・咽喉痛・耳痛・関節痛・神経痛・腰痛・筋肉痛・肩こり痛・打撲痛・骨折痛・ねんざ痛・月経痛（生理痛）・外傷痛の鎮痛 ○悪寒・発熱時の解熱
貯蔵方法及び 有効期間	遮光した密閉容器
規格及び試験方法	別記のとおり。
備考	

規 格 及 び 試 験 方 法

本品は定量するとき，アセトアミノフェン（$C_8H_9NO_2$：151.17）18.0～22.0%，エテンザミド（$C_9H_{11}NO_2$：165.19）30.0～36.7%及びブロモバレリル尿素（$C_6H_{11}BrN_2O_2$：223.07）12.0～14.7%を含む。

性　　状　本品は白色の粉末である。

確認試験　本品 0.15g にメタノール 5mL を加えて振り混ぜた後，ろ過し，ろ液を試料溶液とする。別にアセトアミノフェン 0.03g，エテンザミド 0.05g 及びブロモバレリル尿素 0.02g をそれぞれメタノール 5mL に溶かし，標準溶液（1），標準溶液（2）及び標準溶液（3）とする。これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び標準溶液 5μL ずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲル（蛍光剤入り）を用いて調製した薄層板にスポットする。次に酢酸エチル・ヘキサン混液（4：1）を展開溶媒として約 10cm 展開した後，薄層板を風乾する。これに紫外線（主波長 254nm）を照射するとき，試料溶液から得た 3 個のスポットは，標準溶液（1），標準溶液（2）及び標準溶液（3）から得たそれぞれのスポットと色調及び *Rf* 値が等しい。

定 量 法　（1）　本品約 0.15g を精密に量り，メタノール 30mL を加えて，10 分間振り混ぜた後，内標準溶液 5mL を正確に加え，更にメタノールを加えて 50mL とし，ろ過する。初めのろ液 10mL を除き，次のろ液を試料溶液とする。別に定量用アセトアミノフェン約 0.03g，定量用エテンザミド約 0.05g を精密に量り，内標準溶液 5mL を正確に加え，更にメタノールを加えて 50mL とし，標準溶液とする。試料溶液及び標準溶液 10 μ L につき，次の条件で液体クロマトグラフ法により試験を行い，内標準物質のピーク面積に対するアセトアミノフェン，エテンザミドのピーク面積の比 Q_{Ta}，Q_{Tb}，Q_{Sa} 及び Q_{Sb} を求める。

アセトアミノフェン（$C_8H_9NO_2$）の量（mg）

＝定量用アセトアミノフェンの量（mg）$\times\frac{Q_{Ta}}{Q_{Sa}}$

エテンザミド（$C_9H_{11}NO_2$）の量（mg）

＝定量用エテンザミドの量（mg）$\times\frac{Q_{Tb}}{Q_{Sb}}$

内標準溶液　サリチルアミドのメタノール溶液（1→80）

操作条件

検出器：紫外吸光光度計（測定波長：275nm）

カラム：内径約 4mm，長さ 15～25cm のステンレス管に 5～10μm の液体クロマトグラフ用オクタデシルシリル化シリカゲルを充てんする。

カラム温度：40℃

移動相：薄めたリン酸（1→1000）・メタノール混液（7：3）

流量：サリチルアミドの保持時間が約 7 分になるように調整する。

カラムの選定：標準溶液 10μL につき，上記の条件で操作するとき，アセトアミノフェン，サリチルアミド，エテンザミドの順に溶出し，それぞれのピークが完全に分離するものを用いる。

（2）　本品約 0.45g を精密に量り，メタノール 30mL を加えて 10 分間振り混ぜた後，内標準溶液 5mL を正確に加え，更にメタノールを加えて 50mL とし，ろ過する。初めのろ液 10mL を除き，次のろ液を試料溶液とする。別に定量用ブロモバレリル尿素約 0.06g を精密に量り，内標準溶液 5mL を正確に加え，更にメタノールを加えて 50mL とし，標準溶液とする。試料溶液及び標準溶液 10μL につき，次の条件で液体クロマトグラフ法により試験を行い，内標準物質のピーク面積に対するブロモバレリル尿素のピーク面積の比 Q_T 及び Q_S を求める。

ブロモバレリル尿素（$C_6H_{11}BrN_2O_2$）の量（mg）

＝定量用ブロモバレリル尿素の量（mg）$\times\frac{Q_T}{Q_S}$

内標準溶液　パラオキシ安息香酸エチルのメタノール溶液（1→5000）

操作条件

検出器：紫外吸光光度計（測定波長：254nm）

カラム：内径約 4mm，長さ 15～25cm のステンレス管に 5～10μm の液体クロマトグラフ用オクタデシルシリル化シリカゲルを充てんする。

カラム温度：40℃

移動相：薄めたリン酸（1→1000）・メタノール混液（3：2）

流量：パラオキシ安息香酸エチルの保持時間が約 13 分になるように調整する。

カラムの選定：標準溶液 10μL につき，上記の条件で操作するとき，ブロモバレリル尿素，パラオキシ安息香酸エチルの順に溶出し，それぞれのピークが完全に分離するものを用いる。

【 13 】　解熱鎮痛薬 9—①

成分及び分量 又は本質	日本薬局方　アセトアミノフェン　0.6g 〃　エテンザミド　1.0g 〃　カフェイン水和物　0.24g 賦形剤　〃　デンプン，乳糖水和物又はこれらの混合物　適　量 全　量　3.0g
製造方法	以上をとり，散剤の製法により製する。ただし，分包散剤とする。
用法及び用量	1 回量を次のとおりとし，1 日 2 回を限度とする。なるべく空腹時をさけて服用する。服用間隔は 6 時間以上おくこと。 大人（15 才以上）1 包 1.5g，11 才以上 15 才未満　大人の 2/3，7 才以上 11 才未満　大人の 1/2，3 才以上 7 才未満　大人の 1/3，1 才以上 3 才未満 大人の 1/4
効能又は効果	○頭痛・歯痛・抜歯後の疼痛・咽喉痛・耳痛・関節痛・神経痛・腰痛・筋肉痛・肩こり痛・打撲痛・骨折痛・ねんざ痛・月経痛（生理痛）・外傷痛の鎮痛 ○悪寒・発熱時の解熱
貯蔵方法及び 有効期間	遮光した密閉容器
規格及び試験方法	別記のとおり。
備考	

規 格 及 び 試 験 方 法

本品は定量するとき，アセトアミノフェン（$C_8H_9NO_2$：151.17）18.0～22.0%，エテンザミド（$C_9H_{11}NO_2$：165.19）30.0～36.7%及びカフェイン水和物（$C_8H_{10}N_4O_2 \cdot H_2O$：212.21）7.2～8.8%を含む。

性　　状　本品は白色の粉末である。

確認試験　本品 0.2g にメタノール 5mL を加えて振り混ぜた後，ろ過し，ろ液を試料溶液とする。別にアセトアミノフェン 0.04g，エテンザミド 0.07g 及びカフェイン水和物 0.015g をそれぞれメタノール 5mL に溶かし，標準溶液（1），標準溶液（2）及び標準溶液（3）とする。これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び標準溶液 5μL ずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲル（蛍光剤入り）を用いて調製した薄層板にスポットする。次に酢酸エチル・ヘキサン混液（4：1）を展開溶媒として約 10cm 展開した後，薄層板を風乾する。これに紫外線（主波長 254nm）を照射するとき，試料溶液から得た 3 個のスポットは，標準溶液（1），標準溶液（2）及び標準溶液（3）から得たそれぞれのスポットと色調及び *Rf* 値が等しい。

定 量 法　本品約 0.15g を精密に量り，メタノール 30mL を加え，10 分間振り混ぜた後，内標準溶液 5mL を正確に加え，更にメタノールを加えて 50mL とする。この液をろ過し，初めのろ液 10mL を除き，次のろ液 5mL を量り，メタノールを加えて 25mL とし，試料溶液とする。別に定量用アセトアミノフェン約 0.03g，定量用エテンザミド約 0.05g 及び定量用カフェイン水和物約 0.012g をそれぞれ精密に量り，内標準溶液 5mL を正確に加えた後，メタノールを加えて溶かし 50mL とする。この液 5mL を量り，メタノールを加えて 25mL とし，標準溶液とする。試料溶液及び標準溶液 10μL につき，次の条件で液体クロマトグラフ法により試験を行い，内標準物質のピーク面積に対するアセトアミノフェン，エテンザミド及びカフェイン水和物のピーク面積の比 Q_{Ta}，Q_{Tb}，Q_{Tc}，Q_{Sa}，Q_{Sb} 及び Q_{Sc} を求める。

アセトアミノフェン（$C_8H_9NO_2$）の量（mg）

＝定量用アセトアミノフェンの量（mg）$\times\frac{Q_{Ta}}{Q_{Sa}}$

エテンザミド（$C_9H_{11}NO_2$）の量（mg）

＝定量用エテンザミドの量（mg）$\times\frac{Q_{Tb}}{Q_{Sb}}$

カフェイン水和物（$C_8H_{10}N_4O_2 \cdot H_2O$）の量（mg）

＝定量用カフェイン水和物の量（mg）$\times\frac{Q_{Tc}}{Q_{Sc}}$

内標準溶液　サリチルアミドのメタノール溶液（1→80）

操作条件

検出器：紫外吸光光度計（測定波長：275nm）

カラム：内径約 4mm，長さ 15～25cm のステンレス管に 5～10μm の液体クロマトグラフ用オクタデシルシリル化シリカゲルを充てんする。

カラム温度：40℃付近の一定温度

移動相：薄めたリン酸（1→1000）・メタノール混液（7：3）

流量：アセトアミノフェンの保持時間が約 3 分になるように調整する。

カラムの選定：標準溶液 10μL につき，上記の条件で操作するとき，アセトアミノフェン，カフェイン水和物，サリチルアミド，エテンザミドの順に溶出し，それぞれのピークが完全に分離するものを用いる。

【 14 】　かぜ薬 7—①

成分及び分量又は本質	日本薬局方	クロルフェニラミンマレイン酸塩	0.00375g
	〃	アセトアミノフェン	0.45g
	賦形剤　〃	白糖，乳糖水和物又はこれらの混合物	適　量
		全　　量	3.0g
製造方法	以上をとり，散剤の製法により製する。ただし，分包散剤とする。クロルフェニラミンマレイン酸塩に替えて，クロルフェニラミンマレイン酸塩散1%を用いてもよい。		
用法及び用量	1回量を次のとおりとし，1日3回，食後服用する。 7才以上11才未満　1包1.0g，3才以上7才未満　1包の2/3，1才以上3才未満　1包の1/2		
効能又は効果	かぜの諸症状（鼻水，鼻づまり，くしゃみ，のどの痛み，悪寒，発熱，頭痛，関節の痛み，筋肉の痛み）の緩和		
貯蔵方法及び有効期間	遮光した密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考			

規 格 及 び 試 験 方 法

本品を定量するとき，クロルフェニラミンマレイン酸塩（$C_{16}H_{19}ClN_2$・$C_4H_4O_4$：390.87）0.11～0.14%，及びアセトアミノフェン（$C_8H_9NO_2$：151.17）13.5～16.5%を含む。

性　　状　本品は白色の粉末である。

確認試験　（1）　本品1gにメタノール5mLを加えて振り混ぜた後，ろ過し，ろ液を試料溶液とする。別にクロルフェニラミンマレイン酸塩5mgをメタノール20mLに溶かし，標準溶液とする。これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び標準溶液5μLずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲルを用いて調製した薄層板にスポットする。次に酢酸エチル・エタノール(95)・アンモニア水（28）混液（15：5：1）を展開溶媒として約10cm展開した後，薄層板を風乾する。この薄層板に噴霧用ドラーゲンドルフ試液を均等に噴霧するとき，試料溶液から得た主スポットは，標準溶液から得た黄赤色のスポットと色調及び*Rf*値が等しい。

（2）　本品0.2gにメタノール5mLを加えて振り混ぜた後，ろ過し，ろ液を試料溶液とする。別にアセトアミノフェン0.03gをそれぞれメタノール5mLに溶かし，標準溶液とする。これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び標準溶液5μLずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲル（蛍光剤入り）を用いて調製した薄層板にスポットする。次に酢酸エチル・ヘキサン混液（4：1）を展開溶媒として約10cm展開し

た後，薄層板を風乾する。これに紫外線（主波長 254nm）を照射するとき，試料溶液から得たスポットと色調及び *Rf* 値が等しい。

定 量 法　（1）　本品約 1.2g を精密に量り，薄めたアセトニトリル（1→2）30mL を加えて，10 分間振り混ぜた後，内標準溶液 5mL を正確に加え，更に薄めたアセトニトリル（1→2）を加えて 50mL とし，ろ過する。初めのろ液 10mL を除き，次のろ液を試料溶液とする。別に定量用クロルフェニラミンマレイン酸塩約 0.015g を精密に量り，薄めたアセトニトリル（1→2）を加えて溶かし正確に 50mL とする。この液 5mL を正確に量り，内標準溶液 5mL を正確に加え，薄めたアセトニトリル（1→2）を加えて 50mL とし，標準溶液とする。試料溶液及び標準溶液 10μL につき，次の条件で液体クロマトグラフ法により試験を行い，内標準物質のピーク面積に対するクロルフェニラミンマレイン酸塩のピーク面積の比 Q_T 及び Q_S を求める。

クロルフェニラミンマレイン酸塩（$C_{16}H_{19}ClN_2 \cdot C_4H_4O_4$）の量（mg）

＝定量用クロルフェニラミンマレイン酸塩の量（mg）$\times \frac{Q_T}{Q_S} \times \frac{1}{10}$

内標準溶液　パラオキシ安息香酸イソアミルの薄めたアセトニトリル（1→2）溶液（1→15000）

操作条件

検出器：紫外吸光光度計（測定波長：260nm）

カラム：内径約 4mm，長さ 15～25cm のステンレス管に 5～10μm の液体クロマトグラフ用オクタデシルシリル化シリカゲルを充てんする。

カラム温度：40℃

移動相：ドデシル硫酸ナトリウム 2.0g を薄めたリン酸（1→1000）1000mL に溶かす。この液 500mL にアセトニトリル 500mL を加える。

流量：パラオキシ安息香酸イソアミルの保持時間が約 8 分になるように調整する。

カラムの選定：標準溶液 10μL につき，上記の条件で操作するとき，クロルフェニラミンマレイン酸塩，パラオキシ安息香酸イソアミルの順に溶出し，それぞれのピークが完全に分離するものを用いる。

（2）　本品約 0.1g を精密に量り，メタノール 30mL を加えて，10 分間振り混ぜた後，内標準溶液 5mL を正確に加え，更にメタノールを加えて 50mL とし，ろ過する。初めのろ液 10mL を除き，次のろ液を試料溶液とする。別に定量用アセトアミノフェン約 0.015g を精密に量り，内標準溶液 5mL を正確に加え，更にメタノールを加えて 50mL とし，標準溶液とする。試料溶液及び標準溶液 10μL につき，次の条件で液体クロマトグラフ法により試験を行い，内標準物質のピーク面積に対するアセトアミノフェンのピーク面積の比 Q_T 及び Q_S を求める。

アセトアミノフェン（$C_8H_9NO_2$）の量（mg）

＝定量用アセトアミノフェンの量（mg）$\times \frac{Q_T}{Q_S}$

内標準溶液　パラオキシ安息香酸のメタノール溶液（1→1000）

操作条件

検出器：紫外吸光光度計（測定波長：275nm）

カラム：内径約 4mm，長さ 15～25cm のステンレス管に 5～10μm の液体クロマトグラフ用オクタデシルシリル化シリカゲルを充てんする。

カラム温度：40℃

移動相：薄めたリン酸（1→1000）・アセトニトリル混液（93：7）

流量：パラオキシ安息香酸の保持時間が約 10 分になるように調整する。

カラムの選定：標準溶液 10μL につき，上記の条件で操作するとき，アセトアミノフェン，パラオキシ安息香酸の順に溶出し，それぞれのピークが完全に分離するものを用いる。

【 15 】　かぜ薬 3—③

成分及び分量又は本質	日本薬局方	*dl* - メチルエフェドリン塩酸塩散 10%	0.6g
	〃	クロルフェニラミンマレイン酸塩	0.0075g
	〃	ジヒドロコデインリン酸塩散 1%	2.4g
	〃	ノスカピン	0.048g
	〃	アセトアミノフェン	0.45g
	〃	エテンザミド	0.75g
	〃	カフェイン水和物	0.075g
	〃	カンゾウ末	0.8g
	〃	キキョウ末	1.6g
	賦形剤　〃	デンプン，乳糖水和物又はこれらの混合物	適　量
		全　　量	7.5g
製造方法	以上をとり，散剤の製法により製する。ただし，分包散剤とする。クロルフェニラミンマレイン酸塩に替えて，クロルフェニラミンマレイン酸塩散 1%を用いてもよい。		
用法及び用量	1 回量を次のとおりとし，1 日 3 回，食後服用する。 大人（15 才以上）1 包 2.5g，12 才以上 15 才未満　大人の 2/3		
効能又は効果	かぜの諸症状（鼻水，鼻づまり，くしゃみ，のどの痛み，せき，たん，悪寒，発熱，頭痛，関節の痛み，筋肉の痛み）の緩和		
貯蔵方法及び有効期間	遮光した密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考			

規 格 及 び 試 験 方 法

本品は定量するとき，*dl* - メチルエフェドリン塩酸塩（$C_{11}H_{17}NO \cdot HCl$：215.72）0.65～0.97%，クロルフェニラミンマレイン酸塩（$C_{16}H_{19}ClN_2 \cdot C_4H_4O_4$：390.87）0.09～0.11%，ジヒドロコデインリン酸塩（$C_{18}H_{23}NO_3 \cdot H_3PO_4$：399.38）0.26～0.39%，ノスカピン（$C_{22}H_{23}NO_7$：413.43）0.58～0.70%，アセトアミノフェン（$C_8H_9NO_2$：151.17）5.4～6.6%，エテンザミド（$C_9H_{11}NO_2$：165.19）9.0～11.0%及びカフェイン水和物（$C_8H_{10}N_4O_2 \cdot H_2O$：212.21）0.9～1.1%を含む。

性　　状　本品は淡褐色の粉末である。

確認試験　（1）　本品 1.0g にメタノール 5mL を加えて振り混ぜた後，ろ過し，ろ液を試料溶液とする。別に *dl* - メチルエフェドリン塩酸塩散 10%0.08g にメタノール 5mL を

加えて振り混ぜた後，ろ過し，ろ液を標準溶液（1）とする。クロルフェニラミンマレイン酸塩 5mg をメタノール 25mL に溶かし，標準溶液（2）とする。ジヒドロコデインリン酸塩散 1%0.3g にメタノール 5mL を加えて振り混ぜた後，ろ過する。ろ液を蒸発乾固し，残留物をメタノール 1mL に溶かし，標準溶液（3）とする。ノスカピン 6mg をメタノール 5mL に溶かし，標準溶液（4）とする。これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び標準溶液 5μL ずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲルを用いて調製した薄層板にスポットする。次に酢酸エチル・エタノール（95）・アンモニア水（28）混液（15：5：1）を展開溶媒として約 10cm 展開した後，薄層板を風乾する。この薄層板に噴霧用ドラーゲンドルフ試液を均等に噴霧するとき，試料溶液から得た数個のスポットのうち 4 個のスポットは，標準溶液（1），標準溶液（2），標準溶液（3）及び標準溶液（4）から得た黄赤色のスポットと色調及び *Rf* 値が等しい。

（２）　本品 1.0g にメタノール 5mL を加えて振り混ぜた後，ろ過し，ろ液を試料溶液とする。別にアセトアミノフェン 0.06g，エテンザミド 0.1g 及びカフェイン水和物 0.01g をそれぞれメタノール 5mL に溶かし，標準溶液（1），標準溶液（2）及び標準溶液（3）とする。これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び標準溶液 5μL ずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲル（蛍光剤入り）を用いて調製した薄層板にスポットする。次に酢酸エチル・ヘキサン混液（4：1）を展開溶媒として約 10cm 展開した後，薄層板を風乾する。これに紫外線（主波長 254nm）を照射するとき，試料溶液から得た 3 個のスポットは，標準溶液（1），標準溶液（2）及び標準溶液（3）から得たそれぞれのスポットと色調及び *Rf* 値が等しい。

（３）　本品 2.0g にメタノール 5mL を加えて振り混ぜた後，ろ過し，ろ液を試料溶液とする。別にグリチルリチン酸 5mg をメタノール 2mL に溶かし，標準溶液とする。これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び標準溶液 5μL ずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲル（蛍光剤入り）を用いて調製した薄層板にスポットする。次に l - ブタノール・水・酢酸(100)混液（7：2：1）を展開溶媒とし約 10cm 展開した後，薄層板を風乾する。これに紫外線（主波長 254nm）を照射するとき，試料溶液から得た数個のスポットのうち 1 個のスポットは，標準溶液から得たスポットと色調及び *Rf* 値が等しい。

（４）　本品 1.5g にメタノール 30mL を加え，水浴上で 10 分間加温し，冷後，ろ過する。ろ液を蒸発乾固し，残留物をメタノール 2mL に溶かし，試料溶液とする。別にキキョウ末 0.4g にメタノール 10mL を加え，試料溶液と同様に操作し，標準溶液とする。これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び標準溶液 5μL を薄層クロマトグラフ用シリカゲルを用いて調製した薄層板にスポットする。次にクロロホルム・メタノール・水混液（13：10：2）を展開溶媒とし約 10cm 展開した後，薄層板を風乾する。これにバニリン・硫酸溶液*を均等に噴霧し，105℃で 10 分間加熱するとき，試料溶液から得た数個のスポットのうち 1 個のスポットは，標準溶液から得た緑褐色の主スポットと色調及び *Rf* 値が等しい。

［注］*バニリン・硫酸溶液：バニリン 0.5g にメタノール 25mL 及び希硫酸 25mL を加える。

定 量 法　（１）　本品約 0.75g を精密に量り，薄めたアセトニトリル（4→10）30mL を加えて 10 分間振り混ぜた後，内標準溶液 5mL を正確に加え，更に薄めたアセトニトリル（4→10）を加えて 50mL とし，ろ過する。初めのろ液 10mL を除き，次のろ液を試料溶液とする。別に *dl* - メチルエフェドリン塩酸塩散 10%約 0.06g 及びジヒドロコデインリン酸塩散 1%0.24g を精密に量り，内標準溶液 5mL を正確に加えた後，薄めたアセトニトリル（4→10）を加えて 50mL とする。この液をろ過し，初めのろ液 10mL を除き，次のろ液を標準溶液とする。試料溶液及び標準溶液 10μL につき，次の条件で液体クロマトグ

ラフ法により試験を行い，内標準物質のピーク面積に対する *dl* - メチルエフェドリン塩酸塩及びジヒドロコデインリン酸塩のピーク面積の比 Q_{Ta}，Q_{Tb}，Q_{Sa} 及び Q_{Sb} を求める。

dl - メチルエフェドリン塩酸塩散 10%の量（mg）

$$=dl\text{ - メチルエフェドリン塩酸塩散 10\%の量（mg）}\times\frac{Q_{Ta}}{Q_{Sa}}$$

ジヒドロコデインリン酸塩散 1%の量（mg）

$$=\text{ジヒドロコデインリン酸塩散 1\%の量（mg）}\times\frac{Q_{Tb}}{Q_{Sb}}$$

内標準溶液　パラオキシ安息香酸イソアミルの薄めたアセトニトリル（1→4）溶液（1→2000）

操作条件

検出器：紫外吸光光度計（測定波長：220nm）

カラム：内径約 4mm，長さ 15～25cm のステンレス管に 5～10μm の液体クロマトグラフ用オクタデシルシリル化シリカゲルを充てんする。

カラム温度：40℃付近の一定温度

移動相：ドデシル硫酸ナトリウム 2.0g を薄めたリン酸（1→1000）1000mL に溶かす。この液 600mL にアセトニトリル 400mL を加える。

流量：リン酸ジヒドロコデインの保持時間が約 6 分になるように調整する。

カラムの選定：標準溶液 10μL につき，上記の条件で操作するとき，ジヒドロコデインリン酸塩，*dl* - メチルエフェドリン塩酸塩，パラオキシ安息香酸イソアミルの順に溶出し，それぞれのピークが完全に分離するものを用いる。

（2）　本品約 1.5g を精密に量り，薄めたアセトニトリル（1→2）30mL を加え，10 分間振り混ぜた後，内標準溶液 5mL を正確に加え，更に薄めたアセトニトリル（1→2）を加えて 50mL とする。この液をろ過し，初めのろ液 10mL を除き，次のろ液を試料溶液とする。別に定量用クロルフェニラミンマレイン酸塩約 0.03g 及び定量用ノスカピン約 0.19g を精密に量り，薄めたアセトニトリル（1→2）に溶かし，正確に 100mL とする。この液 5mL を正確に量り，内標準溶液 5mL を正確に加え，更に薄めたアセトニトリル（1→2）を加えて 50mL とし，標準溶液とする。試料溶液及び標準溶液 10 μ L につき，次の条件で液体クロマトグラフ法により試験を行い，内標準物質のピーク面積に対するクロルフェニラミンマレイン酸及びノスカピンのピーク面積の比 Q_{Ta}，Q_{Tb}，Q_{Sa} 及び Q_{Sb} を求める。

クロルフェニラミンマレイン酸塩（$C_{16}H_{19}ClN_2\cdot C_4H_4O_4$）の量（mg）

$$=\text{定量用酸クロルフェニラミンマレイン酸塩の量（mg）}\times\frac{Q_{Ta}}{Q_{Sa}}\times\frac{1}{20}$$

ノスカピン（$C_{22}H_{23}NO_7$）の量（mg）

$$=\text{ノスカピンの量（mg）}\times\frac{Q_{Tb}}{Q_{Sb}}\times\frac{1}{20}$$

内標準溶液　パラオキシ安息香酸イソアミルの薄めたアセトニトリル（1→2）溶液（1→10000）

操作条件

検出器：紫外吸光光度計（測定波長：260nm）

カラム：内径約 4mm，長さ 15～25cm のステンレス管に 5～10μm の液体クロマトグラフ用オクタデシルシリル化シリカゲルを充てんする。

カラム温度：40℃付近の一定温度

移動相：ドデシル硫酸ナトリウム 2.0g を薄めたリン酸（1→1000）1000mL に溶かす。この液 550mL にアセトニトリル 450mL を加える。

流量：ノスカピンの保持時間が約 7 分になるように調整する。

カラムの選定：標準溶液 10μL につき，上記の条件で操作するとき，ノスカピン，クロルフェニラミンマレイン酸塩，パラオキシ安息香酸イソアミルの順に溶出し，それぞれのピークが完全に分離するものを用いる。

（3） 本品約 0.25g を精密に量り，メタノール 30mL を加え，10 分間振り混ぜた後，内標準溶液 5mL を正確に加え，更にメタノールを加えて 50mL とする。この液をろ過し，初めのろ液 10mL を除き，次のろ液を試料溶液とする。別に定量用アセトアミノフェン約 0.15g 及び定量用カフェイン水和物約 0.025g をそれぞれ精密に量り，メタノールに溶かし正確に 100mL とする。この液 5mL を正確に量り，内標準溶液 5mL を正確に加え，更にメタノールを加えて 50mL とし，標準溶液とする。試料溶液及び標準溶液 10μL につき，次の条件で液体クロマトグラフ法により試験を行い，内標準物質のピーク面積に対するアセトアミノフェン及びカフェイン水和物のピーク面積の比 Q_{Ta}，Q_{Tb}，Q_{Sa} 及び Q_{Sb} を求める。

アセトアミノフェン（$C_8H_9NO_2$）の量（mg）

＝定量用アセトアミノフェンの量（mg）$\times\frac{Q_{Ta}}{Q_{Sa}}\times\frac{1}{20}$

カフェイン水和物（$C_8H_{10}N_4O_2\cdot H_2O$）の量（mg）

＝定量用カフェイン水和物の量（mg）$\times\frac{Q_{Tb}}{Q_{Sb}}\times\frac{1}{20}$

内標準溶液　パラオキシ安息香酸のメタノール溶液（1→1000）

操作条件

検出器：紫外吸光光度計（測定波長：254nm）

カラム：内径約 4mm，長さ 15～25cm のステンレス管に 5～10μm の液体クロマトグラフ用オクタデシルシリル化シリカゲルを充てんする。

カラム温度：40℃付近の一定温度

移動相：薄めたリン酸（1→1000）・アセトニトリル混液（93：7）

流量：パラオキシ安息香酸の保持時間が約 10 分になるように調整する。

カラムの選定：標準溶液 10μL につき，上記の条件で操作するとき，アセトアミノフェン，カフェイン水和物，パラオキシ安息香酸の順に溶出し，それぞれのピークが完全に分離するものを用いる。

（4） 本品約 0.5g を精密に量り，メタノール 30mL を加え，10 分間振り混ぜた後，内標準溶液 5mL を正確に加え，更にメタノールを加えて 50mL とする。この液をろ過し，初めのろ液 10mL を除き，次のろ液を試料溶液とする。別に定量用エテンザミド約 0.05g を精密に量り，内標準溶液 5mL を正確に加え，更にメタノールを加えて 50mL とし，標

準溶液とする。試料溶液及び標準溶液 10μL につき，次の条件で液体クロマトグラフ法により試験を行い，内標準物質のピーク面積に対するエテンザミドのピーク面積の比 Q_T 及び Q_S を求める。

エテンザミド（$C_9H_{11}NO_2$）の量（mg）

＝定量用エテンザミドの量（mg）$\times \frac{Q_T}{Q_S}$

内標準溶液　サリチル酸のメタノール溶液（1→70）

操作条件

検出器：紫外吸光光度計（測定波長：280nm）

カラム：内径約 4mm，長さ 15～25cm のステンレス管に 5～10 μ m の液体クロマトグラフ用オクタデシルシリル化シリカゲルを充てんする。

カラム温度：40℃付近の一定温度

移動相：薄めたリン酸（1→1000）・メタノール混液（3：2）

流量：エテンザミドの保持時間が約 7 分になるように調整する。

カラムの選定：標準溶液 10μL につき，上記の条件で操作するとき，エテンザミド，サリチル酸の順に溶出し，それぞれのピークが完全に分離するものを用いる。

【 16 】　かぜ薬 2—①

成分及び分量又は本質	日本薬局方	アセトアミノフェン	0.3g
	〃	エテンザミド	1.0g
	〃	クロルフェニラミンマレイン酸塩	0.0075g
	〃	カフェイン水和物	0.15g
	賦形剤　〃	デンプン，乳糖水和物又はこれらの混合物	適　量
		全　　量	4.5g
製造方法	以上をとり，散剤の製法により製する。ただし，分包散剤とする。クロルフェニラミンマレイン酸塩に替えて，クロルフェニラミンマレイン酸塩散1%を用いてもよい。		
用法及び用量	1回量を次のとおりとし，1日3回，食後服用する。 大人（15才以上）1包1.5g，11才以上15才未満　大人の2/3，7才以上11才未満　大人の1/2，3才以上7才未満　大人の1/3，1才以上3才未満　大人の1/4		
効能又は効果	かぜの諸症状（鼻水，鼻づまり，くしゃみ，のどの痛み，悪寒，発熱，頭痛，関節の痛み，筋肉の痛み）の緩和		
貯蔵方法及び有効期間	遮光した密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考			

規 格 及 び 試 験 方 法

本品は定量するとき，アセトアミノフェン（$C_8H_9NO_2$：151.17）6.0～7.3%，エテンザミド（$C_9H_{11}NO_2$：165.19）20.0～24.4%，クロルフェニラミンマレイン酸塩（$C_{16}H_{19}ClN_2 \cdot C_4H_4O_4$：390.87）0.15～0.18%及びカフェイン水和物（$C_8H_{10}N_4O_2 \cdot H_2O$：212.21）3.0～3.7%を含む。

性　　状　本品は白色の粉末である。

確認試験　（1）　本品0.3gにメタノール5mLを加えて振り混ぜた後，ろ過し，ろ液を試料溶液とする。別にアセトアミノフェン0.02g，エテンザミド0.07g及びカフェイン水和物0.01gをそれぞれメタノール5mLに溶かし，標準溶液（1），標準溶液（2）及び標準溶液（3）とする。これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び標準溶液5μLずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲル（蛍光剤入り）を用いて調製した薄層板にスポットする。次に酢酸エチル・ヘキサン混液（4：1）を展開溶媒として約10cm展開した後，薄層板を風乾する。これに紫外線（主波長254nm）を照射するとき，試料溶液から得た3個のスポットの*Rf*値は，標準溶液（1），標準溶液（2）及び標準溶液（3）から得たそれぞれのスポットの*Rf*値に等しい。

（２）　本品 0.3g にメタノール 5mL を加えて振り混ぜた後，ろ過し，ろ液を試料溶液とする。別にクロルフェニラミンマレイン酸塩 5mg をメタノール 50mL に溶かし，標準溶液とする。これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び標準溶液 5μL ずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲルを用いて調製した薄層板にスポットする。次に酢酸エチル・エタノール（95）・アンモニア水（28）混液（15：5：1）を展開溶媒として約 10cm 展開した後，薄層板を風乾する。これに噴霧用ドラーゲンドルフ試液を均等に噴霧するとき，試料溶液から得たスポットは，標準溶液から得た黄赤色のスポットと色調及び *Rf* 値が等しい。

定 量 法　**（１）**　本品約 0.15g を精密に量り，メタノール 30mL を加えて 10 分間振り混ぜた後，内標準溶液 5mL を正確に加え，更にメタノールを加えて 50mL とし，ろ過する。初めのろ液 10mL を除き，次のろ液を試料溶液とする。別に定量用アセトアミノフェン約 0.1g 及び定量用カフェイン水和物約 0.05g をそれぞれ精密に量り，メタノールに溶かして正確に 50mL とする。この液 5mL を正確に量り，内標準溶液 5mL を正確に加えた後，メタノールを加えて 50mL とし，標準溶液とする。試料溶液及び標準溶液 10μL につき，次の条件で液体クロマトグラフ法により試験を行い，内標準物質のピーク面積に対するアセトアミノフェン及びカフェイン水和物のピーク面積の比 Q_{Ta}，Q_{Tb}，Q_{Sa} 及び Q_{Sb} を求める．

アセトアミノフェン（$C_8H_9NO_2$）の量（mg）

＝定量用アセトアミノフェンの量（mg）$\times\frac{Q_{Ta}}{Q_{Sa}}\times\frac{1}{10}$

カフェイン水和物（$C_8H_{10}N_4O_2\cdot H_2O$）の量（mg）

＝定量用カフェイン水和物の量（mg）$\times\frac{Q_{Tb}}{Q_{Sb}}\times\frac{1}{10}$

内標準溶液　パラオキシ安息香酸のメタノール溶液（1→1000）

操作条件

検出器：紫外吸光光度計（測定波長：275nm）

カラム：内径約 4mm，長さ 15～25cm のステンレス管に 5～10μm の液体クロマトグラフ用オクタデシルシリル化シリカゲルを充てんする。

カラム温度：40℃付近の一定温度

移動相：薄めたリン酸（1→1000）・アセトニトリル混液（93：7）

流量：アセトアミノフェンの保持時間が約 5 分になるように調整する。

カラムの選定：標準溶液 10μL につき，上記の条件で操作するとき，アセトアミノフェン，パラオキシ安息香酸，カフェイン水和物の順に溶出し，それぞれのピークが完全に分離するものを用いる。

（２）　本品約 0.22g を精密に量り，メタノール 30mL を加えて 10 分間振り混ぜた後，内標準溶液 5mL を正確に加え，この液にメタノールを加えて 50mL とし，ろ過する。初めのろ液 10mL を除き，次のろ液を試料溶液とする。別に定量用エテンザミド約 0.05g を精密に量り，内標準溶液 5mL を正確に加えた後，メタノールを加えて 50mL とし標準溶液とする。試料溶液及び標準溶液 10μL につき，次の条件で液体クロマトグラフ法により試験を行い，内標準物質のピーク面積に対するエテンザミドのピーク面積の比 Q_T 及び Q_S を求める。

エテンザミド（$C_9H_{11}NO_2$）の量（mg）

＝定量用エテンザミドの量（mg）$\times\frac{Q_T}{Q_S}$

内標準溶液　安息香酸のメタノール溶液（1→100）

操作条件

検出器：紫外吸光光度計（測定波長：275nm）

カラム：内径約 4mm，長さ 15～25cm のステンレス管に 5～10μm の液体クロマトグラフ用オクタデシルシリル化シリカゲルを充てんする。

カラム温度：40℃付近の一定温度

移動相：薄めたリン酸（1→1000）・メタノール混液（3：2）

流量：エテンザミドの保持時間が約 6 分になるように調整する。

カラムの選定：標準溶液 10μL につき，上記の条件で操作するとき，エテンザミド，安息香酸の順に溶出し，それぞれのピークが完全に分離するものを用いる。

（3）　本品約 0.9g を精密に量り，更に薄めたアセトニトリル（1→2）30mL を加えて 10 分間振り混ぜた後，内標準溶液 5mL を正確に加え，更に薄めたアセトニトリル（1→2）を加えて 50mL とする。この液をろ過し，初めのろ液 10mL を除き，次のろ液を試料溶液とする。別に定量用クロルフェニラミンマレイン酸塩約 0.03g を精密に量り，薄めたアセトニトリル（1→2）を加えて正確に 100mL とする。この液 5mL を正確に量り，内標準溶液 5mL を正確に加えた後，薄めたアセトニトリル（1→2）を加えて 50mL とし，標準溶液とする。試料溶液及び標準溶液 10μL につき，次の条件で液体クロマトグラフ法により試験を行い，内標準物質のピーク面積に対するクロルフェニラミンマレイン酸塩のピーク面積の比 Q_T 及び Q_S を求める。

クロルフェニラミンマレイン酸塩（$C_{16}H_{19}ClN_2 \cdot C_4H_4O_4$）の量（mg）

＝定量用クロルフェニラミンマレイン酸塩の量（mg）$\times\frac{Q_T}{Q_S}\times\frac{1}{20}$

内標準溶液　パラオキシ安息香酸イソアミルのアセトニトリル溶液（1→15000）

操作条件

検出器：紫外吸光光度計（測定波長：260nm）

カラム：内径約 4mm，長さ 15～25cm のステンレス管に 5～10μm の液体クロマトグラフ用オクタデシルシリル化シリカゲルを充てんする。

カラム温度：40℃付近の一定温度

移動相：ドデシル硫酸ナトリウム 2.0g を薄めたリン酸（1→1000）1000mL に溶かす。この液 500mL にアセトニトリル 500mL を加える。

流量：クロルフェニラミンマレイン酸塩の保持時間が約 7 分になるように調整する。

カラムの選定：標準溶液 10μL につき，上記の条件で操作するとき，クロルフェニラミンマレイン酸塩，パラオキシ安息香酸イソアミルの順に溶出し，それぞれのピークが完全に分離するものを用いる。

【 17 】　かぜ薬 9

成分及び分量又は本質	日本薬局方	*dl* - メチルエフェドリン塩酸塩散 10%	0.6g
	〃	クロルフェニラミンマレイン酸塩	0.0075g
	〃	ジヒドロコデインリン酸塩散 1%	2.4g
	〃	ノスカピン	0.048g
	〃	アセトアミノフェン	0.45g
	〃	エテンザミド	0.75g
	〃	カフェイン水和物	0.075g
	賦形剤　〃	デンプン，乳糖水和物又はこれらの混合物	適　量
		全　　量	6.0g
製造方法	以上をとり，散剤の製法により製する。ただし，分包散剤とする。クロルフェニラミンマレイン酸塩に替えて，クロルフェニラミンマレイン酸塩散 1%を用いてもよい。		
用法及び用量	1 回量を次のとおりとし，1 日 3 回，食後服用する。 大人（15 才以上）1 包 2.0g，12 才以上 15 才未満　大人の 2/3		
効能又は効果	かぜの諸症状（鼻水，鼻づまり，くしゃみ，のどの痛み，せき，たん，悪寒，発熱，頭痛，関節の痛み，筋肉の痛み）の緩和		
貯蔵方法及び有効期間	遮光した密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考			

規 格 及 び 試 験 方 法

本品は定量するとき，*dl* - メチルエフェドリン塩酸塩（$C_{11}H_{17}NO \cdot HCl$：215.72）0.81～1.21%，クロルフェニラミンマレイン酸塩（$C_{16}H_{19}ClN_2 \cdot C_4H_4O_4$：390.87）0.11～0.14%，ジヒドロコデインリン酸塩（$C_{18}H_{23}NO_3 \cdot H_3PO_4$：399.38）0.32～0.48%，ノスカピン（$C_{22}H_{23}NO_7$：413.43）0.72～0.88%，アセトアミノフェン（$C_8H_9NO_2$：151.17）6.75～8.25%，エテンザミド（$C_9H_{11}NO_2$：165.19）11.25～13.75%及びカフェイン水和物（$C_8H_{10}N_4O_2 \cdot H_2O$：212.21）1.13～1.38%を含む。

性　　状　本品は白色の粉末である。

確認試験　（1）　本品 1.0g にメタノール 5mL を加えて振り混ぜた後，ろ過し，ろ液を試料溶液とする。別に *dl* - メチルエフェドリン塩酸塩散 10%0.1g にメタノール 5mL を加えて振り混ぜた後，ろ過し，ろ液を標準溶液（1）とする。クロルフェニラミンマレイン酸塩 5mg をメタノール 20mL に溶かし，標準溶液（2）とする。ジヒドロコデインリン酸塩散 1%0.6g にメタノール 5mL を加えて振り混ぜた後，ろ過する。ろ液を蒸発乾固し，

残留物をメタノール 1mL に溶かし，標準溶液（3）とする。ノスカピン 8mg をメタノール 5mL に溶かし，標準溶液（4）とする。これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び標準溶液 5μL ずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲルを用いて調製した薄層板にスポットする。次に酢酸エチル・エタノール(95)・アンモニア水(28)混液（15：5：1）を展開溶媒として約 10cm 展開した後，薄層板を風乾する。これに噴霧用ドラーゲンドルフ試液を均等に噴霧するとき，試料溶液から得た数個のスポットのうち 4 個のスポットは，標準溶液（1），標準溶液（2），標準溶液（3）及び標準溶液（4）から得た黄赤色のスポットと色調及び *Rf* 値が等しい。

（２）　本品 1.0g にメタノール 5mL を加えて振り混ぜた後，ろ過し，ろ液を試料溶液とする。別にアセトアミノフェン 0.06g，エテンザミド 0.1g 及びカフェイン水和物 0.01g をそれぞれメタノール 5mL に溶かし，標準溶液（1），標準溶液（2）及び標準溶液（3）とする。これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び標準溶液 5μL ずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲル（蛍光剤入り）を用いて調製した薄層板にスポットする。次に酢酸エチル・ヘキサン混液（4：1）を展開溶媒として約 10cm 展開した後，薄層板を風乾する。これに紫外線（主波長 254nm）を照射するとき，試料溶液から得た 3 個のスポットの *Rf* 値は，標準溶液（1），標準溶液（2）及び標準溶液（3）から得たそれぞれのスポットの *Rf* 値に等しい。

定 量 法　（１）　本品約 0.6g を精密に量り，薄めたアセトニトリル（4→10）30mL を加えて 10 分間振り混ぜた後，内標準溶液 5mL を正確に加え，更に薄めたアセトニトリル（4→10）を加えて 50mL とする。この液をろ過し，初めのろ液 10mL を除き，次のろ液を試料溶液とする。別に *dl* - メチルエフェドリン塩酸塩散 10%約 0.06g 及びジヒドロコデインリン酸塩散 1%0.24g を精密に量り，内標準溶液 5mL を正確に加えた後，薄めたアセトニトリル（4→10）を加えて 50mL とする。この液をろ過し，初めのろ液 10mL を除き，次のろ液を標準溶液とする。試料溶液及び標準溶液 10μL につき，次の条件で液体クロマトグラフ法により試験を行い，内標準物質のピーク面積に対する *dl* - メチルエフェドリン塩酸塩及びジヒドロコデインリン酸塩のピーク面積の比 Q_{Ta}，Q_{Tb}，Q_{Sa} 及び Q_{Sb} を求める。

dl - メチルエフェドリン塩酸塩散 10%の量（mg）

$$=dl\text{ - メチルエフェドリン塩酸塩散 10\%の量（mg）}\times\frac{Q_{Ta}}{Q_{Sa}}$$

ジヒドロコデインリン酸塩散 1%の量（mg）

$$=\text{ジヒドロコデインリン酸塩散 1\%の量（mg）}\times\frac{Q_{Tb}}{Q_{Sb}}$$

内標準溶液　パラオキシ安息香酸イソアミルの薄めたアセトニトリル（4→10）溶液（1→2000）

操作条件

検出器：紫外吸光光度計（測定波長：254nm）

カラム：内径約 4mm，長さ 15～25cm のステンレス管に 5～10μm の液体クロマトグラフ用オクタデシルシリル化シリカゲルを充てんする。

カラム温度：40℃付近の一定温度

移動相：ドデシル硫酸ナトリウム 6.0g を薄めたリン酸（1→1000）1000mL に溶かす。この液 600mL にアセトニトリル 400mL を加える。

流量：ジヒドロコデインリン酸塩の保持時間が約 6 分になるように調整する。

カラムの選定：標準溶液 10μL につき，上記の条件で操作するとき，ジヒドロコデインリン酸塩，*dl* - メチルエフェドリン塩酸塩，パラオキシ安息香酸イソアミルの順に溶出し，それぞれのピークが完全に分離するものを用いる。

（２）　本品約 1.2g を精密に量り，薄めたアセトニトリル（1→2）30mL を加えて 10 分間振り混ぜた後，内標準溶液 5mL を正確に加え，更に薄めたアセトニトリル（1→2）を加えて 50mL とする。この液をろ過し，初めのろ液 10mL を除き，次のろ液を試料溶液とする。別に定量用クロルフェニラミンマレイン酸塩約 0.03g 及び定量用ノスカピン 0.19g を精密に量り，薄めたアセトニトリル（1→2）を加えて正確に 100mL とする。この液 5mL を正確に量り，内標準溶液 5mL を正確に加えた後，薄めたアセトニトリル（1→2）を加えて 50mL とし，標準溶液とする。試料溶液及び標準溶液 10μL につき，次の条件で液体クロマトグラフ法により試験を行い，内標準物質のピーク面積に対するクロルフェニラミンマレイン酸塩及びノスカピンのピーク面積の比 Q_{Ta}，Q_{Tb}，Q_{Sa} 及び Q_{Sb} を求める。

クロルフェニラミンマレイン酸塩（$C_{16}H_{19}ClN_2$・$C_4H_4O_4$）の量（mg）

＝定量用クロルフェニラミンマレイン酸塩の量（mg）$\times\frac{Q_{\mathrm{Ta}}}{Q_{\mathrm{Sa}}}\times\frac{1}{20}$

ノスカピン（$C_{22}H_{23}NO_7$）の量（mg）

＝ノスカピンの量（mg）$\times\frac{Q_{\mathrm{Tb}}}{Q_{\mathrm{Sb}}}\times\frac{1}{20}$

内標準溶液　パラオキシ安息香酸イソアミルのメタノール溶液（1→10000）

操作条件

検出器：紫外吸光光度計（測定波長：260nm）

カラム：内径約 4mm，長さ 15～25cm のステンレス管に 5～10μm の液体クロマトグラフ用オクタデシルシリル化シリカゲルを充てんする。

カラム温度：40℃付近の一定温度

移動相：ドデシル硫酸ナトリウム 2.0g を薄めたリン酸（1→1000）1000mL に溶かす。

この液 550mL にアセトニトリル 450mL を加える。

流量：ノスカピンの保持時間が約 7 分になるように調整する。

カラムの選定：標準溶液 10μL につき，上記の条件で操作するとき，ノスカピン，パラオキシ安息香酸イソアミル，クロルフェニラミンマレイン酸塩の順に溶出し，それぞれのピークが完全に分離するものを用いる。

（３）　本品約 0.2g を精密に量り，メタノール 30mL を加えて 10 分間振り混ぜた後，内標準溶液 5mL を正確に加え，更にメタノールを加えて 50mL とし，ろ過する。初めのろ液 10mL を除き，次のろ液を試料溶液とする。別に定量用アセトアミノフェン約 0.15g 及び定量用カフェイン水和物約 0.025g をそれぞれ精密に量り，メタノールに溶かして正確に 50mL とする。この液 5mL を正確に量り，内標準溶液 5mL を正確に加えた後，メタノールを加えて 50mL とし，標準溶液とする。試料溶液及び標準溶液 10μL につき，次の条件で液体クロマトグラフ法により試験を行い，内標準物質のピーク面積に対するアセトアミノフェン及びカフェイン水和物のピーク面積の比 Q_{Ta}，Q_{Tb}，Q_{Sa} 及び Q_{Sb} を求める。

アセトアミノフェン（$C_8H_9NO_2$）の量（mg）

＝定量用アセトアミノフェンの量（mg）$\times\frac{Q_{Ta}}{Q_{Sa}}\times\frac{1}{10}$

カフェイン水和物（$C_8H_{10}N_4O_2\cdot H_2O$）の量（mg）

＝定量用カフェイン水和物の量（mg）$\times\frac{Q_{Tb}}{Q_{Sb}}\times\frac{1}{10}$

内標準溶液　パラオキシ安息香酸のメタノール溶液（1→1000）

操作条件

検出器：紫外吸光光度計（測定波長：275nm）

カラム：内径約 4mm，長さ 15～25cm のステンレス管に 5～10 μ m の液体クロマトグラフ用オクタデシルシリル化シリカゲルを充てんする。

カラム温度：40℃付近の一定温度

移動相：薄めたリン酸（1→1000）・アセトニトリル混液（93：7）

流量：アセトアミノフェンの保持時間が約 5 分になるように調整する。

カラムの選定：標準溶液 10μL につき，上記の条件で操作するとき，アセトアミノフェン，パラオキシ安息香酸，カフェイン水和物の順に溶出し，それぞれのピークが完全に分離するものを用いる。

（4）　本品約 0.4g を精密に量り，メタノール 30mL を加えて 10 分間振り混ぜた後，内標準溶液 5mL を正確に加え，この液にメタノールを加えて 50mL とし，ろ過する。初めのろ液 10mL を除き，次のろ液を試料溶液とする。別に定量用エテンザミド約 0.05g を精密に量り，内標準溶液 5mL を正確に加えた後，メタノールを加えて 50mL とし標準溶液とする。試料溶液及び標準溶液 10μL につき，次の条件で液体クロマトグラフ法により試験を行い，内標準物質のピーク面積に対するエテンザミドのピーク面積の比 Q_T 及び Q_S を求める。

エテンザミド（$C_9H_{11}NO_2$）の量（mg）

＝定量用エテンザミドの量（mg）$\times\frac{Q_T}{Q_S}$

内標準溶液　安息香酸のメタノール溶液（1→100）

操作条件

検出器：紫外吸光光度計（測定波長：275nm）

カラム：内径約 4mm，長さ 15～25cm のステンレス管に 5～10μm の液体クロマトグラフ用オクタデシルシリル化シリカゲルを充てんする。

カラム温度：40℃付近の一定温度

移動相：薄めたリン酸（1→1000）・メタノール混液（3：2）

流量：エテンザミドの保持時間が約 6 分になるように調整する。

カラムの選定：標準溶液 10μL につき，上記の条件で操作するとき，エテンザミド，安息香酸の順に溶出し，それぞれのピークが完全に分離するものを用いる。

【 18 】　かぜ薬 4—②

成分及び分量又は本質	日本薬局方	アセトアミノフェン	0.36g
	〃	エテンザミド	0.9g
	〃	クロルフェニラミンマレイン酸塩	0.0075g
	〃	*dl* - メチルエフェドリン塩酸塩散 10%	0.6g
	〃	ジヒドロコデインリン酸塩散 1%	2.4g
	賦形剤　〃	デンプン，乳糖水和物又はこれらの混合物	適　量
		全　　量	6.0g
製造方法	以上をとり，散剤の製法により製する。ただし，分包散剤とする。クロルフェニラミンマレイン酸塩に替えて，クロルフェニラミンマレイン酸塩散１%を用いてもよい。		
用法及び用量	1回量を次のとおりとし，1日3回，食後服用する。 大人（15才以上）1包 2.0g，12才以上15才未満　大人の 2/3		
効能又は効果	かぜの諸症状（鼻水，鼻づまり，くしゃみ，のどの痛み，せき，たん，悪寒，発熱，頭痛，関節の痛み，筋肉の痛み）の緩和		
貯蔵方法及び有効期間	遮光した密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考			

規 格 及 び 試 験 方 法

本品は定量するとき，アセトアミノフェン（$C_8H_9NO_2$：151.17）5.4～6.6%，エテンザミド（$C_9H_{11}NO_2$：165.19）13.5～16.5%，クロルフェニラミンマレイン酸塩（$C_{16}H_{19}ClN_2 \cdot C_4H_4O_4$：390.87）0.11～0.14%，*dl* - メチルエフェドリン塩酸塩（$C_{11}H_{17}NO \cdot HCl$：215.72）0.81～1.21%及びジヒドロコデインリン酸塩（$C_{18}H_{23}NO_3 \cdot H_3PO_4$：399.38）0.32～0.48%を含む。

性　　状　本品は白色の粉末である。

確認試験　（1）　本品 1.0g にメタノール 5mL を加えて振り混ぜた後，ろ過し，ろ液を試料溶液とする。別にアセトアミノフェン 0.06g 及びエテンザミド 0.15g をそれぞれメタノール 5mL に溶かし，標準溶液（1）及び標準溶液（2）とする。これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び標準溶液 5μL ずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲル（蛍光剤入り）を用いて調製した薄層板にスポットする。次に酢酸エチル・ヘキサン混液（4：1）を展開溶媒として約 10cm 展開した後，薄層板を風乾する。これに紫外線（主波長 254nm）を照射するとき，試料溶液から得た 2 個のスポットの *Rf* 値は，標準溶液（1）及び標準溶液（2）から得たそれぞれのスポットの *Rf* 値に等しい。

（２）　本品 1.0g にメタノール 5mL を加えて振り混ぜた後，ろ過し，ろ液を試料溶液とする。別に *dl* - メチルエフェドリン塩酸塩散 10%0.1g にメタノール 3mL を加えて振り混ぜた後，ろ過し，ろ液を標準溶液（1）とする。クロルフェニラミンマレイン酸塩 5mg をメタノール 3mL に溶かし，標準溶液（2）とする。ジヒドロコデインリン酸塩散 1%0.4g にメタノール 5mL を加えて振り混ぜた後，ろ過する。ろ液を蒸発乾固し，残留物をメタノール 1mL に溶かし，標準溶液（3）とする。これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び標準溶液 5μL ずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲルを用いて調製した薄層板にスポットする。次に酢酸エチル・エタノール(95)・アンモニア水(28)混液（15：5：1）を展開溶媒として約 10cm 展開した後，薄層板を風乾する。これに噴霧用ドラーゲンドルフ試液を均等に噴霧するとき，試料溶液から得た数個のスポットのうち 3 個のスポットは，標準溶液（1），標準溶液（2）及び標準溶液（3）から得た黄赤色のスポットと色調及び *Rf* 値が等しい。

定 量 法　**（１）**　本品約 0.2g を精密に量り，メタノール 30mL を加えて 10 分間振り混ぜた後，内標準溶液 5mL を正確に加え，更にメタノールを加えて 50mL とし，ろ過する。初めのろ液 10mL を除き，次のろ液を試料溶液とする。別に定量用アセトアミノフェン約 0.012g を精密に量り，内標準溶液 5mL を正確に加えた後，薄めたメタノールに溶かして 50mL とし，標準溶液とする。試料溶液及び標準溶液 10μL につき，次の条件で液体クロマトグラフ法により試験を行い，内標準物質のピーク面積に対するアセトアミノフェンのピーク面積の比 Q_T 及び Q_S を求める。

アセトアミノフェン（$C_8H_9NO_2$）の量（mg）

＝定量用アセトアミノフェンの量（mg）$\times\frac{Q_T}{Q_S}$

内標準溶液　パラオキシ安息香酸のメタノール溶液（1→1000）

操作条件

検出器：紫外吸光光度計（測定波長：275nm）

カラム：内径約 4mm，長さ 15～25cm のステンレス管に 5～10μm の液体クロマトグラフ用オクタデシルシリル化シリカゲルを充てんする。

カラム温度：40℃付近の一定温度

移動相：薄めたリン酸（1→1000）・アセトニトリル混液（93：7）

流量：アセトアミノフェンの保持時間が約 5 分になるように調整する。

カラムの選定：標準溶液 10μL につき，上記の条件で操作するとき，アセトアミノフェン，パラオキシ安息香酸の順に溶出し，それぞれのピークが完全に分離するものを用いる。

（２）　本品約 0.3g を精密に量り，メタノール 30mL を加えて 10 分間振り混ぜた後，内標準溶液 5mL を正確に加え，この液にメタノールを加えて 50mL とし，ろ過する。初めのろ液 10mL を除き，次のろ液を試料溶液とする。別に定量用エテンザミド約 0.045g を精密に量り，内標準溶液 5mL を正確に加えた後，メタノールを加えて 50mL とし標準溶液とする。試料溶液及び標準溶液 10μL につき，次の条件で液体クロマトグラフ法により試験を行い，内標準物質のピーク面積に対するエテンザミドのピーク面積の比 Q_T 及び Q_S を求める。

エテンザミド（$C_9H_{11}NO_2$）の量（mg）

＝定量用エテンザミドの量（mg）$\times\frac{Q_T}{Q_S}$

内標準溶液　安息香酸のメタノール溶液（1→100）

操作条件

検出器：紫外吸光光度計（測定波長：275nm）

カラム：内径約 4mm，長さ 15～25cm のステンレス管に 5～10μm の液体クロマトグラフ用オクタデシルシリル化シリカゲルを充てんする。

カラム温度：40℃付近の一定温度

移動相：薄めたリン酸（1→1000）・メタノール混液（3：2）

流量：エテンザミドの保持時間が約 6 分になるように調整する。

カラムの選定：標準溶液 10μL につき，上記の条件で操作するとき，エテンザミド，安息香酸の順に溶出し，それぞれのピークが完全に分離するものを用いる。

（３）　本品約 1.2g を精密に量り，薄めたアセトニトリル（1→2）30mL を加えて 10 分間振り混ぜた後，内標準溶液 5mL を正確に加え，更に薄めたアセトニトリル（1→2）を加えて 50mL とし，ろ過する。初めのろ液 10mL を除き，次のろ液を試料溶液とする。別に定量用クロルフェニラミンマレイン酸塩約 0.03g を精密に量り，薄めたアセトニトリル（1→2）を加えて正確に 100mL とする。この液 5mL を正確に量り，内標準溶液 5mL を正確に加えた後，薄めたアセトニトリル（1→2）を加えて 50mL とし，標準溶液とする。試料溶液及び標準溶液 10 μ L につき，次の条件で液体クロマトグラフ法により試験を行い，内標準物質のピーク面積に対するクロルフェニラミンマレイン酸塩のピーク面積の比 Q_T 及び Q_S を求める。

クロルフェニラミンマレイン酸塩（$C_{16}H_{19}ClN_2$・$C_4H_4O_4$）の量（mg）＝定量用クロルフェニラミンマレイン酸塩の量（mg）$\times\frac{Q_T}{Q_S}\times\frac{1}{20}$

内標準溶液　パラオキシ安息香酸イソアミルの薄めたアセトニトリル（1→2）溶液（1→15000）

操作条件

検出器：紫外吸光光度計（測定波長：260nm）

カラム：内径約 4mm，長さ 15～25cm のステンレス管に 5～10μm の液体クロマトグラフ用オクタデシルシリル化シリカゲルを充てんする。

カラム温度：40℃付近の一定温度

移動相：ドデシル硫酸ナトリウム 2.0g を薄めたリン酸（1→1000）1000mL に溶かす。この液 500mL にアセトニトリル 500mL を加える。

流量：クロルフェニラミンマレイン酸の保持時間が約 7 分になるように調整する。

カラムの選定：標準溶液 10μL につき，上記の条件で操作するとき，クロルフェニラミンマレイン酸塩，パラオキシ安息香酸イソアミルの順に溶出し，それぞれのピークが完全に分離するものを用いる。

（４）　本品約 0.6g を精密に量り，薄めたアセトニトリル（4→10）30mL を加えて 10 分間振り混ぜた後，内標準溶液 5mL を正確に加え，更に薄めたアセトニトリル（4→10）を加えて 50mL とし，ろ過する。初めのろ液 10mL を除き，次のろ液を試料溶液とする。

別に *dl* - メチルエフェドリン塩酸塩散 10%約 0.06g 及びジヒドロコデインリン酸塩散 1% 0.24g を精密に量り，内標準溶液 5mL を正確に加えた後，更に薄めたアセトニトリル（4→10）を加えて 50mL とする。この液をろ過し，初めのろ液 10mL を除き，次のろ液を標準溶液とする。試料溶液及び標準溶液 10μL につき，次の条件で液体クロマトグラフ法により試験を行い，内標準物質のピーク面積に対する *dl* - メチルエフェドリン塩酸塩及びジヒドロコデインリン酸塩のピーク面積の比 Q_{Ta}，Q_{Tb}，Q_{Sa} 及び Q_{Sb} を求める。

dl - メチルエフェドリン塩酸塩散 10%の量（mg）

$$=dl\text{ - メチルエフェドリン塩酸塩散 10\%の量（mg）}\times\frac{Q_{Ta}}{Q_{Sa}}$$

ジヒドロコデインリン酸塩散 1%の量（mg）

$$=\text{ジヒドロコデインリン酸塩散 1\%の量（mg）}\times\frac{Q_{Tb}}{Q_{Sb}}$$

内標準溶液　パラオキシ安息香酸イソアミルの薄めたアセトニトリル（4→10）溶液（1→2000）

操作条件

検出器：紫外吸光光度計（測定波長：220nm）

カラム：内径約 4mm，長さ 15～25cm のステンレス管に 5～10μm のオクタデシルシリル化シリカゲルを充てんする。

カラム温度：40℃付近の一定温度

移動相：ドデシル硫酸ナトリウム 2.0g を薄めたリン酸（1→1000）1000mL に溶かす。この液 600mL にアセトニトリル 400mL を加える。

流量：ジヒドロコデインリン酸塩の保持時間が約 6 分になるように調整する。

カラムの選定：標準溶液 10μL につき，上記の条件で操作するとき，リン酸ジヒドロコデイン，*dl* - メチルエフェドリン塩酸塩，パラオキシ安息香酸イソアミルの順に溶出し，それぞれのピークが完全に分離するものを用いる。

【 19 】　かぜ薬 5—②

成分及び分量又は本質	日本薬局方	アセトアミノフェン	0.36g
	〃	エテンザミド	0.9g
	〃	クロルフェニラミンマレイン酸塩	0.0075g
	〃	*dl* - メチルエフェドリン塩酸塩散 10%	0.6g
	〃	カフェイン水和物	0.075g
	〃	ジヒドロコデインリン酸塩散 1%	2.4g
	賦形剤　〃	デンプン，乳糖水和物又はこれらの混合物	適　量
		全　　量	6.0g
製造方法	以上をとり，散剤の製法により製する。ただし，分包散剤とする。クロルフェニラミンマレイン酸塩に替えて，クロルフェニラミンマレイン酸塩散 1%を用いてもよい。		
用法及び用量	1 回量を次のとおりとし，1 日 3 回，食後服用する。 大人（15 才以上）1 包 2.0g，12 才以上 15 才未満　大人の 2/3		
効能又は効果	かぜの諸症状（鼻水，鼻づまり，くしゃみ，のどの痛み，せき，たん，悪寒，発熱，頭痛，関節の痛み，筋肉の痛み）の緩和		
貯蔵方法及び有効期間	遮光した密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考			

規 格 及 び 試 験 方 法

本品は定量するとき，アセトアミノフェン（$C_8H_9NO_2$：151.17）5.4～6.6%，エテンザミド（$C_9H_{11}NO_2$：165.19）13.5～16.5%，クロルフェニラミンマレイン酸塩（$C_{16}H_{19}ClN_2 \cdot C_4H_4O_4$：390.87）0.11～0.14%，*dl* - メチルエフェドリン塩酸塩（$C_{11}H_{17}NO \cdot HCl$：215.72）0.81～1.21%，カフェイン水和物（$C_8H_{10}N_4O_2 \cdot H_2O$：212.21）1.13～1.38%及びジヒドロコデインリン酸塩（$C_{18}H_{23}NO_3 \cdot H_3PO_4$：399.38）0.32～0.48%を含む。

性　　状　本品は白色の粉末である。

確認試験　（1）　本品 1.0g にメタノール 5mL を加えて振り混ぜた後，ろ過し，ろ液を試料溶液とする。別にアセトアミノフェン 0.06g，エテンザミド 0.15g 及びカフェイン水和物 0.012g をそれぞれメタノール 5mL に溶かし，標準溶液（1），標準溶液（2）及び標準溶液（3）とする。これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び標準溶液 5μL ずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲル（蛍光剤入り）を用いて調製した薄層板にスポットする。次に酢酸エチル・ヘキサン混液（4：1）を展開溶媒として

約 10cm 展開した後，薄層板を風乾する。これに紫外線（主波長 254nm）を照射するとき，試料溶液から得た 3 個のスポットは，標準溶液（1），標準溶液（2）及び標準溶液（3）から得たそれぞれのスポットと色調及び *Rf* 値が等しい。

（２）　本品 1.0g にメタノール 5mL を加えて振り混ぜた後，ろ過し，ろ液を試料溶液とする。別にクロルフェニラミンマレイン酸塩 5mg をメタノール 20mL に溶かし，標準溶液（1）とする。*dl* - メチルエフェドリン塩酸塩散 10%0.1g にメタノール 5mL を加えて振り混ぜた後，ろ過し，ろ液を標準溶液（2）とする。ジヒドロコデインリン酸塩散 1% 0.4g にメタノール 5mL を加えて振り混ぜた後，ろ過し，標準溶液（3）とする。これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び標準溶液 10μL ずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲルを用いて調製した薄層板にスポットする。次に酢酸エチル・エタノール（95）・アンモニア水（28）混液（15：5：1）を展開溶媒として約 10cm 展開した後，薄層板を風乾する。これに噴霧用ドラーゲンドルフ試液を均等に噴霧するとき，試料溶液から得た 3 個のスポットは，標準溶液（1），標準溶液（2）及び標準溶液（3）から得た黄赤色のそれぞれのスポットと色調及び *Rf* 値が等しい。

定 量 法　（１）　本品約 0.2g を精密に量り，メタノール 30mL を加えて 10 分間振り混ぜた後，内標準溶液 5mL を正確に加え，更にメタノールを加えて 50mL とする。この液をろ過し，初めのろ液 10mL を除き，次のろ液を試料溶液とする。別に定量用アセトアミノフェン約 0.12g 及び定量用カフェイン水和物 0.025g をそれぞれ精密に量り，メタノールに溶かし，正確に 50mL とする。この液 5mL を正確に量り，内標準溶液 5mL を正確に加えた後，メタノールを加えて 50mL とし，標準溶液とする。試料溶液及び標準溶液 10 μL につき，次の条件で液体クロマトグラフ法により試験を行い，内標準物質のピーク面積に対するアセトアミノフェン及びカフェイン水和物のピーク面積の比 Q_{Ta}，Q_{Tb}，Q_{Sa} 及び Q_{Sb} を求める。

アセトアミノフェン（$C_8H_9NO_2$）の量（mg）

＝定量用アセトアミノフェンの量（mg）$\times\frac{Q_{Ta}}{Q_{Sa}}\times\frac{1}{10}$

カフェイン水和物（$C_8H_{10}N_4O_2\cdot H_2O$：212.21）

＝定量用カフェイン水和物の量（mg）$\times\frac{Q_{Tb}}{Q_{Sb}}\times\frac{1}{10}$

内標準溶液　パラオキシ安息香酸のメタノール溶液（1→1400）

操作条件

検出器：紫外吸光光度計（測定波長：275nm）

カラム：内径約 4mm，長さ 15～25cm のステンレス管に 5～10μm の液体クロマトグラフ用オクタデシルシリル化シリカゲルを充てんする。

カラム温度：40℃付近の一定温度

移動相：薄めたリン酸（1→1000）・アセトニトリル混液（93：7）

流量：アセトアミノフェンの保持時間が約 5 分になるように調製する。

カラムの選定：標準溶液 10μL につき，上記の条件で操作するとき，アセトアミノフェン，パラオキシ安息香酸，カフェイン水和物の順に溶出し，それぞれのピークが完全に分離するものを用いる。

（２）　本品約 0.3g を精密に量り，メタノール 30mL を加えて 10 分間振り混ぜた後，内標準溶液 5mL を正確に加え，更にメタノールを加えて 50mL とする。この液をろ過し，初めのろ液 10mL を除き，次のろ液を試料溶液とする。別に定量用エテンザミド約 0.045g を精密に量り，メタノール 30mL に溶かし，内標準溶液 5mL を正確に加えた後，メタノールを加えて 50mL とし，標準溶液とする。試料溶液及び標準溶液 10μL につき，次の条件で液体クロマトグラフ法により試験を行い，内標準物質のピーク面積に対するエテンザミドのピーク面積の比 Q_T 及び Q_S を求める。

エテンザミド（$C_9H_{11}NO_2$）の量（mg）

＝定量用エテンザミドの量（mg）$\times\frac{Q_T}{Q_S}$

内標準溶液　安息香酸のメタノール溶液（1→100）

操作条件

検出器：紫外吸光光度計（測定波長：275nm）

カラム：内径約 4mm，長さ 15～25cm のステンレス管に 5～10μm の液体クロマトグラフ用オクタデシルシリル化シリカゲルを充てんする。

カラム温度：40℃付近の一定温度

移動相：薄めたリン酸（1→1000）・メタノール混液（3：2）

流量：エテンザミドの保持時間が約 6 分になるように調整する。

カラムの選定：標準溶液 10μL につき，上記の条件で操作するとき，エテンザミド，安息香酸の順に溶出し，それぞれのピークが完全に分離するものを用いる。

（３）　本品約 1.2g を精密に量り，メタノール 30mL を加えて 10 分間振り混ぜた後，内標準溶液 5mL を正確に加え，更にメタノールを加えて 50mL とする。この液をろ過し，初めのろ液 10mL を除き，次のろ液を試料溶液とする。別に定量用クロルフェニラミンマレイン酸塩約 0.03g を精密に量り，メタノールに溶かし，正確に 100mL とする。この液 5mL を正確に量り，内標準溶液 5mL を正確に加えた後，メタノールを加えて 50mL とし，標準溶液とする。試料溶液及び標準溶液 10μL につき，次の条件で液体クロマトグラフ法により試験を行い，内標準物質のピーク面積に対するクロルフェニラミンマレイン酸塩のピーク面積の比 Q_T 及び Q_S を求める。

クロルフェニラミンマレイン酸塩（$C_{16}H_{19}ClN_2 \cdot C_4H_4O_4$）の量（mg）

＝定量用クロルフェニラミンマレイン酸塩の量（mg）$\times\frac{Q_T}{Q_S}\times\frac{1}{20}$

内標準溶液　パラオキシ安息香酸 *n* - アミルのメタノール溶液（1→15000）

操作条件

検出器：紫外吸光光度計（測定波長：260nm）

カラム：内径約 4mm，長さ 15～25cm のステンレス管に 5～10μm の液体クロマトグラフ用オクタデシルシリル化シリカゲルを充てんする。

カラム温度：40℃付近の一定温度

移動相：ドデシル硫酸ナトリウム 2.0g を薄めたリン酸（1→1000）1000mL に溶かす。この液 500mL にアセトニトリル 500mL を加える。

流量：クロルフェニラミンマレイン酸塩の保持時間が約 7 分になるように調整する。

カラムの選定：標準溶液 10μL につき，上記の条件で操作するとき，クロルフェニラミンマレイン酸塩，パラオキシ安息香酸 *n* - アミルの順に溶出し，それぞれのピークが完全に分離するものを用いる。

（4）　本品約 0.6g を精密に量り，メタノール 30mL を加えて 10 分間振り混ぜた後，内標準溶液 5mL を正確に加え，更にメタノールを加えて 50mL とする。この液をろ過し，初めのろ液 10mL を除き，次のろ液を試料溶液とする。別に定量用 *dl* - メチルエフェドリン塩酸塩散 10%約 0.06g 及びジヒドロコデインリン酸塩散 1%約 0.24g を精密に量り，メタノール 30mL を加えて振り混ぜた後，内標準溶液 5mL を正確に加え，更にメタノールを加えて 50mL とする。この液をろ過し，初めのろ液 10mL を除き，次のろ液を標準溶液とする。試料溶液及び標準溶液 10μL につき，次の条件で液体クロマトグラフ法により試験を行い，内標準物質のピーク面積に対する *dl* - メチルエフェドリン塩酸塩及びジヒドロコデインリン酸塩のピーク面積の比 Q_{Ta}，Q_{Tb}，Q_{Sa} 及び Q_{Sb} を求める。

dl - メチルエフェドリン塩酸塩散 10%の量（mg）

＝定量用 *dl* - メチルエフェドリン塩酸塩散 10%の量（mg）$\times\dfrac{Q_{\mathrm{Ta}}}{Q_{\mathrm{Sa}}}$

ジヒドロコデインリン酸塩散 1%の量（mg）

＝定量用ジヒドロコデインリン酸塩散 1%の量（mg）$\times\dfrac{Q_{\mathrm{Tb}}}{Q_{\mathrm{Sb}}}$

内標準溶液　パラオキシ安息香酸イソアミルのメタノール溶液（1→2000）

操作条件

検出器：紫外吸光光度計（測定波長：220nm）

カラム：内径約 4mm，長さ 15～25cm のステンレス管に 5～10μm の液体クロマトグラフ用オクタデシルシリル化シリカゲルを充てんする。

カラム温度：40℃付近の一定温度

移動相：ドデシル硫酸ナトリウム 6.0g を薄めたリン酸（1→1000）1000mL に溶かす。この液 600mL にアセトニトリル 400mL を加える。

流量：リン酸ジヒドロコデインの保持時間が約 6 分になるように調整する。

カラムの選定：標準溶液 10μL につき，上記の条件で操作するとき，ジヒドロコデインリン酸塩，*dl* - メチルエフェドリン塩酸塩，パラオキシ安息香酸イソアミルの順に溶出し，それぞれのピークが完全に分離するものを用いる。

【 20 】　眼科用薬 1—①

成分及び分量 又は本質	日本薬局方		硫酸亜鉛水和物	0.3g
	等張化剤	〃	ホ　ウ　酸	2.0g
	〃	〃	塩化ナトリウム	0.5g
	着香剤	〃	ウイキョウ油	0.2mL
	溶　剤	〃	滅菌精製水（容器入り）	適　量
			全　量	100mL
製造方法	以上をとり，点眼剤の製法により製する。 ただし，プラスチック製容器を使用する場合は，当該容器は，昭和 48 年 9 月 26 日薬発第 958 号通知に適合する。			
用法及び用量	1 日 3～6 回，1 回 1～3 滴点眼する。			
効能又は効果	目の疲れ，結膜充血，眼病予防（水泳のあと，ほこりや汗が目に入ったとき），紫外線その他の光線による眼炎（雪目など），眼膜炎（まぶたのただれ），ハードコンタクトを装着しているときの不快感，目のかゆみ，目のかすみ（目やにの多いときなど）			
貯蔵方法及び有効期間	気密容器			
規格及び試験方法	日本薬局方による。			
備　考	硫酸亜鉛点眼液			

【 21 】　耳鼻科用薬 1—②

成分及び分量又は本質		日本薬局方	ナファゾリン塩酸塩	0.05g
		〃	クロルフェニラミンマレイン酸塩	0.1g
	防腐剤	〃	クロロブタノール	0.2g
	潤滑剤	〃	グリセリン	5.0mL
	溶剤	〃	精製水又は精製水（容器入り）	適　量
			全　　量	100mL
製造方法	以上をとり，溶解混和して製する。なお，全容量は最大 30mL とする。ただし，プラスチック製容器を使用する場合は，当該容器は，昭和 48 年 9 月 26 日薬発第 958 号通知〔透明性及び強熱残分を除く〕に適合する。			
用法及び用量	成人（15 才以上）1 日 6 回を限度として，3～4 時間ごとに鼻汁をよくかんでから 1～2 回鼻腔内に噴霧する。			
効能又は効果	急性鼻炎，アレルギー性鼻炎又は副鼻腔炎による次の諸症状の緩和：鼻づまり，鼻水（鼻汁過多），くしゃみ，頭重（頭が重い）			
貯蔵方法及び有効期間	遮光した気密容器			
規格及び試験方法	別記のとおり。			
備考				

規 格 及 び 試 験 方 法

本品は定量するとき，ナファゾリン塩酸塩（$C_{14}H_{14}N_2$・HCl：246.74）0.045～0.055%及びクロルフェニラミンマレイン酸塩（$C_{16}H_{19}ClN_2$・$C_4H_4O_4$：390.86）0.09～0.11%を含む。

性　　状　本品は無色澄明の液である。

確認試験　（1）　本品 20mL に水酸化カリウム溶液（7→10）2mL 及びピリジン 5mL を加え 100℃で 5 分間加熱するとき，液は赤色を呈する（クロロブタノール）。

（2）　本品 10mL を共栓試験管にとり，エタノール（95）10mL，水酸化ナトリウム試液 2mL 及び塩化銅（Ⅱ）二水和物のエタノール（95）溶液（1→10）1mL を加え，振り混ぜるとき，液は青色を呈する（グリセリン）。

（3）　本品 20mL に水酸化ナトリウム試液 5mL を加え，ジエチルエーテル 10mL で抽出し，ジエチルエーテル層を分取する。この液 5mL をとり，溶媒を留去し，残留物をメタノール 5mL に溶かし，試料溶液とする。別にナファゾリン塩酸塩及びクロルフェニラミンマレイン酸塩標準品 0.01g ずつをそれぞれメタノール 10mL 及び 5mL に溶かし，標準溶液（1）及び標準溶液（2）とする。これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液，標準溶液（1）及び標準溶液（2）5μL ずつを薄層クロマトグラフ

用シリカゲル（蛍光剤入り）を用いて調製した薄層板にスポットする。次にクロロホルム・メタノール・アセトン・アンモニア水（28）混液（73：15：10：2）を展開溶媒として約 10cm 展開した後，薄層板を風乾する。これに紫外線（主波長 254nm）を照射するとき，試料溶液から得た 2 個のスポットの *Rf* 値は，標準溶液（1）及び標準溶液（2）から得たそれぞれのスポットの *Rf* 値に等しい。また，これらの薄層板に噴霧用ドラーゲンドルフ試液を均等に噴霧するとき，標準溶液（1）及び標準溶液（2）から得たスポット並びにそれらに対応する位置の試料溶液から得たスポットは，だいだい色を呈する。

定 量 法　本品 4mL を正確に量り，内標準溶液 4mL を正確に加え，更に水を加えて 10mL とし，試料溶液とする。別に 105℃で 2 時間乾燥した定量用ナファゾリン塩酸塩約 50mg 及び 105℃で 3 時間乾燥したクロルフェニラミンマレイン酸塩標準品約 0.1g をそれぞれ精密に量り，水に溶かし，正確に 100mL とする。この液 4mL を正確に量り，内標準溶液 4mL を正確に加え，更に水を加えて 10mL とし，標準溶液とする。試料溶液及び標準溶液 10μL につき，次の条件で液体クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液の内標準物質のピーク高さに対するナファゾリン塩酸塩及びクロルフェニラミンマレイン酸塩のピーク高さの比 Q_{Ta} 及び Q_{Tb} 並びに標準溶液の内標準物質のピーク高さに対するナファゾリン塩酸塩及びクロルフェニラミンマレイン酸塩のピーク高さの比 Q_{Sa} 及び Q_{Sb} を求める。

ナファゾリン塩酸塩（$C_{14}H_{14}N_2$・HCl）の量（mg）

＝W_{Sa}×（Q_{Ta}／Q_{Sa}）×（1／25）

クロルフェニラミンマレイン酸塩（$C_{16}H_{19}ClN_2$・$C_4H_4O_4$）の量（mg）

＝W_{Sb}×（Q_{Tb}／Q_{Sb}）×（1／25）

W_{Sa}：定量用ナファゾリン塩酸塩の秤取量（mg）

W_{Sb}：クロルフェニラミンマレイン酸塩標準品の秤取量（mg）

内標準溶液　エテンザミドのメタノール溶液（1→1000）

操作条件

検出器：紫外吸光光度計（測定波長：254nm）

カラム：内径約 4mm，長さ 25～30cm のステンレス管に，5μm の液体クロマトグラフ用オクタデシルシリル化シリカゲルを充てんする。

カラム温度：室温

移動相：アセトニトリル／ラウリル硫酸ナトリウムの薄めたリン酸（1→1000）溶液（1→500）混液（1：1）

流量：クロルフェニラミンの保持時間が約 10 分になるように調整する。

カラムの選定：標準溶液 10μL につき，上記の条件で操作するとき，内標準物質，ナファゾリン，クロルフェニラミンの順に溶出し，それぞれのピークが完全に分離するものを用いる。

【 22 】　抗ヒスタミン薬 1—②

成分及び分量又は本質	日本薬局方	*d*- クロルフェニラミンマレイン酸塩	0.006g
	〃	ニコチン酸アミド	0.05g
	〃	リボフラビン	0.012g
	〃	ピリドキシン塩酸塩	0.05g
	賦形剤　〃	デンプン，乳糖水和物又はこれらの混合物	適　量
		全　　量	3.0g
製造方法	以上をとり，散剤の製法により製する。ただし，分包散剤とする。*d*-クロルフェニラミンマレイン酸塩に替えて，*d*-クロルフェニラミンマレイン酸塩散 1%を用いてもよい。		
用法及び用量	1 回量を次のとおりとし，1 日 3 回，食後服用する。 大人（15 才以上）1 包 1.0g，11 才以上 15 才未満　大人の 2/3，7 才以上 11 才未満　大人の 1/2，3 才以上 7 才未満　大人の 1/3，1 才以上 3 才未満　大人の 1/4		
効能又は効果	湿疹・かぶれによるかゆみ，じんましん，鼻炎		
貯蔵方法及び有効期間	遮光した密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考			

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は淡黄色の粉末である。

確認試験　（1）　本品 2g に 0.1mol/L 塩酸試液 20mL を加えて振り混ぜた後，ろ過する。ろ液を分液漏斗に移し，クロロホルム 20mL で洗う。次に水酸化ナトリウム試液 5mL を加え，ヘキサン 5mL で抽出する。ヘキサン抽出液に噴霧用ドラーゲンドルフ試液 2mL を加え，振り混ぜるとき，赤だいだい色の沈殿を生じる（クロルフェニラミンマレイン酸塩）。

（2）　本品 1g にジエチルエーテル 10mL を加えてよく振り混ぜた後，ろ過し，ろ液を水浴上で蒸発乾固する。残留物に 1 - クロロ - 2,4 - ジニトロベンゼン 0.01g を加え，穏やかに加熱して融解し，冷後，水酸化カリウム・エタノール試液 4mL を加えるとき，液は赤色を呈する（ニコチン酸アミド）。

（3）　本品 0.3g に水 100mL を加えて振り混ぜた後，ろ過する。ろ液は淡黄緑色で強い黄緑色の蛍光を発する。この液 5mL に亜ジチオン酸ナトリウム 0.02g を加えるとき，液の色及び蛍光は消えるが，空気中で振り混ぜるとき，徐々に再び現れる。また液の蛍光は希塩酸又は水酸化ナトリウム試液を滴加するとき，消える（リボフラビン）。

（４）　本品 0.5g に水 100mL を加えて振り混ぜた後，ろ過する。ろ液 2mL をとり，必要があれば希水酸化ナトリウム試液を加えて中性（約 pH7.0）とした後，バルビタール緩衝液 2mL，2 - プロパノール 9mL 及び新たに製した 2,6 - ジブロモ - N - クロロ - 1，4 - ベンゾキノンモノイミンのエタノール溶液（1→4000）2mL を加えるとき，液は青緑色を呈する。また試料溶液 1mL にホウ酸の飽和溶液 1mL を加えた後，同様の操作を行うとき，液は青緑色を呈しない（ピリドキシン塩酸塩）。

【 23 】　抗ヒスタミン薬 2—①

成分及び分量又は本質	日本薬局方	クロルフェニラミンマレイン酸塩	0.012g
	〃	リボフラビン	0.012g
	〃	ピリドキシン塩酸塩	0.05g
	〃	パントテン酸カルシウム	0.03g
	賦形剤　〃	リン酸水素カルシウム水和物	2.896g
	〃　〃	デンプン，乳糖水和物又はこれらの混合物	適　量
		全　　量	4.5g
製造方法	以上をとり，散剤の製法により製する。ただし，分包散剤とする。クロルフェニラミンマレイン酸塩に替えて，クロルフェニラミンマレイン酸塩散1%を用いてもよい。		
用法及び用量	1回量を次のとおりとし，1日3回，食後服用する。 大人（15才以上）1包 1.5g，11才以上15才未満　大人の 2/3，7才以上11才未満　大人の 1/2，3才以上7才未満　大人の 1/3，1才以上3才未満　大人の 1/4		
効能又は効果	湿疹・かぶれによるかゆみ，じんましん，鼻炎		
貯蔵方法及び有効期間	遮光した密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考			

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は黄色の粉末である。

確認試験　（1）　本品 1g に 0.1mol/L 塩酸試液 20mL を加えて振り混ぜた後，ろ過する。ろ液を分液漏斗に移し，クロロホルム 20mL で洗う。次に水酸化ナトリウム試液 5mL で抽出する。ヘキサン抽出液に噴霧用ドラーゲンドルフ試液 2mL を加え，振り混ぜるとき，赤だいだい色の沈澱を生じる（クロルフェニラミンマレイン酸塩）。

（2）　本品 0.3g に水 100mL を加えて振り混ぜた後，ろ過する。ろ液は淡黄緑色で強い黄緑色の蛍光を発する。この液 5mL に亜ジチオン酸ナトリウム 0.02g を加えるとき，液の色及び蛍光は消えるが，空気中で振り混ぜるとき，徐々に再び現れる。また液の蛍光は希塩酸又は水酸化ナトリウム試液を滴加するとき，消える（リボフラビン）。

（3）　本品 0.5g に水 100mL を加えて振り混ぜた後，ろ過する。ろ液 2mL をとり，必要があれば希水酸化ナトリウム試液を加えて中性（約 pH7.0）とした後，バルビタール緩衝液 2mL，2 - プロパノール 9mL 及び新たに製した 2,6 - ジブロモ - N - クロロ - 1，4 - ベンゾキノンモノイミン溶液（1→4000）2mL を加えるとき，液は青緑色を呈する。

また試料溶液 1mL を加えた後，同様の操作を行うとき，液は青緑色を呈しない（ピリドキシン塩酸塩）。

（４）　本品 1g に水 20mL を加えて振り混ぜた後，ろ過する。ろ液 5mL に水酸化ナトリウム試液 1mL を加え，水浴上で 15 分間加温し，冷後，ニンヒドリン・L - アスコルビン酸試液 1mL を加えて振り混ぜ，水浴中で加温するとき，液は青紫色を呈する（パントテン酸カルシウム）。

【 24 】　抗ヒスタミン薬 3—②

成分及び分量又は本質	局　外　規	塩酸プソイドエフェドリン	0.18g
	日本薬局方	アリメマジン酒石酸塩	0.005g
	〃	カフェイン水和物	0.15g
	〃	カンゾウ末	1.5g
	賦形剤　〃	デンプン，乳糖水和物又はこれらの混合物	適　量
		全　　量	4.2g
製造方法	以上をとり，散剤の製法により製する。ただし，分包散剤とする。 アリメマジン酒石酸塩に替えて，アリメマジン酒石酸塩散 1%を用いてもよい。塩酸プソイドエフェドリンに替えて，塩酸プソイドエフェドリン散 10%を用いてもよい。		
用法及び用量	1 回量を次のとおりとし，1 日 3 回，食後服用する。服用間隔は 4 時間以上おくこと。 大人（15 才以上）1 包 1.4g，11 才以上 15 才未満　大人の 2/3，7 才以上 11 才未満　大人の 1/2，3 才以上 7 才未満　大人の 1/3		
効能又は効果	急性鼻炎，アレルギー性鼻炎又は副鼻腔炎による次の諸症状の緩和：くしゃみ，鼻水（鼻汁過多），鼻づまり，なみだ目，のどの痛み，頭重（頭が重い）		
貯蔵方法及び有効期間	遮光した密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備　　考			

規 格 及 び 試 験 方 法

本品は定量するとき，塩酸プソイドエフェドリン（$C_{10}H_{15}NO \cdot HCl$：201.69）3.9～4.7%，アリメマジン酒石酸塩［$(C_{18}H_{22}N_2S)_2 \cdot C_4H_6O_6$：746.99］0.11～0.13%及びカフェイン水和物（$C_8H_{10}N_4O_2 \cdot H_2O$：212.21）3.2～3.9%を含む。

性　　状　本品は淡灰褐色の粉末である。

確認試験　（1）　本品 1.0g にメタノール 5mL を加えて振り混ぜた後，ろ過し，ろ液を試料溶液とする。別に塩酸プソイドエフェドリン 0.06g をメタノール 5mL に溶かし，標準溶液とする。これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液および標準溶液 10μL ずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲル（蛍光剤入り）を用いて調製した薄層板にスポットする。次に酢酸エチル・エタノール（95）・アンモニア水(28)混液（15：5：1）を展開溶媒として約 10cm 展開した後，薄層板を風乾する。これに紫外線（主波長 254nm）を照射するとき，試料溶液から得た数個のスポットのうち 1 個のスポットは，標準溶液から得たスポットと色調及び *Rf* 値が等しい。

（２）　本品 0.5g にメタノール 5mL を加えて振り混ぜた後，ろ過し，ろ液を試料溶液とする。別にアリメマジン酒石酸塩 1mg 及びカフェイン水和物 0.02g をそれぞれメタノール 5mL に溶かし，標準溶液（1）及び標準溶液（2）とし，グリチルリチン酸 5mg をメタノール 3mL に溶かして標準溶液（3）とする。これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び標準溶液 10μL ずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲル（蛍光剤入り）を用いて調製した薄層板にスポットする。次に 1 - ブタノール・水・酢酸(100)混液（7：2：1）を展開溶媒として約 10cm 展開した後，薄層板を風乾する。これに紫外線（主波長 254nm）を照射するとき，試料溶液から得た数個のスポットのうち 3 個のスポットは，標準溶液（1），標準溶液（2）及び標準溶液（3）から得たスポットと色調及び *Rf* 値が等しい。また，この薄層板に噴霧用ドラーゲンドルフ試液を均等に噴霧するとき，標準溶液（1）から得たスポット及びそれに対応する位置の試料溶液から得たスポットは黄赤色を呈する。

定 量 法　（１）　本品約 1.0g を精密に量り，薄めたメタノール（1→2）20mL を加えて 30 分間振とうし，遠心分離して上清を分取する。沈殿物についても同様に，メタノール抽出を繰り返す。全上清液中に内標準溶液 5mL を加え，薄めたメタノール（1→2）を加えて正確に 50mL とする。この液をろ過し，最初の 10mL を除いた次のろ液を試料溶液とする。別に定量用アリメマジン酒石酸塩約 0.01g を精密に量り，薄めたメタノール（1→2）に溶かし正確に 25mL とする。この液 5mL を正確に量り，内標準溶液 5mL を正確に加える。この液に定量用塩酸プソイドエフェドリン約 0.06g を精密に量って加え，更に薄めたメタノール（1→2）を加えて 50mL とし，標準溶液とする。試料溶液及び標準溶液 10μL につき，次の条件で液体クロマトグラフ法により試験を行い，内標準物質のピーク面積に対する塩酸プソイドエフェドリン及びアリメマジン酒石酸塩のピーク面積の比 Q_{Ta}，Q_{Tb}，Q_{Sa} 及び Q_{Sb} を求める。

塩酸プソイドエフェドリン（$C_{10}H_{15}NO \cdot HCl$）の量（mg）

＝定量用塩酸プソイドエフェドリンの量（mg）$\times \dfrac{Q_{Ta}}{Q_{Sa}}$

アリメマジン酒石酸塩［$(C_{18}H_{22}N_2S)_2 \cdot C_4H_6O_6$］の量（mg）

＝定量用アリメマジン酒石酸塩の量（mg）$\times \dfrac{Q_{Tb}}{Q_{Sb}} \times \dfrac{1}{5}$

内標準溶液　パラオキシ安息香酸ヘキシルのメタノール溶液（1→8000）

操作条件

検出器：紫外吸光光度計（測定波長：254nm）

カラム：内径約 4mm，長さ 15～25cm のステンレス管に 5～10μm のオクタデシルシリル化シリカゲルを充てんする。

カラム温度：40℃付近の一定温度

移動相：ドデシル硫酸ナトリウム 2g を水 1000mL に溶かす。この液 300mL にメタノール 700mL 加える。

流量：塩酸プソイドエフェドリンの保持時間が約 5 分になるように調整する。

カラムの選定：標準溶液 10μL につき，上記の条件で操作するとき，塩酸プソイドエフェドリン，パラオキシ安息香酸ヘキシル，アリメマジン酒席酸塩の順に溶出し，それぞれのピークが完全に分離するものを用いる。

（２）　本品約 0.1g を精密に量り，メタノール 30mL を加えて 10 分間振り混ぜた後，内標準溶液 5mL を正確に加えた後，更に薄めたメタノールを加えて 50mL とする。この液をろ過し，初めのろ液 10mL を除き，次のろ液を試料溶液とする。別に定量用カフェイン水和物約 0.025g を精密に量り，メタノールに溶かして正確に 25mL とする。この液 5mL を正確に量り，内標準溶液 5mL を正確に加えた後，メタノールを加えて 50mL とし，標準溶液とする。試料溶液及び標準溶液 10μL につき，次の条件で液体クロマトグラフ法により試験を行い，内標準物質のピーク面積に対するカフェイン水和物のピーク面積の比 Q_T 及び Q_S を求める。

カフェイン水和物（$C_8H_{10}N_4O_2 \cdot H_2O$）の量（mg）

＝定量用カフェイン水和物の量（mg）$\times \frac{Q_T}{Q_S} \times \frac{1}{5} \times 1.0928$

内標準溶液　サリチルアミドのメタノール溶液（1→200）

抽出条件

検出器：紫外吸光光度計（測定波長：275nm）

カラム：内径約 4mm，長さ 15～25cm のステンレス管に 5～10μm のオクタデシルシリル化シリカゲルを充てんする。

カラム温度：40℃付近の一定温度

移動相：メタノール・水混液（7：3）

流量：カフェイン水和物の保持時間が約 5 分になるように調整する。

カラムの選定：標準溶液 10μL につき，上記の条件で操作するとき，カフェイン水和物，サリチルアミドの順に溶出し，それぞれのピークが完全に分離するものを用いる。

【 25 】　抗ヒスタミン薬 4—①

成分及び分量又は本質	日本薬局方	クロルフェニラミンマレイン酸塩	0.012g
	〃	リボフラビン酪酸エステル	0.012g
	〃	ピリドキシン塩酸塩	0.05g
	賦形剤　〃	デンプン，乳糖水和物又はこれらの混合物	適　量
		全　　量	3.0g
製造方法	以上をとり，散剤の製法により製する。ただし，分包散剤とする。クロルフェニラミンマレイン酸塩に替えて，クロルフェニラミンマレイン酸塩散１％を用いてもよい。		
用法及び用量	1 回量を次のとおりとし，1 日 3 回，食後服用する。 大人（15 才以上）1 包 1.0g，11 才以上 15 才未満　大人の 2/3，7 才以上 11 才未満　大人の 1/2，3 才以上 7 才未満　大人の 1/3，1 才以上 3 才未満　大人の 1/4		
効能又は効果	湿疹・かぶれによるかゆみ，じんましん，鼻炎		
貯蔵方法及び有効期間	遮光した密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考			

規 格 及 び 試 験 方 法

本品は定量するとき，クロルフェニラミンマレイン酸（$C_{16}H_{19}ClN_2$・$C_4H_4O_4$：390.87）0.36～0.44%，リボフラビン酪酸エステル（$C_{33}H_{44}N_4O_{10}$：656.73）0.36～0.44%及びピリドキシン塩酸塩（$C_8H_{11}NO_3$・HCl：205.64）1.50～1.83%を含む。

性　　状　本品は淡黄色の粉末である。

確認試験　（１）　本品 1.0g に薄めたメタノール（7→10）5mL を加えて振り混ぜた後，ろ過し，ろ液を試料溶液とする。別にリボフラビン酪酸エステル 4mg 及びピリドキシン塩酸塩 0.016g をそれぞれ薄めたメタノール（7→10）5mL に溶かし，標準溶液（1）及び標準溶液（2）とする。これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び標準溶液 5μL ずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲル（蛍光剤入り）を用いて調製した薄層板にスポットする。次にアセトン・ヘキサン・メタノール・酢酸(100)混液（10：8：1：1）を展開溶媒として約 10cm 展開した後，薄層板を風乾する。これに紫外線（波長 254nm 及び 365nm）を照射するとき，試料溶液から得た 2 個のスポットは，標準溶液（1）及び標準溶液（2）から得たスポットと色調及び *Rf* 値が等しい。

（２）　本品 0.4g に薄めたメタノール 5mL を加えて振り混ぜた後，ろ過し，ろ液を試料溶液とする。別にクロルフェニラミンマレイン酸塩 3mg をメタノール 10mL に溶かし，標準溶液とする。これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液

及び標準溶液 5μL ずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲルを用いて調製した薄層板にスポットする。次に酢酸エチル・エタノール（95）・アンモニア水（28）混液（15：5：1）を展開溶媒として約 10cm 展開した後，薄層板を風乾する。これに噴霧用ドラーゲンドルフ試液を均等に噴霧するとき，試料溶液から得たスポットは，標準溶液から得た黄赤色のスポットと色調及び *Rf* 値が等しい。

定 量 法 （1） 本品約 0.5g を精密に量り，薄めたアセトニトリル（1→2）30mL を加えて 10 分間振り混ぜた後，内標準溶液 5mL を正確に加え，更に薄めたアセトニトリル（1→2）を加えて 50mL とする。この液をろ過し，初めのろ液 10mL を除き，次のろ液を試料溶液とする。別に定量用クロルフェニラミンマレイン酸塩約 0.02g を精密に量り，薄めたアセトニトリル（1→2）を加え，正確に 50mL とする。この液 5mL を正確に量り，内標準溶液 5mL を正確に加えた後，薄めたアセトニトリル（1→2）を加えて 50mL とし，標準溶液とする。試料溶液及び標準溶液 10μL につき，次の条件で液体クロマトグラフ法により試験を行い，内標準物質のピーク面積に対するクロルフェニラミンマレイン酸塩のピーク面積の比 Q_T 及び Q_S を求める。

クロルフェニラミンマレイン酸塩（$C_{16}H_{19}ClN_2 \cdot C_4H_4O_4$）の量（mg）

＝定量用マレイン酸クロルフェニラミンの量（mg）$\times \frac{Q_T}{Q_S} \times \frac{1}{10}$

内標準溶液　パラオキシ安息香酸イソアミルのアセトニトリル溶液（1→10000）

操作条件

検出器：紫外吸光光度計（測定波長：260nm）

カラム：内径約 4mm，長さ 15～25cm のステンレス管に 5～10μm の液体クロマトグラフ用オクタデシルシリル化シリカゲルを充てんする。

カラム温度：40℃付近の一定温度

移動相：ドデシル硫酸ナトリウム 2.0g を薄めたリン酸（1→1000）1000mL に溶かす。この液 500mL にアセトニトリル 500mL を加える。

流量：クロルフェニラミンマレイン酸塩の保持時間が約 7 分になるように調整する。

カラムの選定：標準溶液 10μL につき，上記の条件で操作するとき，クロルフェニラミンマレイン酸塩，パラオキシ安息香酸イソアミルの順に溶出し，それぞれのピークが完全に分離するものを用いる。

（2） 本品約 0.5g を精密に量り，薄めたメタノール（7→10）30mL を加えて 10 分間振り混ぜた後，内標準溶液 5mL を正確に加え，更に薄めたメタノール（7→10）を加えて 50mL とする。この液をろ過し，初めのろ液 10mL を除き，次のろ液を試料溶液とする。別に定量用リボフラビン酪酸エステル約 0.01g を精密に量り，薄めたメタノール（7→10）に溶かし，正確に 25mL とする。この液 5mL を正確に量り，内標準溶液 5mL を正確に加えた後，薄めたメタノール（7→10）を加えて 50mL とし，標準溶液とする。試料溶液及び標準溶液 10μL につき，次の条件で液体クロマトグラフ法により試験を行い，内標準物質のピーク面積に対するリボフラビン酪酸エステルのピーク面積の比 Q_T，及び Q_S を求める。

リボフラビン酪酸エステル（$C_{33}H_{44}N_4O_{10}$）の量（mg）

＝定量用リボフラビン酪酸エステルの量（mg）$\times \frac{Q_T}{Q_S} \times \frac{1}{5}$

内標準溶液　パラオキシ安息香酸ヘキシルのメタノール溶液（1→8000）

操作条件

検出器：紫外吸光光度計（測定波長：254nm）

カラム：内径約 4mm，長さ 15～25cm のステンレス管に 5～10μm のオクタデシルシリル化シリカゲルを充てんする。

カラム温度：40℃付近の一定温度

移動相：メタノール・水混液（75：25）

流量：リボフラビン酪酸エステルの保持時間が約 9 分になるように調整する。

カラムの選定：標準溶液 10μL につき，上記の条件で操作するとき，パラオキシ安息香酸ヘキシル，リボフラビン酪酸エステルの順に溶出し，それぞれのピークが完全に分離するものを用いる。

（３）　本品約 0.1g を精密に量り，薄めたアセトニトリル（1→10）30mL を加えて 10 分間振り混ぜ，内標準溶液 5mL を正確に加え，更に薄めたアセトニトリル（1→10）を加えて 50mL とする。この液をろ過し，初めのろ液 10mL を除き，次のろ液を試料溶液とする。別にピリドキシン塩酸塩標準品約 0.01g を精密に量り，薄めたアセトニトリル（1→10）に溶かし，正確に 25mL とする。この液 5mL を正確に量り，内標準溶液 5mL を正確に加えた後，薄めたアセトニトリル（1→10）を加えて 50mL とし，標準溶液とする。試料溶液及び標準溶液 10μL につき，次の条件で液体クロマトグラフ法により試験を行い，内標準物質のピーク面積に対するピリドキシン塩酸塩のピーク面積の比 Q_T 及び Q_S を求める。

ピリドキシン塩酸塩（$C_8H_{11}NO_3$・HCl）の量（mg）

＝ピリドキシン塩酸塩標準品の量（mg）$\times\frac{Q_T}{Q_S}\times\frac{1}{5}$

内標準溶液　パラオキシ安息香酸のアセトニトリル溶液（1→5000）

操作条件

検出器：紫外吸光光度計（測定波長：275nm）

カラム：内径約 4mm，長さ 15～25cm のステンレスに 5～10μm のオクタデシルシリル化シリカゲルを充てんする。

カラム温度：40℃付近の一定温度

移動相：1 - ヘプタンスルホン酸ナトリウム 1g 及びリン酸二水素カリウム 6.8g を水 1000mL に溶かし，リン酸を加えて pH2.5 に調製する。この液 900mL にアセトニトリル 100mL を加える。

流量：ピリドキシン塩酸塩の保持時間が約 6 分になるように調整する。

カラムの選定：標準溶液 10μL につき，上記の条件で操作するとき，ピリドキシン塩酸塩，パラオキシ安息香酸の順に溶出し，それぞれのピークが完全に分離するものを用いる。

【 26 】　抗ヒスタミン薬 5—②

成分及び分量又は本質	日本薬局方	*d*- クロルフェニラミンマレイン酸塩	0.006g
	〃	ロートエキス散	0.6g
	局　外　規	塩酸プソイドエフェドリン	0.18g
	別紙規格	グリチルリチン酸	0.2g
	日本薬局方	カフェイン水和物	0.15g
	賦形剤　〃	デンプン，乳糖水和物又はこれらの混合物	適　量
		全　　量	3.6g
製造方法	以上をとり，散剤の製法により製する。ただし，分包散剤とする。*d*-クロルフェニラミンマレイン酸塩に替えて，*d*-クロルフェニラミンマレイン酸塩散 1%を用いてもよい。塩酸プソイドエフェドリンに替えて，塩酸プソイドエフェドリン散 10%を用いてもよい。		
用法及び用量	1 回量を次のとおりとし，1 日 3 回，食後服用する。服用間隔は 4 時間以上おくこと。 大人（15 才以上）1 包 1.2g，11 才以上 15 才未満　大人の 2/3，7 才以上 11 才未満　大人の 1/2，3 才以上 7 才未満　大人の 1/3		
効能又は効果	急性鼻炎，アレルギー性鼻炎又は副鼻腔炎による次の諸症状の緩和：くしゃみ，鼻水（鼻汁過多），鼻づまり，なみだ目，のどの痛み，頭重（頭が重い）		
貯蔵方法及び有効期間	遮光した密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備　　考			

規 格 及 び 試 験 方 法

本品は定量するとき，*d*- クロルフェニラミンマレイン酸塩（$C_{16}H_{19}ClN_2 \cdot C_4H_4O_4$：390.87）0.15～0.18%，塩酸プソイドエフェドリン（$C_{10}H_{15}NO \cdot HCl$：201.69）4.5～5.5%，グリチルリチン酸（$C_{42}H_{62}O_{16}$：822.94）5.0～6.1%及びカフェイン水和物（$C_8H_{10}N_4O_2 \cdot H_2O$：212.21）3.8～4.6%を含む。

性　　状　本品は淡灰褐色の粉末である。

確認試験　（1）　本品 1.0g にメタノール 5mL を加えて振り混ぜた後，ろ過し，ろ液を試料溶液とする。別に *d*- クロルフェニラミンマレイン酸塩 2mg，塩酸プソイドエフェドリン 0.06g 及びカフェイン水和物 0.05g をそれぞれメタノール 5mL に溶かし，標準溶液（1），標準溶液（2）及び標準溶液（3）とする。これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び標準溶液 10μL ずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲル（蛍光剤入り）を用いて調製した薄層板にスポットする。次に酢酸エチル・エタノール

(95)・アンモニア水（28）混液（15：5：1）を展開溶媒として約 10cm 展開した後，薄層板を風乾する。これに紫外線（主波長 254nm）を照射するとき，試料溶液から得た数個のスポットのうち 3 個のスポットは，標準溶液（1），標準溶液（2）及び標準溶液（3）から得たスポットと色調及び *Rf* 値が等しい。また，この薄層板に噴霧用ドラーゲンドルフ試液を均等に噴霧するとき，標準溶液（1）から得たスポット及びそれに対応する位置の試料溶液から得たスポットは黄赤色を呈する。

（２）　本品 2.0g に水 80mL を加えて 10 分間振り混ぜた後，ろ過する。ろ液を分液漏斗に移し，アンモニア試液を加えて弱アルカリ性とし，直ちにジエチルエーテル 30mL を加えて振り混ぜる。ジエチルエーテル層を分取し，無水硫酸ナトリウム 3g を加えて振り混ぜた後，ろ過する。ろ液を蒸発乾固し，残留物をエタノール(95)5mL に溶かし，試料溶液とする。別に硫酸アトロピン 5mg をエタノール(95)3mL に溶かし，標準溶液とする。これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び標準溶液 10μL を薄層クロマトグラフ用シリカゲルを用いて調製した薄層板にスポットする。次にクロロホルム・メタノール・アセトン・アンモニア水(28)混液（73：15：10：2）を展開溶液として約 10cm 展開した後，薄層板を風乾する。これに噴霧用ドラーゲンドルフ試液を均等に噴霧するとき，試料溶液から得た 2 個のスポットのうち 1 個のスポットは，標準溶液から得た黄赤色のスポットと色調及び *Rf* 値が等しい。

（３）　本品 0.5g にメタノール 5mL を加えて振り混ぜた後，ろ過し，ろ液を試料溶液とする。別にグリチルリチン酸 6mg をメタノール 5mL に溶かし，標準溶液とする。これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び標準溶液 5μL ずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲル（蛍光剤入り）を用いて調製した薄層板にスポットする。次に l - ブタノール・水・酢酸(100)混液（7：2：1）を展開溶媒として約 10cm 展開した後，薄層板を風乾する。これに紫外線（主波長 254nm）を照射するとき，試料溶液から得た数個のスポットのうち 1 個のスポットは，標準溶液から得た暗紫色のスポットと色調及び *Rf* 値が等しい。

定 量 法　（１）　本品約 1.0g を精密に量り，薄めたメタノール（1→2）20mL を加えて 30 分間振とうし，遠心分離して上清を分取する。沈殿物についても同様に，メタノール抽出を繰り返す。全上清液中に内標準溶液 5mL を加え，薄めたメタノール（1→2）を加えて正確に 50mL とする。この液をろ過し，最初の 10mL を除いた次のろ液を試料溶液とする。別に定量用クロルフェニラミンマレイン酸塩約 0.04g を精密に量り，薄めたメタノール（1→2）を加えて 100mL とする。この液 5mL を正確に量り，内標準溶液 5mL を正確に加える。この液に定量用塩酸プソイドエフェドリン約 0.06g を精密に量って加え，薄めたメタノール（1→2）を加えて 50mL とし，標準溶液とする。試料溶液及び標準溶液 10μL につき，次の条件で液体クロマトグラフ法により試験を行い，内標準物質のピーク面積に対するクロルフェニラミンマレイン酸塩及び塩酸プソイドエフェドリンのピーク面積の比 Q_{Ta}，Q_{Tb}，Q_{Sa} 及び Q_{Sb} を求める。

クロルフェニラミンマレイン酸塩（$C_{16}H_{19}ClN_2$・$C_4H_4O_4$）の量（mg）＝定量用クロルフェニラミンマレイン酸塩の量（mg）$\times\frac{Q_{Ta}}{Q_{Sa}}\times\frac{1}{20}$

塩酸プソイドエフェドリン（$C_{10}H_{15}NO$・HCl）の量（mg）

＝定量用塩酸プソイドエフェドリンの量（mg）$\times\frac{Q_{Tb}}{Q_{Sb}}$

内標準溶液　テレフタル酸ジエチルのメタノール溶液（1→25000）

操作条件

検出器：紫外吸光光度計（測定波長：254nm）

カラム：内径約 4mm，長さ 15～25cm のステンレス管に 5～10μm のオクタデシルシリル化シリカゲルを充てんする。

カラム温度：40℃付近の一定温度

移動相：ドデシル硫酸ナトリウム 2g を水 1000mL に溶かす。この液 350mL にメタノール 650mL を加える。

流量：塩酸プソイドエフェドリンの保持時間が約 7 分になるように調整する。

カラムの選定：標準溶液 10μL につき，上記の条件で操作するとき，塩酸プソイドエフェドリン，テレフタル酸ジエチル，クロルフェニラミンマレイン酸塩の順に溶出し，それぞれのピークが完全に分離するものを用いる。

（2） 本品約 0.1g を精密に量り，薄めたメタノール（7→10）30mL を加えて振り混ぜた後，内標準溶液 5mL を正確に加え，更に薄めたメタノールを加えて正確に 50mL とする。この液をろ過し，初めのろ液 10mL を除き，次のろ液を試料溶液とする。別に定量用グリチルリチン酸約 0.01g を精密に量り，内標準溶液 5mL を正確に加えた後，薄めたメタノール（7→10）を加えて溶かし正確に 50mL とし標準溶液とする。試料溶液及び標準溶液 10μL につき，次の条件で液体クロマトグラフ法により試験を行い，内標準物質のピーク面積に対するグリチルリチン酸のピーク面積の比 Q_T 及び Q_S を求める。

グリチルリチン酸（$C_{42}H_{62}O_{16}$）の量（mg）

$$= \text{定量用グリチルリチン酸の量（mg）} \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

内標準溶液　パラオキシ安息香酸イソアミルのメタノール溶液（1→5000）

操作条件

検出器：紫外吸光光度計（測定波長：254nm）

カラム：内径約 4mm，長さ 15～25cm のステンレス管に 5～10μm の液体クロマトグラフ用オクタデシルシリル化シリカゲルを充てんする。

カラム温度：40℃付近の一定温度

移動相：メタノール・薄めた酢酸（1→100）（7：3）

流量：グリチルリチン酸の保持時間が約 8 分になるように調整する。

カラムの選定：標準溶液 10μL につき，上記の条件で操作するとき，パラオキシ安息香酸イソアミル，グリチルリチン酸の順に溶出し，それぞれのピークが完全に分離するものを用いる。

（3） 本品約 0.1g を精密に量り，薄めたメタノール（1→2）30mL を加えて 10 分間振り混ぜた後，内標準溶液 5mL を正確に加え，更に薄めたメタノール（1→2）を加えて 50mL とする。この液をろ過し，初めのろ液 10mL を除き，次のろ液を試料溶液とする。別に定量用カフェイン水和物約 0.025g を精密に量り，内標準溶液 5mL を正確に加えた後，薄めたメタノール（1→2）を加えて溶かして 50mL とし，標準溶液とする。試料溶液及び標準溶液 10μL につき，次の条件で液体クロマトグラフ法により試験を行い，内標準物質のピーク面積に対するカフェイン水和物のピーク面積の比 Q_T 及び Q_S を求める。

カフェイン水和物（$C_8H_{10}N_4O_2 \cdot H_2O$）の量（mg）

＝定量用カフェイン水和物の量（mg）$\times\frac{Q_T}{Q_S}\times 1.0928$

内標準溶液　サリチルアミドのメタノール溶液（1→100）

操作条件

検出器：紫外吸光光度計（測定波長：270nm）

カラム：内径約 4mm，長さ 15～25cm のステンレス管に 5～10μm のオクタデシルシリル化シリカゲルを充てんする。

カラム温度：40℃付近の一定温度

移動相：水・メタノール混液（7：3）

流量：カフェイン水和物の保持時間が約 4 分になるように調整する。

カラムの選定：標準溶液 10μL につき，上記の条件で操作するとき，カフェイン水和物，サリチルアミドの順に溶出し，それぞれのピークが完全に分離するものを用いる。

別紙規格

グリチルリチン酸の規格及び試験方法

本品を乾燥したものは定量するとき，グリチルリチン酸（$C_{42}H_{62}O_{16}$）96.0～102.0%を含む。

性　　状　本品は白色～微黄色の結晶性の粉末で，においはなく，特異な甘味がある。

確認試験　（１）　本品 0.5g に水酸化ナトリウム試液 5mL を加えて溶かし，1mol/L 塩酸試液 15mL を加え，10 分間穏やかに煮沸した後，冷却し，ろ過する。ろ紙上の残留物は，よく水洗し，105℃で 1 時間乾燥する。乾燥物 1mg に硫酸 3mL を加え，水浴上で 5 分間加熱し，冷後，バニリンのエタノール(95)溶液（1→100）2mL を加えるとき，液は濃赤紫色を呈する。

（２）　（１）のろ液にナフトレゾルシン 10mg 及び塩酸 5 滴を加え，1 分間穏やかに煮沸した後，5 分間放置し，直ちに冷却する。この液にベンゼン 3mL を加えて振り混ぜるとき，ベンゼン層は赤紫色を呈する。

pH　本品 1.0g にエタノール(95)50mL 及び新たに煮沸し，冷却した水 50mL を加えて溶かした液の pH は 2.5～3.5 である。

純度試験　（１）　溶状　本品 1.0g にエタノール(95)20mL を加えて溶かすとき，液は無色～微黄色澄明である。

（２）　アンモニア　本品 0.20g に熱湯 20mL を加えてよく振り混ぜた後，水酸化ナトリウム試液 5mL を加えて加熱するとき，発生するガスは，潤した赤色リトマス紙を青変しない。

（３）　重金属　本品 2.0g をとり，硫酸少量で潤し 450～500℃で強熱して灰化する。残留物に希酢酸 2mL を加え，加温して溶かした後，水を加えて 50mL とする。これを検液とし，試験を行う。比較液には鉛標準液 2.0mL を加える（10ppm 以下）。

（４）　ヒ素　本品 0.50g に硝酸 10mL 及び硫酸 5mL を加え，注意しながら加熱する。液が無色～微黄色にならないときは，冷後，時々硝酸 2～3mL ずつを追加し，液が無色～微黄色になるまで加熱する。冷後，飽和シュウ酸アンモニウム溶液 15mL を加え，白煙が

発生するまで加熱する。冷後，水を加えて 20mL とする。これを検液とし，装置Ｂを用いる方法により試験を行う（4ppm 以下）。

乾燥減量　6.0%以下（1g，105℃，1 時間）。

強熱残分　0.20%以下（1g）。

定 量 法　本品を乾燥し，その約 0.1g を精密に量り，希エタノールに溶かして 250mL とする。この液 10mL に希エタノールを加えて 100mL とする。この液につき，紫外可視吸光度測定法により試験を行い，波長 252nm 付近の吸収極大の波長における吸光度Ａを測定する。

グリチルリチン酸（$C_{42}H_{62}O_{16}$）の量（mg）$=\frac{A}{136}\times 25000$

【 27 】　欠　　番

【 28 】　鎮咳去痰薬 1—①

成分及び分量 又は本質		車前草エキス末	3.0g
	日本薬局方	ノスカピン	0.06g
	賦形剤　〃	デンプン，乳糖水和物又はこれらの混合物	適　量
		全　　量	4.5g
製造方法	以上をとり，散剤の製法により製する。ただし，分包散剤とする。		
用法及び用量	1 回量を次のとおりとし，1 日 3 回を限度とする。なるべく空腹時をさけて服用する。服用間隔は 4 時間以上おくこと。 大人（15 才以上）1 包 1.5g，11 才以上 15 才未満　大人の 2/3，8 才以上 11 才未満　大人の 1/2，5 才以上 8 才未満　大人の 1/3，3 才以上 5 才未満 大人の 1/4		
効能又は効果	せき，たん		
貯蔵方法及び有効期間	遮光した密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考			

規 格 及 び 試 験 方 法

本品は定量するとき，ノスカピン（$C_{22}H_{23}NO_7$：413.43）1.20～1.47%を含む。

性　　状　本品は灰褐色の粉末である。

確認試験　本品 1.5g にメタノール 5mL を加え，水浴上で 3 分間加温する。冷後，ろ過し，ろ液を試料溶液とする。別に車前草エキス末 1.0g をメタノール 5mL を加え，水浴上で 3 分間加温する。冷後，ろ過し，ろ液を標準溶液（1）とする。ノスカピン 20mg をメタノール 5mL に溶かし，標準溶液（2）とする。これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び標準溶液 10μL ずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲル（蛍光剤入り）を用いて調製した薄層板にスポットする。次に l - ブタノール・水・酢酸(100)混液（7：2：1）を展開溶媒として約 10cm 展開した後，薄層板を風乾する。これに紫外線（主波長 254nm）を照射するとき，試料溶液から得たスポットは，標準溶液（2）から得たスポットと色調及び *Rf* 値が等しい。また，この薄層板に塩化鉄（Ⅲ）試液を均等に噴霧するとき，試料溶液から得たスポットは，標準溶液（1）から得た暗青色のスポットと色調及び *Rf* 値が等しい。

定 量 法　本品 1.5g を精密に量り，メタノール 30mL を加えて 10 分間振り混ぜた後，内標準溶液 5mL を正確に加え，更にメタノールを加えて 50mL とする。この液をろ過し，初めのろ液 10mL を除き，次のろ液を試料溶液とする。別に定量用ノスカピン約 0.02g を精密に量り，内標準溶液 5mL を正確に加え，更にメタノールを加えて溶かし 50mL とし，標準溶液とする。試料溶液及び標準溶液 10μL につき，次の条件で液体クロマトグラ

フ法により試験を行い，内標準物質のピークの面積に対するノスカピンのピーク面積の比 Q_T 及び Q_S を求める。

ノスカピン（$C_{22}H_{23}O_7$）の量（mg）

＝定量用ノスカピンの量（mg）$\times \frac{Q_T}{Q_S}$

内標準溶液　パラオキシ安息香酸イソアミルのメタノール溶液（1→2500）

操作条件

検出器：紫外吸光光度計（測定波長：254nm）

カラム：内径約 4mm，長さ 15～25cm のステンレス管に 5～10μm のオクタデシルシリル化シリカゲルを充てんする。

カラム温度：40℃付近の一定温度

移動相：メタノール・水混液（65：35）

流量：ノスカピンの保持時間が約 7 分になるように調整する。

カラムの選定：標準溶液 10μL につき，上記の条件で操作するとき，ノスカピン，パラオキシ安息香酸イソアミルの順に溶出し，それぞれのピークが完全に分離するものを用いる。

【 29 】　鎮咳去痰薬 2—①

成分及び分量 又は本質	日本薬局方　*dl* - メチルエフェドリン塩酸塩散 10%　0.5g 局　外　規　ジプロフィリン　0.1g 日本薬局方　クロルフェニラミンマレイン酸塩　0.012g 賦形剤　〃　デンプン，乳糖水和物又はこれらの混合物　適　量 全　量　4.5g
製造方法	以上をとり，散剤の製法により製する。ただし，分包散剤とする。クロルフェニラミンマレイン酸塩に替えて，クロルフェニラミンマレイン酸塩散 1%を用いてもよい。
用法及び用量	1 回量を次のとおりとし，1 日 3 回，適宜服用する。 服用間隔は，4 時間以上おくこと。 大人（15 才以上）1 包 1.5g，11 才以上 15 才未満　大人の 2/3，8 才以上 11 才未満　大人の 1/2，5 才以上 8 才未満　大人の 1/3，3 才以上 5 才未満 大人の 1/4
効能又は効果	せき，ぜんそく，たん
貯蔵方法及び 有効期間	遮光した密閉容器
規格及び試験方法	別記のとおり。
備考	

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は白色の粉末である。

確認試験　本品 1.0g にメタノール 5mL を加えて振り混ぜた後，ろ過し，ろ液を試料溶液とする。別に *dl* - メチルエフェドリン塩酸塩散 10%0.1g をメタノール 5mL を加えて振り混ぜた後，ろ過し，ろ液を標準溶液（1）とする。ジプロフィリン 0.02g をメタノール 5mL に溶かし，標準溶液（2）とする。クロルフェニラミンマレイン酸塩 5mg をメタノール 10mL に溶かし，標準溶液（3）とする。これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び標準溶液 5μL ずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲル（蛍光剤入り）を用いて調製した薄層板にスポットする。次に酢酸エチル・エタノール（95）・アンモニア水（28）混液（15：5：1）を展開溶媒として約 10cm 展開した後，薄層板を風乾する。これに紫外線（主波長 254nm）を照射するとき，試料溶液から得た 3 個のスポットは，標準溶液（1），標準溶液（2）及び標準溶液（3）から得たスポットと色調及び *Rf* 値が等しい。また，この薄層板に噴霧用ドラーゲンドルフ試液を均等に噴霧するとき，試料溶液から得た 2 個のスポットは，標準溶液（1）及び標準溶液（3）から得た黄赤色のスポットと色調及び *Rf* 値が等しい。

【 30 】　鎮咳去痰薬 3—①

成分及び分量又は本質	日本薬局方	*dl* - メチルエフェドリン塩酸塩散 10%	0.5g
	〃	クロルフェニラミンマレイン酸塩	0.012g
	局外規	ジプロフィリン	0.1g
	日本薬局方	ノスカピン	0.06g
	〃	カンゾウ末	1.0g
	〃	キキョウ末	0.5g
	賦形剤　〃	デンプン，乳糖水和物又はこれらの混合物	適　量
		全　　量	4.5g
製造方法	以上をとり，散剤の製法により製する。ただし，分包散剤とする。クロルフェニラミンマレイン酸塩に替えて，クロルフェニラミンマレイン酸塩散 1%を用いてもよい。		
用法及び用量	1 回量を次のとおりとし，1 日 3 回，適宜服用する。 服用間隔は，4 時間以上おくこと。 大人（15 才以上）1 包 1.5g，11 才以上 15 才未満　大人の 2/3，8 才以上 11 才未満　大人の 1/2，5 才以上 8 才未満　大人の 1/3，3 才以上 5 才未満　大人の 1/4		
効能又は効果	せき，ぜんそく，たん		
貯蔵方法及び有効期間	遮光した密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考			

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は淡黄褐色の粉末である。

確認試験　（1）　本品 1.0g にメタノール 5mL を加えて振り混ぜた後，ろ過し，ろ液を試料溶液とする。別に *dl* - メチルエフェドリン塩酸塩散 10%0.1g をメタノール 5mL を加えて振り混ぜた後，ろ過し，ろ液を標準溶液（1）とする。ジプロフィリン 0.02g をメタノール 5mL に溶かし，標準溶液（2）とする。クロルフェニラミンマレイン酸塩 5mg をメタノール 10mL に溶かし，標準溶液（3）とする。ノスカピン 10mg をメタノール 4mL に溶かし，標準溶液（4）とする。これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び標準溶液 5μL ずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲル（蛍光剤入り）を用いて調製した薄層板にスポットする。次に酢酸エチル・エタノール(95)・アンモニア水(28)混液（15：5：1）を展開溶媒として約 10cm 展開した後，薄層板を風乾する。これに紫外線（主波長 254nm）を照射するとき，試料溶液から得た 4 個のスポットは，標

準溶液（1），標準溶液（2），標準溶液（3）及び標準溶液（4）から得たスポットと色調及び *Rf* 値が等しい。また，この薄層板に噴霧用ドラーゲンドルフ試液を均等に噴霧するとき，試料溶液から得た 3 個のスポットは，標準溶液（1），標準溶液（3）及び標準溶液（4）から得た黄赤色のスポットと色調及び *Rf* 値が等しい。

（２）　本品 1.0g にメタノール 5mL を加えて振り混ぜた後，ろ過し，ろ液を試料溶液とする。別にグリチルリチン酸 5mg をメタノール 2mL に溶かし，標準溶液とする。これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び標準溶液 5μL ずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲル（蛍光剤入り）を用いて調製した薄層板にスポットする。次に l - ブタノール・水・酢酸（100）混液（7：2：1）を展開溶媒として約 10cm 展開した後，薄層板を風乾する。これに紫外線（主波長 254nm）を照射するとき，試料溶液から得た数個のスポットのうち 1 個のスポットは，標準溶液から得たスポットと色調及び *Rf* 値が等しい。

（３）　本品 1.5g にメタノール 30mL を加え，水浴上で 10 分間加温し，冷後，ろ過する。ろ液を蒸発乾固し，残留物をメタノール 2mL に溶かし，試料溶液とする。別にキキョウ末 0.15g にメタノール 10mL を加え，試料溶液と同様に操作し，標準溶液とする。これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び標準溶液 10μL ずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲルを用いて調製した薄層板にスポットする。次にクロロホルム・メタノール・水混液（13：10：2）を展開溶媒として約 10cm 展開した後，薄層板を風乾する。これにバニリン・硫酸溶液*を均等に噴霧し，105℃で 10 分間加熱するとき，試料溶液から得た数個のスポットのうち 1 個のスポットは，標準溶液から得た緑褐色のスポットと色調及び *Rf* 値が等しい。

［注］*　バニリン・硫酸溶液：バニリン 0.5g にメタノール 25mL 及び希硫酸 25mL を加える。

【 31 】　鎮咳去痰薬 4—②

成分及び分量又は本質	日本薬局方	*dl* - メチルエフェドリン塩酸塩散 10%	0.75g
	〃	クロルフェニラミンマレイン酸塩	0.012g
	〃	ジヒドロコデインリン酸塩散 1%	3.0g
	〃	ノスカピン	0.06g
	〃	カンゾウ末	1.0g
	〃	キキョウ末	0.5g
	賦形剤　〃	デンプン，乳糖水和物又はこれらの混合物	適　量
		全　　量	7.5g
製造方法	以上をとり，散剤の製法により製する。ただし，分包散剤とする。ただし，分包散剤とする。クロルフェニラミンマレイン酸塩に替えて，クロルフェニラミンマレイン酸塩散 1%を用いてもよい。		
用法及び用量	1 回量を次のとおりとし，1 日 3 回，適宜服用する。 服用間隔は，4 時間以上おくこと。 大人（15 才以上）1 包 2.5g，12 才以上 15 才未満　大人の 2/3		
効能又は効果	せき，たん		
貯蔵方法及び有効期間	遮光した密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考			

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は淡黄褐色の粉末である。

確認試験　（1）　本品 1.0g にメタノール 5mL を加えて振り混ぜた後，ろ過し，ろ液を試料溶液とする。別に *dl* - メチルエフェドリン塩酸塩散 10%0.1g をメタノール 5mL を加えて振り混ぜた後，ろ過し，ろ液を標準溶液（1）とする。クロルフェニラミンマレイン酸塩 5mg をメタノール 10mL に溶かし，標準溶液（2）とする。ジヒドロコデインリン酸塩散 1%0.5g にメタノール 5mL を加えて振り混ぜた後，ろ過する。ろ液を蒸発乾固し，残留物をメタノール 1mL に溶かし，標準溶液（3）とする。ノスカピン 10mg をメタノール 5mL に溶かし，標準溶液（4）とする。これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び標準溶液 5μL ずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲル（蛍光剤入り）を用いて調製した薄層板にスポットする。次に酢酸エチル・エタノール(95)・アンモニア水(28)混液（15：5：1）を展開溶媒として約 10cm 展開した後，薄層板を風乾する。これに紫外線（主波長 254nm）を照射するとき，試料溶液から得た 4 個のスポットは，標準溶液（1），標準溶液（2），標準溶液（3）及び標準溶液（4）から得たスポットと

色調及び *Rf* 値が等しい。また，この薄層板に噴霧用ドラーゲンドルフ試液を均等に噴霧するとき，試料溶液から得た 4 個のスポットは，標準溶液（1），標準溶液（2），標準溶液（3）及び標準溶液（4）から得た黄赤色のスポットと色調及び *Rf* 値が等しい。

（２）　本品 1.3g にメタノール 5mL を加えて振り混ぜた後，ろ過し，ろ液を試料溶液とする。別にグリチルリチン酸 5mg をメタノール 2mL に溶かし標準溶液とする。これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び標準溶液 5μL ずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲル（蛍光剤入り）を用いて調製した薄層板にスポットする。次に l - ブタノール・水・酢酸(100)混液（7：2：1）を展開溶媒として約 10cm 展開した後，薄層板を風乾する。これに紫外線（主波長 254nm）を照射するとき，試料溶液から得た数個のスポットのうち 1 個のスポットは，標準溶液から得たスポットと色調及び *Rf* 値が等しい。

（３）　本品 2.0g にメタノール 30mL を加え，水浴上で 10 分間加温し，冷後，ろ過する。ろ液を蒸発乾固し，残留物をメタノール 2mL に溶かし，試料溶液とする。別にキキョウ末 0.15g にメタノール 10mL を加え，試料溶液と同様に操作し，標準溶液とする。これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び標準溶液 10μL ずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲル（蛍光剤入り）を用いて調製した薄層板にスポットする。次にクロロホルム・メタノール・水混液（13：10：2）を展開溶媒として約 10cm 展開した後，薄層板を風乾する。これにバニリン・硫酸溶液*を均等に噴霧し，105℃で 10 分間加熱するとき，試料溶液から得た数個のスポットのうち 1 個のスポットは，標準溶液から得た緑褐色のスポットと色調及び *Rf* 値が等しい。

［注］*　バニリン・硫酸溶液：バニリン 0.5g にメタノール 25mL 及び希硫酸 25mL を加える。

【 32 】　鎮咳去痰薬 5—②

成分及び分量 又は本質	日本薬局方　トリメトキノール塩酸塩水和物　0.003g 局　外　規　ジプロフィリン　0.15g 日本薬局方　グアイフェネシン　0.3g 賦形剤　〃　デンプン，乳糖水和物又はこれらの混合物　適　量 全　量　3.0g
製造方法	以上をとり，散剤の製法により製する。ただし，分包散剤とする。
用法及び用量	1 回量を次のとおりとし，1 日 3 回，4 時間以上おいて適宜服用する。 大人（15 才以上）1 包 1.0g，11 才以上 15 才未満　大人の 2/3，8 才以上 11 才未満　大人の 1/2，5 才以上 8 才未満　大人の 1/3，3 才以上 5 才未満　大人の 1/4
効能又は効果	せき，ぜんそく，たん
貯蔵方法及び 有効期間	遮光した密閉容器
規格及び試験方法	別記のとおり。
備考	

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は白色の粉末である。

確認試験　（1）　本品 1g に水 2mL を加えて振り混ぜた後，ろ過する。ろ液に希塩化鉄（Ⅲ）試液 1mL を加えるとき，液は緑色を呈し，これに薄めたアンモニア試液（1→10）4 滴を加えるとき，液は赤紫色を呈する（トリメトキノール塩酸塩水和物）。

（2）　本品 2g に水 2mL を加えて振り混ぜた後，ろ過する。ろ液にタンニン酸試液 5 滴を加えるとき，沈殿を生じ，この沈殿はタンニン酸試液 2mL を追加するとき，溶ける（ジプロフィリン）。

（3）　本品 0.2g にエタノール(95)5mL を加えて振り混ぜた後，ろ過し，ろ液を水浴上で蒸発乾固する。残留物にホルムアルデヒド液・硫酸試液 1mL を加えるとき，液は赤紫色を呈する（グアイフェネシン）。

【 33 】　鎮咳去痰薬 6—①

成分及び分量又は本質		日本薬局方	*dl* - メチルエフェドリン塩酸塩散 10%	0.5g
		〃	タンニン酸ジフェンヒドラミン	0.05g
		〃	ブロモバレリル尿素	0.6g
		〃	ジヒドロコデインリン酸塩散 1%	3.0g
	賦形剤	〃	デンプン，乳糖水和物又はこれらの混合物	適　量
			全　　量	6.0g
製造方法	以上をとり，散剤の製法により製する。ただし，分包散剤とする。			
用法及び用量	1 回量を次のとおりとし，1 日 3 回，適宜服用する。 大人（15 才以上）1 包 2.0g，12 才以上 15 才未満　大人の 2/3			
効能又は効果	せき，たん			
貯蔵方法及び有効期間	遮光した気密容器			
規格及び試験方法	別記のとおり。			
備考				

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は淡灰褐色の粉末である。

確認試験　本品 1.2g にメタノール 5mL を加えて振り混ぜた後，ろ過し，ろ液を試料溶液とする。別に *dl* - メチルエフェドリン塩酸塩散 10%0.1g をメタノール 5mL を加えて振り混ぜた後，ろ過し，ろ液を標準溶液（1）とする。タンニン酸ジフェンヒドラミン 0.01g をメタノール 5mL に溶かし，標準溶液（2）とする。ブロモバレリル尿素 0.12g をメタノール 5mL に溶かし，標準溶液（3）とする。ジヒドロコデインリン酸塩散 1%0.6g をメタノール 5mL を加えて振り混ぜた後，ろ過する。ろ液を蒸発乾固し，残留物をメタノール 1mL に溶かし，標準溶液（4）とする。これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び標準溶液 5μL ずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲル（蛍光剤入り）を用いて調製した薄層板にスポットする。次に酢酸エチル・エタノール（95）・アンモニア水（28）混液（15：5：1）を展開溶媒として約 10cm 展開した後，薄層板を風乾する。これに紫外線（主波長 254nm）を照射するとき，試料溶液から得た 4 個のスポットは，標準溶液（1），標準溶液（2），標準溶液（3）及び標準溶液（4）から得たスポットと色調及び *Rf* 値が等しい。また，この薄層板に噴霧用ドラーゲンドルフ試液を均等に噴霧するとき，試料溶液から得た 3 個のスポットは，標準溶液（1），標準溶液（2）及び標準溶液（4）から得た黄赤色のスポットと色調及び *Rf* 値が等しい。

【 34 】　鎮咳去痰薬 7—①

成分及び分量又は本質			桜皮エキスA	4.5mL
		日本薬局方	*dl* - メチルエフェドリン塩酸塩散 10%	0.5g
		〃	グアイフェネシン	0.3g
		〃	セネガシロップ	10.0mL
	防腐剤	〃	パラオキシ安息香酸エチル	0.03g
	溶　剤	〃	精製水又は精製水（容器入り）	適　量
			全　　量	60mL
製造方法	以上をとり，用時溶解混和して製する。ただし，1 回量を量り得るように画線を施した容器に収めるか，適当な計量器を添付する。 全容量は，成人の 1～2 日分とする。 本品の容器としてプラスチック製容器を使用する場合は，当該容器は，昭和 47 年 2 月 17 日薬製第 225 号通知に適合する。			
用法及び用量	1 回量を次のとおりとし，1 日 6 回服用する。 服用間隔は，4 時間以上おくこと。 大人（15 才以上）1 回 10mL，12 才以上 15 才未満　大人の 2/3			
効能又は効果	せき，たん			
貯蔵方法及び有効期間	気密容器			
規格及び試験方法	別記のとおり。			
備　　考				

規 格 及 び 試 験 方 法

本品は定量するとき，*dl* - メチルエフェドリン塩酸塩（$C_{11}H_{17}NO$・HCl：215.72）0.067～0.101%，グアイフェネシン（$C_{10}H_{14}O_4$：198.22）0.45～0.55%及びパラオキシ安息香酸エチル（$C_9H_{10}O_3$：166.18）0.045～0.055%を含む。

性　　状　本品は赤褐色の液で，甘味がある。

確認試験　（1）　本品 10mL をとり，水 10mL 及び 1mol/L 塩酸試液 2mL を加えて分液漏斗に移し，ジエチルエーテル 20mL を加え，穏やかに振り混ぜて洗う。水層に水酸化ナトリウム試液 5mL を加えてアルカリ性とし，ジエチルエーテル 20mL を加え振り混ぜて抽出する。ジエチルエーテル層に無水硫酸ナトリウム 3g を加えて，ろ過する。ろ液を蒸発乾固し，残留物をクロロホルム 1mL に溶かし試料溶液とする。別にリン酸コデイン 100 倍散 0.75g 及び *dl* - メチルエフェドリン塩酸塩散 10%0.08g をとり，それぞれ水 10mL 及び水酸化ナトリウム試液 5mL を加えてアルカリ性とした後，ジエチルエーテル

20mL を加え振り混ぜて抽出する。ジエチルエーテル層に無水硫酸ナトリウム 3g を加えて，ろ過する。ろ液を蒸発乾固し，残留物をクロロホルム 1mL に溶かし標準溶液（1）及び標準溶液（2）とする。これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び標準溶液 10μL ずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲルを用いて調製した薄層板にスポットする。次に酢酸エチル・エタノール(95)・アンモニア水(28)混液（15：5：1）を展開溶媒として約 10cm 展開した後，薄層板を風乾する。これに噴霧用ドラーゲンドルフ試液を均等に噴霧するとき，試料溶液から得た 2 個のスポットは，標準溶液（1）及び標準溶液（2）から得た黄赤色のスポットと色調及び *Rf* 値が等しい。

（２）　（１）の水層をクロロホルム 10mL で抽出し，試料溶液とする。別にグアイフェネシン 0.05g をとり，クロロホルム 10mL に溶かし標準溶液とする。これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び標準溶液 10μL ずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲル（蛍光剤入り）を用いて調製した薄層板にスポットする。次にジエチルエーテル・エタノール(95)・アンモニア水(28)混液（40：10：1）を展開溶媒として約 10cm 展開した後，薄層板を風乾する。これに紫外線（主波長 254nm）を照射するとき，試料溶液から得たスポットは，標準溶液から得たスポットと色調及び *Rf* 値が等しい。

（３）　本品 30mL をとり，分液漏斗に移し，飽和塩化ナトリウム溶液 10mL を加えた後，ジエチルエーテル 20mL を加え，穏やかに振り混ぜて洗う。水層に水飽和 l - ブタノール 20mL を加え，穏やかに振り混ぜて抽出する。水層は更に水飽和 l - ブタノール 20mL で抽出する。l - ブタノール抽出液を合わせ，水 10mL で洗い，l - ブタノール層を蒸発乾固する。残留物をメタノール 3mL に溶かし，この液をジエチルエーテル 20mL に加えて，生じた沈殿をろ過する。ろ液を蒸発乾固し，残留物をメタノール 1mL に溶かし，試料溶液とする。別にセネガ末 0.3g にメタノール 3mL を加えて振り混ぜた後，ろ過する。ろ液をジエチルエーテル 20mL に加えて，生じた沈殿をろ過する。ろ液を蒸発乾固し，残留物をメタノール 1mL に溶かし，標準溶液とする。これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び標準溶液 10μL ずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲルを用いて調製した薄層板にスポットする。次にクロロホルム・メタノール・水混液（13：10：2）を展開溶媒として約 10cm 展開した後，薄層板を風乾する。これに希硫酸を均等に噴霧した後，110℃で 10 分間加熱するとき，試料溶液から得た数個のスポットのうち 1 個のスポットは標準溶液から得た淡緑褐色のスポットと色調及び *Rf* 値が等しい。

（４）　本品そのままを試料溶液とする。別にパラオキシ安息香酸エチル 5mg をメタノール 10mL に溶かし，標準溶液とする。これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び標準溶液 5μL ずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲル（蛍光剤入り）を用いて調製した薄層板にスポットする。次に酢酸エチル・ヘキサン・酢酸(100)混液（10：10：1）を展開溶媒として約 10cm 展開した後，薄層板を風乾する。これに紫外線（主波長 254nm）を照射するとき，試料溶液から得た 1 個のスポットは標準溶液から得たスポットと色調及び *Rf* 値が等しい。

定 量 法　（１）　本品 5mL を正確に量り，内標準溶液 5mL を正確に加え，次に薄めたメタノール（1→2）を加えて 50mL とし，試料溶液とする。別に定量用グアイフェネシン約 0.025g を精密に量る。これに定量用パラオキシ安息香酸エチル約 0.025g を精密に量り，メタノールに溶かし，正確に 20mL とした液 2mL を正確に加える。これに内標準溶液 5mL を正確に加え，更に薄めたメタノール（1→2）を加えて 50mL とし，標準溶液とする。試料溶液及び標準溶液 10μL につき，次の条件で液体クロマトグラフ法により試験を行い，内標準物質のピーク面積に対するグアイフェネシン及びパラオキシ安息香酸エチルのピーク面積の比 Q_{Ta}，Q_{Tb}，Q_{Sa} 及び Q_{Sb} を求める。

グアイフェネシン（$C_{10}H_{14}O_4$）の量（mg）

＝定量用グアイフェネシンの量（mg）$\times\frac{Q_{Ta}}{Q_{Sa}}$

パラオキシ安息香酸エチル（$C_9H_{10}O_3$）の量（mg）

＝定量用パラオキシ安息香酸エチルの量（mg）$\times\frac{Q_{Tb}}{Q_{Sb}}\times\frac{1}{10}$

内標準溶液　エテンザミドのメタノール溶液（1→150）

操作条件

検出器：紫外吸光光度計（測定波長：270nm）

カラム：内径約 4mm，長さ 15～25cm のステンレス管に 5～10μm のオクタデシルシリル化シリカゲルを充てんする。

カラム温度：40℃付近の一定温度

移動相：薄めたリン酸（1→1000）・メタノール混液（6：4）

流量：グアイフェネシンの保持時間が約 5 分になるように調整する。

カラムの選定：標準溶液 10μL につき，上記の条件で操作するとき，グアイフェネシン，エテンザミド，パラオキシ安息香酸エチルの順に溶出し，それぞれのピークが完全に分離するものを用いる。

（２）　本品 20mL を正確に量り，内標準溶液 5mL を正確に加え，次に薄めたメタノール（1→2）を加えて 50mL とし試料溶液とする。別に *dl* - メチルエフェドリン塩酸塩散 10%約 0.16g を精密に量り，内標準溶液 5mL を正確に加えた後，薄めたメタノール（1→2）を加えて 50mL とする。この液をろ過し，初めのろ液 10mL を除き，次のろ液を標準溶液とする。試料溶液及び標準溶液 10μL につき，次の条件で液体クロマトグラフ法により試験を行い，内標準物質のピーク面積に対する *dl* - メチルエフェドリン塩酸塩のピーク面積の比 Q_T，及び Q_S を求める。

dl - メチルエフェドリン塩酸塩散 10%の量（mg）

＝*dl* - メチルエフェドリン塩酸塩散 10%の量（mg）$\times\frac{Q_T}{Q_S}$

内標準溶液　テレフタル酸ジエチルのメタノール溶液（1→50000）

操作条件

検出器：紫外吸光光度計（測定波長：254nm）

カラム：内径約 4mm，長さ 15～25cm のステンレス管に 5～10μm のオクタデシルシリル化シリカゲルを充てんする。

カラム温度：40℃付近の一定温度

移動相：ドデシル硫酸ナトリウム 2g を薄めたリン酸（1→1000）1000mL に溶かす。この液 400mL にメタノール 600mL を加える。

流量：メチルエフェドリン塩酸塩の保持時間が約 11 分になるように調整する。

カラムの選定：標準溶液 10μL につき，上記の条件で操作するとき，*dl* - メチルエフェドリン塩酸塩，テレフタル酸ジエチルの順に溶出し，それぞれのピークが完全に分離するものを用いる。

【 35 】　鎮咳去痰薬 8—①

成分及び分量又は本質	日本薬局方	クロルフェニラミンマレイン酸塩	0.012g
	〃	*dl* - メチルエフェドリン塩酸塩散 10%	0.75g
	〃	ジヒドロコデインリン酸塩散 1%	3.0g
	〃	グアイフェネシン	0.3g
	賦形剤　〃	デンプン，乳糖水和物又はこれらの混合物	適　量
		全　　量	6.0g
製造方法	以上をとり，散剤の製法により製する。ただし，分包散剤とする。クロルフェニラミンマレイン酸塩に替えて，クロルフェニラミンマレイン酸塩散 1%を用いてもよい。		
用法及び用量	1 回量を次のとおりとし，1 日 3 回，適宜服用する。 大人（15 才以上）1 包 2.0g，12 才以上 15 才未満　大人の 2/3		
効能又は効果	せき，たん		
貯蔵方法及び有効期間	遮光した密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考			

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は白色の粉末である。

確認試験　本品 1.0g にメタノール 5mL を加えて振り混ぜた後，ろ過し，ろ液を試料溶液とする。別にクロルフェニラミンマレイン酸塩 5mg をメタノール 10mL に溶かし，標準溶液（1）とする。*dl* - メチルエフェドリン塩酸塩散 10%0.15g をメタノール 5mL を加えて振り混ぜた後，ろ過し，ろ液を標準溶液（2）とする。ジヒドロコデインリン酸塩散 1% 0.6g をメタノール 5mL を加えて振り混ぜた後，ろ過する。ろ液を標準溶液（3）とする。グアイフェネシン 0.06g をメタノール 5mL に溶かし，標準溶液（4）とする。これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び標準溶液 5μL ずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲル（蛍光剤入り）を用いて調製した薄層板にスポットする。次に酢酸エチル・エタノール（95）・アンモニア水(28)混液（20：5：1）を展開溶媒として約 10cm 展開した後，薄層板を風乾する。これに紫外線（主波長 254nm）を照射するとき，試料溶液から得た 4 個のスポットは，標準溶液（1），標準溶液（2），標準溶液（3）及び標準溶液（4）から得たスポットと色調及び *Rf* 値が等しい。また，この薄層板に噴霧用ドラーゲンドルフ試液を均等に噴霧するとき，試料溶液から得た 3 個のスポットは，標準溶液（1），標準溶液（2）及び標準溶液（3）から得た黄赤色のスポットと色調及び *Rf* 値が等しい。

【 36 】　鎮咳去痰薬 9—①

成分及び分量又は本質	日本薬局方	クロルフェニラミンマレイン酸塩	0.012g
	〃	*dl* - メチルエフェドリン塩酸塩散 10%	0.75g
	〃	ジヒドロコデインリン酸塩散 1%	3.0g
	賦形剤　〃	デンプン，乳糖水和物又はこれらの混合物	適　量
		全　　量	6.0g
製造方法	以上をとり，散剤の製法により製する。ただし，分包散剤とする。クロルフェニラミンマレイン酸塩に替えて，クロルフェニラミンマレイン酸塩散１%を用いてもよい。		
用法及び用量	1 回量を次のとおりとし，1 日 3 回，適宜服用する。 大人（15 才以上）1 包 2.0g，12 才以上 15 才未満　大人の 2/3		
効能又は効果	せき，たん		
貯蔵方法及び有効期間	遮光した密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考			

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は白色の粉末である。

確認試験　本品 1.0g にメタノール 5mL を加えて振り混ぜた後，ろ過し，ろ液を試料溶液とする。別にクロルフェニラミンマレイン酸塩 5mg をメタノール 10mL に溶かし，標準溶液（1）とする。*dl* - メチルエフェドリン塩酸塩散 10%0.15g をメタノール 5mL を加えて振り混ぜた後，ろ過し，ろ液を標準溶液（2）とする。ジヒドロコデインリン酸塩散 1% 0.6g にメタノール 5mL を加えて振り混ぜた後，ろ過する。ろ液を標準溶液（3）とする。これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び標準溶液 5 μL ずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲル（蛍光剤入り）を用いて調製した薄層板にスポットする。次に酢酸エチル・エタノール（95）・アンモニア水(28)混液（15：5：1）を展開溶媒として約 10cm 展開した後，薄層板を風乾する。これに紫外線（主波長 254nm）を照射するとき，試料溶液から得た 3 個のスポットは，標準溶液（1），標準溶液（2）及び標準溶液（3）から得たスポットと色調及び *Rf* 値が等しい。また，この薄層板に噴霧用ドラーゲンドルフ試液を均等に噴霧するとき，試料溶液から得た 3 個のスポットは，標準溶液（1），標準溶液（2）及び標準溶液（3）から得た黄赤色のスポットと色調及び *Rf* 値が等しい。

【 37 】　鎮咳去痰薬 10—①

成分及び分量又は本質	日本薬局方		キキョウ流エキス	6.0mL
	〃		キョウニン水	3.0mL
	〃		セネガシロップ	10.0mL
	防腐剤	〃	パラオキシ安息香酸エチル	0.03g
	溶　剤	〃	精製水又は精製水（容器入り）	適　量
			全　　量	60mL
製造方法	以上をとり，用時溶解混和して製する。ただし，1 回量を量り得るように画線を施した容器に収めるか，適当な計量器を添付する。 全容量は，成人の 1～4 日分とする。 本品の容器としてプラスチック製容器を使用する場合は，当該容器は，昭和 47 年 2 月 17 日薬製第 225 号通知に適合する。			
用法及び用量	1 回量を次のとおりとし，1 日 6 回服用する。 服用間隔は，4 時間以上おくこと。 大人（15 才以上）1 回 10mL，11 才以上 15 才未満　大人の 2/3，8 才以上 11 才未満　大人の 1/2，5 才以上 8 才未満　大人の 1/3，3 才以上 5 才未満　大人の 1/4，1 才以上 3 才未満　大人の 1/5，3 カ月以上 1 才未満　大人の 1/10			
効能又は効果	せき，たん			
貯蔵方法及び有効期間	気密容器			
規格及び試験方法	別記のとおり。			
備　　考				

規 格 及 び 試 験 方 法

本品は定量するとき，パラオキシ安息香酸エチル（$C_9H_{10}O_3$：166.18）0.045～0.055%を含む。

性　　状　本品は類黄色澄明の液で，わずかに芳香があり，味はわずかに甘い。

確認試験　（1）　本品 30mL をとり，飽和塩化ナトリウム溶液 10mL を加えた後，ジエチルエーテル 20mL を加え，穏やかに振り混ぜて洗う。水層に水飽和 l - ブタノール 20mL を加え，穏やかに振り混ぜて抽出する。水層は更に水飽和 l - ブタノール 20mL で抽出する。抽出液を合わせ，水 10mL ずつで 2 回洗い，l - ブタノール層を蒸発乾固する。残留物をメタノール 1mL に溶かし，試料溶液とする。別にキキョウ流エキス 3mL に水 20mL 及び飽和塩化ナトリウム溶液 10mL を加えた後，水飽和 l - ブタノール 20mL を加え，穏やかに振り混ぜて抽出する。水層は更に水飽和 l - ブタノール 20mL で抽出し，

抽出液を合わせ，水 10mL ずつで 2 回洗い，l - ブタノール層を蒸発乾固する。残留物をそれぞれメタノール 1mL に溶かし，標準溶液とする。これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び標準溶液 10μL ずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲルを用いて調製した薄層板にスポットする。次にクロロホルム・メタノール・水混液（13：10：2）を展開溶媒として約 10cm 展開した後，薄層板を風乾する。これにバニリン・硫酸試液を均等に噴霧した後，110℃で 10 分間加熱するとき，試料溶液から得た数個のスポットのうち 1 個のスポットは標準溶液から得た緑褐色のスポットと色調及び *Rf* 値が等しい。

（２）　本品 5mL にアンモニア試液 0.5mL を加えて振り混ぜ，5 分間放置した後，ヘキサン 10mL を加えて強く振り混ぜる。これを遠心分離し，ヘキサン層 2mL をとり，2,4 - ジニトロフェニルヒドラジンのベンゼン溶液（1→5000）2mL を加え，25～30℃で 10 分間放置する。これに，エタノール（95）5mL 及び水酸化カリウムのメタノール溶液（1→10）5mL を加えるとき，液は赤色を呈する（キョウニン水）。

○2,4 - ジニトロフェニルヒドラジンのベンゼン溶液（1→5000）

2,4 - ジニトロフェニルヒドラジン 0.02g をとり，トリクロル酢酸・ベンゼン溶液（1→20）に溶かして 100mL とし，必要ならばろ過する。

（３）　（１）の試料溶液を試料溶液とする。別にセネガシロップ 5mL に水 20mL 及び飽和塩化ナトリウム溶液 10mL を加えた後，水飽和 l - ブタノール 20mL を加え，穏やかに振り混ぜて抽出する。水層は更に水飽和 l - ブタノール 20mL で抽出し，抽出液を合わせ，水 10mL ずつで 2 回洗い，l - ブタノール層を蒸発乾固する。残留物をそれぞれメタノール 1mL に溶かし，標準溶液とする。これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び標準溶液 10μL ずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲルを用いて調製した薄層板にスポットする。次にクロロホルム・メタノール・水混液（13：10：2）を展開溶媒として約 10cm 展開した後，薄層板を風乾する。これにバニリン・硫酸試液を均等に噴霧した後，110℃で 10 分間加熱するとき，試料溶液から得た数個のスポットのうち 1 個のスポットは標準溶液から得た緑褐色のスポットと色調及び *Rf* 値が等しい。

（４）　本品そのままを試料溶液とする。別にパラオキシ安息香酸エチル 5mg をメタノール 10mL に溶かし，標準溶液とする。これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び標準溶液 5μL ずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲル（蛍光剤入り）を用いて調製した薄層板にスポットする。次の酢酸エチル・ヘキサン・酢酸(100)混液（10：5：1）を展開溶媒として約 10cm 展開した後，薄層板を風乾する。これに紫外線（主波長 254nm）を照射するとき，試料溶液から得た数個のスポットのうち 1 個のスポットは標準溶液から得たスポットと色調及び *Rf* 値が等しい。

定 量 法　本品 2mL を正確に量り，内標準溶液 5mL を正確に加え，更に薄めたメタノール（1→2）を加えて 50mL とし，試料溶液とする。別に定量用パラオキシ安息香酸エチル約 0.025g を精密に量り，メタノールに溶かし，正確に 50mL とする。この液 2mL を正確に量り，内標準溶液 5mL を正確に加え，更に薄めたメタノール（1→2）を加えて 50mL とし，標準溶液とする。試料溶液及び標準溶液 10μL につき，次の条件で液体クロマトグラフ法により試験を行い，内標準物質のピーク面積に対するパラオキシ安息香酸エチルのピーク面積の比 Q_T 及び Q_S を求める。

パラオキシ安息香酸エチル（$C_9H_{10}O_3$）の量（mg）

＝定量用パラオキシ安息香酸エチルの量（mg）$\times\frac{Q_T}{Q_S}\times\frac{1}{25}$

内標準溶液　フタル酸ジエチルのメタノール溶液（1→500）

操作条件

検出器：紫外吸光光度計（測定波長：254nm）

カラム：内径約 4mm，長さ 15～25cm のステンレス管に 5～10μm のオクタデシルシリル化シリカゲルを充てんする。

カラム温度：40℃付近の一定温度

移動相：メタノール・水混液（1：1）

流量：パラオキシ安息香酸エチルの保持時間が約 6 分になるように調整する。

カラムの選定：標準溶液 10μL につき，上記の条件で操作するとき，パラオキシ安息香酸エチル，フタル酸ジエチルの順に溶出し，それぞれのピークが完全に分離するものを用いる。

【 38 】　鎮咳去痰薬 11—①

成分及び分量又は本質			桜皮エキスＢ	10.0mL
		日本薬局方	セネガシロップ	10.0mL
		〃	アンモニア・ウイキョウ精	2.0mL
	防腐剤	〃	パラオキシ安息香酸エチル	0.03g
	溶　剤	〃	精製水又は精製水（容器入り）	適　量
			全　　量	60mL
製造方法	以上をとり，用時溶解混和して製する。ただし，1 回量を量り得るように画線を施した容器に収めるか，適当な計量器を添付する。 全容量は，成人の 4 日分以内とする。 本品の容器としてプラスチック製容器を使用する場合は，当該容器は，昭和 47 年 2 月 17 日薬製第 225 号通知に適合する。			
用法及び用量	1 回量を次のとおりとし，1 日 6 回服用する。 服用間隔は，4 時間以上おくこと。 大人（15 才以上）1 回 10mL，11 才以上 15 才未満　大人の 2/3，8 才以上 11 才未満　大人の 1/2，5 才以上 8 才未満　大人の 1/3，3 才以上 5 才未満　大人の 1/4，1 才以上 3 才未満　大人の 1/5，3 カ月以上 1 才未満　大人の 1/10			
効能又は効果	せき，たん			
貯蔵方法及び有効期間	気密容器			
規格及び試験方法	別記のとおり。			
備　　考				

規 格 及 び 試 験 方 法

本品は定量するとき，パラオキシ安息香酸エチル（$C_9H_{10}O_3$：166.18）0.045～0.055%を含む。

性　　状　本品は赤褐色の液で，甘味がある。

確認試験　（1）　本品 15mL をとり，水浴上で蒸発して約 10mL とする。冷後，分液漏斗に移し，酢酸エチル 20mL を加え，振り混ぜて抽出する。酢酸エチル層に無水硫酸ナトリウム 5g を加えた後，ろ過し，ろ液を蒸発乾固する。残留物をメタノール 1mL に溶かし，試料溶液とする。別に桜皮エキスＢ2.5mL をとり，水 15mL 及び酢酸エチル 20mL を加え，振り混ぜて抽出する。以下試料溶液と同様に操作し，標準溶液とする。これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び標準溶液 5μL ずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲルを用いて調製した薄層板にスポットする。次にクロロホル

ム・メタノール・水混液（30：10：1）を展開溶媒として約 10cm 展開した後，薄層板を風乾する。これに紫外線（主波長 365nm）を照射するとき，試料溶液から得た 1 個のスポットは標準溶液から得た青色～青白色の蛍光を発するスポットと色調及び *Rf* 値が等しい。

（２）　本品 30mL をとり，水浴上で蒸発して約 20mL とする。冷後，分液漏斗に移し，飽和塩化ナトリウム溶液 10mL を加えた後，ジエチルエーテル 20mL を加え，穏やかに振り混ぜて洗う。水層に水飽和 l - ブタノール 20mL を加え，穏やかに振り混ぜて抽出する。水層は更に水飽和 l - ブタノール 20mL で抽出する。*n* - ブタノール抽出液を合わせ，水 10mL で洗い，l - ブタノール層を蒸発乾固する。残留物をメタノール 3mL に溶かし，この液をジエチルエーテル 20mL に加えて，生じた沈殿をろ過する。ろ液を蒸発乾固し，残留物をメタノール 1mL に溶かし，試料溶液とする。別にセネガ末 0.3g にメタノール 3mL を加えて振り混ぜた後，ろ過する。ろ液をジエチルエーテル 20mL に加えて，生じた沈殿をろ過する。ろ液を蒸発乾固し，残留物をメタノール 1mL に溶かし，標準溶液とする。これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び標準溶液 10 μ L ずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲルを用いて調製した薄層板にスポットする。次にクロロホルム・メタノール・水混液（13：10：2）を展開溶媒として約 10cm 展開した後，薄層板を風乾する。これに希硫酸を均等に噴霧した後，110℃で 10 分間加熱するとき，試料溶液から得た数個のスポットのうち 1 個のスポットは標準溶液から得た淡緑褐色のスポットと色調及び *Rf* 値が等しい。

（３）　本品 15mL をとり，水浴上で蒸発し約 10mL とする。冷後，分液漏斗に移し，ヘキサン 20mL を加え振り混ぜて抽出する。ヘキサン層に無水硫酸ナトリウム 5g を加えた後，ろ過し，ろ液を蒸発乾固する。残留物をヘキサン 1mL に溶かし，試料溶液とする。別にアンモニアウイキョウ精 0.5mL をとり，水 15mL を加え，試料溶液と同様に操作し，標準溶液とする。これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び標準溶液 10 μ L ずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲル（蛍光剤入り）を用いて調製した薄層板にスポットする。次にヘキサン・酢酸エチル混液（10：1）を展開溶媒として約 10cm 展開した後，薄層板を風乾する。これに紫外線（主波長 254nm）を照射するとき，試料溶液から得た数個のスポットうち 2 個のスポットは標準溶液から得たスポットと色調及び *Rf* 値が等しい。

（４）　本品そのままを試料溶液とする。別にパラオキシ安息香酸エチル 5mg をメタノール 10mL に溶かし，標準溶液とする。これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び標準溶液 5μL ずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲル（蛍光剤入り）を用いて調製した薄層板にスポットする。次に酢酸エチル・ヘキサン・酢酸(100)混液（10：5：1）を展開溶媒として約 10cm 展開した後，薄層板を風乾する。これに紫外線（主波長 254nm）を照射するとき，試料溶液から得た数個のスポットのうち 1 個のスポットは標準溶液から得たスポットと色調及び *Rf* 値が等しい。

定 量 法　本品 2mL を正確に量り，内標準溶液 5mL を正確に加え，更に薄めたメタノール（1→2）を加えて 50mL とし，試料溶液とする。別に定量用パラオキシ安息香酸エチル約 0.025g を精密に量り，メタノールに溶かし，正確に 50mL とする。この液 2mL を正確に量り，内標準溶液 5mL を正確に加え，更に薄めたメタノール（1→2）を加えて 50mL とし，標準溶液とする。試料溶液及び標準溶液 10 μ L につき，次の条件で液体クロマトグラフ法により試験を行い，内標準物質のピーク面積に対するパラオキシ安息香酸エチルのピーク面積の比 Q_T，及び Q_S を求める。

パラオキシ安息香酸エチル（$C_9H_{10}O_3$）の量（mg）

＝定量用パラオキシ安息香酸エチルの量（mg）$\times\frac{Q_T}{Q_S}\times\frac{1}{25}$

内標準溶液　フタル酸ジエチルのメタノール溶液（1→500）

操作条件

検出器：紫外吸光光度計（測定波長：254nm）

カラム：内径約 4mm，長さ 15～25cm のステンレス管に 5～10μm のオクタデシルシリル化シリカゲルを充てんする。

カラム温度：40℃付近の一定温度

移動相：メタノール・水混液（1：1）

流量：パラオキシ安息香酸エチルの保持時間が約 6 分になるように調整する。

カラムの選定：標準溶液 10μL につき，上記の条件で操作するとき，パラオキシ安息香酸エチル，フタル酸ジエチルの順に溶出し，それぞれのピークが完全に分離するものを用いる。

【 39 】　鎮咳去痰薬 12—③

成分及び分量又は本質	日本薬局方	チペピジンヒベンズ酸塩	0.075g
	〃	グアイフェネシン	0.3g
	局　外　規	塩酸プソイドエフェドリン	0.162g
	日本薬局方	安息香酸ナトリウムカフェイン	0.3g
	〃	キキョウ末	1.0g
	〃	カンゾウ末	0.75g
	賦形剤　〃	デンプン，乳糖水和物又はこれらの混合物	適　量
		全　　量	4.8g
製造方法	以上をとり，散剤の製法により製する。ただし，分包散剤とする。 チペピジンヒベンズ酸塩に替えて，チペピジンヒベンズ酸塩散 10%を用いてもよい。塩酸プソイドエフェドリンに替えて，塩酸プソイドエフェドリン散 10%を用いてもよい。		
用法及び用量	1 回量を次のとおりとし，1 日 3 回，4 時間以上の間隔をおいて適宜服用する。 大人（15 才以上）1 包 1.6g，11 才以上 15 才未満　大人の 2/3，8 才以上 11 才未満　大人の 1/2，5 才以上 8 才未満　大人の 1/3，3 才以上 5 才未満　大人の 1/4		
効能又は効果	せき，たん		
貯蔵方法及び有効期間	遮光した密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考			

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は淡灰褐色の粉末で，味は甘い。

確認試験　（1）　本品 0.5g にメタノール 5mL を加えて振り混ぜた後，ろ過し，ろ液を試料溶液とする。別にチペピジンヒベンズ酸塩 0.01g をメタノール 5mL に溶かし，標準溶液とする。これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び標準溶液 5μL ずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲル（蛍光剤入り）を用いて調製した薄層板にスポットする。次にクロロホルム・アセトン・アンモニア水（28）混液（45：5：1）を展開溶媒として約 10cm 展開した後，薄層板を風乾する。これに紫外線（主波長 254nm）を照射するとき，試料溶液から得た数個のスポットのうち 1 個のスポットは，標準溶液から得たスポットと色調及び *Rf* 値が等しい。また，この薄層板に噴霧用ドラーゲ

ンドルフ試液を均等に噴霧するとき，標準溶液から得たスポット及びそれに対応する位置の試料溶液から得たスポットは，黄赤色を呈する。

（２）　本品 0.5g にメタノール 5mL を加えて振り混ぜた後，ろ過し，ろ液を試料溶液とする。別にグアイフェネシン 0.03g，安息香酸 0.015g 及びカフェイン水和物 0.015g をそれぞれメタノール 5mL に溶かし，標準溶液（1），標準溶液（2）及び標準溶液（3）とする。これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び標準溶液 5μL ずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲル（蛍光剤入り）を用いて調製した薄層板にスポットする。次にジエチルエーテル・エタノール（99.5）・酢酸(100)混液（40：10：1）を展開溶媒として約 10cm 展開した後，薄層板を風乾する。これに紫外線（主波長 254nm）を照射するとき，試料溶液から得た 3 個のスポットは，標準溶液（1），標準溶液（2）及び標準溶液（3）から得たそれぞれのスポットと色調及び *Rf* 値が等しい。また，この薄層板に噴霧用 *p* - ジメチルアミノベンズアルデヒド試液を均等に噴霧するとき，標準溶液（1）から得たスポット及びそれに対応する位置の試料溶液から得たスポットは，淡赤紫色を呈する。

（３）　本品 1.5g にメタノール 5mL を加えて振り混ぜた後，ろ過し，ろ液を試料溶液とする。別に塩酸プソイドエフェドリン 0.05g をメタノール 5mL に溶かし，標準溶液とする。これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び標準溶液 10μL ずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲル（蛍光剤入り）を用いて調製した薄層板にスポットする。次に酢酸エチル・エタノール（95）・アンモニア水（28）混液（15：5：1）を展開溶媒として約 10cm 展開した後，薄層板を風乾する。これに紫外線（主波長 254nm）を照射するとき，試料溶液から得た数個のスポットのうち 1 個のスポットは，標準溶液から得たスポットと色調及び *Rf* 値が等しい。

（４）　本品 1.5g にメタノール 30mL を加え，水浴上で 10 分間加温し，冷後，ろ過する。ろ液を蒸発乾固し，残留物をメタノール 2mL に溶かし，試料溶液とする。別にキキョウ末 0.4g にメタノール 10mL を加え，水浴上で 10 分間加温し，冷後，ろ過する。ろ液を蒸発乾固し，残留物をメタノール 2mL に溶かし，標準溶液とする。これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び標準溶液 10μL ずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲルを用いて調製した薄層板にスポットする。次にクロロホルム・メタノール・水混液（13：10：2）を展開溶媒として約 10cm 展開した後，薄層板を風乾する。これにバニリン・硫酸溶液*を均等に噴霧し，110℃で 10 分間加熱するとき，試料溶液から得た数個のスポットのうち 1 個のスポットは，標準溶液から得た緑褐色のスポットと色調及び *Rf* 値が等しい。

［注］*バニリン・硫酸溶液：バニリン 0.5g にメタノール 25mL 及び希硫酸 25mL を加える。

（５）　本品 1g にメタノール 5mL を加えて振り混ぜた後，ろ過し，ろ液を試料溶液とする。別にグリチルリチン酸 5mg をメタノール 5mL に溶かし，標準溶液とする。これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び標準溶液 10μL ずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲル（蛍光剤入り）を用いて調製した薄層板にスポットする。次に l - ブタノール・水・酢酸（100）混液（7：2：1）を展開溶媒として約 10cm 展開した後，薄層板を風乾する。これに紫外線（主波長 254nm）を照射するとき，試料溶液から得た数個のスポットのうち 1 個のスポットは，標準溶液から得たスポットと色調及び *Rf* 値が等しい。

【 40 】　欠　　番

【 41 】　鎮咳去痰薬 14—①

成分及び分量又は本質	日本薬局方	アンモニア水	17.0mL
	〃	ウイキョウ油	3.0mL
	溶　剤　〃	エタノール	適　量
		全　　量	100mL
製造方法	以上をとり，酒精剤の製法により製する。ただし，「アンモニア水」の代わりに強アンモニア水及び「精製水又は精製水（容器入り）」適量を用いて製することができる。本品の容器としてプラスチック製容器を使用する場合は，当該容器は，昭和 47 年 2 月 17 日薬製第 225 号通知に適合する。		
用法及び用量	大人 1 日 2mL を 1 日 3 回に分服する。		
効能又は効果	せき，たん		
貯蔵方法及び有効期間	気密容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	アンモニア・ウイキョウ精		

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は微黄色～黄色澄明の液で，特異なにおいがあり，味はわずかに甘く，舌をさすようである。

比　　重　d_{20}^{20}：約 0.85

アルコール数　7.8 以上（第 2 法）

確認試験　本品 1mL をとり，水 20mL を加えた後，ヘキサン 20mL を加え，振り混ぜて抽出する。ヘキサン層に無水硫酸ナトリウム 5g を加えた後，ろ過し，ろ液を蒸発乾固する。残留物をエタノール(99.5)2mL に溶かし，試料溶液とする。別にウイキョウ油 0.1mL をエタノール(99.5)8mL に溶かし，標準溶液とする。これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び標準溶液 3μL ずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲル（蛍光剤入り）を用いて調製した薄層板にスポットする。次にヘキサン・酢酸エチル混液（10：1）を展開溶媒として約 10cm 展開した後，薄層板を風乾する。これに紫外線（主波長 254nm）を照射するとき，試料溶液及び標準溶液から得たスポットの色調及び *Rf* 値は等しい。

【 42 】　吸入剤 1

成分及び分量又は本質		日本薬局方　*d* - カンフル又は *dl* - カンフル	0.08g
		〃　炭酸水素ナトリウム	1.0g
		〃　塩化ナトリウム	0.8g
	溶　剤	〃　グリセリン	1.0mL
	〃	〃　エタノール	0.8mL
	〃	〃　精製水又は精製水（容器入り）	適　量
		全　　量	100mL
製造方法	「*d* - カンフル」又は「*dl* - カンフル」を「エタノール」に溶かした後，他の成分を溶解混和して製する。 ただし，本品の容器としてプラスチック製容器を使用する場合は，当該容器は，昭和 47 年 2 月 17 日薬製第 225 号通知に適合する。		
用法及び用量	随時吸入器を用い，適宜吸入する。		
効能又は効果	気管支炎，咽喉カタル，上気道炎症		
貯蔵方法及び有効期間	遮光した気密容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考			

規 格 及 び 試 験 方 法

本品は定量するとき，塩化ナトリウム（NaCl：58.44）0.7～0.9w/v%を含む。

性　　状　本品は無色澄明の液で，カンフルのにおいがある。

確認試験　（1）　本品をよく振り混ぜてその 100mL をとり，ジエチルエーテル 10mL ずつで 3 回抽出し，ジエチルエーテル層を合わせ水浴上で蒸発するとき，カンフルのにおいを発する（カンフル）。

（2）　本品 50mL に希塩酸を加えるとき，泡立ち，二酸化炭素を発生し，このガスを水酸化カルシウム試液に通ずるとき，直ちに白色の沈殿を生ずる（炭酸水素塩）。

（3）　本品 10mL に硝酸を加えて酸性とし，硝酸銀試液を加えるとき，白色の沈殿を生じ，これに硝酸を加えても溶けないが，過量のアンモニア試液を加えるとき，溶ける（塩化物）。

（4）　本品 10mL を水浴上で蒸発乾固し，残留物に硫酸水素カリウム 0.5g を加えて加熱するとき，アクロレインの刺激性のにおいを発する（グリセリン）。

定 量 法　本品をよく振り混ぜ正確にその 5mL を量り，水 20mL を加え，0.1mol/L 硝酸銀液 50mL，硝酸 3mL 及びニトロベンゼン 3mL を加え，よく振り混ぜた後，過量の硝酸

銀を 0.1mol/L チオシアン酸アンモニウム液で滴定する（指示薬：硫酸鉄（Ⅲ）試液 2mL）。

0.1mol/L 硝酸銀液 1mL＝5.844mg　NaCl

【 43 】　吸入剤 2

成分及び分量 又は本質	日本薬局方	炭酸水素ナトリウム	1.0g
	〃	塩化ナトリウム	0.8g
	溶　剤　〃	グリセリン	1.0mL
	〃　〃	精製水又は精製水（容器入り）	適　量
		全　　量	100mL
製造方法	以上をとり，溶解混和して製する。 ただし，プラスチック製容器を使用する場合は，当該容器は，昭和 47 年 2 月 17 日薬製第 225 号通知に適合する。		
用法及び用量	随時吸入器を用い，適宜吸入する。		
効能又は効果	気管支炎，咽喉カタル，上気道炎症		
貯蔵方法及び 有効期間	気密容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備　　考			

規 格 及 び 試 験 方 法

本品は定量するとき，塩化ナトリウム（NaCl：58.44）0.7～0.9w/v%を含む。

性　　状　本品は無色澄明の液で，わずかに塩味がある。

確認試験　（１）　本品 50mL に希塩酸を加えるとき，泡立ち，二酸化炭素を発生し，このガスを水酸化カルシウム試液に通ずるとき，直ちに沈殿を生ずる（炭酸水素塩）。

（２）　本品 10mL に硝酸を加えて酸性とし，硝酸銀試液を加えるとき，白色の沈殿を生じ，これに硝酸を加えても溶けないが，過量のアンモニア試液を加えるとき，溶ける（塩化物）。

（３）　本品 10mL を水浴上で蒸発乾固し，残留物に硫酸水素カリウム 0.5g を加えて加熱するとき，アクロレインの刺激性のにおいを発する（グリセリン）。

定 量 法　本品をよく振り混ぜ，正確にその 5mL を量り，水 20mL を加え，0.1mol/L 硝酸銀液 50mL，硝酸 3mL 及びニトロベンゼン 3mL を加え，よく振り混ぜた後，過量の硝酸銀を 0.1mol/L チオシアン酸アンモニウム液で滴定する（指示薬：硫酸鉄（Ⅲ）試液 2mL）。

0.1mol/L 硝酸銀液 1mL＝5.844mg　NaCl

【 44 】　欠　　番

【 45 】　歯科口腔用薬 2

成分及び分量 又は本質	日本薬局方	硫酸アルミニウムカリウム水和物	0.3g
	矯味剤　〃	ハッカ水	5.0mL
	溶剤　〃	常水又は精製水又は精製水（容器入り）	適量
		全量	100mL
製造方法	以上をとり，溶解混和して製する。		
用法及び用量	本品適量をとり，含嗽する。		
効能又は効果	口腔内の洗浄 口腔・咽頭のはれ		
貯蔵方法及び有効期間	気密容器		
規格及び試験方法	日本薬局方による。		
備考	ミョウバン水		

【 46 】　歯科口腔用薬 3—①

成分及び分量又は本質	日本薬局方	ヨ　ウ　素	1.2g
	〃	液状フェノール	0.5mL
	湿　潤　剤　〃	グリセリン	90.0mL
	矯　味　剤　〃	ハッカ水	4.5mL
	溶解補助剤　〃	ヨウ化カリウム	2.4g
	溶　　剤　〃	精製水又は精製水（容器入り）	適　量
		全　　量	100mL
製造方法	「ヨウ化カリウム」及び「ヨウ素」を「精製水又は精製水（容器入り）」約 2.5mL に溶かし，これに「グリセリン」を加えた後，「ハッカ水」，「液状フェノール」及び「精製水又は精製水（容器入り）」を加えて全量を 100mL とし，混和して製する。ただし，「グリセリン」の代わりに「濃グリセリン」及び「精製水又は精製水（容器入り）」適量を用いて製することができる。		
用法及び用量	適宜，適量を患部に塗布又は噴霧する。		
効能又は効果	のどの殺菌・消毒		
貯蔵方法及び有効期間	遮光した気密容器		
規格及び試験方法	日本薬局方による。		
備考	複方ヨード・グリセリン		

【 47 】　歯科口腔用薬 4

成分及び分量 又は本質	日本薬局方	プロテイン銀	3.0g
	湿潤剤　〃	グリセリン	10.0mL
	矯味剤　〃	ハッカ水	適　量
		全　　量	100mL
製造方法	以上をとり，溶解混和して製する。		
用法及び用量	綿棒などを用いて，適宜患部に適用する。		
効能又は効果	咽頭炎，鼻炎		
貯蔵方法及び有効期間	遮光した気密容器		
規格及び試験方法	日本薬局方による。		
備考	プロテイン銀液		

【 48 】　歯科口腔用薬 5

成分及び分量 又は本質		日本薬局方	ジブカイン塩酸塩	0.2g
		別紙規格	ホモスルファミン	0.5g
		日本薬局方	アミノ安息香酸エチル	1.0g
	分散剤	〃	トラガント末	0.7g
	溶剤	〃	精製水又は精製水（容器入り）	適量
			全量	100mL
製造方法	「トラガント末」に「精製水又は精製水（容器入り）」30mL を加えて溶かし，これをあらかじめ「ジブカイン塩酸塩」,「ホモスルファミン」及び「アミノ安息香酸エチル」を混合研和したものに少量ずつ加えて研和し，更に「精製水又は精製水（容器入り）」を加えて全量を 100mL とし，振り混ぜて製する。			
用法及び用量	本品少量を綿棒に浸して患部に塗布する。			
効能又は効果	歯　痛			
貯蔵方法及び有効期間	気密容器			
規格及び試験方法	別記のとおり。			
備考				

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は白色の懸濁液である。

本品は放置するとき，成分の一部を分離する。

確認試験　（1）　本品 1mL をとり，水 50mL を加えて振り混ぜた後，ろ過する。ろ液 5mL をとり，水酸化ナトリウム試液 5mL 及び 1，2 - ナフトキノン - 4-スルホン酸カリウム試液 0.5mL を加えるとき，液は黄赤色を呈し，10 分間放置した後，塩化アンモニウム 0.2g を加えるとき，青緑色に変わる（ホモスルファミン）。

（2）　本品 1mL をとり，希塩酸 1mL 及び水 5mL を加えた液は，芳香族第一アミンの定性反応を呈する（アミノ安息香酸エチル）。

（3）　本品 1mL をとり，pH4.6 のフタル酸水素カリウム緩衝液 5mL 及びブロモフェノールブルー試液 0.2mL を加え，更にクロロホルム 5mL を加えて振り混ぜた後，放置するとき，クロロホルム層は黄色を呈する（ジブカイン塩酸塩）。

（4）　本品 1mL をとり，これを試料溶液とする。別にジブカイン塩酸塩，ホモスルファミン及びアミノ安息香酸エチル 0.05g をとり，それぞれにメタノール 25mL，10mL，5mL を加えて溶かし，標準溶液（1），標準溶液（2）及び標準溶液（3）とする。これらの液につき，薄層クロマトグラフ法によって試験を行う。試料溶液及び標準溶液 5μL ずつ

を，薄層クロマトグラフ用シリカゲル（蛍光剤入り）を用いて調製した薄層板にスポットする。次に酢酸エチル・ジエチルエーテル混液（4：1）を展開溶媒として約 10cm 展開した後，薄層板を風乾する。これに紫外線（主波長 254nm）を照射するとき，試料溶液から得た 3 個のスポットは，標準溶液（1），標準溶液（2）及び標準溶液（3）から得たスポットと *Rf* 値が等しい。

別紙規格　　ホモスルファミンの規格及び試験方法

本品を乾燥したものは定量するとき，ホモスルファミン（$C_7H_{10}N_2O_2S.HCl$：222.69）99.0%以上を含む。

性　　状　本品は無色又は白色の結晶あるいは白色の結晶性の粉末で，においはなく，味は苦い。

本品は水に溶けやすく，エタノール（95）にやや溶けにくい。

本品の水溶液（1→20）の pH は約 5 である。

融点：約 260℃

確認試験　（１）　本品の水溶液（1→1000）5mL に水酸化ナトリウム試液 5mL 及び 1，2 - ナフトキノン-4-スルホン酸カリウム試液 0.5mL を加えるとき，液は黄赤色を呈し，10 分間放置した後，塩化アンモニウム 0.2g を加えるとき，青緑色に変わる。

（２）　本品 0.2g に水 1mL を加えて溶かし，アンモニア試液 0.5mL を加えるとき，無色の結晶を析出する。結晶をろ取し，少量の水で洗い，デシケーター（減圧，シリカゲル）で 3 時間乾燥するとき，その融点は 152～155℃である。

（３）　本品の水溶液（1→10）5mL に硝酸 1 滴及び硝酸銀試液 3 滴を加えるとき，白色の沈殿を生じる。

純度試験　（１）　溶状　本品 1.0g に水 10mL を加えて溶かすとき，液は無色澄明である。

（２）　酸　（１）の液 5mL に水 15mL 及びメチルオレンジ試液 1 滴を加えるとき，液の色は黄色である。

（３）　アンモニウム　本品 0.5g に水 10mL を加えて溶かし，水酸化ナトリウム試液 5mL を加え，水浴中で 5 分間加熱するとき，発生するガスは潤した赤色リトマス紙を青変しない。

（４）　重金属　本品 1.5g をとり，第 1 法により操作し，試験を行う。比較液には鉛標準液 3.0mL を加える（20ppm 以下）。

乾燥減量　3.5～5.5%（1g，110℃，4 時間）。

強熱残分　0.10%以下（1g）。

定 量 法　本品を乾燥し，その約 0.3g を精密に量り，非水滴定用酢酸(100)50mL 及び非水滴定用酢酸水銀（Ⅱ）試液 10mL を加え，加熱して溶かし，冷後，0.1mol/L 過塩素酸で滴定する（指示薬：クリスタルバイオレット試液 2 滴）。同様の方法で空試験を行い補正する。

0.1mol/L 過塩素酸 1mL＝22.269mg　$C_7H_{10}N_2O_2S.HCl$

【 49 】　胃腸薬 1—①

成分及び分量又は本質	日本薬局方	ロートエキス	0.8g
	〃	ジアスターゼ	20.0g
	〃	沈降炭酸カルシウム	30.0g
	〃	炭酸水素ナトリウム	25.0g
	〃	酸化マグネシウム	10.0g
	〃	ゲンチアナ末	5.0g
	賦形剤　〃	デンプン，乳糖水和物又はこれらの混合物	適　量
		全　　量	100g
製造方法	以上をとり，散剤の製法により用時製し，分包散剤とする。ただし，「ロートエキス」の代わりに「ロートエキス散」を用いて製することができる。		
用法及び用量	1 回量を次のとおりとし，1 日 3 回を限度とし，服用する。服用間隔は 4 時間以上おくこと。 大人（15 才以上）1 包 2.0g，11 才以上 15 才未満　大人の 2/3，8 才以上 11 才未満　大人の 1/2，5 才以上 8 才未満　大人の 1/3		
効能又は効果	胃酸過多，胸やけ，胃部不快感，胃部膨満感，もたれ，胃重，胸つかえ，げっぷ，はきけ（むかつき，胃のむかつき，二日酔・悪酔のむかつき，嘔気，悪心），嘔吐，飲み過ぎ，胃痛		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	複方ロートエキス・ジアスターゼ散		

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は淡黄色の粉末で，味は苦い。

確認試験　（1）　本品 4g に水 30mL を加え，静かに振り混ぜ，ろ過して得た液はナトリウム塩の定性反応（2）及び炭酸水素塩の定性反応（2）を呈する。

（2）　（1）の水不溶の残留物に希塩酸 20mL を加えて振り混ぜ，ろ過して得た液 5mL はマグネシウム塩の定性反応を呈する。

（3）　（2）の残りのろ液を煮沸し，冷後，水酸化ナトリウム試液を加えて中和した液はカルシウム塩の定性反応を呈する。

（4）　本品 12g に水 50mL を加え，次に薄めた塩酸（1→2）60mL を注意しながら徐々に加え，10 分間振り混ぜた後，ガラスろ過器（G3）を用いて吸引ろ過する。ろ液にアン

モニア試液 30mL を加えて弱アルカリ性とした後，ジエチルエーテル 40mL ずつで 2 回抽出し，ジエチルエーテル層は水 20mL ずつで 2 回洗う。ジエチルエーテル層を分取し，無水硫酸ナトリウム 3g を加えて振り混ぜ，脱脂綿を用いてろ過する。ろ液を蒸発乾固し，残留物をエタノール(95)0.2mL に溶かし，試料溶液とする。別に薄層クロマトグラフ用硫酸アトロピン 0.01g 及び臭化水素酸スコポラミン 5mg をそれぞれエタノール(95)10mL に溶かし，標準溶液（1）及び標準溶液（2）とする。これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び標準溶液 20μL ずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲルを用いて調製した薄層板にスポットする。次にクロロホルム・メタノール・アセトン・アンモニア水（28）混液（73：15：10：2）を展開溶媒として約 10cm 展開した後，薄層板を 80℃で 10 分間乾燥する。冷後，これに噴霧用ドラーゲンドルフ試液を均等に噴霧するとき，試料溶液から得た 2 個の主スポットは，標準溶液から得たそれぞれの黄赤色のスポットと色調及び *Rf* 値が等しい。

（５）　本品 6g にジエチルエーテル 20mL を加え，10 分間振り混ぜた後，吸引ろ過する。残留物をジエチルエーテル 10mL で洗って吸引ろ過した後，残留物にメタノール 10mL を加え，20 分間振り混ぜて，ろ過し，ろ液を試料溶液とする。別にゲンチアナ末 0.3g をとり，試料溶液と同様に操作し，標準溶液とする。これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び標準溶液 10μL を薄層クロマトグラフ用シリカゲル（蛍光剤入り）を用いて調製した薄層板にスポットする。次にクロロホルム・メタノール・水混液（30：10：1）を展開溶媒として約 10cm 展開した後，薄層板を風乾する。これに紫外線（主波長 254nm）を照射するとき，試料溶液から得たスポットは，標準溶液から得た *Rf* 値 0.3～0.5 の暗紫色のスポットと色調及び *Rf* 値が等しい。

【 50 】　胃腸薬 2—②

成分及び分量又は本質		局　外　規	メチルオクタトロピン臭化物	0.03g
		日本薬局方	アミノ安息香酸エチル	0.6g
		〃	炭酸水素ナトリウム	3.0g
		〃	酸化マグネシウム	0.5g
		〃	エンゴサク，細末	1.0g
		〃	コウボク末	1.5g
	賦形剤	〃	デンプン，乳糖水和物又はこれらの混合物	適　量
			全　　量	7.5g
製造方法	以上をとり，散剤の製法により製する。ただし，分包散剤とする。			
用法及び用量	1 回量を次のとおりとし，1 日 3 回，食前又は食間に服用する。服用間隔は 4 時間以上おくこと。 大人（15 才以上）1 包 2.5g，11 才以上 15 才未満　大人の 2/3，8 才以上 11 才未満　大人の 1/2，6 才以上 8 才未満　大人の 1/3			
効能又は効果	胃痛，腹痛，さしこみ（疝痛，癪），胃酸過多，胸やけ			
貯蔵方法及び有効期間	気密容器			
規格及び試験方法	別記のとおり。			
備　　考				

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は黄褐色の粉末で，味はわずかに苦く，わずかに舌を麻ひする。

確認試験　（1）　本品 2g にメタノール 30mL を加え，水浴上で 5 分間加温し，冷後，ろ過する。ろ液を蒸発乾固し，残留物をメタノール 1mL に溶かし，試料溶液とする。別にメチルオクタトロピン臭化物 8mg をメタノール 1mL に溶かし，標準溶液（1）とする。エンゴサク，細末，0.25g 及びコウボク末 0.4g にそれぞれメタノール 20mL を加えて振り混ぜた後，ろ過する。ろ液を蒸発乾固し，残留物をメタノール 1mL ずつに溶かし，標準溶液（2）及び標準溶液（3）とする。これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び標準溶液 5μL ずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲル（蛍光剤入り）を用いて調製した薄層板にスポットする。次に 3-メチル-1-ブタノール・水・酢酸（100）混液（3：3：2）を展開溶媒として約 10cm 展開した後，薄層板を 80℃で 10 分間乾燥する。これに噴霧用ドラーゲンドルフ試液を均等に噴霧するとき，試料溶液から得た数個のスポットのうち 3 個のスポットは，標準溶液（1），標準溶液（2）及び標準溶液（3）から得たそれぞれの黄赤色のスポットと色調及び *Rf* 値が等しい。

（２）　本品 0.15g にジエチルエーテル 10mL を加えて振り混ぜた後，ろ過する。ろ液を蒸発乾固し，残留物をエタノール(95)10mL に溶かし，試料溶液とする。別にアミノ安息香酸エチル 0.01g をエタノール(95)10mL に溶かし，標準溶液とする。これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び標準溶液 2μL ずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲル（蛍光剤入り）を用いて調製した薄層板にスポットする。次に 2-プロパノール・酢酸(100)混液（9：1）を展開溶媒として約 10cm 展開した後，薄層板を風乾する。これに紫外線（主波長 254nm）を照射するとき，試料溶液から得たスポットは，標準溶液から得たスポットと色調及び *Rf* 値が等しい。

（３）　本品 3g に水 30mL を加え，静かに振り混ぜた後，ろ過する。ろ液はナトリウム塩の定性反応及び炭酸水素塩の定性反応（1），（2）を呈する（炭酸水素ナトリウム）。

（４）　（３）の水に不溶の残留物に希塩酸 10mL を加え，振り混ぜた後，ろ過する。ろ液はマグネシウム塩の定性反応を呈する（酸化マグネシウム）。

【 51 】　胃腸薬 3—②

成分及び分量又は本質	日本薬局方	メチルベナクチジウム臭化物	0.03g
	〃	酸化マグネシウム	0.3g
	局　外　規	メタケイ酸アルミン酸マグネシウム	3.0g
	日本薬局方	コウボク末	1.0g
	〃	シャクヤク末	1.0g
	〃	エンゴサク，細末	1.0g
	賦形剤　〃	デンプン，乳糖水和物又はこれらの混合物	適　量
		全　　量	7.5g
製造方法	以上をとり，散剤の製法により製する。ただし，分包散剤とする。 メチルベナクチジウム臭化物に替えて，メチルベナクチジウム臭化物散 10%を用いてもよい。		
用法及び用量	1 回量を次のとおりとし，1 日 3 回，食前又は食間に服用する。服用間隔は 4 時間以上おくこと。 大人（15 才以上）1 包 2.5g，11 才以上 15 才未満　大人の 2/3，8 才以上 11 才未満　大人の 1/2，5 才以上 8 才未満　大人の 1/3		
効能又は効果	胃痛，腹痛，さしこみ（疝痛，癪），胃酸過多，胸やけ		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備　　考			

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は淡黄褐色の粉末で，味はわずかに苦い。

確認試験　（1）　本品 1g にメタノール 5mL を加えて振り混ぜた後，ろ過し，ろ液を試料溶液とする。別にメチルベナクチジウム臭化物 3mg をメタノール 2mL に溶かし，標準溶液とする。これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び標準溶液 5μL ずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲルを用いて調製した薄層板にスポットする。次にエタノール(95)・酢酸(100)・水混液（5：3：2）を展開溶媒として約 10cm 展開した後，薄層板を 80℃で 10 分間乾燥する。これに噴霧用ドラーゲンドルフ試液を均等に噴霧するとき，試料溶液から得たスポットは，標準溶液から得た黄赤色のスポットと色調及び *Rf* 値が等しい。

（2）　本品 2.5g に薄めた硫酸（1→3）5mL を加え，白煙が発生するまで加熱し，冷後，水 20mL を加えてろ過する。ろ液にアンモニア試液を加えて中性とし，生じた沈殿を

ろ過する。ろ液はマグネシウム塩の定性反応（2）を呈する。残留物に希塩酸を加えて溶かした液はアルミニウム塩の定性反応を呈する（メタケイ酸アルミン酸マグネシウム）。

（３）　本品 2g にメタノール 30mL を加え，水浴上で 5 分間加温し，冷後，ろ過する。ろ液を蒸発乾固し，残留物をメタノール 1mL に溶かし，試料溶液とする。別にシャクヤク末 0.25g にメタノール 20mL を加え，水浴上で 5 分間加温し，冷後，ろ過する。ろ液を蒸発乾固し，残留物をメタノール 1mL に溶かし，標準溶液とする。これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び標準溶液 5μL ずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲルを用いて調製した薄層板にスポットする。次にクロロホルム・メタノール・水混液（26：14：5）の下層を展開溶媒として約 10cm 展開した後，薄層板を風乾する。これに 4-メトキシベンズアルデヒド・硫酸試液を均等に噴霧し，105℃で 5 分間加熱するとき，試料溶液から得た数個のスポットのうち 1 個のスポットは，標準溶液から得た赤紫色のスポットと色調及び *Rf* 値が等しい。

（４）　（３）の試料溶液を試料溶液とする。別にコウボク末及びエンゴサク，細末 0.25g ずつに，それぞれメタノール 20mL を加えて振り混ぜた後，ろ過する。ろ液を蒸発乾固し，残留物をメタノール 1mL ずつに溶かし，標準溶液（1）及び標準溶液（2）とする。これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び標準溶液 5μL ずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲルを用いて調製した薄層板にスポットする。次に 3-メチル-1-ブタノール・水・酢酸（100）混液（3：3：2）の上層を展開溶媒として約 10cm 展開した後，薄層板を 80℃で 10 分間乾燥する。これに噴霧用ドラーゲンドルフ試液を均等に噴霧するとき，試料溶液から得た数個のスポットのうち 2 個のスポットは，標準溶液（1）及び標準溶液（2）から得たそれぞれの黄赤色のスポットと色調及び *Rf* 値が等しい。

【 52 】　胃腸薬 4—②

成分及び分量又は本質	局　外　規	臭化メチルアトロピン	0.002g
	日本薬局方	酸化マグネシウム	0.2g
	〃	パパベリン塩酸塩	0.02g
	〃	アミノ安息香酸エチル	0.2g
	賦形剤　〃	デンプン，乳糖水和物又はこれらの混合物	適　量
		全　　量	1.0g
製造方法	以上をとり，散剤の製法により製する。ただし，分包散剤とする。		
用法及び用量	1 回量を次のとおりとし，1 日 3 回を限度とし，必要時に服用する。 服用間隔は 4 時間以上おくこと。 大人（15 才以上）1 包 1.0g，11 才以上 15 才未満　大人の 2/3，8 才以上 11 才未満　大人の 1/2，6 才以上 8 才未満　大人の 1/3		
効能又は効果	胃痛，腹痛，さしこみ（疝痛，癪）		
貯蔵方法及び有効期間	遮光した気密容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考			

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は白色の粉末で，味はわずかに苦く，舌を麻ひする。

確認試験　（1）　本品 1.5g にメタノール 30mL を加えて振り混ぜた後，ろ過する。ろ液を蒸発乾固し，残留物を薄めたメタノール（7→10）1mL に溶かし，試料溶液とする。別に臭化メチルアトロピン 3mg 及びパパベリン塩酸塩 0.03g をそれぞれ薄めたメタノール（7→10）1mL に溶かし，標準溶液（1）及び標準溶液（2）とする。これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び標準溶液 5μL ずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲル（蛍光剤入り）を用いて調製した薄層板にスポットする。次にエタノール(95)・酢酸(100)・水混液（6：3：1）を展開溶媒として約 10cm 展開した後，薄層板を 80℃で 10 分間乾燥する。これに噴霧用ドラーゲンドルフ試液を均等に噴霧するとき，試料溶液から得た 2 個のスポットは，標準溶液（1）及び標準溶液（2）から得たそれぞれの黄赤色のスポットと色調及び *Rf* 値が等しい。

（2）　本品 0.05g にエタノール(95)10mL を加えて振り混ぜた後，ろ過し，ろ液を試料溶液とする。別にアミノ安息香酸エチル 0.01g をエタノール(95)10mL に溶かし，標準溶液とする。これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び標準溶液 2μL ずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲル（蛍光剤入り）を用いて調製した薄層板にスポットする。次に 2-プロパノール・酢酸（100）混液（9：1）を展開溶媒として約

10cm 展開した後，薄層板を風乾する。これに紫外線（主波長 254nm）を照射するとき，試料溶液から得たスポットは，標準溶液から得たスポットと色調及び *Rf* 値が等しい。

（３）　本品 1g に希塩酸 10mL を加えて振り混ぜた後，ろ過する。ろ液はマグネシウム塩の定性反応を呈する（酸化マグネシウム）。

【 53 】　胃腸薬 5—①

成分及び分量 又は本質	日本薬局方　乾燥酵母　3.0g 〃　ジアスターゼ　0.6g 〃　パンクレアチン　0.6g 〃　ゲンチアナ末　0.3g 全　量　4.5g
製造方法	以上をとり，散剤の製法により用時製する。ただし，分包散剤とする。
用法及び用量	1 回量を次のとおりとし，1 日 3 回，食後服用する。 大人（15 才以上）1 包 1.5g，11 才以上 15 才未満　大人の 2/3，8 才以上 11 才未満　大人の 1/2，5 才以上 8 才未満　大人の 1/3
効能又は効果	食欲不振，消化不良，消化促進，食べ過ぎ，胃もたれ，胸つかえ，消化不良による胃部・腹部膨満感
貯蔵方法及び 有効期間	密閉容器
規格及び試験方法	別記のとおり。
備考	

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は淡黄褐色の粉末である。

確認試験　本品 4.5g をとり，クロロホルム 20mL，アンモニア水（28）1mL を加えてよく振り混ぜた後，ろ過する。ろ液に無水硫酸ナトリウム 2g を加え振り混ぜてろ過し，ろ液中のクロロホルムを水浴上で留去し，残留物に水 2mL を加え，加温して溶かし，冷後，ヨウ素ヨウ化カリウム溶液 5 滴を加えるとき，褐色の沈殿を生ずる（ゲンチアナ）。

○ヨウ素ヨウ化カリウム溶液：ヨウ素 0.5g 及びヨウ化カリウム 1.5g を水 25mL に溶かす。

【 54 】　胃腸薬 6—②

成分及び分量 又は本質	局　外　規	メチルオクタトロピン臭化物	0.01g
	日本薬局方	シャクヤク末	0.5g
	〃	カンゾウ末	0.5g
	賦形剤　〃	デンプン，乳糖水和物又はこれらの混合物	適　量
		全　　量	1.5g
製造方法	以上をとり，散剤の製法により製する。ただし，分包散剤とする。		
用法及び用量	1 回量を次のとおりとし，1 日 3 回を限度とし，必要時に服用する。 服用間隔は 4 時間以上おくこと。 大人（15 才以上）1 包 1.5g，11 才以上 15 才未満　大人の 2/3，8 才以上 11 才未満　大人の 1/2，5 才以上 8 才未満　大人の 1/3		
効能又は効果	胃痛，腹痛，さしこみ（疝痛，癪）		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備　　考			

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は淡黄褐色の粉末で，味は甘い。

確認試験　（１）　本品 1.5g にメタノール 30mL を加え，水浴上で 5 分間加温し，冷後，ろ過する。ろ液を蒸発乾固し，残留物をメタノール 2mL に溶かし，試料溶液とする。別にメチルオクタトロピン臭化物 0.01g をメタノール 2mL に溶かし，標準溶液とする。これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び標準溶液 5μL ずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲルを用いて調製した薄層板にスポットする。次に 3-メチル-1-ブタノール・水・酢酸(100)混液（3：3：2）の上層を展開溶媒として約 10cm 展開した後，薄層板を 80℃で 10 分間乾燥する。これに噴霧用ドラーゲンドルフ試液を均等に噴霧するとき，試料溶液から得たスポットは，標準溶液から得た黄赤色のスポットと色調及び *Rf* 値が等しい。

（２）　（１）の試料溶液を試料溶液とする。別にシャクヤク末 0.5g にメタノール 20mL を加え，水浴上で 5 分間加温し，冷後，ろ過する。ろ液を蒸発乾固し，残留物をメタノール 2mL に溶かし，標準溶液とする。これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び標準溶液 5μL ずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲルを用いて調製した薄層板にスポットする。次にクロロホルム・メタノール・水混液（26：14：5）の下層を展開溶媒として約 10cm 展開した後，薄層板を風乾する。これに 4-メトキシベンズアルデヒド・硫酸試液を均等に噴霧し，105℃で 5 分間加熱するとき，試料溶液から得た

数個のスポットのうち 1 個のスポットは，標準溶液から得た赤紫色のスポットと色調及び *Rf* 値が等しい。

（３）　（１）の試料溶液を試料溶液とする。別にグリチルリチン酸 5mg をメタノール 2mL に溶かし，標準溶液とする。これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び標準溶液 5μL ずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲル（蛍光剤入り）を用いて調製した薄層板にスポットする。次に l - ブタノール・水・酢酸（100）混液（7：2：1）を展開溶媒として約 10cm 展開した後，薄層板を風乾する。これに紫外線（主波長 254nm）を照射するとき，試料溶液から得た数個のスポットのうち 1 個のスポットは，標準溶液から得たスポットと色調及び *Rf* 値が等しい。

【 55 】　胃腸薬 7—①

成分及び分量 又は本質	日本薬局方　センブリ末　3.0g 〃　炭酸水素ナトリウム　70.0g 賦形剤　〃　デンプン，乳糖水和物又はこれらの混合物　適　量 全　量　100g
製造方法	以上をとり，散剤の製法により製する。なお，分包散剤とする場合もある。 ただし，分包散剤としない場合は，1回量を量り得る適当な計量器を添付するものとする。
用法及び用量	1回量を次のとおりとし，1日3回，食前服用する。 大人（15才以上）1包 0.5g，11才以上15才未満　大人の 2/3，8才以上11才未満　大人の 1/2，5才以上8才未満　大人の 1/3
効能又は効果	食欲不振，胃部・腹部膨満感，消化不良，胃弱，食べ過ぎ，飲み過ぎ，胸やけ，もたれ，胸つかえ，はきけ（むかつき，胃のむかつき，二日酔・悪酔のむかつき，嘔気，悪心），嘔吐
貯蔵方法及び 有効期間	密閉容器
規格及び試験方法	日本薬局方による。
備考	センブリ・重曹散

【 56 】　胃腸薬 8—②

成分及び分量又は本質	日本薬局方	ブチルスコポラミン臭化物	0.03g
	〃	乾燥水酸化アルミニウムゲル細粒	1.8g
	〃	ケイ酸マグネシウム	1.8g
	賦形剤　〃	デンプン，乳糖水和物又はこれらの混合物	適　量
		全　　量	4.5g
製造方法	以上をとり，散剤の製法により製する。ただし，分包散剤とする。		
用法及び用量	大人（15 才以上）1 回 1 包 1.5g，1 日 3 回，食前又は食間に服用する。服用間隔は 4 時間以上おくこと。		
効能又は効果	胃痛，腹痛，さしこみ（疝痛，癪），胃酸過多，胸やけ		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考			

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は白色の粉末である。

確認試験　**（1）**　本品 1g に希塩酸 20mL を加えて加温し，冷後，ろ過する。ろ液はアルミニウム塩の定性反応を呈する（乾燥水酸化アルミニウムゲル）。

（2）　本品 1.5g に希塩酸 10mL を加えて加温し，冷後，ろ過する。ろ液にアンモニア試液を加えて中性とし，生じたゲル状の沈殿を吸引ろ過する。ろ液はマグネシウム塩の定性反応（2）を呈する（ケイ酸マグネシウム）。

（3）　本品 0.8g にメタノール 20mL を加えて，10 分間振り混ぜた後，ろ過する。ろ液を蒸発乾固し，残留物をメタノール 1mL に溶かし，試料溶液とする。別にブチルスコポラミン臭化物 5mg をメタノール 1mL に溶かし，標準溶液とする。これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び標準溶液 5 μL ずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲルを用いて調製した薄層板にスポットする。次にエタノール(95)・酢酸(100)・水混液（5：3：2）を展開溶媒として約 10cm 展開した後，薄層板を 80℃で 10 分間乾燥する。これに噴霧用ドラーゲンドルフ試液を均等に噴霧するとき，試料溶液から得たスポットは，標準溶液から得た黄赤色のスポットと色調及び *Rf* 値が等しい。

【 57 】　胃腸薬 9—①

成分及び分量 又は本質	日本薬局方　希　塩　酸　0.5mL 甘味剤　〃　単シロップ　8.0mL 溶　剤　〃　精製水又は精製水（容器入り）　適　量 全　　量　100mL
製造方法	以上をとり，リモナーデ剤の製法により，用時製する。ただし，1 回量を量り得るように，画線を施した容器に収めるか適当な計量器を添付する。 本品の容器としてプラスチック製容器を使用する場合は，当該容器は，昭和 47 年 2 月 17 日薬製第 225 号通知に適合する。
用法及び用量	1 回量を次のとおりとし，1 日 3 回，食前服用する。 大人（15 才以上）30mL，11 才以上 15 才未満　大人の 2/3，8 才以上 11 才未満　大人の 1/2，5 才以上 8 才未満　大人の 1/3
効能又は効果	食欲不振，胃部・腹部膨満感，消化不良，胃弱，食べ過ぎ，飲み過ぎ，胸やけ，もたれ，胸つかえ，はきけ（むかつき，胃のむかつき，二日酔・悪酔のむかつき，嘔気，悪心），嘔吐
貯蔵方法及び有効期間	気密容器
規格及び試験方法	別記のとおり。
備　　考	塩酸リモナーデ

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は無色澄明の液で，甘味及び清涼な酸味がある。

確認試験　**（1）**　本品は青色リトマス紙を赤変し，塩化物の定性反応を呈する。

（2）　本品 1.5mL に希硫酸 2mL を加えて煮沸し，水酸化ナトリウム試液 4mL 及びフェーリング試液 3mL を加えて沸騰するまで加熱するとき，赤色～暗赤色の沈殿を生じる（単シロップ）。

【 58 】　胃腸薬 10—②

成分及び分量又は本質		日本薬局方	メチルベナクチジウム臭化物	0.03g
		〃	酸化マグネシウム	0.5g
		〃	乾燥水酸化アルミニウムゲル細粒	3.0g
		〃	*l*- メントール	0.02g
	賦形剤	〃	デンプン，乳糖水和物又はこれらの混合物	適　量
			全　　量	4.5g
製造方法	以上をとり，散剤の製法により製する。ただし，分包散剤とする。 メチルベナクチジウム臭化物に替えて，メチルベナクチジウム臭化物散 10%を用いてもよい。			
用法及び用量	1 回量を次のとおりとし，1 日 3 回，食前又は食間に服用する。服用間隔は 4 時間以上おくこと。 大人（15 才以上）1 包 1.5g，11 才以上 15 才未満　大人の 2/3，8 才以上 11 才未満　大人の 1/2，5 才以上 8 才未満　大人の 1/3			
効能又は効果	胃痛，腹痛，さしこみ（疝痛，癪），胃酸過多，胸やけ			
貯蔵方法及び有効期間	気密容器			
規格及び試験方法	別記のとおり。			
備考				

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は白色の粉末で，ハッカのにおいがある。

確認試験　（1）　本品 1g にメタノール 5mL を加えて振り混ぜた後，ろ過し，ろ液を試料溶液とする。別にメチルベナクチジウム臭化物 3mg をメタノール 2mL に溶かし，標準溶液とする。これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び標準溶液 5μL ずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲルを用いて調製した薄層板にスポットする。次にエタノール（95）・酢酸(100)・水混液（5：3：2）を展開溶媒として約 10cm 展開した後，薄層板を 80℃で 10 分間乾燥する。これに噴霧用ドラーゲンドルフ試液を均等に噴霧するとき，試料溶液から得たスポットは，標準溶液から得た黄赤色のスポットと色調及び *Rf* 値が等しい。

（2）　本品 2g に希塩酸 10mL を加えて加温し，冷後，アンモニア試液を加えて中性とし，生じたゲル状の沈殿を吸引ろ過する。ろ液はマグネシウム塩の定性反応を呈する（酸化マグネシウム）。

（3）　本品 0.5g に希塩酸 20mL を加え，加温して溶かした液はアルミニウム塩の定性反応を呈する（乾燥水酸化アルミニウムゲル）。

（4）　本品 4g に石油エーテル 10mL を加えて振り混ぜた後，ろ過する。ろ液を蒸発乾固し，残留物にエタノール(95)10mL を加えた後，硫酸 3mL を加えて振り混ぜるとき，液は黄赤色を呈する（メントール）。

【 59 】　胃腸薬 11—①

成分及び分量又は本質		日本薬局方	乾燥水酸化アルミニウムゲル細粒	2.0g
		〃	酸化マグネシウム	0.6g
		〃	*l*- メントール	0.02g
			ロートエキス	0.06g
	賦形剤	〃	デンプン，乳糖水和物又はこれらの混合物	適　量
			全　　量	3.6g
製造方法	以上をとり，散剤の製法により製し，分包散剤とする。			
用法及び用量	1 回量を次のとおりとし，1 日 3 回，適宜服用する。 大人（15 才以上）1 包 1.2g，11 才以上 15 才未満　大人の 2/3，8 才以上 11 才未満　大人の 1/2，5 才以上 8 才未満　大人の 1/3			
効能又は効果	胃痛，腹痛，さしこみ（疝痛，癪），胃酸過多，胸やけ			
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器			
規格及び試験方法	別記のとおり。			
備考				

規 格 及 び 試 験 方 法

本品は定量するとき，酸化アルミニウム（Al_2O_3：101.96）25～39%を含む。

性　　状　本品は淡褐色の粉末で，ハッカのにおいがある。

確認試験　（1）　本品 3.6g 以上をとり，水 10mL ずつで 3 回よくかき混ぜた後，ろ過する。ろ液を合わせ，アンモニア試液でアルカリ性とし，ジエチルエーテル 10mL ずつで 3 回抽出する。ジエチルエーテル抽出液を合わせ，水浴上で蒸発乾固し，発煙硝酸 5 滴を加え，水浴上で再び乾固し，冷後，水酸化カリウム・エタノール試液を滴加するとき，紫色を呈する（ヒヨスチアミン）。

（2）　本品 3.6g をとり，ジエチルエーテル 30mL で抽出し，ジエチルエーテル層を分取する。これを水浴上で注意して蒸発するとき，ハッカのにおいを発する（*l*- メントール）。

（3）　（1）の残留物に希塩酸 10mL 及び水 10mL を加え，振り混ぜた後，ろ過する。ろ液に塩化アンモニウム試液及び炭酸アンモニウム試液を加え，更にリン酸水素二ナトリウム試液を加えるとき，白色結晶性の沈殿を生じ，この沈殿はアンモニア試液に溶けない（マグネシウム）。

（4）　(3) のろ液に水酸化ナトリウム試液を加えるとき，ゼラチンようの白色沈殿を生じ，これは水酸化ナトリウム試液の過量に溶ける（アルミニウム）。

定 量 法　本品 10 包をとり，1 包の平均重量を算出し，よく混和した後，乾燥水酸化アルミニウム・ゲル約 0.5g に対応する量を精密に量り，希塩酸 15mL を加え，水浴上で 5 分間加熱し，水 50mL を加え，振り混ぜた後，ろ過する。ろ紙は熱湯でよく洗い，洗液はろ液に合わせ，更に水を加えて 200mL とし，塩化アンモニウム 1g 及びメチルレッド試液 3 滴を加えて沸騰するまで加熱した後，液が黄色を呈するまでアンモニア試液を加え，1～2 分間煮沸する。直ちにろ過し，沈殿は熱湯でよく洗い，乾燥し，恒量になるまで強熱し，重量を量り，酸化アルミニウム（Al_2O_3）の量とする。

【 60 】　胃腸薬 12—②

成分及び分量又は本質	日本薬局方	ウルソデオキシコール酸	0.06g
	〃	ホミカエキス散	0.3g
	〃	炭酸水素ナトリウム	2.0g
	〃	酸化マグネシウム	0.6g
	〃	ゲンチアナ末	0.3g
	〃	ケイヒ末	0.2g
	〃	*l*- メントール	0.05g
	賦形剤　〃	デンプン，乳糖水和物又はこれらの混合物	適　量
		全　　量	6.0g
製造方法	以上をとり，散剤の製法により製する。ただし，分包散剤とする。		
用法及び用量	1 回量を次のとおりとし，1 日 3 回，食前又は食後に服用する。 大人（15 才以上）1 包 2.0g，11 才以上 15 才未満　大人の 2/3，8 才以上 11 才未満　大人の 1/2，5 才以上 8 才未満　大人の 1/3		
効能又は効果	食欲不振（食欲減退），胃部・腹部膨満感，消化不良，胃弱，食べ過ぎ（過食），飲み過ぎ（過飲），胸やけ，もたれ（胃もたれ），胸つかえ，はきけ（むかつき，胃のむかつき，二日酔・悪酔のむかつき，嘔気，悪心），嘔吐		
貯蔵方法及び有効期間	気密容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考			

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は淡褐色の粉末で，ハッカのにおいがあり，味は苦い。

確認試験　（1）　本品 1g にエタノール（95）20mL を加えて振り混ぜた後，ろ過する。ろ液を蒸発乾固し，残留物をエタノール（95）2mL に溶かし，試料溶液とする。別にウルソデオキシコール酸 0.01g をエタノール(95)2mL に溶かし，標準溶液とする。これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び標準溶液 10μL ずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲルを用いて調製した薄層板にスポットする。次にクロロホルム・アセトン・酢酸(100)混液（7：2：1）を展開溶媒として約 10cm 展開した後，薄層板 120℃で 30 分間乾燥した後，直ちにリンモリブデン酸のエタノール(95)溶液（1→5）を均等に噴霧し，120℃で 2～3 分間加熱するとき，試料溶液から得た数個のスポットのうち 1 個のスポットは，標準溶液から得た暗青色のスポットと色調及び *Rf* 値が等しい。

（２）　本品 2g に石油エーテル 10mL を加えて振り混ぜた後，ろ過する。ろ液を蒸発乾固し，残留物にエタノール（99.5）10mL を加え，更に硫酸 3mL を加えて振り混ぜるとき，液は黄赤色を呈する（メントール）。

（３）　本品 3g に水 30mL を加え，静かに振り混ぜた後，ろ過する。ろ液はナトリウム塩の定性反応及び炭酸水素塩の定性反応（1），（2）を呈する（炭酸水素ナトリウム）。

（４）　（３）の水不溶の残留物に希塩酸 10mL を加え，振り混ぜた後，ろ過する。ろ液はマグネシウム塩の定性反応を呈する（酸化マグネシウム）。

（５）　本品 6g に水 50mL を加え，15 分間振り混ぜた後，ろ過する。ろ液を分液漏斗にとり，1mol/L 塩酸試液 25mL を加え，ジクロルメタン 20mL を加えて振り混ぜた後，水層を分取する。水層にアンモニア試液を加えて弱アルカリ性とし，ジクロルメタン 30mL を加えて振り混ぜた後，ジクロルメタン層を分取する。この液を蒸発乾固し，残留物を薄めたメタノール（1→2）1mL に溶かし，試料溶液とする。別に硝酸ストリキニーネ 2mg を薄めたメタノール（1→2）1mL に溶かし，標準溶液とする。これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び標準溶液 10μL ずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲルを用いて調製した薄層板にスポットする。次にクロロホルム・ジエチルアミン混液（9：1）を展開溶媒として約 10cm 展開した後，薄層板を 80℃で 10 分間乾燥する。これに噴霧用ドラーゲンドルフ試液を均等に噴霧するとき，試料溶液から得たスポットは，標準溶液から得た黄赤色のスポットと色調及び *Rf* 値が等しい。

（６）　本品 10g にジエチルエーテル 20mL を加え，振り混ぜた後，ろ過する。ろ液を蒸発乾固し，エタノール（95）1mL に溶かし，試料溶液とする。別にケイヒ末 0.3g をとり，試料溶液と同様に操作し，標準溶液とする。これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び標準溶液 10μL ずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲル（蛍光剤入り）を用いて調製した薄層板にスポットする。次にヘキサン・クロロホルム・酢酸エチル混液（4：1：1）を展開溶媒として約 10cm 展開した後，薄層板を風乾する。これに紫外線（主波長 254nm）を照射するとき，試料溶液から得た主スポットは，標準溶液から得た主スポットと色調及び *Rf* 値が等しい。更に，このスポットは，2,4 - ジニトロフェニルヒドラジン試液を噴霧するとき，黄赤色を呈する。

（７）　（６）のジエチルエーテル不溶の残留物にメタノール 10mL を加え，10 分間振り混ぜた後，ろ過し，ろ液を試料溶液とする。別にゲンチアナ末 0.5g をとり，試料溶液と同様に操作し，標準溶液とする。これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び標準溶液 10μL ずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲル（蛍光剤入り）を用いて調製した薄層板にスポットする。次にクロロホルム・メタノール・水混液（30：10：1）を展開溶媒として約 10cm 展開した後，薄層板を風乾する。これに紫外線（主波長 254nm）を照射するとき，試料溶液から得た主スポットは，標準溶液から得た主スポットと色調及び *Rf* 値が等しい。

【 61 】　胃腸薬 13

成分及び分量 又は本質	日本薬局方　ダイオウ末　0.2g 〃　カンゾウ末　0.2g 〃　シャクヤク末　0.2g 〃　センナ末　0.6g 全　量　1.2g
製造方法	以上をとり，散剤の製法により製する。ただし，分包散剤とする。
用法及び用量	1 回量を次のとおりとし，1 日 1 回，就寝前服用する。 大人（15 才以上）1 包 1.2g，11 才以上 15 才未満　大人の 2/3，7 才以上 11 才未満　大人の 1/2，3 才以上 7 才未満　大人の 1/3
効能又は効果	○便　秘 ○便秘に伴う次の症状の緩和 頭重，のぼせ，肌あれ，吹出物，食欲不振（食欲減退），腹部膨満，腸内異常醗酵，痔
貯蔵方法及び 有効期間	密閉容器
規格及び試験方法	別記のとおり。
備考	

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は黄褐色の粉末である。

確認試験　本品 2g に水 50mL を加え，水浴上で 30 分間加温した後，ろ過する。ろ液に希塩酸 2 滴を加え，ジエチルエーテル 20mL ずつで 2 回振り混ぜ，水層をとり，塩酸 5mL を加えて水浴上で 30 分間加熱する。冷後，ジエチルエーテル 20mL を加えて振り混ぜ，ジエチルエーテル層を分取し，炭酸水素ナトリウム試液 10mL を加えて振り混ぜるとき，水層は赤色を呈する（ダイオウ）。

【 62 】　胃腸薬 14

成分及び分量 又は本質	日本薬局方　センナ末　11.0g 〃　ダイオウ末　11.0g 〃　イオウ　55.5g 〃　酸化マグネシウム　22.5g 全量　100g
製造方法	以上をとり，散剤の製法により製する。ただし，分包散剤とする。
用法及び用量	1回量を次のとおりとし，1日3回服用する。 大人（15才以上）1包3.0g，11才以上15才未満　大人の2/3，7才以上11才未満　大人の1/2，3才以上7才未満　大人の1/3
効能又は効果	○便　秘 ○便秘に伴う次の症状の緩和 頭重，のぼせ，肌あれ，吹出物，食欲不振（食欲減退），腹部膨満，腸内異常醗酵，痔
貯蔵方法及び 有効期間	密閉容器
規格及び試験方法	日本薬局方による。
備考	複方ダイオウ・センナ散

【 63 】　欠　　番

【 64 】　胃腸薬 16

成分及び分量又は本質	日本薬局方	硫酸マグネシウム水和物	15.0g
	矯味剤　〃	苦味チンキ	2.0mL
	〃　〃	希　塩　酸	0.5mL
	溶　剤　〃	精製水又は精製水（容器入り）	適　量
		全　　量	100mL
製造方法	以上をとり，用時製する。ただし，1 回量を量り得るように画線を施した容器に収めるか，適当な計量器を添付する。 本品の容器としてプラスチック製容器を使用する場合は，当該容器は，昭和 47 年 2 月 17 日薬製第 225 号通知に適合する。		
用法及び用量	大人（15 才以上）1 回 30mL，1 日 3 回服用する。		
効能又は効果	便　秘		
貯蔵方法及び有効期間	気密容器		
規格及び試験方法	日本薬局方による。		
備考	硫酸マグネシウム水		

【 65 】　胃腸薬 17—①

成分及び分量又は本質	局　外　規　水酸化マグネシウム　2.1g 賦形剤　日本薬局方　デンプン，乳糖水和物又はこれらの混合物　適　量 全　　量　4.0g
製造方法	以上をとり，散剤の製法により製する。ただし，1 包 1.0g の分包散剤とする。
用法及び用量	大人（15 才以上）1 日 1 回 2～4 包を就寝前（又は空腹時）コップ 1 杯の水で服用する。ただし初回は 2 包とし，必要に応じ増量又は減量すること。
効能又は効果	便秘，便秘に伴う次の症状の緩和：頭重，のぼせ，肌あれ，吹出物，食欲不振（食欲減退），腹部膨満，腸内異常醗酵，痔
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器
規格及び試験方法	別記のとおり。
備考	

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は白色の粉末である。

確認試験　本品 1g に希塩酸 25mL を加え，振り混ぜ，必要ならろ過する。ろ液はマグネシウム塩の定性反応を呈する（水酸化マグネシウム）。

【 66 】　胃腸薬 18—①

成分及び分量 又は本質	日本薬局方　乳酸カルシウム水和物　3.0g 〃　タンニン酸アルブミン　3.0g 乳酸菌又は酪酸菌の製剤　3.0g 全　量　9.0g
製造方法	以上をとり，散剤の製法により製する。ただし，分包散剤とする。
用法及び用量	1回量を次のとおりとし，1日3回，適宜服用する。 大人（15才以上）1包3.0g，11才以上15才未満　大人の2/3，8才以上11才未満　大人の1/2，5才以上8才未満　大人の1/3，3才以上5才未満　大人の1/4，1才以上3才未満　大人の1/5，3カ月以上1才未満　大人の1/10
効能又は効果	下痢，消化不良による下痢，食あたり，はき下し，水あたり，くだり腹，軟便
貯蔵方法及び 有効期間	密閉容器
規格及び試験方法	別記のとおり。
備考	

規格及び試験方法

本品は定量するとき，乳酸カルシウム水和物（$C_6H_{10}CaO_6$・$5H_2O$：308.30）30～36%を含む。

性　状　本品は淡褐色の粉末である。

確認試験　（1）　本品1.0gに水10mLを加え，よく振り混ぜた後，ろ過し，ろ液に塩化鉄（Ⅲ）試液5滴を加えるとき，液は紫青色を呈する（タンニン酸アルブミン）。

（2）　本品2.0gに水10mLを加えてよく振り混ぜた後，ろ過する。ろ液に希硫酸1mLを加えて酸性とし，過マンガン酸カリウム試液5mLを加えて加熱するとき，アセトアルデヒドのにおいを発する。また，同じろ液をアンモニア試液でアルカリ性とし，シュウ酸アンモニウム試液5mLを加えるとき，白色の沈殿を生じ，この沈殿は酢酸に溶けないが，塩酸に溶ける（乳酸カルシウム水和物）。

定量法　本品10包をとり，1包の平均重量を算出し，よく混和した後，乳酸カルシウム水和物約0.5gに対応する量を精密に量り，水10mLを加え，水浴上でおだやかに加温した後，ろ過する。ろ紙上の残留物を少量の水で2回洗い，洗液はろ液に合わせる。この液を煮沸して二酸化炭素を追い出し，水100mLを加え沸騰するまで加熱し，アンモニア試液を加えてアルカリ性とし，かき混ぜながら過量の熱シュウ酸アンモニウム試液を加える。この液を水浴上で1時間加熱した後，ろ過する。沈殿を少量の温湯を用いて，ろ液に塩化カルシウム試液を加えても1分間以内に混濁を生じなくなるまで洗い，残留物を重量

既知のるつぼに入れ，徐々に加熱して全く灰化したとき放冷する。これに硫酸 1mL を加えて潤した後，強熱し炭素が全く消失したとき，るつぼをデシケーター中に放冷し，重量を量り，硫酸カルシウム（$CaSO_4$：136.15）の量とする。

乳酸カルシウム水和物（$C_6H_{10}CaO_6.5H_2O$）の量＝硫酸カルシウム（$CaSO_4$）の量×2.2645

【 67 】　胃腸薬 19—②

成分及び分量又は本質		日本薬局方	タンニン酸アルブミン	2.0g
		〃	天然ケイ酸アルミニウム	4.0g
		〃	ゲンノショウコ末	1.5g
		〃	ベルベリン塩化物水和物	0.3g
	賦形剤	〃	デンプン，乳糖水和物又はこれらの混合物	適　量
			全　　量	9.0g
製造方法	以上をとり，散剤の製法により製する。ただし，分包散剤とする。			
用法及び用量	1回量を次のとおりとし，1日3回，食間に服用する。 大人（15才以上）1包3.0g，11才以上15才未満　大人の2/3，8才以上11才未満　大人の1/2，5才以上8才未満　大人の1/3，3才以上5才未満　大人の1/4，1才以上3才未満　大人の1/5，3カ月以上1才未満　大人の1/10			
効能又は効果	下痢，消化不良による下痢，食あたり，はき下し，水あたり，くだり腹，軟便			
貯蔵方法及び有効期間	遮光した気密容器			
規格及び試験方法	別記のとおり。			
備考				

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は暗黄褐色の粉末で，味は苦い。

確認試験　（1）　本品0.5gにエタノール(95)10mLを加え，水浴中で振り混ぜながら3分間加温する。冷後，ろ過し，ろ液5mLに塩化鉄（Ⅲ）試液を1～2滴加えるとき，液は青緑色を呈し，放置するとき，青黒色の沈殿を生じる（タンニン酸アルブミン）。

（2）　本品1.2gに薄めた硫酸（1→3）3mLを加え，白煙が発生するまで加熱し，冷後，水20mLを加えてろ過し，ろ液にアンモニア試液を加えて弱酸性とした液は，アルミニウム塩の定性反応を呈する（天然ケイ酸アルミニウム）。

（3）　本品1.5gにアセトン30mLを加え，15分間振り混ぜた後，ろ過する。ろ液を蒸発乾固し，残留物をアセトン1mLに溶かし，試料溶液とする。別にゲンノショウコ末0.25gにアセトン20mLを加え，試料溶液と同様に操作し標準溶液とする。これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び標準溶液5μLずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲルを用いて調製した薄層板にスポットする。次にベンゼン・エタノール（99.5）混液（8：2）を展開溶媒として約10cm展開した後，薄層板を風乾する。これにバニリン・硫酸溶液*を均等に噴霧し，105℃で5分間加熱するとき，試料溶液から

得た数個のスポットのうち 1 個のスポットは，標準溶液から得た緑色のスポットと色調及び *Rf* 値が等しい。

［注］*バニリン・硫酸溶液：バニリン 0.5g にメタノール 25mL 及び希硫酸 25mL を加える。

（4） 本品 0.3g にメタノール 10mL を加えて振り混ぜた後，ろ過し，ろ液を試料溶液とする。別にベルベリン塩化物水和物 1mg をメタノール 1mL に溶かし，標準溶液とする。これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び標準溶液 10μL ずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲルを用いて調製した薄層板にスポットする。次に l - ブタノール・水・酢酸(100)混液（7：2：1）を展開溶媒として約 10cm 展開した後，薄層板を風乾する。これに紫外線（主波長 365nm）を照射するとき，試料溶液から得たスポットは，標準溶液から得た黄色～黄緑色の蛍光を発するスポットと色調及び *Rf* 値が等しい。

【 68 】　胃腸薬 20

成分及び分量又は本質		日本薬局方	ロートエキス散	0.3g
		〃	ゲンチアナ末	0.3g
		〃	オウバク末	2.0g
		〃	タンニン酸アルブミン	3.0g
	賦形剤	〃	デンプン，乳糖水和物又はこれらの混合物	適　量
			全　　量	6.0g
製造方法	以上をとり，散剤の製法により製する。ただし，分包散剤とする。			
用法及び用量	1回量を次のとおりとし，1日3回，食後服用する。 大人（15才以上）1包 2.0g，11才以上 15才未満　大人の 2/3，8才以上 11才未満　大人の 1/2，5才以上 8才未満　大人の 1/3，3才以上 5才未満　大人の 1/4，1才以上 3才未満　大人の 1/5，3カ月以上 1才未満　大人の 1/10			
効能又は効果	下痢，食あたり，はき下し，水あたり，くだり腹，軟便			
貯蔵方法及び有効期間	遮光した密閉容器			
規格及び試験方法	別記のとおり。			
備考				

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は黄色～黄褐色の粉末である。

確認試験　（1）　本品の粉末 4g にジエチルエーテル 10mL を加え，ときどき振り混ぜながら 10 分間放置した後，ろ過する。ろ紙上の残留物にエタノール（95）10mL を加えて，ときどき振り混ぜながら 10 分間放置した後，ろ過する。

ろ液 2～3 滴に塩酸 1mL 及び過酸化水素試液 1～2 滴を加えて振り混ぜるとき，液は赤紫色を呈する（ベルベリン）。

（2）　（1）で得たエタノール（95）溶液の残部にヨウ化カリウム試液 3mL を加え，生じた黄色の沈殿を遠心分離して集め，ヨウ化カリウム溶液（1→50）2mL で洗った後，メタノールから再結晶する。この結晶の少量をとり，少量の硫酸を加えて溶かし，没食子酸のエタノール（95）溶液（1→20）2～3 滴を加えるとき，液は緑色を呈する（オウバク）。

（3）　本品 5g にエタノール（95）20mL を加え，水浴中で振り混ぜながら 3 分間加熱し，冷後，ろ過する。ろ液 10mL に塩化鉄（Ⅲ）試液 1 滴を加えるとき，液は青緑色を呈し，放置するとき，青黒色の沈殿を生じる（タンニン酸アルブミン）。

（４）　本品 5g に薄めたピリジン（1→5）20mL を加え，水浴中で振り混ぜながら 3 分間加温し，冷後，ろ過する。ろ液にニンヒドリン・L-アスコルビン酸試液 1mL を加え，水浴中で加熱するとき，液は青色を呈する（タンニン酸アルブミン）。

（５）　本品 1g をとり，クロロホルム 20mL 及びアンモニア水(28)1mL を加えて振り混ぜてろ過する。ろ液に無水硫酸ナトリウム 2g を加え，振り混ぜてろ過し，ろ液中のクロロホルムを水浴上で留去し，残留物に水 2mL を加え，加温して溶かし，冷後，ヨウ素ヨウ化カリウム溶液 5 滴を加えるとき褐色の沈殿を生じる（ゲンチアナ）。

○ヨウ素ヨウ化カリウム溶液：ヨウ素 0.5g 及びヨウ化カリウム 1.5g を水 25mL に溶かす。

（６）　本品 6g をとり，水 10mL を加え，よくかき混ぜた後ろ過する。残留物にこの操作を更に 2 回繰り返して，ろ液を合わせ，アンモニア試液でアルカリ性とし，ジエチルエーテル 10mL ずつで 3 回抽出する。ジエチルエーテル抽出液を合わせ，水浴上で蒸発乾固し，発煙硝酸 5 滴を加え，水浴上で再び乾固し，冷後，N,N-ジメチルホルムアミド 1mL を加えて溶かし，テトラエチルアンモニウムヒドロキシド試液 5～6 滴を加えるとき，液は赤紫色～紫色を呈する（ヒヨスチアミン）。

【 69 】　胃腸薬 21

成分及び分量 又は本質		日本薬局方	ベルベリン塩化物水和物	0.2g
		〃	アクリノール水和物	0.1g
		〃	タンニン酸アルブミン	3.0g
	賦形剤	〃	デンプン，乳糖水和物又はこれらの混合物	適　量
			全　　量	4.5g
製造方法	以上をとり，散剤の製法により製する。ただし，分包散剤とする。			
用法及び用量	1 回量を次のとおりとし，1 日 3 回を限度とし，服用する。服用間隔は 4 時間以上おくこと。 大人（15 才以上）1 包 1.5g，11 才以上 15 才未満　大人の 2/3，8 才以上 11 才未満　大人の 1/2，5 才以上 8 才未満　大人の 1/3，3 才以上 5 才未満　大人の 1/4，1 才以上 3 才未満　大人の 1/5，3 カ月以上 1 才未満　大人の 1/10			
効能又は効果	下痢，消化不良による下痢，食あたり，はき下し，水あたり，くだり腹，軟便			
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器			
規格及び試験方法	別記のとおり。			
備考				

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は黄色の粉末である。

確認試験　（１）　本品 2g に，水 20mL を加えてよく振り混ぜた後，ろ過する。ろ液に亜硝酸ナトリウム試液及び希塩酸を 2 滴ずつ加えるとき，液は暗赤色を呈する（アクリノール水和物）。

（２）　（１）のろ紙上の残留物を熱湯でよく洗った後，エタノール（95）10mL を加え，水浴上で加温しながら 30 分間振り混ぜ，冷後，ろ過する。ろ液 2～3 滴に塩酸 1mL 及び過酸化水素試液 1～2 滴を加えて振り混ぜるとき，液は淡赤紫色を呈する（ベルベリン塩化物水和物）。

（３）　（２）のろ液に塩化鉄（Ⅲ）試液 1 滴を加えるとき，液は青緑色を呈し，放置するとき，青黒色の沈殿を生じる（タンニン酸アルブミン）。

（４）　本品 5g をとり，熱湯 20mL ずつで 3 回振り混ぜた後，ろ過し，更にろ紙上の残留物を熱湯でよく洗う。この残留物をとり，薄めたピリジン（1→5）10mL を加え，水浴中で振り混ぜながら 3 分間加温し，冷後，ろ過する。ろ液にニンヒドリン・L-アスコルビン酸試液 1mL を加え，水浴中で加熱するとき，液は青色を呈する（タンニン酸アルブミン）。

【 70 】　胃腸薬 22

成分及び分量又は本質	日本薬局方	オウバク末		30.0g
	〃	タンニン酸アルブミン		30.0g
	〃	次硝酸ビスマス		20.0g
	〃	ロートエキス		1.0g
	賦形剤 〃	デンプン，乳糖水和物又はこれらの混合物		適　量
		全　　量		100g
製造方法	以上をとり，散剤の製法により製し，分包散剤とする。ただし，「ロートエキス」の代わりに「ロートエキス散」を用いて製することができる。			
用法及び用量	1 回量を次のとおりとし，1 日 3 回を限度とし，服用する。服用間隔は 4 時間以上おくこと。 大人（15 才以上）1 包 2.0g，11 才以上 15 才未満　大人の 2/3，8 才以上 11 才未満　大人の 1/2，5 才以上 8 才未満　大人の 1/3，3 才以上 5 才未満　大人の 1/4，1 才以上 3 才未満　大人の 1/5，3 カ月以上 1 才未満　大人の 1/10			
効能又は効果	下痢，消化不良による下痢，食あたり，はき下し，水あたり，くだり腹，軟便，腹痛を伴う下痢			
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器			
規格及び試験方法	日本薬局方による。			
備考	オウバク・タンナルビン・ビスマス散			

【 71 】　胃腸薬 23—①

成分及び分量 又は本質		日本薬局方	炭酸水素ナトリウム	2.0g
		〃	乾燥水酸化アルミニウムゲル	1.0g
		〃	ジアスターゼ	0.5g
		〃	パンクレアチン	0.5g
		〃	ゲンチアナ末	0.3g
		〃	*l*-メントール	0.02g
	賦形剤	〃	デンプン，乳糖水和物又はこれらの混合物	適　量
			全　　量	4.5g
製造方法	以上をとり，散剤の製法により用時製する。ただし，分包散剤とする。			
用法及び用量	1回量を次のとおりとし，1日3回，食後服用する。 大人（15才以上）1包1.5g，11才以上15才未満　大人の2/3，8才以上11才未満　大人の1/2，5才以上8才未満　大人の1/3			
効能又は効果	胸やけ，食欲不振，消化不良，はきけ（二日酔・悪酔のむかつき），もたれ，胃部・腹部膨満感，食べ過ぎ，飲み過ぎ			
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器			
規格及び試験方法	別記のとおり。			
備考				

規格及び試験方法

本品は定量するとき，酸化アルミニウム（Al_2O_3：101.96）8～17%を含む。

性　　状　本品は淡褐色の粉末で，ハッカのにおいがある。

確認試験　（1）　本品1.5gをとり，希塩酸5mLを滴加するとき，一部発泡して溶ける（炭酸水素塩）。

（2）　（1）のろ液3mLにアンモニア試液10mLを加えるとき，白色の沈殿を生じ，これに水酸化ナトリウム試液を加えると，沈殿は再び溶ける（アルミニウム）。

（3）　本品1.5gをとり，クロロホルム5mL及びアンモニア水(28)1mLを加えて振り混ぜてろ過する。ろ液に無水硫酸ナトリウム2gを加え，振り混ぜてろ過し，ろ液中のクロロホルムを水浴上で留去し，残留物に水2mLを加え，加温して溶かし，冷後，ヨウ素ヨウ化カリウム溶液5滴を加えるとき，褐色の沈殿を生ずる（ゲンチアナ）。

○ヨウ素ヨウ化カリウム溶液：ヨウ素0.5g及びヨウ化カリウム1.5gを水25mLに溶かす。

定 量 法　本品 10 包以上をとり，1 包の平均重量を算出し，よく混和した後，乾燥水酸化アルミニウムゲル約 0.5g に対応する量を精密に量り，希塩酸 20mL を加え，水浴上で 5 分間加熱し，水 50mL を加えて振り混ぜた後，ろ過する。ろ紙は熱湯でよく洗い，洗液はろ液に合わせ，更に水を加えて 200mL とし，塩化アンモニウム 1g 及びメチルレッド試液 3 滴を加え，沸騰するまで加熱する。熱時これに黄色を呈するまでアンモニア試液を加えて 1～2 分間煮沸し，直ちにろ過し，沈殿は熱湯でよく洗い，乾燥し，恒量になるまで強熱し，重量を量り，酸化アルミニウム（Al_2O_3）の量とする。

【 72 】　胃腸薬 24—③

成分及び分量 又は本質		日本薬局方	乾燥酵母	2.0g
		〃	ジアスターゼ	0.6g
		〃	パンクレアチン	0.6g
		〃	ゲンチアナ末	0.3g
		〃	ホミカエキス散	0.3g
		〃	炭酸水素ナトリウム	2.0g
		〃	ウルソデオキシコール酸	0.06g
	矯味剤	〃	*l*- メントール	0.05g
	賦形剤	〃	デンプン，乳糖水和物又はこれらの混合物	適　量
			全　　量	6.0g
製造方法	以上をとり，散剤の製法により製する。ただし，分包散剤とする。			
用法及び用量	1 回量を次のとおりとし，1 日 3 回，食後服用する。 大人（15 才以上）1 包 2.0g，11 才以上 15 才未満　大人の 2/3，8 才以上 11 才未満　大人の 1/2，5 才以上 8 才未満　大人の 1/3			
効能又は効果	胃弱，胸やけ，はきけ（むかつき，胃のむかつき，二日酔・悪酔のむかつき，嘔気，悪心），嘔吐，消化促進，消化不良，食欲不振，食べ過ぎ，もたれ，胸つかえ，消化不良による胃部・腹部膨満感			
貯蔵方法及び有効期間	気密容器			
規格及び試験方法	別記のとおり。			
備考				

規 格 及 び 試 験 方 法

本品は定量するとき，ウルソデオキシコール酸（$C_{24}H_{40}O_4$：392.57）0.9～1.1%を含む。

性　　状　本品は淡褐色の粉末である。

確認試験　（1）　本品 0.5g にエタノール（95）20mL を加えて振り混ぜた後，ろ過する。ろ液を蒸発乾固し，残留物をエタノール(95)2mL に溶かし，試料溶液とする。別にウルソデオキシコール酸 0.01g をエタノール(95)2mL に溶かし，標準溶液とする。これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び標準溶液 10μL ずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲルを用いて調製した薄層板にスポットする。次にクロロホルム・アセトン・酢酸(100)混液（7：2：1）を展開溶媒として約 10cm 展開した後，薄層板を 120℃で 30 分間乾燥した後，直ちにリンモリブデン酸のエタノール(95)溶液（1→5）を均等に噴霧し，薄層板を 120℃で 2～3 分間加熱するとき，試料溶液から得た数個のス

ポットのうち 1 個のスポットは，標準溶液から得た暗青色のスポットと色調及び *Rf* 値が等しい。

（２）　本品 3g をとり，希塩酸 5mL を加えるとき，一部ガスを発生して溶け，ガスを水酸化カルシウム試液に通すとき，白濁する（炭酸水素ナトリウム）。

（３）　本品 4.0g をとり，クロロホルム 10mL 及びアンモニア水(28)1mL を加えて振り混ぜてろ過する。ろ液に無水硫酸ナトリウム 2g を加え，振り混ぜてろ過し，ろ液中のクロロホルムを水浴上で留去し，残留物に水 2mL を加え，加温して溶かした後，ヨウ素ヨウ化カリウム溶液 5 滴を加えるとき，褐色の沈殿を生じる（ゲンチアナ）。

定 量 法　本品約 1.25g を精密に量り，リン酸を添加したメタノール（1→1000）80mL を加え，ときどき振り混ぜながら 60℃で 30 分間加温し，冷後，リン酸を添加したメタノール（1→1000）を加えて，正確に 100mL とする。この液 20mL を正確に量り，60℃の水浴上で抽出溶媒を留去する。残留物に内標準溶液 2mL を正確に加え，さらに移動相を加えて溶かし 10mL とした後，孔径 0.45 μ m 以下のメンブランフィルターでろ過し，初めのろ液 3mL を除き，次のろ液を試料溶液とする。別に，ウルソデオキシコール酸標準品を 105℃で 4 時間乾燥し，その約 25mg を正確に量り，移動相溶液に溶かし，正確に 50mL とする。この液 5mL を正確に量り，内標準溶液 2mL を正確に加えた後，移動相を加えて 10mL とし，標準溶液とする。試料溶液及び標準溶液 100μL につき，次の条件で液体クロマトグラフ法により試験を行い，内標準物質のピーク面積に対するウルソデオキシコール酸のピーク面積の比 Q_T 及び Q_S を求める。

内標準溶液：ブチルヒドロキシアニソールのメタノール溶液（1→200000）

操作条件

検出器：紫外吸光光度計（測定波長：208nm）

カラム：内径約 4mm，長さ 15～25cm のステンレス管に 5～10μm の液体クロマトグラフ用オクタデシルシリル化シリカゲルを充填する。

カラム温度：40℃

移動相：薄めたリン酸（1→1000）・アセトニトリル混液（58：42）

流量：1mL/min

カラムの選定：標準溶液 100μL につき，上記の条件で操作するとき，ウルソデオキシコール酸，ブチルヒドロキシアニソールの順に溶出し，それぞれのピークが完全に分離するものを用いる。

【 73 】　胃腸薬 25—②

成分及び分量又は本質		日本薬局方	ウルソデオキシコール酸	0.06g
		〃	ジアスターゼ	1.0g
		〃	パンクレアチン	0.5g
		〃	*l*-メントール	0.02g
	賦形剤	〃	デンプン，乳糖水和物又はこれらの混合物	適　量
			全　　量	3.0g
製造方法	以上をとり，散剤の製法により用時製する。ただし，分包散剤とする。			
用法及び用量	1回量を次のとおりとし，1日3回，食後服用する。 大人（15才以上）1包1.0g，11才以上15才未満　大人の2/3，8才以上11才未満　大人の1/2，5才以上8才未満　大人の1/3			
効能又は効果	消化促進，消化不良，食欲不振（食欲減退），食べ過ぎ（過食），もたれ（胃もたれ），胸つかえ，消化不良による胃部・腹部膨満感			
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器			
規格及び試験方法	別記のとおり。			
備考				

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は白色の粉末で，ハッカのにおいがある。

確認試験　（1）　本品0.5gにエタノール（95）20mLを加えて振り混ぜた後，ろ過する。ろ液を蒸発乾固し，残留物をエタノール（95）2mLに溶かし，試料溶液とする。別にウルソデオキシコール酸0.01gをエタノール（95）2mLに溶かし，標準溶液とする。これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び標準溶液10μLずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲルを用いて調製した薄層板にスポットする。次にクロロホルム・アセトン・酢酸(100)混液（7：2：1）を展開溶媒として約10cm展開した後，薄層板を120℃で30分間乾燥した後，直ちにリンモリブデン酸のエタノール（95）溶液（1→5）を均等に噴霧し，120℃で2～3分間加熱するとき，試料溶液から得た数個のスポットのうち1個のスポットは，標準溶液から得た暗青色のスポットと色調及び*Rf*値が等しい。

（2）　本品2gに石油エーテル10mLを加えて振り混ぜた後，ろ過する。ろ液を蒸発乾固し，残留物にエタノール（99.5）10mLを加え，更に硫酸3mLを加えて振り混ぜるとき，液は黄赤色を呈する（メントール）。

【 74 】　胃腸薬 26—①

成分及び分量 又は本質	日本薬局方　ジアスターゼ　20.0g 〃　炭酸水素ナトリウム　60.0g 〃　酸化マグネシウム　15.0g 〃　ゲンチアナ末　5.0g 全　量　100g
製造方法	以上をとり，散剤の製法により用時製する。なお，分包散剤とする場合もある。ただし，分包散剤としない場合には 1 回量を量り得る適当な計量器を添付するものとする。
用法及び用量	1 回量を次のとおりとし，1 日 3 回，食後服用する。 大人（15 才以上）1 包 2.0g，11 才以上 15 才未満　大人の 2/3，8 才以上 11 才未満　大人の 1/2，5 才以上 8 才未満　大人の 1/3
効能又は効果	胃酸過多，胸やけ，胃部不快感，もたれ，胃重，胸つかえ，げっぷ，はきけ（むかつき，胃のむかつき，二日酔・悪酔のむかつき，嘔気，悪心），嘔吐，飲み過ぎ，胃痛，食欲不振，胃部・腹部膨満感，消化不良，胃弱，食べ過ぎ，消化促進，消化不良による胃部・腹部膨満感
貯蔵方法及び 有効期間	密閉容器
規格及び試験方法	別記のとおり。
備考	複方ジアスターゼ・重曹散

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品はわずかに褐色を帯びた淡黄色で，特異なにおいがあり，味は苦い。

確認試験　（1）　本品 2g に水 30mL を加え，静かに振り混ぜた後，ろ過する。ろ液はナトリウム塩の定性反応（2）及び炭酸水素塩の定性反応（2）を呈する。

（2）　（1）の水不溶の残留物に希塩酸 10mL を加え，振り混ぜた後，ろ過した液はマグネシウム塩の定性反応（2）を呈する。

（3）　本品 6g にジエチルエーテル 20mL を加え，10 分間振り混ぜた後，吸引ろ過する。残留物は更にジエチルエーテル 10mL で洗い，吸引ろ過する。残留物にメタノール 10mL を加え，20 分間振り混ぜた後，ろ過し，ろ液を試料溶液とする。別にゲンチアナ末 0.3g をとり，試料溶液と同様に操作し，標準溶液とする。これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び標準溶液 10 μL を薄層クロマトグラフ用シリカゲル（蛍光剤入り）を用いて調製した薄層板にスポットする。次にクロロホルム・メタノール・水混液（30：10：1）を展開溶媒として約 10cm 展開した後，薄層板を風乾する。これに紫外線（主波長 254nm）を照射するとき，試料溶液から得たスポットは，標準溶液から得た暗紫色のスポットと色調及び *Rf* 値が等しい。

【 75 】　胃腸薬 27—②

成分及び分量又は本質	日本薬局方	乾燥水酸化アルミニウムゲル細粒		1.0g
	〃	ジアスターゼ		1.0g
	〃	パンクレアチン		1.0g
	〃	ゲンチアナ末		0.3g
	〃	*l*- メントール		0.02g
	賦形剤　〃	デンプン，乳糖水和物又はこれらの混合物		適　量
		全　　量		4.5g
製造方法	以上をとり，散剤の製法により用時製する。ただし，分包散剤とする。			
用法及び用量	1 回量を次のとおりとし，1 日 3 回，食後服用する。 大人（15 才以上）1 包 1.5g，11 才以上 15 才未満　大人の 2/3，8 才以上 11 才未満　大人の 1/2，5 才以上 8 才未満　大人の 1/3			
効能又は効果	消化促進，消化不良，食欲不振（食欲減退），食べ過ぎ（過食），もたれ（胃もたれ），胸つかえ，消化不良による胃部・腹部膨満感			
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器			
規格及び試験方法	別記のとおり。			
備考				

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は淡褐色の粉末で，ハッカのにおいがあり，味はわずかに苦い。

確認試験　（1）　本品 1g に希塩酸 20mL を加え，加温して溶かした液はアルミニウム塩の定性反応を呈する（乾燥水酸化アルミニウムゲル）。

（2）　本品 4g にメタノール 5mL を加えて振り混ぜた後，ろ過し，ろ液を試料溶液とする。別にゲンチアナ末 0.25g にメタノール 5mL を加えて振り混ぜた後，ろ過し，ろ液を標準溶液とする。これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び標準溶液 5μL ずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲル（蛍光剤入り）を用いて調製した薄層板にスポットする。次にクロロホルム・メタノール・水混液（30：10：1）を展開溶媒として約 10cm 展開した後，薄層板を風乾する。これに紫外線（主波長 254nm）を照射するとき，試料溶液から得た主スポットは，標準溶液から得た主スポットと色調及び *Rf* 値が等しい。

（3）　本品 3g に石油エーテル 10mL を加えて振り混ぜた後，ろ過する。ろ液を蒸発乾固し，残留物にエタノール（99.5）10mL を加え，更に硫酸 3mL を加えて振り混ぜるとき，液は黄赤色を呈する（メントール）。

【 76 】　胃腸薬 28—①

成分及び分量 又は本質		日本薬局方	ロートエキス	0.8g
		〃	炭酸水素ナトリウム	20.0g
		〃	合成ケイ酸アルミニウム	60.0g
		〃	酸化マグネシウム	10.0g
	賦形剤	〃	デンプン，乳糖水和物又はこれらの混合物	適　量
			全　　量	100g
製造方法	以上をとり，散剤の製法により用時製し，分包散剤とする。ただし，「ロートエキス」の代わりに「ロートエキス散」を用いて製することができる。			
用法及び用量	1 回量を次のとおりとし，1 日 3 回，食間に服用する。 大人（15 才以上）1 包 2.0g，11 才以上 15 才未満　大人の 2/3，8 才以上 11 才未満　大人の 1/2，5 才以上 8 才未満　大人の 1/3			
効能又は効果	胃酸過多，胸やけ，胃部不快感，胃部膨満感，もたれ，胃重，胸つかえ，げっぷ，はきけ（むかつき，胃のむかつき，二日酔・悪酔のむかつき，嘔気，悪心），嘔吐，飲み過ぎ，胃痛			
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器			
規格及び試験方法	別記のとおり。			
備考				

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は灰白色の粉末で，わずかに塩味があり，後わずかに苦味がある。

確認試験　（1）　本品 12g に水 50mL を加えて振り混ぜた後，アンモニア試液 10mL を加え，ジエチルエーテル 40mL ずつで 2 回よく振り混ぜて抽出し，ジエチルエーテル層は水 20mL ずつで 2 回洗う。ジエチルエーテル層を分取し，無水硫酸ナトリウム 3g を加えて振り混ぜ，脱脂綿を用いてろ過する。ろ液を蒸発乾固し，残留物をエタノール（95）0.2mL に溶かし，試料溶液とする。別に薄層クロマトグラフ用硫酸アトロピン 0.01g 及び臭化水素酸スコポラミン 5mg をそれぞれエタノール(95)10mL に溶かし，標準溶液（1）及び標準溶液（2）とする。これらの液につき，薄層クロマトグラフ用シリカゲルを用いて調製した薄層板にスポットする。次にクロロホルム・メタノール・アセトン・アンモニア水（28）混液（73：15：10：2）を展開溶媒として約 10cm 展開した後，薄層板を 80℃で 10 分間乾燥する。冷後，これに噴霧用ドラーゲンドルフ試液を均等に噴霧するとき，試料溶液から得た 2 個の主スポットは，標準溶液から得たそれぞれの黄赤色のスポットと色調及び *Rf* 値が等しい。

（２）　本品 4g に水 30mL を加え，静かに振り混ぜ，ろ過して得た液はナトリウム塩の定性反応（2）及び炭酸水素塩の定性反応（2）を呈する（炭酸水素ナトリウム）。

（３）　本品 1g に薄めた硫酸（1→3）3mL を加え，白煙が発生するまで加熱し，冷後，水 20mL を加えてろ過し，ろ液にアンモニア試液を加えて，弱酸性とした液は，アルミニウム塩の定性反応を呈する（合成ケイ酸アルミニウム）。

（４）　（２）の水不溶の残留物に希塩酸 20mL を加えて振り混ぜ，ろ過して得た液 5mL はマグネシウム塩の定性反応を呈する（酸化マグネシウム）。

【 77 】　胃腸薬 29—①

成分及び分量又は本質	日本薬局方	ロートエキス	0.8g
	〃	乾燥水酸化アルミニウムゲル	50.0g
	〃	炭酸水素ナトリウム	15.0g
	〃	ジアスターゼ	12.0g
	〃	酸化マグネシウム	12.0g
	賦形剤　〃	デンプン，乳糖水和物又はこれらの混合物	適　量
		全　　量	100g
製造方法	以上をとり，散剤の製法により用時製し，分包散剤とする。ただし，「ロートエキス」の代わりに「ロートエキス散」を用いて製することができる。		
用法及び用量	1回量を次のとおりとし，1日3回，食間又は食後に服用する。 大人（15才以上）1包2.0g，11才以上15才未満　大人の2/3，8才以上11才未満　大人の1/2，5才以上8才未満　大人の1/3		
効能又は効果	胃酸過多，胸やけ，胃部不快感，胃部膨満感，もたれ，胃重，胸つかえ，げっぷ，はきけ（むかつき，胃のむかつき，二日酔・悪酔のむかつき，嘔気，悪心），嘔吐，飲み過ぎ，胃痛		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考			

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は淡灰白色の粉末である。

確認試験　（1）　本品12gに水50mLを加え，更に薄めた塩酸（1→2）60mLを注意しながら徐々に加え，10分間振り混ぜた後，ガラスろ過器（G3）を用いて吸引ろ過する。ろ液にアンモニア試液30mLを加えて弱アルカリ性とした後，ジエチルエーテル40mLずつで2回抽出し，ジエチルエーテル層は水20mLずつで2回洗う。ジエチルエーテル層を分取し，無水硫酸ナトリウム3gを加えて振り混ぜ，脱脂綿を用いてろ過する。ろ液を蒸発乾固し，残留物をエタノール（95）0.2mLに溶かし，試料溶液とする。別に薄層クロマトグラフ用硫酸アトロピン0.01g及び臭化水素酸スコポラミン5mgをそれぞれエタノール（95）10mLに溶かし，標準溶液（1）及び標準溶液（2）とする。これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び標準溶液20μLずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲルを用いて調製した薄層板にスポットする。次にクロロホルム・メタノール・アセトン・アンモニア水（28）混液（73：15：10：2）を展開溶媒として約10cm展開した後，薄層板を80℃で10分間乾燥する。冷後，これに噴霧用ドラーゲンドルフ試

液を均等に噴霧するとき，試料溶液から得た 2 個の主スポットは，標準溶液から得たそれぞれの黄赤色のスポットと色調及び *Rf* 値が等しい。

（２）　本品 0.5g に希塩酸 20mL を加え，加温して溶かした液はアルミニウム塩の定性反応を呈する（乾燥水酸化アルミニウムゲル）。

（３）　本品 5g に水 30mL を加え，静かに振り混ぜ，ろ過して得た液はナトリウム塩の定性反応（2）及び炭酸水素塩の定性反応（2）を呈する（炭酸水素ナトリウム）。

（４）　（３）の水不溶の残留物に希塩酸 20mL を加えて振り混ぜ，ろ過して得た液 5mL はマグネシウム塩の定性反応を呈する（酸化マグネシウム）。

【 78 】　胃腸薬 30—①

成分及び分量 又は本質	日本薬局方　ロートエキス　10.0g 賦形剤　〃　デンプン，乳糖水和物又はこれらの混合物　適　量 全　量　100g
製造方法	「ロートエキス」をとり，「精製水又は精製水（容器入り）」10mL を加え，加温しながらかき混ぜて軟化し，冷後，「デンプン」，「乳糖水和物」又はこれらの混合物 80g を少量ずつ加えてよく混和し，なるべく低温で乾燥し，更にその適量を追加して均質とし，粉末として製する。なお，分包散剤とする場合もある。
用法及び用量	1 回量を次のとおりとし，1 日 3 回を限度として服用する。 服用間隔は 4 時間以上おくこと。 大人（15 才以上）1 包 0.2g，11 才以上 15 才未満　大人の 2/3，8 才以上 11 才未満　大人の 1/2，5 才以上 8 才未満　大人の 1/3
効能又は効果	胃痛，腹痛，さしこみ（疝痛，癪），胃酸過多，胸やけ
貯蔵方法及び有効期間	気密容器
規格及び試験方法	日本薬局方による。
備考	ロートエキス散

【 79 】　胃腸薬 31—②

成分及び分量 又は本質	日本薬局方　ガジュツ，細末　2.0g 局　外　規　カルニチン塩化物　0.4g 賦形剤　日本薬局方　デンプン，乳糖水和物又はこれらの混合物　適　量 全　　量　3.0g
製造方法	以上をとり，散剤の製法により製する。ただし，分包散剤とする。
用法及び用量	1回量を次のとおりとし，1日3回，食前又は食後に服用する。 大人（15才以上）1包 1.0g，11才以上15才未満　大人の 2/3，8才以上11才未満　大人の 1/2，5才以上8才未満　大人の 1/3
効能又は効果	食欲不振（食欲減退），胃部・腹部膨満感，消化不良，胃弱，食べ過ぎ（過食），飲み過ぎ（過飲），胸やけ，もたれ（胃もたれ），胸つかえ，はきけ（むかつき，胃のむかつき，二日酔・悪酔のむかつき，嘔気，悪心），嘔吐
貯蔵方法及び 有効期間	気密容器
規格及び試験方法	別記のとおり。
備考	

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は灰黄褐色～灰褐色の粉末で，特異なにおいがあり，味は苦い。

確認試験　（1）　本品 5g にジエチルエーテル 50mL を加えて振り混ぜた後，ろ過する。ろ液を蒸発乾固し，残留物にエタノール（95）1mL を加えて溶かし，必要ならろ過し，試料溶液とする。別にガジュツ，細末 3g をとり，試料溶液と同様に操作して標準溶液とする。これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び標準溶液 10μL ずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲルを用いて調製した薄層板にスポットする。次にクロロホルムを展開溶媒として約 10cm 展開した後，薄層板を風乾する。これに 4-メトキシベンズアルデヒド・硫酸試液を均等に噴霧し，80℃で 2 分間加熱するとき，試料溶液から得た主スポットは，標準溶液から得た赤紫色の主スポットと色調及び *Rf* 値が等しい。

（2）　本品 1g に薄めたメタノール（1→2）5mL を加えて振り混ぜた後，ろ過し，ろ液を試料溶液とする。別にカルニチン塩化物 0.03g を薄めたメタノール（1→2）1mL に溶かし，標準溶液とする。これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び標準溶液 10μL ずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲルを用いて調製した薄層板にスポットする。次にメタノール・水・アンモニア水(28)混液（7：2：1）を展開溶媒として約 10cm 展開した後，薄層板を 80℃で 10 分間乾燥する。これに噴霧用ドラーゲンドルフ試液を均等に噴霧するとき，試料溶液から得た黄赤色のスポットは，標準溶液から得た黄赤色のスポットと色調及び *Rf* 値が等しい。

【 80 】　胃腸薬 32—②

成分及び分量又は本質	日本薬局方	オウレン末	0.8g
	〃	オウゴン末	1.2g
	〃	オウバク末	0.8g
	〃	ガジュツ，細末	3.0g
	〃	*l*-メントール	0.02g
	賦形剤　〃	デンプン，乳糖水和物又はこれらの混合物	適　量
		全　　量	6.0g
製造方法	以上をとり，散剤の製法により製する。なお，分包散剤とする場合もある。ただし分包散剤としない場合は，1回量を量り得る適当な計量器を添付するものとする。		
用法及び用量	1回量を次のとおりとし，1日3回，食前又は食間に服用する。 大人（15才以上）1包 2.0g，11才以上15才未満　大人の 2/3，8才以上11才未満　大人の 1/2，5才以上8才未満　大人の 1/3		
効能又は効果	食欲不振（食欲減退），胃部・腹部膨満感，消化不良，胃弱，食べ過ぎ（過食），飲み過ぎ（過飲），胸やけ，もたれ（胃もたれ），胸つかえ，はきけ（むかつき，胃のむかつき，二日酔・悪酔のむかつき，嘔気，悪心），嘔吐		
貯蔵方法及び有効期間	気密容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考			

規格及び試験方法

性　　状　本品は黄褐色の粉末で，ハッカのにおいがあり，味は苦い。

確認試験　（1）　本品 1g にメタノール 20mL を加えて振り混ぜた後，ろ過する。ろ液を蒸発乾固し，残留物をメタノール 1mL に溶かし，必要ならろ過し，試料溶液とする。別にベルベリン塩化物水和物 1mg をメタノール 1mL に溶かし，標準溶液とする。これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び標準溶液 5μL ずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲルを用いて調製した薄層板にスポットする。次に l-ブタノール・水・酢酸（100）混液（7：2：1）を展開溶媒として約 10cm 展開した後，薄層板を風乾する。これに紫外線（主波長 365nm）を照射するとき，試料溶液から得た数個のスポットのうち1個のスポットは，標準溶液から得た黄色～黄緑色の蛍光を発するスポットと色調及び *Rf* 値が等しい。

（2）　（1）の試料溶液を試料溶液とする。別にバイカリン 1mg をメタノール 1mL に溶かし，標準溶液とする。これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。

試料溶液及び標準溶液 5μL ずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲルを用いて調製した薄層板にスポットする。次にクロロホルム・メタノール・酢酸（100）・水混液（20：10：3：2）を展開溶媒として約 10cm 展開した後，薄層板を風乾する。これに塩化鉄(Ⅲ)メタノール溶液（1→100）を均等に噴霧するとき，試料溶液から得た数個のスポットのうち 1 個のスポットは，標準溶液から得た暗緑色のスポットと色調及び *Rf* 値が等しい。

（3）　本品 6g にジエチルエーテル 50mL を加えて振り混ぜた後，ろ過する。ろ液を蒸発乾固し，残留物をエタノール(95)1mL に溶かし，試料溶液とする。別にガジュツ，細末 3g をとり，試料溶液と同様に操作し，標準溶液とする。これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び標準溶液 10μL ずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲルを用いて調製した薄層板にスポットする。次にクロロホルムを展開溶媒として約 10cm 展開した後，薄層板を風乾する。これに 4-メトキシベンズアルデヒド・硫酸試液を均等に噴霧し，80℃で 2 分間加熱するとき，試料溶液から得た主スポットは，標準溶液から得た赤紫色の主スポットと色調及び *Rf* 値が等しい。

（4）　本品 4g に石油エーテル 10mL を加えて振り混ぜた後，ろ過する。ろ液を蒸発乾固し，残留物にエタノール（99.5）10mL を加え，更に硫酸 3mL を加えて振り混ぜるとき，液は黄赤色を呈する（メントール）。

【 81 】　胃腸薬 33

成分及び分量 又は本質	日本薬局方　トウヒチンキ　20.0mL 甘味剤　〃　単シロップ　適　量 全　量　100mL
製造方法	以上をとり，シロップ剤の製法により製する。ただし，「白糖」及び「精製水又は精製水（容器入り）」適量を用いて製することができる。 ただし，本品の容器としてプラスチック製容器を使用する場合は，当該容器は，昭和 47 年 2 月 17 日薬製第 225 号通知に適合する。
用法及び用量	大人 1 日 10mL の服用を基準とし，調剤原料として用いる。
効能又は効果	調剤原料として用いる。
貯蔵方法及び 有効期間	気密容器
規格及び試験方法	日本薬局方による。
備考	トウヒシロップ

【 82 】　胃腸薬 34—①

成分及び分量 又は本質	局　外　規　メタケイ酸アルミン酸マグネシウム　2.0g 日本薬局方　L - グルタミン　2.0g 局　外　規　銅クロロフィリンナトリウム　0.1g 賦形剤　日本薬局方　デンプン，乳糖水和物又はこれらの混合物　適　量 全　　量　4.5g
製造方法	以上をとり，散剤の製法により製する。ただし，分包散剤とする。
用法及び用量	1 回量を次のとおりとし，1 日 3 回，食前又は食間に服用する。 大人（15 才以上）1 包 1.5g，11 才以上 15 才未満　大人の 2/3，8 才以上 11 才未満　大人の 1/2，5 才以上 8 才未満　大人の 1/3
効能又は効果	胃酸過多，胸やけ，胃部不快感，胃部膨満感，もたれ（胃もたれ），胃重，胸つかえ，げっぷ（おくび），はきけ（むかつき，胃のむかつき，二日酔・悪酔のむかつき，嘔気，悪心），嘔吐，飲み過ぎ（過飲），胃痛
貯蔵方法及び 有効期間	遮光した密閉容器
規格及び試験方法	別記のとおり。
備考	

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は淡青白色の粉末である。

確認試験　（1）　本品 1.2g に薄めた硫酸（1→3）5mL を加え，白煙が発生するまで加熱し，冷後，水 20mL を加えてろ過する。ろ液にアンモニア試液を加えて中性とし，生じた沈殿をろ過する。ろ液はマグネシウム塩の定性反応（2）を呈する。残留物に希塩酸を加えて溶かした液は，アルミニウム塩の定性反応を呈する（メタケイ酸アルミン酸マグネシウム）。

（2）　本品 0.3g に水 100mL を加え，振り混ぜた後，ろ過し，ろ液 5mL にニンヒドリン試液 1mL を加え，3 分間加熱するとき，液は紫色を呈する（L - グルタミン）。

（3）　本品 0.5g にメタノール 30mL を加え，10 分間振り混ぜた後，ろ過する。ろ液を蒸発乾固し，残留物にメタノール 1mL を加えて溶かし，試料溶液とする。別に銅クロロフィリンナトリウム 5mg をメタノール 1mL に溶かし，標準溶液とする。これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び標準溶液 5 μL ずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲルを用いて調製した薄層板にスポットする。次にベンゼン・ジオキサン・酢酸（100）混液（90：25：2）を展開溶媒として約 10cm 展開した後，薄層板を風乾する。試料溶液から得た主スポットは，標準溶液から得た緑色の主スポットと色調及び *Rf* 値が等しい。

【 83 】　胃腸薬 35—①

成分及び分量又は本質		局　外　規	メタケイ酸アルミン酸マグネシウム	3.0g
		〃	アズレンスルホン酸ナトリウム	0.006g
		日本薬局方	アルジオキサ	0.3g
		〃	*l*- メントール	0.02g
	賦形剤	〃	デンプン，乳糖水和物又はこれらの混合物	適　量
			全　　量	4.5g
製造方法	以上をとり，散剤の製法により製する。ただし，分包散剤とする。			
用法及び用量	1 回量を次のとおりとし，1 日 3 回，食前又は食間に服用する。 通常，成人は 1 回量を多量の水（約 200mL）とともに服用する。 大人（15 才以上）1 包 1.5g，11 才以上 15 才未満　大人の 2/3，8 才以上 11 才未満　大人の 1/2，5 才以上 8 才未満　大人の 1/3			
効能又は効果	胃酸過多，胸やけ，胃部不快感，胃部膨満感，もたれ（胃もたれ），胃重，胸つかえ，げっぷ（おくび），はきけ（むかつき，胃のむかつき，二日酔・悪酔のむかつき，嘔気，悪心），嘔吐，飲み過ぎ（過飲），胃痛			
貯蔵方法及び有効期間	遮光した気密容器			
規格及び試験方法	別記のとおり。			
備考				

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は灰白色の粉末で，ハッカのにおいがある。

確認試験　（1）　本品 1.2g に薄めた硫酸（1→3）5mL を加え，白煙が発生するまで加熱し，冷後，水 20mL を加えてろ過する。ろ液にアンモニア試液を加えて中性とし，生じた沈殿をろ過する。ろ液はマグネシウム塩の定性反応（2）を呈する。残留物に希塩酸を加えて溶かした液はアルミニウム塩の定性反応を呈する（メタケイ酸アルミン酸マグネシウム）。

（2）　本品 8g にメタノール 30mL を加え，振り混ぜた後，ろ過する。ろ液を蒸発乾固し，残留物に水 3mL を加えて溶かした液 2mL に塩化バリウム試液 1mL を加えるとき，青色の沈殿を生じる。残りの水溶液 1mL に塩酸 0.5mL を滴加するとき，液の色はしだいに淡黄色になるか，または脱色する（アズレンスルホン酸ナトリウム）。

（3）　本品 5g に石油エーテル 10mL を加え，振り混ぜた後，ろ過する。残留物は（4）に用いる。ろ液を蒸発乾固し，残留物にエタノール（95）10mL を加えた後，硫酸 3mL を加えて振り混ぜるとき，液は黄赤色を呈する（メントール）。

（４）　（３）の残留物にエタノール(95)20mL を加え，振り混ぜた後，ろ過する。ろ液は捨て，残留物は更に水 20mL を加えて振り混ぜた後，ろ過する。残留物に希塩酸 10mL を加えて 5 分間煮沸し，これに塩化フェニルヒドラジニウム溶液（1→100）10mL を加え，冷後，ヘキサシアノ鉄（Ⅲ）酸カリウム試液 0.5mL を加えてよく混和し，更に塩酸 1mL を加えて振り混ぜるとき，液は赤色を呈する（アルジオキサ）。

【 84 】　胃腸薬 36—①

成分及び分量又は本質	日本薬局方		アルジオキサ	0.3g
	〃		ロートエキス散	0.3g
	〃		炭酸水素ナトリウム	2.0g
	〃		酸化マグネシウム	0.6g
	〃		*l*-メントール	0.02g
	賦形剤	〃	デンプン，乳糖水和物又はこれらの混合物	適　量
			全　　量	4.5g
製造方法	以上をとり，散剤の製法により製する。ただし，分包散剤とする。			
用法及び用量	1回量を次のとおりとし，1日3回，食前又は食間に服用する。 大人（15才以上）1包1.5g，11才以上15才未満　大人の2/3，8才以上11才未満　大人の1/2，5才以上8才未満　大人の1/3			
効能又は効果	胃酸過多，胸やけ，胃部不快感，胃部膨満感，もたれ（胃もたれ），胃重，胸つかえ，げっぷ（おくび），はきけ（むかつき，胃のむかつき，二日酔・悪酔のむかつき，嘔気，悪心），嘔吐，飲み過ぎ（過飲），胃痛			
貯蔵方法及び有効期間	気密容器			
規格及び試験方法	別記のとおり。			
備考				

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品はわずかに褐色を帯びた白色の粉末で，ハッカのにおいがある。

確認試験　（1）　本品5gにエタノール（95）20mLを加え，振り混ぜた後，ろ過する。残留物は（2）に用いる。ろ液10mLに硫酸3mLを加えて振り混ぜるとき，液は赤色を呈する（メントール）。

（2）　（1）の残留物に水30mLを加えて振り混ぜた後，ろ過する。残留物に希塩酸10mLを加えて5分間煮沸し，これに塩化フェニルヒドラジニウム溶液（1→100）10mLを加え，冷後，ろ過する。ろ液にヘキサシアノ鉄（Ⅲ）酸カリウム試液0.5mLを加えて混和し，更に塩酸1mLを加えて振り混ぜるとき，液は赤色を呈する（アルジオキサ）。

（3）　本品3gに水30mLを加え，振り混ぜた後，ろ過する。ろ液はナトリウム塩の定性反応及び炭酸水素塩の定性反応（1），（2）を呈する（炭酸水素ナトリウム）。

（4）　（3）の水に不溶の残留物に希塩酸10mLを加えて振り混ぜ，ろ過して得た液はマグネシウム塩の定性反応を呈する（酸化マグネシウム）。

（５）　本品 4.5g に水 30mL を加え，振り混ぜた後，ろ過する。ろ液にアンモニア試液を加えて弱アルカリ性とし，ジクロルメタン 30mL を加えて振り混ぜた後，ジクロルメタン層を分取する。この液に無水硫酸ナトリウム 3g を加えて振り混ぜた後，ろ過する。ろ液を蒸発乾固し，残留物をエタノール（95）0.5mL に溶かし，試料溶液とする。別に硫酸アトロピン 5mg をエタノール（95）3mL に溶かし，標準溶液とする。これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び標準溶液 10 μL ずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲルを用いて調製した薄層板にスポットする。次にクロロホルム・メタノール・アセトン・アンモニア水（28）混液（73：15：10：2）を展開溶媒として約 10cm 展開した後，薄層板を 80℃で 10 分間乾燥する。これに噴霧用ドラーゲンドルフ試液を均等に噴霧するとき，試料溶液から得た数個のスポットのうち 1 個のスポットは，標準溶液から得た黄赤色のスポットと色調及び *Rf* 値が等しい。

【 85 】　胃腸薬 37—①

成分及び分量 又 は 本 質	日本薬局方　カンゾウ末　1.5g 局　外　規　メタケイ酸アルミン酸マグネシウム　3.0g 全　　量　4.5g
製 造 方 法	以上をとり，散剤の製法により製する。なお，分包散剤とする場合もある。ただし分包散剤としない場合は，1回量を量り得る適当なさじを添付するものとする。
用法及び用量	1回量を次のとおりとし，1日3回，食前又は食間に服用する。 大人（15才以上）1包1.5g，11才以上15才未満　大人の2/3，8才以上11才未満　大人の1/2，5才以上8才未満　大人の1/3
効能又は効果	胃酸過多，胸やけ，胃部不快感，胃部膨満感，もたれ（胃もたれ），胃重，胸つかえ，げっぷ（おくび），はきけ（むかつき，胃のむかつき，二日酔・悪酔のむかつき，嘔気，悪心），嘔吐，飲み過ぎ（過飲），胃痛
貯蔵方法及び 有 効 期 間	密閉容器
規格及び試験方法	別記のとおり。
備　　考	

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は淡黄褐色の粉末で，味は甘い。

確認試験　（1）　本品0.8gに薄めた硫酸（1→3）5mLを加え，白煙が発生するまで加熱し，冷後，水20mLを加えてろ過する。ろ液にアンモニア試液を加えて中性とし，生じた沈殿をろ過する。ろ液はマグネシウム塩の定性反応（2）を呈する。残留物に希塩酸を加えて溶かした液はアルミニウム塩の定性反応（2）を呈する（メタケイ酸アルミン酸マグネシウム）。

（2）　本品1gにメタノール5mLを加えて振り混ぜた後，ろ過し，ろ液を試料溶液とする。別にグリチルリチン酸5mgをメタノール2mLに溶かし，標準溶液とする。これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液10μL及び標準溶液2μLを薄層クロマトグラフ用シリカゲル（蛍光剤入り）を用いて調製した薄層板にスポットする。次にl-ブタノール・水・酢酸（100）混液（7：2：1）を展開溶媒として約10cm展開した後，薄層板を風乾する。これに紫外線（主波長254nm）を照射するとき，試料溶液から得た数個のスポットのうち1個のスポットは，標準溶液から得た暗紫色のスポットと色調及び*Rf*値が等しい。

【 86 】　胃腸薬 38—①

成分及び分量又は本質		ミヤ BM 細粒	3.0g
	日本薬局方	乾燥酵母	3.0g
	〃	リン酸水素カルシウム水和物	1.0g
	賦形剤　〃	デンプン，乳糖水和物又はこれらの混合物	適　量
		全　　量	7.5g
製造方法	以上をとり，散剤の製法により，用時製する。なお，分包散剤とする場合もある。ただし分包散剤としない場合は，1 回量を量り得る適当なさじを添付するものとする。		
用法及び用量	1 回量を次のとおりとし，1 日 3 回，食後に服用する。 大人（15 才以上）1 包 2.5g，11 才以上 15 才未満　大人の 2/3，8 才以上 11 才未満　大人の 1/2，5 才以上 8 才未満　大人の 1/3，3 才以上 5 才未満　大人の 1/4，1 才以上 3 才未満　大人の 1/5，3 カ月以上 1 才未満　大人の 1/10		
効能又は効果	整腸（便通を整える），腹部膨満感，軟便，便秘		
貯蔵方法及び有効期間	気密容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考			

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は淡黄白色の粉末で，特異なにおい及び味がある。

確認試験　（1）　本品 0.8g に希塩酸 5mL を加え，70℃で 1～2 分間加温した後，ろ過する。ろ液にモリブデン酸アンモニウム試液 2mL を加えるとき，黄色の沈殿を生じる（リン酸水素カルシウム水和物）。

（2）　本品 1.5g に希塩酸 1mL 及び水 20mL を加え，10 分間振り混ぜた後，ろ過する。ろ液に酢酸・酢酸ナトリウム試液 5mL 及び酵素試液 1mL を加え，45～50℃で 2 時間放置した後，この液 5mL に水酸化ナトリウム試液 2.5mL 及びヘキサシアノ鉄(Ⅲ)酸カリウム試液 0.5mL を加え，次にイソブタノール 5mL を加え，2 分間激しく振り混ぜて放置し，紫外線（主波長 365nm）下で観察するとき，イソブタノール層は青紫色の蛍光を発する。この蛍光は酸性にすると消え，アルカリ性に戻すと再び現れる（乾燥酵母）。

【 87 】　外用痔疾用薬 1

成分及び分量 又は本質	日本薬局方	ジブカイン塩酸塩	0.1g
	〃	タンニン酸	1.0g
	基剤　薬添規	ハードファット又は適当な基剤	適　量
		全　　量	15g
製造方法	以上をとり，坐剤の製法により製し，10 個とする。		
用法及び用量	成人 1 回 1 個，1 日 3 回を限度とし，直腸内に挿入する。		
効能又は効果	きれ痔・いぼ痔の痛み，かゆみ，はれ，出血の緩和		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考			

規 格 及 び 試 験 方 法

本品は定量するとき，ジブカイン塩酸塩（$C_{20}H_{29}N_3O_2$・HCl：379.93）0.60～0.73%を含む。

性　　状　本品は褐色の坐剤である。

確認試験　（1）　本品 1 個をとり，ヘキサン 20mL を加え，40℃に加温して溶かす。冷後，水 10mL を加えて振り混ぜ，水層を分取する。これをろ過し，ろ液を試料溶液とする。別にジブカイン塩酸塩 5mg を水 8mL に溶かし，標準溶液とする。これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び標準溶液 3μL ずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲル（蛍光剤入り）を用いて調製した薄層板にスポットする。次に酢酸エチル・エタノール（99.5）・アンモニア水（28）混液（50：5：1）を展開溶媒として約 10cm 展開した後，薄層板を風乾する。これに紫外線（主波長 254nm）を照射するとき，試料溶液から得たスポットは標準溶液から得たスポットと色調及び *Rf* 値が等しい。

（2）　（1）の水層 1mL に塩化鉄（Ⅲ）試液 1 滴を加えるとき，液は青黒色を呈し，放置するとき，青黒色の沈澱を生じる（タンニン酸）。

定 量 法　本品 10 個をとり，その重量を精密に量り，注意して細片とし，均一に混和する。その約 1.2g を精密に量り，テトラヒドロフラン 40mL を加え，40℃に加温し，振り混ぜて溶かし，冷後，更にテトラヒドロフランを加えて正確に 50mL とする。この液 5mL を正確に量り，内標準溶液 5mL を正確に加え，更にメタノールを加えて 50mL とする。この液を 30 分間氷冷した後，ろ過し，初めのろ液 10mL を除き，次のろ液を試料溶液とする。別に定量用ジブカイン塩酸塩約 0.04g を精密に量り，テトラヒドロフランに溶かし，正確に 25mL とする。この液 5mL を正確に量り，テトラヒドロフランを加えて正確に 50mL とする。この液 5mL を正確に量り，内標準溶液 5mL を正確に加え，更にメタノールを加えて 50mL とし，標準溶液とする。試料溶液及び標準溶液 10μL につき，次の

条件で液体クロマトグラフ法により試験を行い，内標準物質のピーク面積に対するジブカイン塩酸塩のピーク面積の比 Q_T 及び Q_S を求める。

ジブカイン塩酸塩（$C_{20}H_{29}N_3O_2$・HCl）の量（mg）

＝定量用ジブカイン塩酸塩の量（mg）$\times\frac{Q_T}{Q_S}\times\frac{1}{5}$

内標準溶液　パラオキシ安息香酸ヘキシルのメタノール溶液（1→6000）

操作条件

検出器：紫外吸光光度計（測定波長：240nm）

カラム：内径約 4mm，長さ 15～25cm のステンレス管に 5～10μm のオクタデシルシリル化シリカゲルを充てんする。

カラム温度：40℃付近の一定温度

移動相：ドデシル硫酸ナトリウム 3g を薄めたリン酸（1→1000）に溶かして 1000mL とする。この液 270mL にメタノール 730mL を加える。

流量：ジブカイン塩酸塩の保持時間が約 10 分になるように調整する。

カラムの選定：標準溶液 10μL につき，上記の条件で操作するとき，パラオキシ安息香酸ヘキシル，ジブカイン塩酸塩の順に溶出し，それぞれのピークが完全に分離するものを用いる。

【 88 】　外用痔疾用薬 2

成分及び分量 又は本質	日本薬局方	ジブカイン塩酸塩	0.1g
	〃	ヒドロコルチゾン酢酸エステル	0.05g
	基剤　薬添規	ハードファット又は適当な基剤	適　量
		全　　量	15g
製造方法	以上をとり，坐剤の製法により製し，10 個とする。		
用法及び用量	成人 1 回 1 個，1 日 3 回を限度とし，直腸内に挿入する。		
効能又は効果	きれ痔・いぼ痔の痛み，かゆみ，はれ，出血の緩和		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考			

規 格 及 び 試 験 方 法

本品は定量するとき，ジブカイン塩酸塩（$C_{20}H_{29}N_3O_2$・HCl：379.93）0.60～0.73%，ヒドロコルチゾン酢酸エステル（$C_{23}H_{32}O_6$：404.50）0.30～0.37%を含む。

性　　状　本品は白色の坐剤である。

確認試験　（1）　本品 1 個をとり，ヘキサン 20mL を加え，40℃に加温して溶かす。冷後，水 10mL を加えて振り混ぜ，水層を分取する。これをろ過し，ろ液を試料溶液とする。別にジブカイン塩酸塩 5mg を水 8mL に溶かし，標準溶液とする。これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び標準溶液 3μL ずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲル（蛍光剤入り）を用いて調製した薄層板にスポットする。次に酢酸エチル・エタノール（99.5）・アンモニア水(28)混液（50：5：1）を展開溶媒として約 10cm 展開した後，薄層板を風乾する。これに紫外線（主波長 254nm）を照射するとき，試料溶液から得たスポットは標準溶液から得たスポットと色調及び *Rf* 値が等しい。

（2）　本品 1 個をとり，テトラヒドロフラン 5mL を加え，40℃に加温し，振り混ぜて溶かす。冷後，メタノール 5mL を加え，30 分間氷冷した後，ろ過し，ろ液を試料溶液とする。別にヒドロコルチゾン酢酸エステル 2mg をメタノール 4mL に溶かし，標準溶液とする。これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び標準溶液 5μL ずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲル（蛍光剤入り）を用いて調製した薄層板にスポットする。次にジクロルメタン・ジエチルエーテル・メタノール・水混液（160：30：8：1）を展開溶媒として約 10cm 展開した後，薄層板を風乾する。これに紫外線（主波長 254nm）を照射するとき，試料溶液から得たスポットは標準溶液から得たスポットと色調及び *Rf* 値が等しい。また，この薄層板にアルカリ性ブルーテトラゾリウム試液を均等に噴霧するとき，標準溶液から得たスポット及びそれに対応する位置の試料溶液から得たスポットは，紫色を呈する。

定 量 法　本品 10 個をとり，その重量を精密に量り，注意して細片とし，均一に混和する。その約 1.2g を精密に量り，テトラヒドロフラン 40mL を加え，40℃に加温し，振り混ぜて溶かし，冷後，更にテトラヒドロフランを加えて正確に 50mL とする。この液 5mL を正確に量り，内標準溶液 5mL を正確に加え，更にメタノールを加えて 50mL とする。この液を 30 分間氷冷した後，ろ過し，初めのろ液 10mL を除き，次のろ液を試料溶液とする。別に定量用ジブカイン塩酸塩約 0.04g 及び定量用ヒドロコルチゾン酢酸エステル約 0.02g をそれぞれ精密に量り，テトラヒドロフランに溶かし，正確に 25mL とする。この液 5mL を正確に量り，テトラヒドロフランを加えて正確に 50mL とする。この液 5mL を正確に量り，内標準溶液 5mL を正確に加え，更にメタノールを加えて 50mL とし，標準溶液とする。試料溶液及び標準溶液 10 μ L につき，次の条件で液体クロマトグラフ法により試験を行い，内標準物質のピーク面積に対するジブカイン塩酸塩及びヒドロコルチゾン酢酸エステルのピーク面積の比 Q_{Ta}，Q_{Tb}，Q_{Sa} 及び Q_{Sb} を求める。

ジブカイン塩酸塩（$C_{20}H_{29}N_3O_2$・HCl）の量（mg）

＝定量用ジブカイン塩酸塩の量（mg）$\times\dfrac{Q_{\mathrm{Ta}}}{Q_{\mathrm{Sa}}}\times\dfrac{1}{5}$

ヒドロコルチゾン酢酸エステル（$C_{23}H_{32}O_6$）の量（mg）

＝定量用ヒドロコルチゾン酢酸エステルの量（mg）$\times\dfrac{Q_{\mathrm{Tb}}}{Q_{\mathrm{Sb}}}\times\dfrac{1}{5}$

内標準溶液　パラオキシ安息香酸ヘキシルのメタノール溶液（1→6000）

操作条件

検出器：紫外吸光光度計（測定波長：240nm）

カラム：内径約 4mm，長さ 15～25cm のステンレス管に 5～10μm のオクタデシルシリル化シリカゲルを充てんする。

カラム温度：40℃付近の一定温度

移動相：ドデシル硫酸ナトリウム 3g を薄めたリン酸（1→1000）に溶かして 1000mL とする。この液 270mL にメタノール 730mL を加える。

流量：ジブカイン塩酸塩の保持時間が約 10 分になるように調整する。

カラムの選定：標準溶液 10μL につき，上記の条件で操作するとき，ヒドロコルチゾン酢酸エステル，パラオキシ安息香酸ヘキシル，ジブカイン塩酸塩の順に溶出し，それぞれのピークが完全に分離するものを用いる。

【 89 】　外用痔疾用薬 3

成分及び分量 又は本質		日本薬局方	ジブカイン塩酸塩	0.5g
		〃	ヒドロコルチゾン酢酸エステル	0.5g
		〃	タンニン酸	5.0g
		〃	トコフェロール酢酸エステル	3.0g
		局外規	クロタミトン	5.0g
	基剤	薬添規	ゲル化炭化水素	適量
			全量	100g
製造方法	以上をとり，軟膏剤の製法により製する。			
用法及び用量	1日1～3回，適量を患部に塗布するか，ガーゼ又はリント布などにのばして貼付する。			
効能又は効果	きれ痔・いぼ痔の痛み，かゆみ，はれ，出血，ただれの緩和			
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器			
規格及び試験方法	別記のとおり。			
備考				

規格及び試験方法

本品は定量するとき，ジブカイン塩酸塩（$C_{20}H_{29}N_3O_2$・HCl：379.93）0.45～0.55%，ヒドロコルチゾン酢酸エステル（$C_{23}H_{32}O_6$：404.50）0.45～0.55%，クロタミトン（$C_{13}H_{17}NO$：203.28）4.5～5.5%，トコフェロール酢酸エステル（$C_{31}H_{52}O_3$：472.75）2.7～3.3%を含む。

性　　状　本品は褐色の軟膏剤である。

確認試験　（1）　本品 0.5g にテトラヒドロフラン 5mL を加えてかき混ぜた後，ろ過し，ろ液を試料溶液とする。別にジブカイン塩酸塩 2mg をメタノール 4mL に溶かし，標準溶液（1）とする。クロタミトン 0.02g をメタノール 4mL に溶かし，標準溶液（2）とする。トコフェロール酢酸エステル 0.015g をエタノール(99.5)5mL に溶かし，標準溶液（3）とする。これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び標準溶液 3μL ずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲル（蛍光剤入り）を用いて調製した薄層板にスポットする。次に酢酸エチル・エタノール（99.5）・アンモニア水(28)混液（50：5：1）を展開溶媒として約 10cm 展開した後，薄層板を風乾する。これに紫外線（主波長 254nm）を照射するとき，試料溶液から得た 3 個のスポットは標準溶液（1），標準溶液（2）及び標準溶液（3）から得たそれぞれのスポットと色調及び *Rf* 値が等しい。また，紫外線（主波長 365nm）を照射するとき，標準溶液（1）から得たスポット及びそれに対応する位置の試料溶液から得たスポットは青色の蛍光を発する。

（２）　（１）の試料溶液を試料溶液とする。別にヒドロコルチゾン酢酸エステル 2mg をメタノール 4mL に溶かし，標準溶液とする。これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び標準溶液 2μL ずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲル（蛍光剤入り）を用いて調製した薄層板にスポットする。次にジクロルメタン・ジエチルエーテル・メタノール・水混液（160：30：8：1）を展開溶媒として約 10cm 展開した後，薄層板を風乾する。これに紫外線（主波長 254nm）を照射するとき，試料溶液から得たスポットは標準溶液から得たスポットと色調及び *Rf* 値が等しい。また，この薄層板にアルカリ性ブルーテトラゾリウム試液を均等に噴霧するとき，標準溶液から得たスポット及びそれに対応する位置の試料溶液から得たスポットは，紫色を呈する。

（３）　（１）の試料溶液 1mL に塩化鉄（Ⅲ）試液 1 滴を加えるとき，液は青黒色を呈し，放置するとき，青黒色の沈殿を生じる（タンニン酸）。

定 量 法　（１）　本品約 1.0g を精密に量り，テトラヒドロフラン 30mL を加えて振り混ぜた後，メタノールを加えて 50mL とする。この液をろ過し，初めのろ液 10mL を除き，次のろ液 5mL を正確に量り，内標準溶液 3mL を正確に加え，更にメタノールを加えて 25mL とし，試料溶液とする。別に定量用ジブカイン塩酸塩約 0.02g を精密に量り，メタノールを加えて，正確に 20mL とする。この液 2mL を正確に量り，メタノールに溶かし，正確に 20mL とする。この液 5mL を正確に量り，内標準溶液 3mL を正確に加え，更にメタノールを加えて 25mL とし，標準溶液とする。試料溶液及び標準溶液 10μL につき，次の条件で液体クロマトグラフ法により試験を行い，内標準物質のピーク面積に対するジブカイン塩酸塩のピーク面積の比 Q_T 及び Q_S を求める。

ジブカイン塩酸塩（$C_{20}H_{29}N_3O_2$・HCl）の量（mg）

＝定量用ジブカイン塩酸塩の量（mg）$\times\frac{Q_T}{Q_S}\times\frac{1}{4}$

内標準溶液　パラオキシ安息香酸ヘキシルのメタノール溶液（1→6000）

操作条件

検出器：紫外吸光光度計（測定波長：240nm）

カラム：内径約 4mm，長さ 15～25cm のステンレス管に 5～10μm のオクタデシルシリル化シリカゲルを充てんする。

カラム温度：40℃付近の一定温度

移動相：ドデシル硫酸ナトリウム 3g を薄めたリン酸（1→1000）に溶かして 1000mL とする。この液 270mL にメタノール 730mL を加える。

流量：ジブカイン塩酸塩の保持時間が約 10 分になるように調整する。

カラムの選定：標準溶液 10μL につき，上記の条件で操作するとき，パラオキシ安息香酸ヘキシル，ジブカイン塩酸塩の順に溶出し，それぞれのピークが完全に分離するものを用いる。

（２）　本品約 1.0g を精密に量り，テトラヒドロフラン 30mL を加えて振り混ぜた後，メタノールを加えて 50mL とする。この液をろ過し，初めのろ液 10mL を除き，次のろ液 5mL を正確に量り，内標準溶液 5mL を正確に加え，更にメタノールを加えて 50mL とし，試料溶液とする。別に定量用ヒドロコルチゾン酢酸エステル約 0.01g を精密に量り，メタノールに溶かし，正確に 25mL とする。この液 5mL を正確に量り，メタノールを加えて正確に 20mL とする。この液 5mL を正確に量り，内標準溶液 5mL を正確に加え，更にメタノールを加えて 50mL とし，標準溶液とする。試料溶液及び標準溶液 10μL につ

き，次の条件で液体クロマトグラフ法により試験を行い，内標準物質のピーク面積に対するヒドロコルチゾン酢酸エステルのピーク面積の比 Q_T 及び Q_S を求める。

ヒドロコルチゾン酢酸エステル（$C_{23}H_{32}O_6$）の量（mg）

＝定量用ヒドロコルチゾン酢酸エステルの量（mg）$\times\frac{Q_T}{Q_S}\times\frac{1}{2}$

内標準溶液　フタル酸ジメチルのメタノール溶液（1→10000）

操作条件

検出器：紫外吸光光度計（測定波長：240nm）

カラム：内径約 4mm，長さ 15～25cm のステンレス管に 5～10μm のオクタデシルシリル化シリカゲルを充てんする。

カラム温度：40℃付近の一定温度

移動相：薄めたリン酸（1→1000）・アセトニトリル混液（65：35）

流量：ヒドロコルチゾン酢酸エステルの保持時間が約 10 分になるように調整する。

カラムの選定：標準溶液 10μL につき，上記の条件で操作するとき，フタル酸ジメチル，ヒドロコルチゾン酢酸エステルの順に溶出し，それぞれのピークが完全に分離するものを用いる。

（3）　本品約 1.0g を精密に量り，テトラヒドロフラン 30mL を加えて振り混ぜた後，メタノールを加えて正確に 50mL とする。この液をろ過し，初めのろ液 10mL を除き，次のろ液 5mL を正確に量り，メタノールを加えて正確に 25mL とする。この液 5mL を正確に量り，内標準溶液 5mL を正確に加え，更にメタノールを加えて 50mL とし，試料溶液とする。別に定量用クロタミトン約 0.05g を精密に量り，メタノールに溶かし，正確に 50mL とする。この液 5mL を正確に量り，メタノールを加えて正確に 25mL とする。この液 5mL を正確に量り，内標準溶液 5mL を正確に加え，更にメタノールを加えて 50mL とし，標準溶液とする。試料溶液及び標準溶液 10μL につき，次の条件で液体クロマトグラフ法により試験を行い，内標準物質のピーク面積に対するクロタミトンのピーク面積の比 Q_T 及び Q_S を求める。

クロタミトン（$C_{13}H_{17}NO$）の量（mg）

＝定量用クロタミトンの量（mg）$\times\frac{Q_T}{Q_S}$

内標準溶液　*p* - トルイル酸エチルのメタノール溶液（1→7500）

操作条件

検出器：紫外吸光光度計（測定波長：254nm）

カラム：内径約 4mm，長さ 15～25cm のステンレス管に 5～10μm のオクタデシルシリル化シリカゲルを充てんする。

カラム温度：40℃付近の一定温度

移動相：メタノール・水混液（6：4）

流量：クロタミトンの保持時間が約 10 分になるように調整する。

カラムの選定：標準溶液 10μL につき，上記の条件で操作するとき，トルイル酸エチル，クロタミトンの順に溶出し，それぞれのピークが完全に分離するものを用いる。

（4）　本品約 1.0g を精密に量り，テトラヒドロフラン 30mL を加えて振り混ぜた後，メタノールを加えて正確に 50mL とする。この液をろ過し，初めのろ液 10mL を除き，次のろ液 5mL を正確に量り，内標準溶液 5mL を正確に加え，更にメタノールを加えて 25mL とし，試料溶液とする。別にトコフェロール酢酸エステル標準品約 0.03g を精密に量り，メタノールに溶かして正確に 50mL とする。この液 5mL を正確に量り，内標準溶液 5mL を正確に加えた後，メタノールを加えて 25mL とし，標準溶液とする。試料溶液及び標準溶液 10 μ L につき，次の条件で液体クロマトグラフ法により試験を行い，内標準物質のピーク面積に対するトコフェロール酢酸エステルのピーク面積の比 Q_T 及び Q_S を求める。

トコフェロール酢酸エステル（$C_{31}H_{52}O_3$）の量（mg）

＝トコフェロール酢酸エステル標準品の量（mg）$\times \frac{Q_T}{Q_S}$

内標準溶液　ビタミン K_1 のメタノール溶液（1→5000）（遮光容器）

操作条件

検出器：紫外吸光光度計（測定波長：280nm）

カラム：内径約 4mm，長さ 15～25cm のステンレス管に 5～10μm のオクタデシルシリル化シリカゲルを充てんする。

カラム温度：40℃付近の一定温度

移動相：メタノール

流量：トコフェロール酢酸エステルの保持時間が約 7 分になるように調整する。

カラムの選定：標準溶液 10μL につき，上記の条件で操作するとき，トコフェロール酢酸エステル，ビタミン K_1 の順に溶出し，それぞれピークが完全に分離するものを用いる。

【 90 】　外皮用薬 1

成分及び分量 又は本質	日本薬局方　ベンザルコニウム塩化物　10.0g 溶剤　〃　常水又は精製水又は精製水（容器入り）　適量 全量　100mL
製造方法	「ベンザルコニウム塩化物」をとり，「常水」又は「精製水又は精製水（容器入り）」に溶かして製する。ただし，濃厚な「ベンザルコニウム塩化物液」をとり，「常水」又は「精製水」又は「精製水(容器入り)」で薄めて製することができる。
用法及び用量	次のように水で希釈して，塗布又は洗浄する。 手指・創傷面の殺菌・消毒：ベンザルコニウム塩化物として　0.1% 含嗽：ベンザルコニウム塩化物として　0.005～0.01%
効能又は効果	手指・創傷面の殺菌・消毒 口腔内の殺菌・消毒
貯蔵方法及び 有効期間	遮光した気密容器
規格及び試験方法	日本薬局方による。
備考	ベンザルコニウム塩化物液

【 91 】　外皮用薬 2

成分及び分量 又は本質	日本薬局方　ベンゼトニウム塩化物　10.0g 溶　剤　〃　常水又は精製水又は精製水（容器入り）　適　量 全　量　100mL
製造方法	「ベンゼトニウム塩化物」をとり，「常水」又は「精製水又は精製水（容器入り）」に溶かして製する。
用法及び用量	次のように水で希釈して，塗布又は洗浄する。 手指・創傷面の殺菌・消毒：ベンゼトニウム塩化物として　0.1% 含嗽：ベンゼトニウム塩化物として　0.0025～0.005%
効能又は効果	手指・創傷面の殺菌・消毒 口腔内の殺菌・消毒
貯蔵方法及び 有効期間	遮光した気密容器
規格及び試験方法	日本薬局方による。
備考	ベンゼトニウム塩化物液

【 92 】　外皮用薬 3

成分及び分量 又は本質	日本薬局方　アクリノール水和物　0.2g 溶剤　〃　精製水又は精製水（容器入り）　適量 全量　100mL
製造方法	以上をとり，溶解混和して製する。
用法及び用量	適宜，患部に塗布するか，又はガーゼなどに浸し，患部に貼布する。
効能又は効果	創傷面の殺菌・消毒
貯蔵方法及び 有効期間	遮光した気密容器
規格及び試験方法	別記のとおり。
備考	

規 格 及 び 試 験 方 法

本品は定量するとき，アクリノール水和物（$C_{15}H_{15}N_3O.\ C_3H_6O_3.\ H_2O$：361.40）0.18～0.22%を含む。

性　　状　本品は淡黄色の液である。

確認試験　（1）　本品 10mL に，ヨウ素試液 2 滴を加えるとき，青緑色の沈殿を生じ，これにエタノール(95)を加えるとき，沈殿は溶ける（アクリノール水和物）。

（2）　本品 5mL に，亜硝酸ナトリウム試液及び希塩酸 2 滴ずつを加えるとき，液は暗赤色を呈する（アクリノール水和物）。

（3）　本品 5mL に，希硫酸 5mL を加えてよく振り混ぜ，室温で 10 分間放置した後，ろ過する。ろ液は乳酸塩の定性反応を呈する（アクリノール水和物）。

定 量 法　本品 100mL を正確に量り，200mL のメスフラスコに入れ，酢酸ナトリウム試液 20mL 及び希塩酸 1.25mL を加え，更に正確に 1/30mol/L 二クロム酸カリウム液 50mL を加え，水を加えて 200mL とし，しばしば振り混ぜて 1 時間放置した後，ろ過する。初めのろ液 20mL を除き，次のろ液 100mL を正確に量り，ヨウ素びんに入れ，希硫酸 30mL 及びヨウ化カリウム試液 6mL を加え，直ちに密せんし，5 分間暗所に放置した後，水 50mL を加え，遊離したヨウ素を 0.1mol/L チオ硫酸ナトリウム液で滴定する（指示薬：デンプン試液 3mL）。同様の方法で空試験を行う。

1/30mol/L 二クロム酸カリウム液 1mL＝12.047mg　$C_{15}H_{15}N_3O.C_3H_6O_3.H_2O$

【 93 】　欠　　番

【 94 】　外皮用薬 5

成分及び分量 又は本質	日本薬局方　クレゾール石ケン液　3.0mL 溶剤　〃　常水又は精製水又は精製水（容器入り）　適量 全量　100mL
製造方法	以上をとり，混和して製する。
用法及び用量	手指の殺菌の場合：2～10 倍に希釈して用いる。 便所等の殺菌・消毒には原液を用いる。
効能又は効果	手指の殺菌・消毒 便所，便器，ごみ箱，たんつぼ，浄化槽等，疾病の予防のために必要と思われる場所の殺菌・消毒
貯蔵方法及び 有効期間	気密容器
規格及び試験方法	日本薬局方による。
備考	クレゾール水

【 95 】　外皮用薬 6

成分及び分量 又は本質	日本薬局方	ヨウ素	3.0g
	溶剤　〃	ヨウ化カリウム	2.0g
	〃　別紙規格	70vol%エタノール	適　量
		全　量	100mL
製造方法	以上をとり，酒精剤の製法により製する。ただし，「エタノール」及び「精製水又は精製水（容器入り）」適量を用いて製することができる。また，「ヨードチンキ」50mL をとり，70vol%エタノールを加えて全量を 100mL として製することができる。		
用法及び用量	適宜，患部に塗布する。		
効能又は効果	創傷面の殺菌・消毒		
貯蔵方法及び有効期間	気密容器		
規格及び試験方法	日本薬局方による。		
備考	希ヨードチンキ		

別紙規格　　**70vol%エタノールの規格及び試験方法**

本品は 15℃でエタノール（C_2H_6O：46.07）67.7～72.6vol%を含む（比重による）。

製　法

エタノール	735mL
精製水又は精製水（容器入り）	適　量
全　量	1000mL

以上をとり，混和して製する。

性　状　本品は無色澄明の液で，特異なにおい及びやくような味がある。

本品は水と混和する。

本品は点火するとき，淡青色の炎をあげて燃える。

確認試験　「エタノール」の確認試験を準用する。

比　重　d_{15}^{15}：0.884～0.896

純度試験　「エタノール」の純度試験を準用する。

貯　法　遮光した気密容器に入れ，火気をさけて保存する。

【 96 】　外皮用薬 7

成分及び分量 又は本質	日本薬局方　エタノール　83.0mL 溶剤　〃　精製水又は精製水（容器入り）　適量 全量　100mL
製造方法	以上をとり，混和して製する。
用法及び用量	適宜，患部に塗布する。
効能又は効果	皮膚及び創傷面の殺菌・消毒
貯蔵方法及び 有効期間	遮光した気密容器に入れ，火気を避けて保存する。
規格及び試験方法	日本薬局方による。
備考	消毒用エタノール

【 97 】　外皮用薬 8—②

成分及び分量 又は本質	日本薬局方	アクリノール水和物	0.1g
	〃	ハチミツ	50.0g
	〃	グリセリン	49.9g
		全　量	100g
製造方法	以上をとり，溶解混和して製する。		
用法及び用量	適宜，患部に塗布する。		
効能又は効果	口角びらん，口唇のひびわれ，ただれ，舌炎		
貯蔵方法及び有効期間	遮光した気密容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考			

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は黄色の粘稠性の液である。

確認試験　本品 1g に水 10mL を加えて溶かし，ヨウ素試液 3 滴を加えて加熱するとき，青緑色の沈殿を生じ，これにエタノール（95）を加えるとき，沈殿は溶ける（アクリノール水和物）。

【 98 】　外皮用薬 9—①

成分及び分量又は本質	別紙規格	塩化アルミニウム（Ⅲ）六水和物	20.0g
	日本薬局方	ベンザルコニウム塩化物	0.02g
	溶剤　〃	精製水又は精製水（容器入り）	適量
		全量	100mL
製造方法	以上をとり，溶解混和して製する。ただし，濃厚な「ベンザルコニウム塩化物液」をとり，「精製水」又は「精製水(容器入り)」で薄めて製することができる。		
用法及び用量	必要に応じ，適宜患部に塗擦する。		
効能又は効果	皮膚の殺菌・消毒		
貯蔵方法及び有効期間	遮光した気密容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考			

規 格 及 び 試 験 方 法

本品を定量するとき，塩化アルミニウム（Ⅲ）六水和物（$AlCl_3.6H_2O$：241.43）18～22w/v%を含む。

性　　状　本品は無色透明な液体である。

確認試験　本品 2mL をとり，水 8mL を加えて振り混ぜる。この液はアルミニウム塩の定性反応を呈する（塩化アルミニウム（Ⅲ）六水和物)。

定 量 法　本品 10mL を正確に量り，水を加えて正確に 200mL とする。この液 20mL を正確に量り，0.05mol/L エチレンジアミン四酢酸二ナトリウム液 30mL を正確に加え，pH4.8 の酢酸・酢酸アンモニウム緩衝液 20mL を加えた後，5 分間煮沸し，冷後，エタノール（95）55mL を加え，0.05mol/L 酢酸亜鉛液で滴定する（指示薬：ジチゾン試液 2mL)。

ただし，滴定の終点は液の暗緑色が淡紅色に変わるときとする。同様の方法で空試験を行う。

0.05mol/L エチレンジアミン四酢酸二ナトリウム液 1mL＝12.0715mg　$AlCl_3.6H_2O$

別紙規格　　**塩化アルミニウム（Ⅲ）六水和物の規格及び試験方法**

本品は，定量するとき，塩化アルミニウム（Ⅲ）六水和物（$AlCl_3.6H_2O$：241.43）97%以上を含む。

性　　状　本品は，白色～帯黄白色の結晶性の粉末で，においはないか，又はわずかに特異なにおいがある。

確認試験　本品の水溶液（1→20）は，アルミニウム塩及び塩化物の定性反応を呈する。

純度試験　**（１）**　溶状　本品 1.0g に水 20mL を加えて溶かすとき，液は，無色澄明である。

（２）　酸　本品 2.0g に水 30mL を加えて溶かし，フッ化ナトリウム試液 50mL を加え，3 時間放置した後，ろ過する。ろ液 40mL に 0.1mol/L 水酸化ナトリウム液 0.60mL を加えるとき，液は紅色を呈する。

（３）　硫酸塩　本品 1.0g に水 30mL を加えて溶かし，エタノール（95）3mL，希塩酸 1mL 及び水を加えて 50mL とし，これを試験溶液として試験を行うとき，その限度は，0.0096%以下である。ただし，比較液には，0.005mol/L 硫酸 0.20mL 及びエタノール（95）3mL をとり，放置時間は，30 分間とする。

（４）　ヒ素　本品 1.0g に水 5mL を加えて溶かし，これを試験溶液として試験を行うとき，その限度は，2ppm 以下である。

定 量 法　本品約 1g を精密に量り，水を加えて溶かし，250mL とする。この液 25mL をとり，0.01mol/L エデト酸二ナトリウム液 50mL を加えて 3 分間煮沸する。冷後，1mol/L 酢酸アンモニウム試液及び希酢酸の等容量混液 10mL，エタノール（95）85mL 及びジチゾン・エタノール（95）溶液（1→4000）3mL を加えて 0.01mol/L 酢酸亜鉛液で滴定する。ただし，滴定の終点は，液の灰褐色が紅色に変わる点とする。同様の方法で空試験を行う。

0.01mol/L エデト酸二ナトリウム液 1mL＝2.4143mg　$AlCl_3 . 6H_2O$

【 99 】　欠　　番

【 100 】　外皮用薬 11—①

成分及び分量 又は本質	日本薬局方　レチノールパルミチン酸エステル　0.067g （ビタミンAとして 1g 中 150 万 I.U.含有） 〃　トコフェロール酢酸エステル　0.5g 基剤　薬添規　ゲル化炭化水素　適量 全量　100g
製造方法	以上をとり，軟膏剤の製法により製する。
用法及び用量	適宜，患部に塗布する。
効能又は効果	ひじ・ひざ・かかとのあれ，指先・手のひらのあれ ひび，しもやけ，あかぎれ
貯蔵方法及び 有効期間	遮光した気密容器
規格及び試験方法	別記のとおり。
備考	

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は微黄白色である。

確認試験　（1）　本品 0.5g にクロロホルム 15mL を加えてよくかき混ぜた後，ろ過する。ろ液 1mL をとり，塩化アンチモン（Ⅲ）試液 3mL を加えるとき，液は直ちに青色となるが，この色は速やかに退色する（ビタミンA）。

（2）　本品 2g にエタノール（95）10mL を加えてよくかき混ぜた後，上澄液をとり，硝酸 2mL を加えてろ過する。ろ液を 75℃で 15 分間加熱するとき，液はだいだい色を呈する（トコフェロール酢酸エステル）。

【 101 】　外皮用薬 12

成分及び分量 又は本質	日本薬局方　アクリノール水和物，微末　1.0g 〃　チンク油　99.0g 全　量　100g
製造方法	以上をとり，研和して製する。
用法及び用量	適宜，患部に塗布する。
効能又は効果	温疹・皮膚炎，ただれ，あせも，かぶれ，やけどによる潮紅
貯蔵方法及び 有効期間	遮光した気密容器
規格及び試験方法	日本薬局方による。
備考	アクリノール・チンク油

【 102 】　外皮用薬 13

成分及び分量 又は本質	日本薬局方	アクリノール水和物，微末	1.0g
	〃	チンク油	65.0g
	〃	アミノ安息香酸エチル，細末	5.0g
	基剤　〃	親水ワセリン	27.0g
	〃　〃	サラシミツロウ	2.0g
		全　量	100g
製造方法	以上をとり，研和して製する。		
用法及び用量	適宜，患部に塗布する。		
効能又は効果	やけどによる潮紅，かゆみ		
貯蔵方法及び有効期間	遮光した気密容器		
規格及び試験方法	日本薬局方による。		
備考	複方アクリノール・チンク油		

【 103 】　外皮用薬 14—①

成分及び分量 又は本質	日本薬局方　ヒドロコルチゾン酢酸エステル　0.5g 基剤　〃　親水クリーム　適量 全量　100g
製造方法	以上をとり，クリーム剤の製法により製する。
用法及び用量	適宜，患部に塗布する。
効能又は効果	湿疹・皮膚炎，かぶれ
貯蔵方法及び 有効期間	気密容器
規格及び試験方法	別記のとおり。
備考	

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は白色である。

確認試験　（１）　本品 2g にジエチルエーテル 10mL を加えてよくかき混ぜた後，ろ過する。残留物にクロロホルム 20mL を加えてよくかき混ぜた後，ろ過し，水浴上でクロロホルムを留去する。残留物の半量をとり，硫酸 2mL を加えるとき，初めに帯黄緑色の蛍光を発し，徐々にだいだい色を経て暗赤色に変わる。この液に水 10mL を加えるとき，液は黄色からだいだい黄色に変わり，緑色の蛍光を発する（ヒドロコルチゾン酢酸エステル）。

（２）　（１）で得た残留物半量にメタノール 1mL を加え，加温して振り混ぜた後，ろ過し，ろ液にフェーリング試液 1mL を加えて加熱するとき，だいだい色～赤色の沈殿を生じる（ヒドロコルチゾン酢酸エステル）。

【 104 】　外皮用薬 15

成分及び分量 又は本質	日本薬局方　アクリノール水和物，微末　0.1g 基剤　〃　マクロゴール軟膏　適量 全量　100g
製造方法	以上をとり，軟膏剤の製法により製する。
用法及び用量	適宜，患部に塗布するか，又はガーゼなどに展延し，患部に貼布する。
効能又は効果	外傷，靴ずれ，火傷，腫物，にきび，あせも，とびひ，湿疹，ただれ
貯蔵方法及び 有効期間	遮光した気密容器
規格及び試験方法	別記のとおり。
備考	

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は淡黄色である。

確認試験　本品 1g に水 10mL を加えて溶かし，ヨウ素試液 2 滴を加えるとき青緑色の沈殿を生じ，これにエタノール（95）を加えるとき，沈殿は溶ける（アクリノール水和物）。

【 105 】　外皮用薬 16—①

成分及び分量 又は本質	局外規 日本薬局方	スルフイソミジン 亜鉛華軟膏 全　量	5.0g 95.0g 100g
製造方法	以上をとり，軟膏剤の製法により製する。		
用法及び用量	適宜，患部に塗布するか又はガーゼなどに展延し，患部に貼布する。		
効能又は効果	化膿性皮膚疾患（とびひ，めんちょう，毛のう炎）		
貯蔵方法及び 有効期間	遮光した気密容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考			

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は白色である。

確認試験　（１）　本品 0.5g にピリジン 2mL を加えてよくかき混ぜた後，ろ過する。ろ液に硫酸銅試液 2 滴を加えて振り混ぜる。更に，水 3mL 及びクロロホルム 5mL を加えて振り混ぜ，放置するとき，クロロホルム層は緑色を呈する（スルフイソミジン）。

（２）　本品 1g を磁製るつぼにとり，弱く加熱して融解し，徐々に温度を高めて炭化し，更にこれを強熱するとき黄色を呈する。この色は冷えると消える。更にこれに希塩酸 10mL を加えてよくかき混ぜた後，ヘキサシアノ鉄（Ⅱ）酸カリウム試液を加えるとき，白色の沈殿を生じる（酸化亜鉛）。

【 106 】　外皮用薬 17

成分及び分量 又は本質	日本薬局方　アクリノール水和物，微末　1.0g 〃　亜鉛華軟膏　99.0g 全　量　100g
製造方法	以上をとり，軟膏剤の製法により製する。
用法及び用量	ガーゼなどに展延し，患部に貼布するか，又は適宜，患部に塗布する。
効能又は効果	湿疹・皮膚炎，ただれ，あせも，かぶれ，やけどによる潮紅
貯蔵方法及び 有効期間	遮光した気密容器
規格及び試験方法	日本薬局方による。
備考	アクリノール・亜鉛華軟膏

【 107 】　外皮用薬 18—①

成分及び分量 又は本質	日本薬局方	サリチル酸メチル	4.0mL
	〃	トウガラシチンキ	10.0mL
	〃	*d*-又は *dl*-カンフル	5.0g
	基剤　〃	エタノール	適量
		全量	100mL
製造方法	以上をとり，酒精剤の製法により製する。		
用法及び用量	適宜，患部に塗布する。		
効能又は効果	リウマチ，肩こり，筋肉疲労，しもやけ，挫傷，頭痛，歯痛，のどの痛み，筋肉のはれ，筋肉のこり，関節痛，神経痛，筋肉痛，腰痛，筋ちがい，うちみ，ねんざ		
貯蔵方法及び有効期間	気密容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	複方サリチル酸メチル精		

規格及び試験方法

本品は定量するとき，サリチル酸メチル（$C_8H_8O_3$：152.15）4.2～5.2w/v%及び *d*-又は *dl*-カンフル 4.5～5.5w/v%を含む。

性　状　本品は帯赤黄色の液で，特異なにおいがあり，味はやくようである。

確認試験　（1）　本品 1mL に希エタノール 5mL を加えて振り混ぜた後，塩化鉄（Ⅲ）試液 1 滴を加えるとき，液は紫色を呈する（サリチル酸メチル）。

（2）　本品 1mL にクロロホルム 10mL を加えてよく振り混ぜ，試料溶液とする。別にサリチル酸メチル 0.04g をクロロホルム 10mL に溶かし，標準溶液とする。これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び標準溶液 5μL ずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲル（蛍光剤入り）を用いて調製した薄層板にスポットする。次にヘキサン・クロロホルム混液（4：1）を展開溶媒として約 10cm 展開した後，薄層板を風乾する。これに紫外線（主波長 254nm）を照射するとき，試料溶液及び標準溶液から得たスポットの *Rf* 値は等しい。また，この薄層板に塩化鉄（Ⅲ）試液を均等に噴霧するとき，標準溶液から得たスポット及びそれに対応する位置の試料溶液から得たスポットは，紫色を呈する。

（3）　本品 10mL を水浴上で蒸発乾固し，残留物をエタノール（95）1mL に溶かし，試料溶液とする。別に薄層クロマトグラフ用カプサイシン 1mg をエタノール（95）3mL に溶かし，標準溶液とする。これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び標準溶液 20μL ずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲルを用いて調製した薄層板にスポットする。次にジエチルエーテル・メタノール混液（19：1）を展開溶媒

として約 10cm 展開した後，薄層板を風乾する。これに 2,6 - ジブロモ - N - クロロ - 1,4 - ベンゾキノンモノイミン試液を均等に噴霧し，アンモニアガス中に放置するとき，試料溶液から得たスポットは，標準溶液から得た青色のスポットと色調及び *Rf* 値が等しい。

（4） 本品そのままを試料溶液とする。別に *dl* - カンフル 0.05g をエタノール（95）1mL に溶かし，標準溶液とする。これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び標準溶液 5μL ずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲルを用いて調製した薄層板にスポットする。次にクロロホルム・シクロヘキサン・酢酸（100）混液（5：4：1）を展開溶媒として約 10cm 展開した後，薄層板を風乾する。これに噴霧用ドラーゲンドルフ試液を均等に噴霧するとき，試料溶液から得たスポットは，標準溶液から得た黄赤色のスポットと色調及び *Rf* 値が等しい。

定 量 法 本品 1mL を正確に量り，内標準溶液 5mL を正確に加え，アセトンを加えて 50mL とし，試料溶液とする。別に定量用サリチル酸メチル約 0.05g 及び *d* - 又は *dl* - カンフル標準品約 0.05g を精密に量り，内標準溶液 5mL を正確に加え，アセトンを加えて 50mL とし，標準溶液とする。試料溶液及び標準溶液 2μL につき，次の条件でガスクロマトグラフ法により試験を行い，内標準物質のピーク面積に対するサリチル酸メチル及び *d* - 又は *dl* - カンフルのピーク面積の比 Q_{Ta}，Q_{Tb}，Q_{Sa} 及び Q_{Sb} を求める。

サリチル酸メチル（$C_8H_8O_3$）の量（mg）

$$= \text{定量用サリチル酸メチルの量（mg）} \times \frac{Q_{Ta}}{Q_{Sa}}$$

d - 又は *dl* - カンフル（$C_{10}H_{16}O$）の量（mg）

$$= d\text{ - 又は }dl\text{ - カンフル標準品の量（mg）} \times \frac{Q_{Tb}}{Q_{Sb}}$$

内標準溶液　安息香酸エチルのアセトン溶液（1→100）

操作条件

検出器：水素炎イオン化検出器

カラム：内径約 3mm，長さ約 3m のガラス管に，ガスクロマトグラフ用ポリエチレングリコール 20M をシラン処理した 180～250μm のガスクロマトグラフ用ケイソウ土に 10%の割合で被覆したものを充てんする。

カラム温度：150℃付近の一定温度

キャリヤーガス：窒素

流量：*dl* - カンフルの保持時間が約 5 分になるように調整する。

カラムの選定：標準溶液 2μL につき，上記の条件で操作するとき，*dl* - カンフル，安息香酸エチル，サリチル酸メチルの順に流出し，完全に分離するものを用いる。

【 108 】　外皮用薬 19

成分及び分量 又は本質		日本薬局方	ヨードチンキ	20.0mL
		〃	トウガラシチンキ	10.0mL
		〃	*d*- 又は *dl*- カンフル	5.5g
		〃	液状フェノール	2.0mL
		〃	サリチル酸メチル	1.0mL
	溶　剤	〃	ヒマシ油	10.0mL
	〃	〃	エタノール	適　量
			全　　量	100mL
製造方法	以上をとり，酒精剤の製法により製する。			
用法及び用量	適宜，患部に塗布する。			
効能又は効果	リウマチ，肩こり，筋肉疲労，しもやけ，挫傷，頭痛，歯痛，のどの痛み，筋肉のはれ，筋肉のこり，関節痛，神経痛，筋肉痛，腰痛，筋ちがい，うちみ，ねんざ			
貯蔵方法及び有効期間	遮光した気密容器			
規格及び試験方法	第十二改正日本薬局方による。			
備考	複方ヨード・トウガラシ精			

【 109 】　外皮用薬 20—②

成分及び分量 又は本質		日本薬局方	ヒドロコルチゾン酢酸エステル	0.5g
		局外規	クロタミトン	5.0g
	基剤	薬添規	ゲル化炭化水素	50g
	基剤	日本薬局方	白色ワセリン	適量
			全量	100.0g
製造方法	以上をとり，軟膏剤の製法により製する。			
用法及び用量	適宜，患部に塗布する。			
効能又は効果	湿疹・皮膚炎，ただれ，かぶれ			
貯蔵方法及び 有効期間	気密容器			
規格及び試験方法	別記のとおり。			
備考				

規 格 及 び 試 験 方 法

本品は定量するとき，ヒドロコルチゾン酢酸エステル（$C_{23}H_{32}O_6$：404.50）0.45～0.55%及びクロタミトン（$C_{13}H_{17}NO$：203.28）4.5～5.5%を含む。

性　　状　本品は白色である。

確認試験　（1）　本品 2g にジエチルエーテル 10mL を加えてよくかき混ぜた後，ろ過する。残留物にクロロホルム 20mL を加えてよくかき混ぜた後，ろ過し，水浴上でクロロホルムを留去する。残留物の半量をとり，硫酸 2mL を加えるとき，初めに帯黄緑色の蛍光を発し，徐々にだいだい色を経て暗赤色に変わる。この液に水 10mL を加えるとき，液は黄色からだいだい黄色に変わり，緑色の蛍光を発する（ヒドロコルチゾン酢酸エステル）。

（2）　（1）で得た残留物半量にメタノール 1mL を加え，加温して振り混ぜた後，ろ過し，ろ液にフェーリング試液 1mL を加えて加熱するとき，だいだい色～赤色の沈殿を生じる（ヒドロコルチゾン酢酸エステル）。

（3）　本品 0.5g にテトラヒドロフラン 5mL を加えてかき混ぜた後，ろ過し，ろ液を試料溶液とする。別にクロタミトン 0.02g をメタノール 4mL に溶かし，標準溶液とする。これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び標準溶液 3μL ずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲル（蛍光剤入り）を用いて調製した薄層板にスポットする。次に酢酸エチル・エタノール（99.5）・アンモニア水（28）混液（50：5：1）を展開溶媒として約 10cm 展開した後，薄層板を風乾する。これに紫外線（主波長 254nm）を照射するとき，試料溶液から得たスポットは標準溶液から得たスポットと色調及び *Rf* 値が等しい。

定 量 法　（1）　本品約 1.0g を精密に量り，テトラヒドロフラン 30mL を加えて振り混ぜた後，メタノールを加えて 50mL とする。この液をろ過し，初めのろ液 10mL を除き，次のろ液 5mL を正確に量り，内標準溶液 5mL を正確に加え，更にメタノールを加えて正確に 50mL とし，試料溶液とする。別に定量用ヒドロコルチゾン酢酸エステル約 0.01g を精密に量り，メタノールに溶かし，正確に 25mL とする。この液 5mL を正確に量り，メタノールを加えて 20mL とする。この液 5mL を正確に量り，内標準溶液 5mL を正確に加え，更にメタノールを加えて 50mL とし，標準溶液とする。試料溶液及び標準溶液 10μL につき，次の条件で液体クロマトグラフ法により試験を行い，内標準物質のピーク面積に対するヒドロコルチゾン酢酸エステルのピーク面積の比 Q_T 及び Q_S を求める。

ヒドロコルチゾン酢酸エステル（$C_{23}H_{32}O_6$）の量（mg）

＝定量用ヒドロコルチゾン酢酸エステルの量（mg）×（Q_T／Q_S）×（1／2）

内標準溶液　フタル酸ジメチルのメタノール溶液（1→10000）

操作条件

検出器：紫外吸光光度計（測定波長：240nm）

カラム：内径約 4mm，長さ 15～25cm のステンレス管に 5～10μm の液体クロマトグラフ用オクタデシルシリル化シリカゲルを充てんする。

カラム温度：40℃付近の一定温度

移動相：薄めたリン酸（1→1000）・アセトニトリル混液（65：35）

流量：ヒドロコルチゾン酢酸エステルの保持時間が約 10 分になるように調整する。

カラムの選定：標準溶液 10μL につき，上記の条件で操作するとき，フタル酸ジメチル，ヒドロコルチゾン酢酸エステルの順に溶出し，それぞれのピークが完全に分離するものを用いる。

（2）　本品約 1.0g を精密に量り，テトラヒドロフラン 30mL を加えて振り混ぜた後，メタノールを加えて正確に 50mL とする。この液をろ過し，初めのろ液 10mL を除き，次のろ液 5mL を正確に量り，メタノールを加えて正確に 25mL とする。この液 5mL を正確に量り，内標準溶液 5mL を正確に加え，更にメタノールを加えて 50mL とし，試料溶液とする。別に定量用クロタミトン約 0.05g を精密に量り，メタノールに溶かし，正確に 50mL とする。この液 5mL を正確に量り，メタノールを加えて正確に 25mL とする。この液 5mL を正確に量り，内標準溶液 5mL を正確に加え，更にメタノールを加えて 50mL とし，標準溶液とする。試料溶液及び標準溶液 10μL につき，次の条件で液体クロマトグラフ法により試験を行い，内標準物質のピーク面積に対するクロタミトンのピーク面積の比 Q_T 及び Q_S を求める。

クロタミトン（$C_{13}H_{17}NO$）の量（mg）

＝定量用クロタミトンの量（mg）×（Q_T／Q_S）

内標準溶液　*p*-トルイル酸エチルのメタノール溶液（1→7500）

操作条件

検出器：紫外吸光光度計（測定波長：254nm）

カラム：内径約 4mm，長さ 15～25cm のステンレス管に 5～10μm の液体クロマトグラフ用オクタデシルシリル化シリカゲルを充てんする。

カラム温度：40℃付近の一定温度

移動相：メタノール・水混液（6：4）

流量：クロタミトンの保持時間が約 10 分になるように調整する。

カラムの選定：標準溶液 10μL につき，上記の条件で操作するとき，トルイル酸エチル，クロタミトンの順に溶出し，それぞれのピークが完全に分離するものを用いる。

【 110 】　外皮用薬 21—①

成分及び分量 又は本質	日本薬局方	オウバク末	66.0g
	〃	サンシシ末	32.5g
	〃	*d* - 又は *dl* - カンフル	1.0g
	〃	*l* - 又は *dl* - メントール	0.5g
		全　　量	100g
製造方法	以上をとり，散剤の製法により製する。		
用法及び用量	水で練り合わせて泥状とし，リント布などに展延し，患部に貼付する。		
効能又は効果	うちみ，ねんざ		
貯蔵方法及び有効期間	気密容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備　　考	パップ用複方オウバク散		

規 格 及 び 試 験 方 法

本品は定量するとき，カンフル（$C_{10}H_{16}O$：152.24）0.9～1.1%，メントール（$C_{10}H_{20}O$：156.27）0.45～0.55%を含む。

性　　状　本品は黄褐色の粉末で，特異なにおいがある。

確認試験　（1）　本品 0.2g にメタノール 5mL を加え，よく振り混ぜた後，ろ過し，ろ液を試料溶液とする。別にベルベリン塩化物水和物 0.01g をメタノール 10mL に溶かし，標準溶液とする。これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び標準溶液 5μL ずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲルを用いて調製した薄層板にスポットする。次に 1 - ブタノール・水・酢酸（100）混液（7：2：1）を展開溶媒として約 10cm 展開した後，薄層板を風乾する。これに紫外線（主波長 365nm）を照射するとき，試料溶液及び標準溶液から得たスポットは，黄色を呈し，それらの *Rf* 値は等しい（ベルベリン）。

（2）　本品 0.3g にメタノール 10mL を加え，水浴上で 3 分間加温し，冷後ろ過し，ろ液を蒸発乾固する。残留物をメタノール 2mL に溶かし試料溶液とする。別に薄層クロマトグラフ用ゲニポシド 1mg をメタノール 1mL に溶かし，標準溶液とする。これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び標準溶液 10μL ずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲルを用いて調製した薄層板にスポットする。次にクロロホルム・メタノール混液（3：1）を展開溶媒として約 10cm 展開した後，薄層板を風乾する。これに 4 - メトキシベンズアルデヒド・硫酸試液を均等に噴霧し，105℃で 5 分間加熱するとき，試料溶液から得た数個のスポットのうち 1 個のスポットは，標準溶液から得た暗紫色のスポットと色調及び *Rf* 値が等しい。

定 量 法　本品 5g を正確に量り，アセトン 30mL を加え，10 分間振り混ぜた後，内標準溶液 5mL を正確に加え，更にアセトンを加えて 50mL とする。この液をろ過し，初めのろ液 10mL を除き，次のろ液を試料溶液とする。別に *dl* - カンフル標準品約 0.05g 及び定量用 *l* - メントール約 25mg をそれぞれ精密に量り，アセトン 30mL に溶かし，次に内標準溶液 5mL を正確に加えた後，アセトンを加えて 50mL とし，標準溶液とする。試料溶液及び標準溶液 2 μ L につき，次の条件でガスクロマトグラフ法により試験を行い，内標準物質のピーク面積に対する *dl* - カンフル及び *l* - メントールのピーク面積の比 Q_{Ta}，Q_{Tb}，Q_{Sa} 及び Q_{Sb} を求める。

dl - カンフル（$C_{10}H_{16}O$）の量（mg）

$$= dl\text{-カンフル標準品の量（mg）} \times \frac{Q_{Ta}}{Q_{Sa}}$$

l - メントール（$C_{10}H_{20}O$）の量（mg）

$$= l\text{-メントール標準品の量（mg）} \times \frac{Q_{Tb}}{Q_{Sb}}$$

内標準溶液　安息香酸エチルのアセトン溶液（1→100）

操作条件

検出器：水素炎イオン化検出器

カラム：内径約 3mm，長さ約 3m のガラス管に，ガスクロマトグラフ用ポリエチレングリコール 20M をシラン処理した 180～250μm のガスクロマトグラフ用ケイソウ土に 10%の割合で被覆したものを充てんする。

カラム温度：150℃付近の一定温度

キャリヤーガス：窒素

流量：*dl* - カンフルの保持時間が約 6 分になるように調整する。

カラムの選定：標準溶液 2μL につき，上記の条件で操作するとき，*dl* - カンフル，安息香酸エチルの順に流出し，完全に分離するものを用いる。

【 111 】　外皮用薬 22—②

成分及び分量又は本質	日本薬局方	尿　　素	20.0g
	基　剤　〃	親水クリーム	25.0g
	防腐剤　〃	パラオキシ安息香酸メチル	0.013g
	防腐剤　〃	パラオキシ安息香酸プロピル	0.007g
	溶　剤　〃	精製水又は精製水（容器入り）	適　量
		全　　量	100mL
製造方法	以上をとり，ローション剤の製法により製する。		
用法及び用量	1 日数回，適量を患部に塗擦する。		
効能又は効果	手指のあれ，ひじ・ひざ・かかと・くるぶしの角化症，老人の乾皮症，さめ肌		
貯蔵方法及び有効期間	気密容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考			

規 格 及 び 試 験 方 法

本品は定量するとき，尿素（CH_4N_2O：60.06）18.0～22.0%を含む。

性　　状　本品は乳剤性ローションである。

確認試験　（1）　本品 1.0g にエタノール（95）30mL を加えて振り混ぜた後，ろ過し，ろ液を蒸発乾固する。残留物に水 3mL を加え，振り混ぜた後，ろ過し，ろ液 1mL に硝酸 1mL を加えて放置するとき，白色の結晶性の沈殿を生じる（尿素）。

（2）　本品 10mL に飽和塩化ナトリウム溶液 10mL を加えた後，ジエチルエーテル 10mL で抽出する。ジエチルエーテル層を蒸発乾固し，残留物をメタノール 1mL に溶かして，試料溶液とする。別にパラオキシ安息香酸メチル 1mg 及びパラオキシ安息香酸プロピル 1mg をそれぞれメタノール 1mL に溶かして，標準溶液（1）及び標準溶液（2）とする。これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び標準溶液 10μL ずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲル（蛍光剤入り）を用いて調製した薄層板にスポットする。次に酢酸エチル・ヘキサン・酢酸（100）混液（10：5：1）を展開溶媒として約 10cm 展開した後，薄層板を風乾する。これに紫外線（主波長 254nm）を照射するとき，試料溶液から得た 2 個のスポットは標準溶液（1）及び標準溶液（2）から得たスポットと色調及び *Rf* 値が等しい。

定 量 法　本品約 1.0g を精密に量り，エタノール（95）100mL を加えて振り混ぜた後，ろ過する。ろ紙上の残留物をエタノール（95）10mL で洗い，ろ液と洗液を合わせ，強酸性陽イオン交換樹脂カラム*に注入する。更にエタノール（95）50～100mL を流してカラ

ムを洗う。次に水 100mL を流して尿素を溶出する。溶出液は重量既知のビーカーに入れ，水浴上で蒸発乾固した後，約 70℃で 1 時間乾燥し，秤量する。

100mL 中の尿素の量（g）

＝（溶出物の重量（g）／採取量（g））×（1／0.99574）×100　（比重：0.99574）

〔注〕*内径約 1.0cm，長さ 20～30cm のカラムに強酸性陽イオン交換樹脂（H 形）を約 10cm 充塡する。

【 112 】　外皮用薬 23

成分及び分量又は本質		日本薬局方	酸化亜鉛	15.0g
		〃	グリセリン	5.0mL
		〃	液状フェノール	1.5mL
	着香剤	〃	キョウニン水	3.0mL
	溶　剤	〃	精製水又は精製水（容器入り）	適　量
			全　　量	100mL
製造方法	以上をとり，溶解混和して製する。			
用法及び用量	1 日数回，適量を患部に塗布する。用時よく振り混ぜること。			
効能又は効果	虫ささされ，かゆみ，あせも			
貯蔵方法及び有効期間	気密容器			
規格及び試験方法	別記のとおり。			
備考				

規 格 及 び 試 験 方 法

本品は定量するとき，酸化亜鉛（ZnO：81.38）13.5～16.5%を含む。

性　　状　本品は白色の懸濁液である。

確認試験　（1）　本品の上澄液 1mL をとり，水 20mL 及び希塩酸 5mL を加え，ジエチルエーテル 20mL で抽出する。ジエチルエーテル抽出液を炭酸水素ナトリウム試液 5mL ずつで 2 回洗った後，希水酸化ナトリウム試液 10mL で抽出する。抽出液 1mL をとり，亜硝酸ナトリウム試液 1mL 及び希塩酸 1mL を加えて振り混ぜ，10 分間放置する。次に水酸化ナトリウム試液 3mL を加えるとき，液は淡黄色を呈する（フェノール）。

（2）　本品の上澄液 20mL をとり，必要ならばろ過する。ろ液 5mL に塩化鉄（Ⅲ）試液 1 滴を加えるとき，液は紫色を呈する（フェノール）。

（3）　（2）のろ液 5mL を共せん試験管にとり，水酸化ナトリウム試液 2mL 及び硫酸銅試液 1mL を加えて振り混ぜるとき，液は青色を呈する（グリセリン）。

（4）　（2）のろ液 5mL に硫酸水素カリウム 1.0g を加えて加熱するとき，アクロレインのにおいを発する（グリセリン）。

（5）　本品をよく振り混ぜた後，その 10mL をとり，ジエチルエーテル 20mL を加えて振り混ぜた後，ろ過する。残留物はジエチルエーテル 10mL ずつで 2 回洗い，乾燥した後，強熱するとき，黄色を呈し，この色は冷えると消える。また，これを希塩酸 10mL に溶かし，ヘキサシアノ鉄（Ⅱ）酸カリウム試液を加えるとき，白色の沈殿を生じる（酸化亜鉛）。

定 量 法　本品をよく振り混ぜた後，その 10mL を正確に量り，るつぼに入れ，水浴上で加熱して水分を蒸発させ，残留物を徐々に温度を高めて全く炭化し，次に残留物が黄色となるまで強熱し，冷後，水 1mL 及び塩酸 1.5mL を加えて溶かした後，水を加えて正確に 100mL とする。この液 25mL を正確に量り，水 80mL を加え，水酸化ナトリウム溶液（1→50）を液がわずかに沈殿を生じるまで加え，次に pH10.7 のアンモニア・塩化アンモニウム緩衝液 5mL を加えた後，0.05mol/L エチレンジアミン四酢酸二ナトリウム液で滴定する（指示薬：エリオクロムブラック T・塩化ナトリウム指示薬 0.04g）。

0.05mol/L エチレンジアミン四酢酸二ナトリウム液 1mL＝4.069mg　ZnO

【 113 】　外皮用薬 24—①

成分及び分量又は本質		日本薬局方	液状フェノール	2.2mL
	粘着剤	〃	トラガント末	2.0g
	〃	〃	カルメロースナトリウム	3.0g
	湿潤剤	〃	グリセリン	3.0mL
		〃	酸化亜鉛	10.0g
	溶　剤	〃	精製水又は精製水（容器入り）	適　量
			全　　量	100g
製造方法	「液状フェノール」,「グリセリン」及び「精製水又は精製水（容器入り）」を混和し,「トラガント末」を少量ずつかき混ぜながら加えて，一夜放置し，これに「カルメロースナトリウム」を少量ずつかき混ぜながら加えてのり状とし,「酸化亜鉛」を少量ずつ加え，リニメント剤の製法により製する。ただし,「トラガント末」及び「カルメロースナトリウム」のそれぞれ 0.5g 以内の量を互いに増減して，全量 5g とすることができる。			
用法及び用量	1 日数回，適宜患部に塗布する。			
効能又は効果	湿疹・皮膚炎，あせも，虫ささされ，かぶれ，かゆみ			
貯蔵方法及び有効期間	遮光した気密容器			
規格及び試験方法	日本薬局方による。			
備考	フェノール・亜鉛華リニメント			

【 114 】　外皮用薬 25—①

成分及び分量 又は本質	日本薬局方　ジフェンヒドラミン　2.0g 〃　フェノール・亜鉛華リニメント　98.0g 全　量　100g
製造方法	以上をとり，混和して製する。
用法及び用量	適宜，患部に塗布する。
効能又は効果	湿疹・皮膚炎，あせも，虫さされ，かぶれ，かゆみ
貯蔵方法及び 有効期間	遮光した気密容器
規格及び試験方法	別記のとおり。
備考	ジフェンヒドラミン・フェノール・亜鉛華リニメント

規格及び試験方法

本品は定量するとき，ジフェンヒドラミン（$C_{17}H_{21}NO$：255.36）1.8～2.2%を含む。

性　状　本品は白色～類白色ののり状で，わずかにフェノールのにおいがある。

確認試験　**（1）**　本品 3g にヘキサン 20mL を加えてよく振り混ぜた後，ヘキサン層を分取し，0.2mol/L 塩酸 10mL を加えてよく振り混ぜる。水層を分取し，水酸化ナトリウム試液を加えて pH4.6 に調整し，ブロモフェノールブルー・フタル酸水素カリウム試液 1mL 及びクロロホルム 10mL を加えて振り混ぜるとき，クロロホルム層は黄色を呈する（ジフェンヒドラミン）。

（2）　本品 1g を磁性るつぼにとり，徐々に温度を高めて炭化し，更にこれを強熱するとき，黄色を呈し，冷えると色は消える。更に残留物に水 10mL 及び希塩酸 5mL を加え，よく振り混ぜた後，ろ過し，ろ液にヘキサシアノ鉄（Ⅱ）酸カリウム試液 2～3 滴を加えるとき，白色の沈殿を生じる（酸化亜鉛）。

（3）　本品 0.5g に，水 1mL 及びクロロホルム 5mL を加えて振り混ぜた後，クロロホルム層を分取し，試料溶液とする。別にジフェンヒドラミン及びフェノール 0.01g ずつをそれぞれクロロホルム 5mL に溶かし，標準溶液（1）及び標準溶液（2）とする。これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び標準溶液 5μL ずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲルを用いて調製した薄層板にスポットする。次に酢酸エチル・エタノール（99.5）・アンモニア水（28）混液（50：5：1）を展開溶媒として約 10cm 展開した後，薄層板を風乾する。これをヨウ素蒸気中に放置するとき，試料溶液から得た 2 個のスポットの *Rf* 値は，標準溶液（1）及び標準溶液（2）から得たそれぞれのスポットの *Rf* 値に等しい。また，ヨウ素を揮散させた薄層板に噴霧用ドラーゲンドルフ試液を均等に噴霧するとき，標準溶液（1）から得たスポット及びそれに対応する位置の試料溶液から得たスポットは，だいだい色を呈する。

定 量 法　本品約 0.5g を精密に量り，水 30mL を加えた後，アンモニア試液を加えてアルカリ性とする。この液にクロロホルム 30mL を加えて振り混ぜた後，クロロホルム層を分取する。水層は更にクロロホルム 20mL ずつで 2 回抽出し，クロロホルム層を合わせ，無水硫酸ナトリウム 3g を加えて脱水した後，クロロホルムを留去する。残留物に内標準溶液 5mL を正確に加え，更にメタノールを加えて溶かし 100mL とし，試料溶液とする。別に定量用ジフェンヒドラミン約 0.02g を精密に量り，メタノールに溶かして正確に 10mL とする。この液 5mL を正確に量り，内標準溶液 5mL を正確に加え，更にメタノールを加えて 100mL とし，標準溶液とする。試料溶液及び標準溶液 10μL につき，次の条件で液体クロマトグラフ法により試験を行い，内標準物質のピーク面積に対するジフェンヒドラミンのピーク面積の比 Q_T 及び Q_S を求める。

ジフェンヒドラミン（$C_{17}H_{21}NO$）の量（mg）

＝定量用ジフェンヒドラミンの量（mg）$\times\frac{Q_T}{Q_S}\times\frac{1}{2}$

内標準溶液　パラオキシ安息香酸ヘプチルのメタノール溶液（1→220）

操作条件

検出器：紫外吸光光度計（測定波長：220nm）

カラム：内径約 4mm，長さ 15～25cm のステンレス管に 5～10μm の液体クロマトグラフ用オクタデシルシリル化シリカゲルを充てんする。

カラム温度：40℃付近の一定温度

移動相：ドデシル硫酸ナトリウム 5g を薄めたリン酸（1→1000）に溶かして 1000mL とする。この液 250mL にメタノール 750mL を加える。

流量：ジフェンヒドラミンの保持時間が約 7 分になるように調整する。

カラムの選定：標準溶液 10μL につき，上記の条件で操作するとき，ジフェンヒドラミン，パラオキシ安息香酸ヘプチルの順に溶出し，それぞれのピークが完全に分離するものを用いる。

【 115 】　外皮用薬 26

成分及び分量 又は本質	日本薬局方　酸化亜鉛　50.0g 基剤　植物油　適量 全量　100g
製造方法	以上をとり，研和して製する。ただし，植物油の一部の代わりに，「ヒマシ油」又はポリソルベート 20 適量を用いることができる。
用法及び用量	適宜，患部に塗布する。
効能又は効果	湿疹・皮膚炎，ただれ，あせも，かぶれ，やけどによる潮紅
貯蔵方法及び 有効期間	気密容器
規格及び試験方法	日本薬局方による。
備考	チンク油

【 116 】　外皮用薬 27—①

成分及び分量又は本質		日本薬局方	ジフェンヒドラミン塩酸塩	1.0g
		〃	*l*-メントール	2.0g
		〃	*dl*-カンフル	2.0g
		〃	ジブカイン塩酸塩	0.3g
	湿潤剤	〃	グリセリン	10.0mL
	溶　剤	〃	消毒用エタノール	適　量
			全　　量	100mL
製造方法	以上をとり，外用液剤の製法により製する。			
用法及び用量	1日数回，適宜患部に塗擦する。			
効能又は効果	虫さされ，かゆみ			
貯蔵方法及び有効期間	気密容器			
規格及び試験方法	別記のとおり。			
備考				

規 格 及 び 試 験 方 法

本品は定量するとき，ジフェンヒドラミン塩酸塩（$C_{17}H_{21}NO$・HCl：291.82）0.9～1.1%，*l*-メントール（$C_{10}H_{20}O$：156.27）1.8～2.2%，*dl*-カンフル（$C_{10}H_{16}O$：152.24）1.8～2.2%及びジブカイン塩酸塩（$C_{20}H_{29}N_3O_2$・HCl：379.93）0.27～0.33%を含む。

性　　状　本品は無色澄明の液で，ハッカのにおいがある。

確認試験　（1）　本品 3mL に水 5mL を加え，石油エーテル 10mL で抽出する。石油エーテル抽出液を蒸発乾固し，残留物にエタノール（95）10mL を加えた後，硫酸 3mL を加えて振り混ぜるとき，液は黄赤色を呈する（メントール）。

（2）　本品 2mL に 2,4-ジニトロフェニルヒドラジン試液 1mL を加えた後，水浴上で 5 分間加熱するとき，だいだい赤色の沈殿を生じる（カンフル）。

（3）　本品 1mL にメタノール 5mL を加えて試料溶液とする。別にジフェンヒドラミン塩酸塩 10mg 及びジブカイン塩酸塩 3mg をそれぞれメタノール 5mL に溶かし，標準溶液（1）及び標準溶液（2）とする。これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び標準溶液 10μL ずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲル（蛍光剤入り）を用いて調製した薄層板にスポットする。次に酢酸エチル・エタノール（99.5）・アンモニア水（28）混液（50：5：1）を展開溶媒として約 10cm 展開した後，薄層板を風乾する。これに紫外線（主波長 254nm）を照射するとき，試料溶液から得た 2 個のスポットは

標準溶液（1）及び標準溶液（2）から得たスポットと色調及び *Rf* 値が等しい。また，この薄層板に噴霧用ドラーゲンドルフ試液を均等に噴霧するとき，黄赤色を呈する。

定 量 法 **（1）** 本品 2mL を正確に量り，内標準溶液 5mL を正確に加え，アセトンを加えて 50mL とし，試料溶液とする。別に定量用 *dl* - カンフル及び定量用 *l* - メントールをそれぞれ約 0.04g を精密に量り，内標準溶液 5mL を正確に加え，アセトンを加えて 50mL とし，標準溶液とする。試料溶液及び標準溶液 3μL につき，次の条件でガスクロマトグラフ法により試験を行い，内標準物質のピーク面積に対する *dl* - カンフル及び *l* - メントールのピーク面積の比 Q_{Ta}，Q_{Tb}，Q_{Sa} 及び Q_{Sb} を求める。

dl - カンフル（$C_{10}H_{16}O$）の量（mg）

＝定量用 *dl* - カンフルの量（mg）$\times\frac{Q_{Ta}}{Q_{Sa}}$

l - メントール（$C_{10}H_{20}O$）の量（mg）

＝定量用 *l* - メントールの量（mg）$\times\frac{Q_{Tb}}{Q_{sb}}$

内標準溶液　安息香酸エチルのアセトン溶液（1→100）

操作条件

検出器：水素炎イオン化検出器

カラム：内径約 3mm，長さ約 3m のガラス管に，ガスクロマトグラフ法ポリエチレングリコール 20M をシラン処理した 180～250μm のガスクロマトグラフ用ケイソウ土に 10%の割合で被覆したものを充てんする。

カラム温度：150℃付近の一定温度

キャリヤーガス：窒素

流量：カンフルの保持時間が約 6 分になるように調整する。

カラムの選定：標準溶液 3μL につき，上記の条件で操作するとき，*dl* - カンフル，*l* - メントール，安息香酸エチルの順に流出し，完全に分離するものを用いる。

（2） 本品 1mL を正確に量り，内標準溶液 5mL を正確に加え，メタノールを加えて 50mL とし試料溶液とする。別に定量用ジフェンヒドラミン塩酸塩約 0.1g 及び定量用ジブカイン塩酸塩約 0.03g を精密に量り，メタノールに溶かして正確に 50mL とする。この液 5mL を正確に量り，内標準溶液 5mL を正確に加え，メタノールを加えて 50mL とし標準溶液とする。試料溶液及び標準溶液 10μL につき，次の条件で液体クロマトグラフ法により試験を行い，内標準物質のピーク面積に対するジフェンヒドラミン塩酸塩及びジブカイン塩酸塩のピーク面積の比 Q_{Ta}，Q_{Tb}，Q_{Sa} 及び Q_{Sb} を求める。

ジフェンヒドラミン塩酸塩（$C_{17}H_{21}NO \cdot HCl$）の量（mg）

＝定量用ジフェンヒドラミン塩酸塩の量（mg）$\times\frac{Q_{Ta}}{Q_{Sa}}\times\frac{1}{10}$

ジブカイン塩酸塩（$C_{20}H_{29}N_3O_2 \cdot HCl$）の量（mg）

＝定量用ジブカイン塩酸塩の量（mg）$\times\frac{Q_{Tb}}{Q_{sb}}\times\frac{1}{10}$

内標準溶液　パラオキシ安息香酸ヘプチルのメタノール溶液（1→600）

操作条件

検出器：紫外吸光光度計（測定波長：220nm）

カラム：内径約 4mm，長さ 15～25cm のステンレス管に 5～10μm のオクタデシルシリル化シリカゲルを充てんする。

カラム温度：40℃付近の一定温度

移動相：ドデシル硫酸ナトリウム 5g を薄めたリン酸（1→1000）に溶かして 1000mL とする。この液 250mL にメタノール 750mL を加える。

流量：ジフェンヒドラミン塩酸塩の保持時間が約 6 分になるように調整する。

カラムの選定：標準溶液 10μL につき，上記の条件で操作するとき，ジフェンヒドラミン塩酸塩，パラオキシ安息香酸ヘプチル，ジブカイン塩酸塩の順に溶出し，それぞれのピークが完全に分離するものを用いる。

【 117 】　外皮用薬 28

成分及び分量 又は本質	日本薬局方	酸化亜鉛	20.0g
	基剤　〃	流動パラフィン	3.0g
	〃　〃	白色軟膏	適量
		全量	100g
製造方法	以上をとり，軟膏剤の製法により製する。		
用法及び用量	ガーゼなどに展延し，患部に貼布するか，又は適宜，患部に塗布する。		
効能又は効果	湿疹・皮膚炎，ただれ，あせも，かぶれ，やけどによる潮紅		
貯蔵方法及び有効期間	気密容器		
規格及び試験方法	日本薬局方による。		
備考	亜鉛華軟膏		

【 118 】　外皮用薬 29—①

成分及び分量 又は本質	日本薬局方	レチノールパルミチン酸エステル （ビタミンAとして 1g 中 150 万 I.U.含有）	0.067g
	〃	トコフェロール酢酸エステル	0.5g
	〃	酸化亜鉛	10.0g
	基剤　薬添規	ゲル化炭化水素	適　量
		全　　量	100g
製造方法	以上をとり，軟膏剤の製法により製する。		
用法及び用量	適宜，患部に塗布する。		
効能又は効果	指先・手のひらのあれ，しもやけ，ひび，あかぎれ		
貯蔵方法及び有効期間	遮光した気密容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考			

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は白色である。

確認試験　（１）　本品 0.5g にクロロホルム 15mL を加えてよくかき混ぜた後，ろ過する。ろ液 1mL をとり，三塩化アンチモン試液 3mL を加えるとき，液は直ちに青色となるが，この色は速やかに退色する（ビタミン A)。

（２）　本品 2g にエタノール（95）10mL を加えてよくかき混ぜた後，上澄液をとり，硝酸 2mL を加えてろ過する。ろ液を 75℃で 15 分間加熱するとき，液はだいだい色を呈する（トコフェロール酢酸エステル)。

（３）　本品 2g にジエチルエーテル 20mL を加えてよくかき混ぜた後，ろ過する。残留物をジエチルエーテル 10mL ずつで 2 回洗った後，乾燥する。これを強熱するとき黄色を呈し，この色は冷えると消える。また，これを希塩酸 10mL に溶かし，ヘキサシアノ鉄（Ⅱ）酸カリウム試液を加えるとき，白色の沈殿を生じる（酸化亜鉛)。

【 119 】　外皮用薬 30—③

成分及び分量又は本質	日本薬局方	インドメタシン	1.0g
	〃	*l*- メントール	3.0g
	溶解補助剤 〃	プロピレングリコール	10.0mL
	保存剤 〃	ベンザルコニウム塩化物液（10%）	0.1mL
	溶剤 〃	エタノール	80.0mL
	溶剤 〃	精製水又は精製水（容器入り）	適　量
		全　量	100mL
製造方法	インドメタシンを，水浴上で加温したプロピレングリコールに溶解し，*l*- メントールを溶解したエタノールと合わせた後，ベンザルコニウム塩化物液，精製水又は精製水（容器入り）を加え，全量 100mL とする。		
用法及び用量	1 日 4 回を限度として，適量を患部に塗布する。 1 週間 50mL を限度とする。11 才未満は使用しない。		
効能又は効果	関節痛，筋肉痛，腰痛，肩こりに伴う肩の痛み，腱鞘炎，肘の痛み，打撲，ねんざ		
貯蔵方法及び有効期間	遮光した気密容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考			

規 格 及 び 試 験 方 法

本品は定量するとき，インドメタシン（$C_{19}H_{16}ClNO_4$：357.79）0.9～1.1%，*l*- メントール（$C_{10}H_{20}O$：156.27）2.7～3.3%を含む。

性　　状　本品は淡黄色澄明の液で，ハッカのにおいがある。

確認試験　（1）　本品 1mL にメタノール 4mL を加えて，試料溶液とする。別にインドメタシン 10mg をメタノール 5mL に溶かし，標準溶液とする。これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び標準溶液 5μL ずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲル（蛍光剤入り）を用いて調製した薄層板にスポットする。次にジエチルエーテル・酢酸（100）混液（100：3）を展開溶媒として約 10cm 展開した後，薄層板を風乾する。これに紫外線（主波長 254nm）を照射するとき，試料溶液から得たスポットは，標準溶液から得た暗紫色のスポットと色調及び *Rf* 値が等しい。

（2）　本品 2mL に水 5mL を加え，石油エーテル 10mL で抽出する。石油エーテル抽出液を蒸発乾固し，残留物にエタノール（99.5）10mL を加えた後，硫酸 3mL を加えて振り混ぜるとき，液は黄赤色を呈する（メントール）。

（３）　本品 5mL を水浴上で蒸発乾固し，残留物に水 1mL，ブロモフェノールブルー溶液（1→2000）0.2mL 及び水酸化ナトリウム試液 0.5mL の混液を加えるとき，液は青色を呈し，これにクロロホルム 4mL を加えて激しく振り混ぜるとき，青色はクロロホルム層に移る。このクロロホルム層を分取し，振り混ぜながらラウリル硫酸ナトリウム溶液（1→1000）を滴加するとき，クロロホルム層は無色となる（ベンザルコニウム塩化物）。

定 量 法　（１）　本品 5mL を正確に量り，メタノールを加えて正確に 50mL とする。この液をろ過し，初めのろ液 10mL を除き，次のろ液 5mL を正確に量り，内標準溶液 3mL を正確に加え，更に移動相を加えて 100mL とし，試料溶液とする。別にインドメタシン標準品を 105℃で 4 時間乾燥し，その約 50mg を精密に量り，メタノールに溶かし，正確に 50mL とする。この液 5mL を正確に量り，内標準溶液 3mL を正確に加え，更に移動相を加えて 100mL とし，標準溶液とする。試料溶液及び標準溶液 20 μL につき，次の条件で液体クロマトグラフ法により試験を行い，内標準物質のピーク面積に対するインドメタシンのピーク面積の比 Q_T 及び Q_S を求める。

インドメタシン（$C_{19}H_{16}ClNO_4$）の量（mg）

$$= W_S \times (Q_T / Q_S)$$

W_S：インドメタシン標準品の秤取量（mg）

内標準溶液　パラオキシ安息香酸ブチルのメタノール溶液（1→1000）

操作条件

検出器：紫外吸光光度計（測定波長：254nm）

カラム：内径約 4mm，長さ 15～25cm のステンレス管に 5～10μm のオクタデシルシリル化シリカゲルを充てんする。

カラム温度：25℃付近の一定温度

移動相：メタノール／薄めたリン酸（1→1000）混液（7：3）

流量：インドメタシンの保持時間が約 8 分になるように調整する。

カラムの選定：標準溶液 20μL につき，上記の条件で操作するとき，パラオキシ安息香酸ブチル，インドメタシンの順に溶出し，それぞれのピークが完全に分離するものを用いる。

（２）　本品 2mL を正確に量り，内標準溶液 5mL を正確に加え，アセトンを加えて 50mL とし，試料溶液とする。別に定量用 *l*- メントール約 0.06g を精密に量り，アセトン 30mL に溶かし，内標準溶液 5mL を正確に加え，更にアセトンを加えて 50mL とし，標準溶液とする。試料溶液及び標準溶液 2μL につき，次の条件でガスクロマトグラフ法により試験を行い，内標準物質のピーク面積に対する *l*- メントールのピーク面積の比 Q_T 及び Q_S を求める。

l- メントール（$C_{10}H_{20}O$）の量（mg）

$$= \text{定量用 } l\text{- メントールの量（mg）} \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

内標準溶液　安息香酸エチルのアセトン溶液（1→100）

操作条件

検出器：水素炎イオン化検出器

カラム：内径約 3mm，長さ約 3m のガラス管に，ガスクロマトグラフ法ポリエチレングリコール 20M をシラン処理した 180～250μm のガスクロマトグラフ用ケイソウ土に 10%の割合で被覆したものを充てんする。

カラム温度：150℃付近の一定温度

キャリヤーガス：窒素

流量：*l*- メントールの保持時間が約 6 分になるように調整する。

カラムの選定：標準溶液 3μL につき，上記の条件で操作するとき，*l*- メントール，安息香酸エチルの順に流出し，完全に分離するものを用いる。

【 120 】　外皮用薬 31—①

成分及び分量 又は本質	日本薬局方	ヒドロコルチゾン酢酸エステル	0.5g
	基剤　〃	マクロゴール軟膏	適　量
		全　量	100g
製造方法	以上をとり，軟膏剤の製法により製する。		
用法及び用量	適宜，患部に塗布する。		
効能又は効果	湿疹・皮膚炎，かぶれ，しもやけ，ひび，あかぎれ，ただれ		
貯蔵方法及び 有効期間	気密容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考			

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は白色である。

確認試験　（1）　本品 10g をとり，ジエチルエーテル 10mL ずつで 2 回振り混ぜた後，ろ過する。残留物をとり，クロロホルム 20mL ずつで 2 回抽出する。クロロホルム抽出液を合わせ，あらかじめクロロホルムで潤した脱脂綿を用いてろ過し，水浴上でクロロホルムを留去し，残留物約 5mg に硫酸 2mL を加えるとき，初めに帯黄緑色の蛍光を発し，徐々にだいだい色を経て暗赤色に変わる。この液に水 10mL を加えるとき，液は黄色からだいだい黄色に変わり，緑色の蛍光を発する（ヒドロコルチゾン酢酸エステル）。

（2）　（1）で得た残留物約 10mg にメタノール 1mL を加え，加温して，振り混ぜた後，ろ過し，ろ液にフェーリング試液 1mL を加えて加熱するとき，だいだい色～赤色の沈殿を生じる（ヒドロコルチゾン酢酸エステル）。

【 121 】　外皮用薬 32—①

成分及び分量 又は本質	日本薬局方　ヒドロコルチゾン酢酸エステル　0.5g 基剤　〃　白色ワセリン　適量 全量　100g
製造方法	以上をとり，軟膏剤の製法により製する。
用法及び用量	適宜，患部に塗布する。
効能又は効果	湿疹・皮膚炎，ただれ，かぶれ，しもやけ，ひび，あかぎれ
貯蔵方法及び 有効期間	気密容器
規格及び試験方法	別記のとおり。
備考	

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は白色である。

確認試験　（１）　本品 0.5g をとり，無水硫酸ナトリウム 5g 及びメタノール 30mL を加え，60℃の水浴上でかき混ぜた後，氷冷し，遠心して上澄液を分取する。同様の操作を更に 2 回繰り返し，全抽出液を合わせ，メタノールを加えて 100mL とする。これをろ過し，ろ液 5mL を共せん試験管にとり，メタノール 5mL 及びイソニアジド溶液 2mL を加えて混和し，密せんして 60℃の水浴上で 20 分間加温する。このとき，液の色は黄色を呈する（ヒドロコルチゾン酢酸エステル）。

○イソニアジド溶液：イソニアジド 3g をメタノールに溶かし，塩酸 3.75mL を加え，メタノールを加えて 1000mL とする。

（２）　本品 2g をとり，ジエチルエーテル 10mL ずつで 2 回振り混ぜた後，ろ過する。残留物にクロロホルム 20mL を加えて抽出した後，ろ過し，水浴上でクロロホルムを留去する。残留物に硫酸 2mL を加えるとき，初めに帯黄緑色の蛍光を発し，徐々にだいだい色を経て，暗赤色に変わる。この液に水 10mL を加えるとき，液は黄色からだいだい黄色に変わり，緑色の蛍光を発する（ヒドロコルチゾン酢酸エステル）。

【 122 】　外皮用薬 33—①

成分及び分量又は本質		日本薬局方	ヒドロコルチゾン酢酸エステル	0.5g
		局　外　規	グリチルレチン酸	0.5g
	溶解補助剤	日本薬局方	マクロゴール 400	5.0mL
	基　　剤	〃	マクロゴール軟膏	適　量
			全　　量	100g
製造方法	以上をとり，軟膏剤の製法により製する。			
用法及び用量	適宜，患部に塗布する。			
効能又は効果	湿疹・皮膚炎，かぶれ，かゆみ，ただれ，あせも			
貯蔵方法及び有効期間	気密容器			
規格及び試験方法	別記のとおり。			
備　　考				

規 格 及 び 試 験 方 法

本品は定量するとき，ヒドロコルチゾン酢酸エステル（$C_{23}H_{32}O_6$：404.50）0.45～0.55%及びグリチルレチン酸（$C_{30}H_{46}O_4$：470.69）0.9～1.1%を含む。

性　　状　本品は白色の軟膏である。

確認試験　本品 0.2g にメタノール 5mL を加えて振り混ぜた後，ろ過し，ろ液を試料溶液とする。別にヒドロコルチゾン酢酸エステル 1mg 及びグリチルレチン酸 2mg をそれぞれメタノール 5mL に溶かし標準溶液（1）及び標準溶液（2）とする。これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び標準溶液 5μL ずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲルを用いて調製した薄層板にスポットする。次にジクロルメタン・ジエチルエーテル・メタノール・水混液（160：30：8：1）を展開溶媒として約 10cm 展開した後，薄層板を風乾する。これに紫外線（主波長 254nm）を照射するとき，試料溶液から得た 2 個のスポットは，標準溶液（1）及び標準溶液（2）から得たスポットと色調及び *Rf* 値が等しい。また，この薄層板にアルカリ性ブルーテトラゾリウム試液を均等に噴霧するとき，標準溶液（1）から得たスポット及びそれに対応する位置の試料溶液から得たスポットは，紫色を呈する。

定 量 法　（1）　本品約 1.0g を精密に量り，メタノール 30mL を加えて振り混ぜた後，内標準溶液 5mL を正確に加え，更にメタノールを加えて 50mL とし，試料溶液とする。別に定量用ヒドロコルチゾン酢酸エステル約 0.02g を精密に量り，メタノールに溶かして正確に 20mL とする。この液 5mL を正確に量り，内標準溶液 5mL を正確に加え，メタノールを加えて 50mL とし，標準溶液とする。試料溶液及び標準溶液 10μL につき，次の条件で液体クロマトグラフ法により試験を行い，内標準物質のピーク面積に対するヒドロコルチゾン酢酸エステルのピーク面積の比 Q_T 及び Q_S を求める。

ヒドロコルチゾン酢酸エステル（$C_{23}H_{32}O_6$）の量（mg）

$$=\text{ヒドロコルチゾン酢酸エステルの量（mg）}\times\frac{Q_T}{Q_S}\times\frac{1}{4}$$

内標準溶液　パラオキシ安息香酸メチルのメタノール溶液（1→2000）

操作条件

検出器：紫外吸光光度計（測定波長：240nm）

カラム：内径約 4mm，長さ 15～25cm のステンレス管に 5～10 μm のオクタデシルシリル化シリカゲルを充てんする。

カラム温度：40℃付近の一定温度

移動相：メタノール・水混液（1：1）

流量：ヒドロコルチゾン酢酸エステルの保持時間が約 13 分になるように調整する。

カラムの選定：標準溶液 10 μL につき，上記の条件で操作するとき，パラオキシ安息香酸メチル，ヒドロコルチゾン酢酸エステルの順に溶出し，それぞれのピークが完全に分離するものを用いる。

（２）　本品約 0.5g を精密に量り，メタノール 30mL を加えて振り混ぜた後，内標準溶液 5mL を正確に加え，更にメタノールを加えて 50mL とする。この液をろ過し，ろ液を試料溶液とする。別に定量用グリチルレチン酸約 0.02g を精密に量り，メタノールに溶かして正確に 20mL とする。この液 5mL を正確に量り，内標準溶液 5mL を正確に加え，メタノールを加えて 50mL とし，標準溶液とする。試料溶液及び標準溶液 10μL につき，次の条件で液体クロマトグラフ法により試験を行い，内標準物質のピーク面積に対するグリチルレチン酸のピーク面積の比 Q_T 及び Q_S を求める。

グリチルレチン酸（$C_{30}H_{46}O_4$）の量（mg）

$$=\text{定量用グリチルレチン酸の量（mg）}\times\frac{Q_T}{Q_S}\times\frac{1}{4}$$

内標準溶液　パラオキシ安息香酸ヘプチルのメタノール溶液（1→3000）

操作条件

検出器：紫外吸光光度計（測定波長：254nm）

カラム：内径約 4mm，長さ 15～25cm のステンレス管に 5～10μm のオクタデシルシリル化シリカゲルを充てんする。

カラム温度：40℃付近の一定温度

移動相：メタノール・薄めた酢酸（1→100）混液（4：1）

流量：グリチルレチン酸の保持時間が約 6 分になるように調整する。

カラムの選定：標準溶液 10μL につき，上記の条件で操作するとき，パラオキシ安息香酸ヘプチル，グリチルレチン酸の順に溶出し，それぞれのピークが完全に分離するものを用いる。

【 123 】　外皮用薬 34—①

成分及び分量 又は本質	日本薬局方	ヒドロコルチゾン酢酸エステル	0.5g
		脱脂大豆の乾留タール	1.0g
	日本薬局方	酸化亜鉛	2.0g
	基剤　〃	白色ワセリン	適量
		全量	100g
製造方法	以上をとり，軟膏剤の製法により製する。		
用法及び用量	適宜，患部に塗布する。		
効能又は効果	湿疹・皮膚炎，ひび，あかぎれ		
貯蔵方法及び 有効期間	気密容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考			

規格及び試験方法

本品は定量するとき，酸化亜鉛（ZnO：81.38）1.8～2.2%を含む。

性　状　本品は茶褐色で，特異なにおいがある。

確認試験　**（1）**　本品 0.5g をとり，無水硫酸ナトリウム 5g 及びメタノール 30mL を加え，60℃の水浴上でかき混ぜた後，氷冷し，遠心して上澄液を分取する。同様の操作を更に 2 回繰り返し，全抽出液を合わせ，メタノールを加えて 100mL とする。これをろ過し，ろ液 5mL を共せん試験管にとり，メタノール 5mL 及びイソニアジド溶液 2mL を加えて混和し，密せんして 60℃の水浴上で 20 分間加温する。このとき，液の色は微かに赤色を帯びた黄色を呈する（ヒドロコルチゾン酢酸エステル）。

○イソニアジド溶液：イソニアジド 3g をメタノールに溶かし，塩酸 3.75mL を加え，メタノールを加えて 1000mL とする。

（2）　本品 1g を磁製るつぼにとり，弱く加熱して融解し，徐々に温度を高めて炭化し，更にこれを強熱するとき，黄色を呈する。この色は冷えると消える。更にこれに希塩酸 10mL を加えてよくかき混ぜた後，ヘキサシアノ鉄（Ⅱ）酸カリウム試液を加えるとき，白色の沈殿を生じる（酸化亜鉛）。

定量法　本品約 10g を磁製るつぼに精密に量り，初め弱く加熱して融解し，徐々に温度を高めて炭化し，更に残留物が黄色となるまで強熱する。冷後，残留物に水 1mL 及び塩酸 1mL を加えて溶かした後，水を加えて正確に 50mL とし，ろ過する。ろ液 20mL を正確に量り，水 80mL を加え，水酸化ナトリウム溶液（1→50）を液がわずかに沈殿を生じるまで加え，次に pH10.7 のアンモニア・塩化アンモニウム緩衝液 5mL を加えた後，

0.05mol/L エチレンジアミン四酢酸二ナトリウム液で滴定する（指示薬：エリオクロムブラックＴ・塩化ナトリウム指示薬 0.04g）。

0.05mol/L エチレンジアミン四酢酸二ナトリウム液 1mL＝4.069mg ZnO

【 124 】　外皮用薬 35—①

成分及び分量 又は本質	日本薬局方	ヒドロコルチゾン酢酸エステル	0.5g
	〃	酸化亜鉛	5.0g
	基剤　〃	親水クリーム	適量
		全量	100g
製造方法	以上をとり，クリーム剤の製法により製する。		
用法及び用量	適宜，患部に塗布する。		
効能又は効果	湿疹・皮膚炎，ただれ，かぶれ，しもやけ，あかぎれ，ひび		
貯蔵方法及び有効期間	気密容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考			

規 格 及 び 試 験 方 法

本品は定量するとき，酸化亜鉛（ZnO：81.38）4.5～5.5%を含む。

性　　状　本品は白色である。

確認試験　（1）　本品 10g をとり，分液漏斗に入れ，ジエチルエーテル 10mL ずつで 2 回振り混ぜた後，ろ過する。残留物をとり，クロロホルム 20mL ずつで 2 回抽出する。クロロホルム抽出液を合わせ，あらかじめクロロホルムで潤した脱脂綿を用いてろ過し，水浴上でクロロホルムを留去し，残留物約 5mg に硫酸 2mL を加えるとき，初めに帯黄緑色の蛍光を発し，徐々にだいだい色を経て暗赤色に変わる。この液に水 10mL を加えるとき，液は黄色からだいだい黄色に変わり，緑色の蛍光を発する（ヒドロコルチゾン酢酸エステル）。

（2）　（1）で得た残留物約 10mg にメタノール 1mL を加え，加温して振り混ぜた後，ろ過し，ろ液にフェーリング試液 1mL を加えて加熱するとき，だいだい色～赤色の沈殿を生じる（ヒドロコルチゾン酢酸エステル）。

（3）　本品 1g にジエチルエーテル 20mL を加えて振り混ぜた後，ろ過する。残留物をジエチルエーテル 10mL ずつで 2 回洗った後，乾燥する。これを強熱するとき黄色を呈し，この色は冷えると消える。また，これを希塩酸 10mL に溶かし，ヘキサシアノ鉄（Ⅱ）酸カリウム試液を加えるとき，白色の沈殿を生じる（酸化亜鉛）。

定 量 法　本品約 10g を精密に量り，るつぼに入れ，弱く加熱して融解し，徐々に温度を高めて炭化し，次に残留物が黄色となるまで強熱し，冷後，水 1mL 及び塩酸 1.5mL を加えて溶かした後，水を加えて正確に 100mL とする。この液 20mL を正確に量り，水 80mL を加え，水酸化ナトリウム溶液（1→50）を液がわずかに沈殿を生じるまで加え，次に pH10.7 のアンモニア・塩化アンモニウム緩衝液 5mL を加えた後，0.05mol/L エチレ

ンジアミン四酢酸二ナトリウム液で滴定する（指示薬：エリオクロムブラック T・塩化ナトリウム指示薬 0.04g）。

0.05mol/L エチレンジアミン四酢酸二ナトリウム液 1mL＝4.069mg　ZnO

【 125 】　外皮用薬 36—①

成分及び分量 又は本質	日本薬局方	ヒドロコルチゾン酢酸エステル	0.5g
	〃	ジフェンヒドラミン	0.5g
	基剤　〃	白色ワセリン	適量
		全量	100g
製造方法	以上をとり，軟膏剤の製法により製する。		
用法及び用量	適宜，患部に塗布する。		
効能又は効果	湿疹・皮膚炎，じんましん，ただれ，あせも，かぶれ，かゆみ，しもやけ，虫さされ		
貯蔵方法及び有効期間	遮光した気密容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	ヒドロコルチゾン・ジフェンヒドラミン軟膏		

規格及び試験方法

本品は定量するとき，ヒドロコルチゾン酢酸エステル（$C_{22}H_{32}$：404.50）0.45～0.55%及びジフェンヒドラミン（$C_{12}H_{21}NO$：255.36）0.45～0.55%を含む。

性　状　本品は白色～微黄色である。

確認試験　（1）　本品 1g にエタノール（95）10mL を加え，時々振り混ぜながら水浴上で 5 分間加熱する。冷後，ろ過し，ろ液 5mL をとり，エタノール（95）を留去した後，残留物に硫酸 2mL を加えるとき，液は初め黄緑色の蛍光を発し，徐々に黄色を経て黄褐色に変わる。この液に注意して水 10mL を加えるとき，液は黄色に変わり，緑色の蛍光を発し，淡黄色の浮遊物を生じる（ヒドロコルチゾン酢酸エステル）。

（2）　（1）のろ液 1mL に pH4.6 のフタル酸水素カリウム緩衝液 5mL 及びブロモフェノールブルー試液 2mL を加え，更にクロロホルム 5mL を加えてよく振り混ぜた後，静置するとき，クロロホルム層は黄色を呈する（ジフェンヒドラミン）。

（3）　本品 1g にメタノール 5mL を加えて加温し，振り混ぜ，冷後，メタノール層を分取し，試料溶液とする。別にヒドロコルチゾン酢酸エステル及びジフェンヒドラミン 0.01g ずつをそれぞれメタノール 10mL に溶かし，標準溶液（1）及び標準溶液（2）とする。これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び標準溶液 5μL ずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲル（混合蛍光剤入り）を用いて調製した薄層板にスポットする。次に酢酸エチル・ジエチルエーテル混液（4：1）を展開溶媒として約 10cm 展開した後，薄層板を風乾する。これに紫外線（広域波長）を照射するとき，試料溶液から得た 2 個のスポットの *Rf* 値は，標準溶液（1）及び標準溶液（2）から得たそれぞれのスポットの *Rf* 値に等しい。

定 量 法　（1）　本品約 1.0g を精密に量り，テトラヒドロフラン 30mL を加えて振り混ぜた後，内標準溶液 5mL を正確に加え，更にメタノールを加えて 50mL とする。この液をろ過し，初めのろ液 10mL を除き，次のろ液を試料溶液とする。別にヒドロコルチゾン酢酸エステル標準品約 0.02g を精密に量り，メタノールに溶かして正確に 20mL とする。この液 5mL を正確に量り，内標準溶液 5mL を正確に加え，テトラヒドロフラン 30mL を加え，更にメタノールを加えて溶かし 50mL とし，標準溶液とする。試料溶液及び標準溶液 10μL につき，次の条件で液体クロマトグラフ法により試験を行い，内標準物質のピーク面積に対するヒドロコルチゾン酢酸エステルのピーク面積の比 Q_T 及び Q_S を求める。

ヒドロコルチゾン酢酸エステル（$C_{23}H_{32}O_6$）の量（mg）

$$= \text{ヒドロコルチゾン酢酸エステル標準品の量（mg）} \times \frac{Q_T}{Q_S} \times \frac{1}{4}$$

内標準溶液　パラオキシ安息香酸エチルのメタノール溶液（1→1250）

操作条件

検出器：紫外吸光光度計（測定波長：240nm）

カラム：内径約 4mm，長さ 15～25cm のステンレス管に 5～10μm の液体クロマトグラフ用オクタデシルシリル化シリカゲルを充てんする。

カラム温度：40℃付近の一定温度

移動相：メタノール・水混液（55：45）

流量：ヒドロコルチゾン酢酸エステルの保持時間が約 8 分になるように調整する。

カラムの選定：標準溶液 10μL につき，上記の条件で操作するとき，パラオキシ安息香酸エチル，ヒドロコルチゾン酢酸エステルの順に溶出し，それぞれのピークが完全に分離するものを用いる。

（2）　本品約 1.0g を精密に量り，テトラヒドロフラン 30mL を加え，振り混ぜた後，内標準溶液 5mL を正確に加え，更にメタノールを加えて 50mL とする。この液をろ過し，初めのろ液 10mL を除き，次のろ液を試料溶液とする。別に定量用ジフェンヒドラミン約 0.025g を精密に量り，メタノールに溶かし，正確に 50mL とする。この液 10mL を正確に量り，内標準溶液 5mL を正確に加え，テトラヒドロフラン 30mL を加え，更にメタノールを加えて 50mL とし，標準溶液とする。試料溶液及び標準溶液 10μL につき，次の条件で液体クロマトグラフ法により試験を行い，内標準物質のピーク面積に対するジフェンヒドラミンのピーク面積の比 Q_T 及び Q_S を求める。

ジフェンヒドラミン（$C_{17}H_{21}NO$）の量（mg）

$$= \text{定量用ジフェンヒドラミンの量（mg）} \times \frac{Q_T}{Q_S} \times \frac{1}{5}$$

内標準溶液　パラオキシ安息香酸ヘプチルのメタノール溶液（1→450）

操作条件

検出器：紫外吸光光度計（測定波長：220nm）

カラム：内径約 4mm，長さ 15～25cm のステンレス管に 5～10μm の液体クロマトグラフ用オクタデシルシリル化シリカゲルを充てんする。

カラム温度：40℃付近の一定温度

移動相：ドデシル硫酸ナトリウム 5g を薄めたリン酸（1→1000）に溶かして 1000mL とする。この液 350mL にアセトニトリル 650mL を加える。

流量：ジフェンヒドラミンの保持時間が約 6 分になるように調整する。

カラムの選定：標準溶液 10μL につき，上記の条件で操作するとき，ジフェンヒドラミン，パラオキシ安息香酸ヘプチルの順に溶出し，それぞれのピークが完全に分離するものを用いる。

【 126 】　外皮用薬 37—①

成分及び分量 又は本質	日本薬局方	ジフェンヒドラミン	1.0g
	〃	酸化亜鉛	5.0g
	基剤　〃	吸水クリーム	適　量
		全　　量	100g
製造方法	以上をとり，クリーム剤の製法により製する。		
用法及び用量	適宜，患部に塗布する。		
効能又は効果	湿疹，小児ストロフルス，じんましん，皮膚瘙痒症，虫ささされ		
貯蔵方法及び有効期間	気密容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考			

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は帯黄白色である。

確認試験　本品 200g に水 500mL を加えて振り混ぜた後，水酸化ナトリウム試液でアルカリ性とし，ジエチルエーテル 100mL ずつで 3 回抽出する。ジエチルエーテル抽出液を合わせ，水浴上で約 50mL になるまで濃縮する。これを薄めた希塩酸（1→5）20mL ずつで 3 回抽出し，抽出液を合わせ，次に水酸化ナトリウム試液でアルカリ性とし，ジエチルエーテル 20mL ずつで 3 回抽出する。ジエチルエーテル抽出液を合わせ，水浴上でジエチルエーテルを留去した後，残留物に濃硫酸 2mL を加えるとき，直ちに黄色となり，これを放置するとき，赤褐色となる。また，この液に等容量の水を加えるとき，赤褐色の沈殿を生ずる（ジフェンヒドラミン）。

【 127 】　外皮用薬 38—①

成分及び分量 又は本質	日本薬局方	ジフェンヒドラミン	1.0g
	〃	酸化亜鉛	5.0g
	基剤　〃	マクロゴール軟膏	適　量
		全　　量	100g
製造方法	以上をとり，軟膏剤の製法により製する。		
用法及び用量	適宜，患部に塗布する。		
効能又は効果	湿疹，小児ストロフルス，じんましん，皮膚瘙痒症，虫ささされ		
貯蔵方法及び有効期間	気密容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考			

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は帯黄白色である。

確認試験　本品 200g に水 500mL を加えて振り混ぜた後，水酸化ナトリウム試液でアルカリ性とし，ジエチルエーテル 100mL ずつで 3 回抽出する。ジエチルエーテル抽出液を合わせ，水浴上でジエチルエーテルを留去した後，残留物に濃硫酸 2mL を加えるとき，直ちに黄色となり，これを放置するとき，赤褐色となる。また，この液に等容量の水を加えるとき，赤褐色の沈殿を生ずる（ジフェンヒドラミン）。

【 128 】　外皮用薬 39

成分及び分量 又は本質	日本薬局方	チンク油	40.0g
	〃	亜鉛華軟膏	60.0g
		全　　量	100g
製造方法	以上をとり，軟膏剤の製法により製する。		
用法及び用量	適宜，患部に塗布するか，又はガーゼなどに展延し，患部に貼布する。		
効能又は効果	湿疹・皮膚炎，あせも，ただれ，かぶれ		
貯蔵方法及び 有効期間	気密容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考			

規 格 及 び 試 験 方 法

本品は定量するとき，酸化亜鉛（ZnO：81.38）28.8～35.2%を含む。

性　　状　本品は白色である。

確認試験　本品 1g にジエチルエーテル 20mL を加えて振り混ぜた後，ろ過する。残留物をジエチルエーテル 10mL ずつで 2 回洗った後，乾燥し，これを強熱するとき黄色を呈し，この色は冷えると消える。また，これを希塩酸 10mL に溶かし，ヘキサシアノ鉄（Ⅱ）酸カリウム試液を加えるとき，白色の沈殿を生じる（酸化亜鉛）。

定 量 法　本品約 1.5g を精密に量り，るつぼに入れ，弱く加熱して融解し，徐々に温度を高めて炭化し，次に残留物が黄色となるまで強熱し，冷後，水 1mL 及び塩酸 1.5mL を加えて溶かした後，水を加えて正確に 100mL とする。この液 20mL を正確に量り，水 80mL を加え，水酸化ナトリウム溶液（1→50）を液がわずかに沈殿を生じるまで加え，次に pH10.7 のアンモニア・塩化アンモニウム緩衝液 5mL を加えた後，0.05mol/L エチレンジアミン四酢酸二ナトリウム液で滴定する（指示薬：エリオクロムブラック T・塩化ナトリウム指示薬 0.04g）。

0.05mol/L エチレンジアミン四酢酸二ナトリウム液 1mL＝4.069mg　ZnO

【 129 】　外皮用薬 40—②

成分及び分量 又は本質	日本薬局方		トルナフタート	2.0g
	溶解補助剤	〃	マクロゴール 400	50.0mL
	溶剤	〃	エタノール	適量
			全量	100mL
製造方法	以上をとり，外用液剤の製法により製する。			
用法及び用量	患部を清潔にして，1 日 2～3 回塗布する。			
効能又は効果	みずむし，ぜにたむし，いんきんたむし			
貯蔵方法及び有効期間	気密容器			
規格及び試験方法	日本薬局方による。			
備考	トルナフタート液			

【 130 】　外皮用薬 41—②

成分及び分量 又は本質	日本薬局方	トルナフタート	2.0g
	溶解補助剤　局外規	クロタミトン	5.0g
	基剤　薬添規	ゲル化炭化水素	適量
		全量	100g
製造方法	以上をとり，軟膏剤の製法により製する。		
用法及び用量	患部を清潔にして，1 日 2～3 回塗布する。		
効能又は効果	みずむし，ぜにたむし，いんきんたむし		
貯蔵方法及び有効期間	気密容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考			

規 格 及 び 試 験 方 法

本品は定量するとき，トルナフタート（$C_{19}H_{17}NOS$：307.42）1.8～2.2%，クロタミトン（$C_{13}H_{17}NO$：203.28）4.5～5.5%を含む。

性　　状　本品は白色の軟膏剤である。

確認試験　本品 0.5g にクロロホルム 5mL を加えてかき混ぜた後，ろ過し，ろ液を試料溶液とする。別にトルナフタート 0.01g 及びクロタミトン 0.025g をそれぞれクロロホルム 5mL に溶かし，標準溶液（1）及び標準溶液（2）とする。これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び標準溶液 2μL ずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲル（蛍光剤入り）を用いて調製した薄層板にスポットする。次にベンゼン・エタノール（99.5）混液（99：1）を展開溶媒として約 10cm 展開した後，薄層板を風乾する。これに紫外線（主波長 254nm）を照射するとき，試料溶液から得た 2 個のスポットは標準溶液（1）及び標準溶液（2）から得たそれぞれのスポットと色調及び *Rf* 値が等しい。

定 量 法　本品約 0.5g を精密に量り，テトラヒドロフラン 30mL を加えて振り混ぜた後，内標準溶液 5mL を正確に加え，更にメタノールを加えて 100mL とする。この液をろ過し，初めのろ液 10mL を除き，次のろ液を試料溶液とする。別に定量用トルナフタート約 0.1g 及び定量用クロタミトン約 0.25g を精密に量り，メタノールに溶かし正確に 50mL とする。この液 5mL を正確に量り，内標準溶液 5mL を正確に加え，テトラヒドロフラン 30mL を加えた後，更にメタノールを加えて 100mL とし，標準溶液とする。試料溶液及び標準溶液 10μL につき，次の条件で液体クロマトグラフ法により試験を行い，内標準物質のピーク面積に対するトルナフタート及びクロタミトンのピーク面積の比 Q_{Ta}，Q_{Tb}，Q_{Sa} 及び Q_{Sb} を求める。

トルナフタート（$C_{19}H_{17}NOS$）の量（mg）

＝定量用トルナフタートの量（mg）×$\frac{Q_{Ta}}{Q_{Sa}}\times\frac{1}{10}$

クロタミトン（$C_{13}H_{17}NO$）の量（mg）

＝定量用クロタミトンの量（mg）×$\frac{Q_{Tb}}{Q_{sb}}\times\frac{1}{10}$

内標準溶液　ナフタレンのメタノール溶液（1→150）

操作条件

検出器：紫外吸光光度計（測定波長：254nm）

カラム：内径約 4mm，長さ 15～25cm のステンレス管に 5～10μm のオクタデシルシリル化シリカゲルを充てんする。

カラム温度：40℃付近の一定温度

移動相：メタノール・水混液（75：25）

流量：トルナフタートの保持時間が約 10 分になるように調整する。

カラムの選定：標準溶液 10 μL につき，上記の条件で操作するとき，クロタミトン，ナフタレン，トルナフタートの順に溶出し，それぞれのピークが完全に分離するものを用いる。

【 131 】　外皮用薬 42—①

成分及び分量 又は本質	日本薬局方	アクリノール水和物	1.0g
	〃	ジブカイン塩酸塩	0.3g
	基剤　〃	亜鉛華軟膏	適　量
		全　　量	100g
製造方法	以上をとり，軟膏剤の製法により製する。		
用法及び用量	適宜患部に塗布するか，又はガーゼなどに展延し，貼布する。		
効能又は効果	すりきず，きりきず，靴ずれ，湿疹		
貯蔵方法及び有効期間	遮光した気密容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考			

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は黄白色である。

確認試験（１）　本品 0.5g を強熱して灰化し，残留物を希塩酸 5mL に溶かした液は，亜鉛塩の定性反応を呈する（亜鉛華）。

（２）　本品 1g にジエチルエーテル 10mL，酢酸（100）1mL 及び水 5mL を加えて振り混ぜた後，水層を分取し，試料溶液とする。別にアクリノール水和物 5mg 及びジブカイン塩酸塩 5mg にそれぞれ酢酸（100）1mL 及び水 5mL を加えて溶かし，標準溶液（1）及び標準溶液（2）とする。これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び標準溶液 5μL ずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲル（蛍光剤入り）を用いて調製した薄層板にスポットする。次にクロロホルム・エタノール（99.5）混液（7：3）を展開溶媒として約 10cm 展開した後，薄層板を風乾する。これに紫外線（主波長 365nm）を照射するとき，試料溶液から得た数個のスポットのうち 1 個のスポットは，標準溶液（1）から得た青色の蛍光を発するスポットと色調及び *Rf* 値が等しい。また，紫外線（主波長 254nm）を照射するとき，試料溶液から得た数個のスポットのうち 1 個のスポットは，標準溶液（2）から得た紫色のスポットと色調及び *Rf* 値が等しい。

【 132 】　外皮用薬 43—②

成分及び分量 又は本質		日本薬局方	ヒドロコルチゾン酢酸エステル	0.5g
		局外規	グリチルレチン酸	1.0g
	溶解補助剤	日本薬局方	プロピレングリコール	5.0mL
	基剤	〃	親水クリーム	適量
			全量	100g
製造方法	以上をとり，クリーム剤の製法により製する。			
用法及び用量	適宜，患部に塗布する。			
効能又は効果	湿疹・皮膚炎，かぶれ，あせも，かゆみ，しもやけ，虫ささされ，じんましん			
貯蔵方法及び有効期間	気密容器			
規格及び試験方法	別記のとおり。			
備考				

規 格 及 び 試 験 方 法

本品は定量するとき，ヒドロコルチゾン酢酸エステル（$C_{23}H_{32}O_6$：404.50）0.45～0.55%及びグリチルレチン酸（$C_{30}H_{46}O_4$：470.69）0.9～1.1%を含む。

性　　状　本品は白色のクリームである。

確認試験　本品 0.2g にテトラヒドロフラン 5mL を加えて振り混ぜた後，ろ過し，ろ液を試料溶液とする。別にヒドロコルチゾン酢酸エステル 1mg 及びグリチルレチン酸 2mg をそれぞれテトラヒドロフラン 5mL に溶かし標準溶液（1）及び標準溶液（2）とする。これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び標準溶液 5μL ずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲルを用いて調製した薄層板にスポットする。次にジクロルメタン・ジエチルエーテル・メタノール・水混液（160：30：8：1）を展開溶媒として約 10cm 展開した後，薄層板を風乾する。これに紫外線（主波長 254nm）を照射するとき，試料溶液から得た数個のスポットのうち 2 個のスポットは，標準溶液（1）及び標準溶液（2）から得たスポットと色調及び *Rf* 値が等しい。また，この薄層板にアルカリ性ブルーテトラゾリウム試液を均等に噴霧するとき，標準溶液（1）から得たスポット及びそれに対応する位置の試料溶液から得たスポットは，紫色を呈する。

定 量 法（1）　本品約 1.0g を精密に量り，テトラヒドロフラン 30mL を加えて振り混ぜた後，内標準溶液 5mL を正確に加え，更にメタノールを加えて 50mL とする。この液をろ過し，初めのろ液 10mL を除き，次のろ液を試料溶液とする。別に定量用ヒドロコルチゾン酢酸エステル約 0.02g を精密に量り，メタノールに溶かして正確に 20mL とする。この液 5mL を正確に量り，内標準溶液 5mL を正確に加え，テトラヒドロフラン 30mL を加え，更にメタノールを加えて 50mL とし，標準溶液とする。試料溶液及び標準溶液

10μL につき，次の条件で液体クロマトグラフ法により試験を行い，内標準物質のピーク面積に対するヒドロコルチゾン酢酸エステルのピーク面積の比 Q_T 及び Q_S を求める。

ヒドロコルチゾン酢酸エステル（$C_{23}H_{32}O_6$）の量（mg）

$$= \text{ヒドロコルチゾン酢酸エステルの量（mg）} \times \frac{Q_T}{Q_S} \times \frac{1}{4}$$

内標準溶液　パラオキシ安息香酸メチルのメタノール溶液（1→2000）

操作条件

検出器：紫外吸光光度計（測定波長：240nm）

カラム：内径約 4mm，長さ 15～25cm のステンレス管に 5～10μm のオクタデシルシリル化シリカゲルを充てんする。

カラム温度：40℃付近の一定温度

移動相：メタノール・水混液（1：1）

流量：ヒドロコルチゾン酢酸エステルの保持時間が約 13 分になるように調整する。

カラムの選定：標準溶液 10μL につき，上記の条件で操作するとき，パラオキシ安息香酸メチル，ヒドロコルチゾン酢酸エステルの順に溶出し，それぞれのピークが完全に分離するものを用いる。

（2）　本品約 0.5g を精密に量り，テトラヒドロフラン 30mL を加えて振り混ぜた後，内標準溶液 5mL を正確に加え，更にメタノールを加えて正確に 50mL とする。この液をろ過し，ろ液を試料溶液とする。別に定量用グリチルレチン酸約 0.02g を精密に量り，メタノールに溶かして正確に 20mL とする。この液 5mL を正確に量り，内標準溶液 5mL を正確に加え，テトラヒドロフラン 30mL を加え，更にメタノールを加えて 50mL とし標準溶液とする。試料溶液及び標準溶液 10μL につき，次の条件で液体クロマトグラフ法により試験を行い，内標準物質のピーク面積に対するグリチルレチン酸のピーク面積の比 Q_T 及び Q_S を求める。

グリチルレチン酸（$C_{30}H_{46}O_4$）の量（mg）

$$= \text{定量用グリチルレチン酸の量（mg）} \times \frac{Q_T}{Q_S} \times \frac{1}{4}$$

内標準溶液　パラオキシ安息香酸ヘプチルのメタノール溶液（1→3000）

操作条件

検出器：紫外吸光光度計（測定波長：254nm）

カラム：内径約 4mm，長さ 15～25cm のステンレス管に 5～10μm のオクタデシルシリル化シリカゲルを充てんする。

カラム温度：40℃付近の一定温度

移動相：メタノール・薄めた酢酸（1→100）混液（4：1）

流量：グリチルレチン酸の保持時間が約 9 分になるように調整する。

カラムの選定：標準溶液 10μL につき，上記の条件で操作するとき，パラオキシ安息香酸ヘプチル，グリチルレチン酸の順に溶出し，それぞれのピークが完全に分離するものを用いる。

【 133 】　外皮用薬 44

成分及び分量 又は本質	日本薬局方　酸化亜鉛　50.0g 賦形剤　〃　デンプン　適量 全量　100g
製造方法	以上をとり，散剤の製法により製する。
用法及び用量	適宜，患部に散布する。
効能又は効果	湿疹・皮膚炎，ただれ，あせも
貯蔵方法及び 有効期間	密閉容器
規格及び試験方法	日本薬局方による。
備考	亜鉛華デンプン

【 134 】　外皮用薬 45

成分及び分量 又は本質	日本薬局方	サリチル酸，細末	3.0g
	〃	乾燥硫酸アルミニウムカリウム，微末	64.0g
	〃	タルク，微末	適　量
		全　　量	100g
製造方法	以上をとり，散剤の製法により製する。		
用法及び用量	適宜，患部に散布する。		
効能又は効果	あせも，ただれ，局所多汗症		
貯蔵方法及び 有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	日本薬局方による。		
備考	サリチル・ミョウバン散		

【 135 】　外皮用薬 46

成分及び分量又は本質	局　外　規	レゾルシン	2.0g
	日本薬局方	サリチル酸	2.0g
	湿潤剤　〃	グリセリン	3.0g
	溶　剤　〃	エタノール	70.0mL
	〃　〃	精　製　水又は精製水（容器入り）	適　量
		全　　量	100mL
製造方法	以上をとり，溶解混和して製する。		
用法及び用量	1 日数回，適量を患部に塗布する。		
効能又は効果	みずむし，ぜにたむし，いんきんたむし		
貯蔵方法及び有効期間	遮光した気密容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備　　考			

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は無色透明の液である。

確認試験（１）　本品 10mL をとり，水浴上で冷風を送りながら溶媒を留去する。残留物にクロロホルム 50mL 及び水 20mL を加えて振り混ぜ，クロロホルム層を分取し，更に水層をクロロホルム 20mL で 2 回抽出する。全クロロホルム層を合わせ，無水硫酸ナトリウム 5g を加えて振り混ぜた後，ろ過し，ろ液に炭酸水素ナトリウム試液 20mL を加えて振り混ぜ，水層を分取する。水層 1mL をとり，pH2.0 の塩酸・塩化カリウム緩衝液を加えて 50mL とする。この液 5mL をとり，硝酸鉄（Ⅲ）試液 5mL を加えるとき，液は赤紫色を呈する（サリチル酸）。

（２）　（１）の水層 2mL に水酸化ナトリウム試液 3mL を加え，クロロホルム 2 滴を加えて加熱するとき，液は深赤色を呈し，塩酸 10 滴を加えるとき，淡黄色に変わる（レゾルシン）。

【 136 】　外皮用薬 47

成分及び分量又は本質		日本薬局方	チアントール	20.0mL
		〃	サリチル酸	2.0g
		〃	フェノール	2.0g
	着香剤	〃	オリブ油	5.0mL
	溶　剤	〃	エーテル	10.0mL
	〃	〃	石油ベンジン	適　量
			全　　量	100mL
製造方法	「サリチル酸」及び「フェノール」を「エーテル」に溶かし，これに「チアントール」,「オリブ油」及び「石油ベンジン」を加え，溶解混和し，全量を 100mL とする。			
用法及び用量	適宜，患部に塗布する。			
効能又は効果	みずむし，いんきんたむし，ぜにたむし，かいせん			
貯蔵方法及び有効期間	遮光した気密容器に入れ，25℃以下で保存する。			
規格及び試験方法	日本薬局方による。			
備考	複方チアントール・サリチル酸液			

【 137 】　外皮用薬 48

成分及び分量 又は本質	日本薬局方	サリチル酸	3.0g
	湿潤剤　〃	グリセリン	5.0mL
	溶剤　〃	エタノール	適量
		全量	100mL
製造方法	以上をとり，酒精剤の製法により製する。		
用法及び用量	適宜，患部に塗布する。		
効能又は効果	みずむし，いんきんたむし，ぜにたむし		
貯蔵方法及び有効期間	気密容器		
規格及び試験方法	日本薬局方による。		
備考	サリチル酸精		

【 138 】　外皮用薬 49

成分及び分量又は本質	日本薬局方	サリチル酸	2.0g
	〃	液状フェノール	0.5mL
	湿潤剤　〃	グリセリン	4.0mL
	溶　剤　〃	エタノール	80.0mL
	〃　〃	常水又は精製水又は精製水（容器入り）	適　量
		全　　量	100mL
製造方法	以上をとり，酒精剤の製法により製する。		
用法及び用量	適宜，患部に塗布する。		
効能又は効果	みずむし，いんきんたむし，ぜにたむし		
貯蔵方法及び有効期間	気密容器		
規格及び試験方法	日本薬局方による。		
備考	複方サリチル酸精		

【 139 】　外皮用薬 50—①

成分及び分量又は本質	日本薬局方	ヨードチンキ	20.0mL
	〃	サリチル酸	5.0g
	〃	液状フェノール	2.2mL
	〃	安息香酸	8.0g
	溶　剤　〃	消毒用エタノール	適　量
		全　量	100mL
製造方法	以上をとり，酒精剤の製法により製する。ただし，「エタノール」及び「精製水又は精製水（容器入り）」適量を用いて製することができる。		
用法及び用量	適宜，患部に塗布する。		
効能又は効果	みずむし，いんきんたむし，ぜにたむし		
貯蔵方法及び有効期間	遮光した気密容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考			

規 格 及 び 試 験 方 法

本品は定量するとき，ヨウ素（I：126.90）1.08～1.32%，ヨウ化カリウム（KI：166.00）0.72～0.88%，サリチル酸（$C_7H_6O_3$：138.12）4.5～5.5%，フェノール（C_6H_6O：94.11）1.8～2.2%及び安息香酸（$C_7H_6O_2$：122.12）7.2～8.8%を含む。

性　　状　本品は暗赤褐色の液で，フェノールのにおいがある。

確認試験（１）　本品 1 滴をデンプン試液 1mL 及び水 9mL の混液に加えるとき，暗青紫色を呈する（ヨウ素）。

（２）　本品 1mL にエタノール（95）5mL 及び水を加えて 50mL とする。この液 1mL に pH2.0 の塩酸・塩化カリウム緩衝液を加えて 50mL とする。この液 15mL に硝酸鉄（Ⅲ）九水和物溶液（1→200）5mL を加えるとき，液は赤紫色を呈する（サリチル酸）。

（３）　本品 1mL にチオ硫酸ナトリウム試液 1mL を加えて振り混ぜ，水 20mL 及び希塩酸 5mL を加え，ジエチルエーテル 25mL で抽出する。ジエチルエーテル抽出液を炭酸水素ナトリウム試液 25mL ずつで 2 回洗った後，希水酸化ナトリウム試液 10mL で抽出する。抽出液 1mL に亜硝酸ナトリウム試液 1mL 及び希塩酸 1mL を加えて振り混ぜ，更に水酸化ナトリウム試液 3mL を加えるとき，液は黄色を呈する（フェノール）。

（４）　本品 1mL にチオ硫酸ナトリウム試液 1mL を加えて振り混ぜ，更に水 20mL 及び希塩酸 5mL を加え，ジエチルエーテル 10mL で抽出し，試料溶液とする。別にサリチル酸 25mg，フェノール 0.01g 及び安息香酸 0.04g をそれぞれジエチルエーテル 5mL に溶かし，標準溶液（1），標準溶液（2）及び標準溶液（3）とする。これらの液につき，薄層ク

ロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液，標準溶液（1），標準溶液（2）及び標準溶液（3）5μL ずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲル（蛍光剤入り）を用いて調製した薄層板にスポットする。次にクロロホルム・アセトン・酢酸（100）混液（45：5：1）を展開溶媒として約 10cm 展開した後，薄層板を風乾する。これに紫外線（主波長 254nm）を照射するとき，試料溶液から得た 3 個のスポットの *Rf* 値は，標準溶液（1），標準溶液（2）及び標準溶液（3）から得たそれぞれのスポットの *Rf* 値に等しい。また，この薄層板に塩化鉄（Ⅲ）試液を均等に噴霧するとき，標準溶液（1）から得たスポット及びそれに対応する位置の試料溶液から得たスポットは，紫色を呈する。

定 量 法（1） ヨウ素本品 4mL を正確に量り，エタノール（95）を加えて正確に 50mL とし，試料溶液とする。別に定量用ヨウ素約 1.2g 及び 105℃で 4 時間乾燥した定量用ヨウ化カリウム約 0.8g をそれぞれ精密に量り，エタノール（95）に溶かし，正確に 100mL とする。この液 4mL を正確に量り，エタノール（95）を加えて正確に 50mL とし，標準溶液とする。試料溶液及び標準溶液 3mL ずつを正確に量り，それぞれにクロロホルム・ヘキサン混液（2：1）25mL を正確に加えて振り混ぜ，更に水 10mL を正確に加えて振り混ぜた後，クロロホルム・ヘキサン層を分取し，〔水層は（2）に用いる〕，脱脂綿でろ過する。ろ液につき，クロロホルム・ヘキサン混液（2：1）を対照とし，紫外可視吸光度測定法により試験を行う。試料溶液及び標準溶液から得たそれぞれの液の波長 512nm における吸光度 A_T 及び A_S を測定する。

ヨウ素（I）の量（mg）＝W_S×（A_T／A_S）×（1／25）

W_S：定量用ヨウ素の秤取量（mg）

（2） ヨウ化カリウム （1）の試料溶液及び標準溶液から得た水層 8mL ずつを正確に量り，それぞれに薄めた希塩酸（1→2）1mL 及び亜硝酸ナトリウム試液 1mL を加えて振り混ぜ，直ちにクロロホルム・ヘキサン混液（2：1）10mL を正確に加えて振り混ぜ，更に水 10mL を正確に加えて振り混ぜた後，以下（1）と同様に操作する。

ヨウ化カリウム（KI）の量（mg）＝W_S×（A_T／A_S）×（1／25）

W_S：定量用ヨウ化カリウムの秤取量（mg）

（3） サリチル酸，フェノール及び安息香酸 本品 2mL を正確に量り，薄めたメタノール（1→2）20mL を加える。この液に 0.1mol/L チオ硫酸ナトリウム液をヨウ素の色が消えるまで加えた後，内標準溶液 20mL を正確に加え，更に薄めたメタノール（1→2）を加えて 200mL とし，試料溶液とする。別にデシケーター（シリカゲル）で 3 時間乾燥した定量用サリチル酸約 0.2g，定量用フェノール約 80mg 及びデシケーター（シリカゲル）で 3 時間乾燥した安息香酸約 0.32g をそれぞれ精密に量り，薄めたメタノール（1→2）に溶かし，正確に 50mL とする。この液 25mL を正確に量り，内標準溶液 20mL を正確に加え，更に薄めたメタノール（1→2）を加えて 200mL とし，標準溶液とする。試料溶液及び標準溶液 3μL につき，次の条件で液体クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液の内標準物質のピーク面積に対するサリチル酸，フェノール及び安息香酸のピーク面積の比 Q_{Ta}，Q_{Tb} 及び Q_{Tc} 並びに標準溶液の内標準物質のピーク面積に対するサリチル酸，フェノール及び安息香酸のピーク面積の比 Q_{Sa}，Q_{Sb} 及び Q_{Sc} を求める。

サリチル酸（$C_7H_6O_3$）の量（mg）＝W_{Sa}×（Q_{Ta}／Q_{Sa}）×（1／2）

フェノール（C_6H_6O）の量（mg）＝W_{Sb}×（Q_{Tb}／Q_{Sb}）×（1／2）

安息香酸（$C_7H_6O_2$）の量（mg）＝W_{Sc}×（Q_{Tc}／Q_{Sc}）×（1／2）

W_{Sa}：定量用サリチル酸の秤取量（mg）

W_{Sb}：定量用フェノールの秤取量（mg）

W_{Sc}：安息香酸の秤取量（mg）

内標準溶液　テオフィリンのメタノール溶液（1→1000）

操作条件

検出器：紫外吸光光度計（測定波長：270nm）

カラム：内径約 4mm，長さ 25～30cm のステンレス管に 5μm の液体クロマトグラフ用オクタデシルシリル化シリカゲルを充てんする。

カラム温度：室温

移動相：pH7.0 の 0.1mol/L リン酸塩緩衝液・メタノール混液（3：1）

流量：サリチル酸の保持時間が約 6 分になるように調整する。

カラムの選定：安息香酸 0.2g，サリチル酸 0.2g 及びテオフィリン 0.05g を薄めたメタノール（1→2）100mL に溶かす。この液 10mL に薄めたメタノール（1→2）90mL を加える。この液 10μL につき，上記の条件で操作するとき，安息香酸，サリチル酸，テオフィリンの順に溶出し，それぞれのピークが完全に分離するものを用いる。

【 140 】　外皮用薬 51—①

成分及び分量 又は本質		日本薬局方　サリチル酸	5.0g
	基剤	〃　白色ワセリン	適量
		全量	100g
製造方法	以上をとり，軟膏剤の製法により製する。		
用法及び用量	適宜，患部に塗布する。ただし，小児には使用しないこと。		
効能又は効果	みずむし，いんきんたむし，ぜにたむし		
貯蔵方法及び 有効期間	気密容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考			

規格及び試験方法

性　　状　本品は白色である。

確認試験　本品 1g にジエチルエーテル 20mL を加えてよくかき混ぜた後，ろ過する。ろ液に炭酸水素ナトリウム試液 5mL を加えて振り混ぜた後，水層を分取する。この液 1mL に pH2.0 の塩酸・塩化カリウム緩衝液を加えて 200mL とする。この液 5mL をとり，硝酸鉄（Ⅲ）九水和物溶液（1→200）5mL を加えるとき，液は赤紫色を呈する。

【 141 】　外皮用薬 52

成分及び分量又は本質	日本薬局方	イ　オ　ウ	10.0g
	〃	サリチル酸，細末	3.0g
	〃	チアントール	10.0mL
	〃	酸化亜鉛，微末	10.0g
	基　剤　〃	単軟膏又は適当な軟膏基剤	適　量
		全　　量	100g
製造方法	以上をとり，軟膏剤の製法により製する。		
用法及び用量	適宜，患部に塗布する。		
効能又は効果	みずむし，いんきんたむし，ぜにたむし，かいせん		
貯蔵方法及び有効期間	気密容器		
規格及び試験方法	日本薬局方による。		
備考	イオウ・サリチル酸・チアントール軟膏		

【 142 】　外皮用薬 53—①

成分及び分量 又は本質	日本薬局方	サリチル酸	3.0g
	〃	イオウ	3.0g
	基剤　〃	オリブ油	10.0g
	〃　〃	流動パラフィン	3.0g
	〃　〃	白色ワセリン	適量
		全量	100g
製造方法	以上をとり，軟膏剤の製法により製する。		
用法及び用量	適宜，患部に塗布する。		
効能又は効果	みずむし，ぜにたむし，いんきんたむし		
貯蔵方法及び有効期間	気密容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考			

規格及び試験方法

本品は定量するとき，サリチル酸（$C_7H_6O_3$：138.12）2.7～3.3%を含む。

性　状　本品は白色の軟膏剤である。

確認試験（1）　本品 1g に水 10mL を加えてかき混ぜた後，放置する。上澄液 5mL に塩化鉄（Ⅲ）試液 1 滴を加えるとき，赤紫色を呈する（サリチル酸）。

（2）　本品 2g にジエチルエーテル 20mL を加えてかき混ぜた後，遠心分離する。上澄液を除き，残留物にピリジン 2mL 及び炭酸水素ナトリウム試液 0.2mL を加えて煮沸するとき，青色を呈する（イオウ）。

定量法　本品約 0.5g を精密に量り，テトラヒドロフラン 10mL を加えて振り混ぜて溶かした後，内標準溶液 5mL を正確に加え，更にメタノールを加えて 100mL とする。この液をろ過し，初めのろ液 10mL を除き，次のろ液を試料溶液とする。別に定量用サリチル酸約 0.015g を精密に量り，テトラヒドロフラン 10mL に溶かし，内標準溶液 5mL を正確に加え，更にメタノールを加えて 100mL とし，標準溶液とする。試料溶液及び標準溶液 10μL につき，次の条件で液体クロマトグラフ法により試験を行い，内標準物質のピーク面積に対するサリチル酸のピーク面積の比 Q_T 及び Q_S を求める。

サリチル酸（$C_7H_6O_3$）の量（mg）

$$= \text{定量用サリチル酸の量（mg）} \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

内標準溶液　テオフィリンのメタノール溶液（1→3500）

操作条件

検出器：紫外吸光光度計（測定波長：270nm）

カラム：内径約 4mm，長さ 15～25cm のステンレス管に 5～10μm のオクタデシルシリル化シリカゲルを充てんする。

カラム温度：40℃付近の一定温度

移動相：pH6.5 の 0.1mol/L リン酸塩緩衝液・アセトニトリル混液（9：1）

流量：サリチル酸の保持時間が約 7 分になるように調整する。

カラムの選定：標準溶液 10μL につき，上記の条件で操作するとき，テオフィリン，サリチル酸の順に溶出し，それぞれのピークが完全に分離するものを用いる。

【 143 】　外皮用薬 54—①

成分及び分量 又は本質	局　外　規	ウンデシレン酸	2.0g
	〃	ウンデシレン酸亜鉛	5.0g
	日本薬局方	サリチル酸	3.0g
	〃	ジフェンヒドラミン	1.0g
	〃	亜鉛華軟膏	89.0g
		全　　量	100g
製造方法	以上をとり，軟膏剤の製法により製する。		
用法及び用量	適宜，患部に塗布する。		
効能又は効果	みずむし，ぜにたむし，いんきんたむし		
貯蔵方法及び有効期間	遮光した気密容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備　　考			

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は白色である。

確認試験（１）　本品 1g をとり，水 10mL を加えてよくかき混ぜた後，上澄液を分取する。これに塩化鉄（Ⅲ）試液 1～2 滴を加えるとき，液の色は赤紫色を呈する（サリチル酸）。

（２）　本品 10g にヘキサン 50mL を加えてよくかき混ぜた後，ろ過する。ろ液に 0.2mol/L 塩酸試液 20mL を加えて振り混ぜ，水層を分取する。水酸化ナトリウム試液を加えて pH4.6 に調整し，この液 10mL に pH4.6 のフタル酸水素カリウム緩衝液 10mL 及びブロモフェノールブルー溶液（1→1000）1mL を加えて振り混ぜ，クロロホルム 10mL を加えて振り混ぜるとき，クロロホルム層は黄色を呈する（ジフェンヒドラミン）。

○ブロモフェノールブルー溶液（1→1000）

ブロモフェノールブルー100mg に pH4.6 のフタル酸水素カリウム緩衝液を加えて溶かし，100mL とする。必要ならばろ過する（用時製する）。

【 144 】　外皮用薬 55—①

成分及び分量又は本質	日本薬局方	クロトリマゾール	1.0g
	基剤　〃	マクロゴール軟膏	適　量
		全　量	100g
製造方法	以上をとり，軟膏剤の製法により製する。		
用法及び用量	患部を清潔にして 1 日 2～3 回，適量を塗布する。		
効能又は効果	みずむし，いんきんたむし，ぜにたむし		
貯蔵方法及び有効期間	遮光した気密容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考			

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は白色である。

確認試験（１）　本品 1.5g に 5mol/L 塩酸試液 5mL を加え，加温して溶かし，冷後，ライネッケ塩試液 3 滴を加えるとき，淡赤色の沈殿を生じる（クロトリマゾール）。

（２）　本品 0.1g に希塩酸 5mL を加えて溶かし，塩化バリウム試液 1mL を加えて振り混ぜた後，リンモリブデン酸 n 水和物溶液（1→10）1mL を加えるとき，黄緑色の沈殿を生じる（マクロゴール）。

【 145 】　外皮用薬 56

成分及び分量 又は本質		日本薬局方	ベンゼトニウム塩化物，微末	0.5g
		〃	タ　ル　ク	30.0g
		〃	酸化亜鉛	35.0g
	賦形剤	〃	デンプン	適　量
			全　　量	100g
製造方法	以上をとり，散剤の製法により製する。			
用法及び用量	適宜，患部に散布する。			
効能又は効果	みずむし，いんきんたむし，ぜにたむし			
貯蔵方法及び 有効期間	密閉容器			
規格及び試験方法	第十二改正日本薬局方による。			
備考	複方ベンゼトニウム・タルク散			

【 146 】　外皮用薬 57—①

成分及び分量又は本質		日本薬局方　水酸化カリウム	0.3g
		〃　グリセリン	20.0mL
	溶　剤	〃　エタノール	25.0mL
		芳　香　剤	微　量
	溶　剤	日本薬局方　常水又は精製水又は精製水（容器入り）	適　量
		全　　量	100mL
製造方法	「水酸化カリウム」に「常水」又は「精製水又は精製水（容器入り）」の一部を加えて溶かした後，「グリセリン」，「エタノール」，芳香剤及び残りの「常水」又は「精製水又は精製水（容器入り）」を加え，ろ過して製する。ただし，「グリセリン」の代わりに「濃グリセリン」を用いて製することができる。		
用法及び用量	適宜，患部に塗布する。		
効能又は効果	ひび，あかぎれ，皮膚のあれ		
貯蔵方法及び有効期間	気密容器		
規格及び試験方法	日本薬局方による。		
備考	グリセリンカリ液		

【 147 】　外皮用薬 58—②

成分及び分量 又は本質	日本薬局方	ジブカイン塩酸塩	0.5g
	〃	ヒドロコルチゾン酢酸エステル	0.5g
	〃	*l*- メントール	1.0g
	〃	*dl* - カンフル	1.0g
	基　剤　〃	親水クリーム	適　量
		全　　量	100g
製造方法	以上をとり，クリーム剤の製法により製する。		
用法及び用量	適宜，患部に塗布する。		
効能又は効果	虫ささされ，かゆみ，じんましん		
貯蔵方法及び有効期間	遮光した気密容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備　　考			

規 格 及 び 試 験 方 法

本品は定量するとき，ジブカイン塩酸塩（$C_{20}H_{29}N_3O_2$・HCl：379.93）0.45～0.55%，ヒドロコルチゾン酢酸エステル（$C_{23}H_{32}O_6$：404.50）0.45～0.55%，メントール（$C_{10}H_{20}O$：156.27）0.9～1.1%，カンフル（$C_{10}H_{16}O$：152.24）0.9～1.1%を含む。

性　　状　本品は白色のクリーム剤である。

確認試験　本品 0.5g にテトラヒドロフラン 5mL を加えてかき混ぜた後，ろ過し，ろ液を試料溶液とする。別にジブカイン塩酸塩 2mg 及びヒドロコルチゾン酢酸エステル 2mg をそれぞれメタノール 4mL に溶かし，標準溶液（1）及び標準溶液（2）とする。これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び標準溶液 2 μL ずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲル（蛍光剤入り）を用いて調製した薄層板にスポットする。次にジクロルメタン・ジエチルエーテル・メタノール・水混液（160：30：8：1）を展開溶媒として約 10cm 展開した後，薄層板を風乾する。これに紫外線（主波長 254nm）を照射するとき，試料溶液から得た 2 個のスポットは標準溶液（1）及び標準溶液（2）から得たそれぞれのスポットと色調及び *Rf* 値が等しい。また，これに紫外線（主波長 365nm）を照射するとき，標準溶液（1）及びこれに対応する位置の試料溶液から得たそれぞれのスポットは青色の蛍光を発する。この薄層板にアルカリ性ブルーテトラゾリウム試液を均等に噴霧するとき，標準溶液（2）から得たスポット及びこれに対応する位置の試料溶液から得たスポットは，紫色を呈する。

定 量 法（1）　本品約 1.0g を精密に量り，テトラヒドロフラン 30mL を加えて振り混ぜた後，メタノールを加えて 50mL とする。この液をろ過し，初めのろ液 10mL を除き，次のろ液 5mL を正確に量り，内標準溶液 3mL を正確に加え，メタノールを加えて 25mL

とし，試料溶液とする。別に定量用ジブカイン塩酸塩約 0.02g を精密に量り，メタノールを加えて，正確に 20mL とする。この液 2mL を正確に量り，メタノールに溶かし，正確に 20mL とする。この液 5mL を正確に量り，内標準溶液 3mL を正確に加え，メタノールを加えて 25mL とし，標準溶液とする。試料溶液及び標準溶液 10μL につき，次の条件で液体クロマトグラフ法により試験を行い，内標準物質のピーク面積に対するジブカイン塩酸塩のピーク面積の比 Q_T 及び Q_S を求める。

ジブカイン塩酸塩（$C_{20}H_{29}N_3O_2$・HCl）の量（mg）

$$= \text{定量用ジブカイン塩酸塩の量（mg）} \times \frac{Q_T}{Q_S} \times \frac{1}{4}$$

内標準溶液　パラオキシ安息香酸ヘキシルのメタノール溶液（1→6000）

操作条件

検出器：紫外吸光光度計（測定波長：240nm）

カラム：内径約 4mm，長さ 15～25cm のステンレス管に 5～10μm のオクタデシルシリル化シリカゲルを充てんする。

カラム温度：40℃付近の一定温度

移動相：ドデシル硫酸ナトリウム 3g を薄めたリン酸（1→1000）に溶かして 1000mL とする。この液 270mL にメタノール 730mL を加える。

流量：ジブカイン塩酸塩の保持時間が約 10 分になるように調整する。

カラムの選定：標準溶液 10μL につき，上記の条件で操作するとき，パラオキシ安息香酸ヘキシル，ジブカイン塩酸塩の順に溶出し，それぞれのピークが完全に分離するものを用いる。

（2）　本品約 1.0g を精密に量り，テトラヒドロフラン 30mL を加えて振り混ぜた後，メタノールを加えて 50mL とする。この液をろ過し，初めのろ液 10mL を除き，次のろ液 5mL を正確に量り，内標準溶液 5mL を正確に加え，メタノールを加えて 50mL とし，試料溶液とする。別に定量用ヒドロコルチゾン酢酸エステル約 0.01g を精密に量り，メタノールに溶かし，正確に 25mL とする。この液 5mL を正確に量り，メタノールを加えて正確に 20mL とする。この液 5mL を正確に量り，内標準溶液 5mL を正確に加え，メタノールを加えて 50mL とし，標準溶液とする。試料溶液及び標準溶液 10μL につき，次の条件で液体クロマトグラフ法により試験を行い，内標準物質のピーク面積に対するヒドロコルチゾン酢酸エステルのピーク面積の比 Q_T 及び Q_S を求める。

ヒドロコルチゾン酢酸エステル（$C_{23}H_{32}O_6$）の量（mg）

$$= \text{定量用ヒドロコルチゾン酢酸エステルの量（mg）} \times \frac{Q_T}{Q_S} \times \frac{1}{2}$$

内標準溶液　パラオキシ安息香酸エチルのメタノール溶液（1→12000）

操作条件

検出器：紫外吸光光度計（測定波長：240nm）

カラム：内径約 4mm，長さ 15～25cm のステンレス管に 5～10μm のオクタデシルシリル化シリカゲルを充てんする。

カラム温度：40℃付近の一定温度

移動相：メタノール・薄めたリン酸（1→1000）混液（55：45）

流量：ヒドロコルチゾン酢酸エステルの保持時間が約 10 分になるように調整する。

カラムの選定：標準溶液 10μL につき，上記の条件で操作するとき，パラオキシ安息香酸エチル，ヒドロコルチゾン酢酸エステルの順に溶出し，それぞれのピークが完全に分離するものを用いる。

（３） 本品約 2.5g を精密に量り，アセトン 30mL を加えて振り混ぜた後，内標準溶液 5mL を正確に加え，更にアセトンを加えて 50mL とする。この液をろ過し，初めのろ液 10mL を除き，次のろ液を試料溶液とする。別に定量用 *l*- メントール約 0.05g 及び *dl* - カンフル約 0.05g をそれぞれ精密に量り，アセトン 30mL に溶かし，内標準溶液 5mL を正確に加え，更にアセトンを加えて 50mL とし，標準溶液とする。試料溶液及び標準溶液 2μL につき，次の条件でガスクロマトグラフ法により試験を行い，内標準物質のピーク面積に対する *l*- メントール及び *dl* - カンフルのピーク面積の比 Q_{Ta}，Q_{Tb}，Q_{Sa} 及び Q_{Sb} を求める。

l- メントール（$C_{10}H_{20}O$）の量（mg）

＝定量用 l―メントールの量（mg）$\times \frac{Q_{Ta}}{Q_{Sa}}$

dl - カンフル（$C_{10}H_{16}O$）の量（mg）

＝定量用 *dl* - カンフルの量（mg）$\times \frac{Q_{Tb}}{Q_{sb}}$

内標準溶液　サリチル酸メチルのアセトン溶液（1→100）

操作条件

検出器：水素炎イオン化検出器

カラム：内径約 3mm，長さ約 2m のガラス管にガスクロマトグラフ用ジエチレングリコールアジピン酸エステル及びリン酸を 180～250μm のガスクロマトグラフ用ケイソウ土に 5%及び 1%の割合で被覆したものを充てんする。

カラム温度：80℃付近の一定温度

キャリヤーガス：窒素

流量：*dl* - カンフルの保持時間が約 4 分になるように調整する。

カラムの選定：標準溶液 2μL につき，上記の条件で操作するとき，*dl* - カンフル，*l*- メントール，サリチル酸メチルの順に溶出し，それぞれのピークが完全に分離するものを用いる。

【 148 】　外皮用薬 59—①

成分及び分量又は本質		日本薬局方	ステアリン酸	10.0g
		〃	グリセリン	16.0g
	基　剤	〃	カカオ脂	2.0g
	〃	〃	流動パラフィン	1.0g
	〃	〃	サラシミツロウ	1.0g
	乳化剤	別紙規格	トリエタノールアミン	4.0g
	溶　剤	日本薬局方	精　製　水又は精製水（容器入り）	適　量
			全　　量	100g
製造方法	「ステアリン酸」,「カカオ脂」,「流動パラフィン」,「サラシミツロウ」及び「トリエタノールアミン」を適当な容器に秤取し，加温して溶解する。別に「グリセリン」を秤取し，適量の「精製水又は精製水（容器入り）」と混和し，約 70℃に加熱する。この加熱したグリセリン液を先に溶解したステアリン酸等の溶液に，少量ずつ撹拌しながら加え全質均等なクリーム状とし，徐々に放冷して製する。			
用法及び用量	適宜，患部に塗布する。			
効能又は効果	ひび，あかぎれ，しもやけ			
貯蔵方法及び有効期間	遮光した気密容器			
規格及び試験方法	別記のとおり。			
備　　考				

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は白色の全質均等の軟膏ようの物質である。

確認試験（１）　本品 5g に水 20mL を加えてかき混ぜ，分液漏斗に移す。これに飽和塩化ナトリウム溶液 5mL 及びジエチルエーテル 20mL を加えて振り混ぜ，水層を分取する。水層は（２）及び（３）の試験に用いる。ジエチルエーテル層は水酸化ナトリウム試液 10mL 及び水 80mL を加えて振り混ぜ，水層を分取する。水層はジエチルエーテル 10mL で洗い，希塩酸 5mL を加えて酸性とした後，クロロホルム 20mL ずつで 2 回抽出する。抽出液を合わせ，蒸発乾固する。残留物をエタノール（99.5）1mL に溶かし，この液 0.5mL に塩酸ヒドロキシルアミン飽和エタノール溶液 0.5mL 及びジシクロヘキシルカルボジイミド溶液 0.5mL を加え，10 分間放置する。これに塩化鉄（Ⅲ）エタノール（95）溶液 1～2 滴を加えるとき，淡赤紫褐色を呈する（ステアリン酸）。

ジシクロヘキシルカルボジイミド溶液：ジシクロヘキシルカルボジイミド 0.1g をエタノール（99.5）10mL に溶かす。

塩化鉄（Ⅲ）エタノール（95）溶液：塩化鉄（Ⅲ）0.5g をエタノール（99.5）50mL に溶かし，塩酸 2 滴を加える。

（２）　（１）の水層をとり，ジエチルエーテル 5mL で洗った後，クロロホルム 10mL ずつで 2 回抽出する。水層は（３）の試験に用いる。クロロホルム抽出液を合わせ，蒸発乾固する。残留物をエタノール（99.5）1mL に溶かし，この液 0.5mL をとり，水浴中で蒸発乾固する。残留物にクエン酸・無水酢酸溶液 0.5mL を加え，水浴中で 30 分間加熱するとき，赤紫色を呈する（トリエタノールアミン）。

クエン酸・無水酢酸溶液：クエン酸 0.2g に無水酢酸 10mL を加えて水浴上で加温して溶かす。

（３）　（２）の水層をとり，この液 1mL に飽和過ヨウ素酸カリウム溶液 0.4mL 及び薄めた硫酸（1→20）0.2mL を加え，5 分間放置する。これに亜硫酸水 0.3mL を加えた後，フクシン亜硫酸試液 2 滴を加え，10 分間放置するとき，赤紫色を呈する（グリセリン）。

別紙規格　　トリエタノールアミンの規格及び試験方法

本品は主としてトリエタノールアミンで，通例，ジエタノールアミン及びモノエタノールアミンを含む。

本品は定量するとき，トリエタノールアミン〔($C_6H_{15}NO_3$：149.19）として〕99.0～105.0%を含む。

性　　状　本品は無色～微黄色の粘性の液で，においはないか，又はわずかにアンモニアようのにおいがある。

本品は水，エタノール（95）又はクロロホルムと混和する。

本品は吸湿性である。

確認試験（１）　本品 1mL に硫酸銅試液 0.1mL を加えるとき，液は濃青色を呈する。この液に水酸化ナトリウム試液 5mL を加え，加熱して蒸発し，2mL とするとき，液の色は濃青色で沈殿を生じない。

（２）　本品 1mL に塩化コバルト試液 0.3mL を加えるとき，液は赤色を呈する。

（３）　本品 1mL をとり，徐々に加熱するとき，発生するガスは潤した赤色リトマス紙を青変する。

屈　折　率　n_D^{20}：1.481～1.486

比　　重　d_{20}^{20}：1.120～1.128

強熱残分　0.05%以下（2g）。

定 量 法　本品約 2g を精密に量り，水 75mL を加えて溶かし，1mol/L 塩酸で滴定する（指示薬：メチルレッド試液 2 滴）。

1mol/L 塩酸 1mL＝149.19mg　$C_6H_{15}NO_3$

【 149 】　外皮用薬 60—①

成分及び分量 又は本質	日本薬局方　ヒドロコルチゾン酢酸エステル　0.5g 〃　亜鉛華軟膏　適　量 全　　量　100g
製造方法	以上をとり，軟膏剤の製法により製する。
用法及び用量	適宜，患部に塗布する。
効能又は効果	湿疹・皮膚炎，ただれ，かぶれ
貯蔵方法及び 有効期間	気密容器
規格及び試験方法	別記のとおり。
備考	

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は白色である。

確認試験　（１）　本品 2g にジエチルエーテル 10mL を加えてよくかき混ぜた後，ろ過する。残留物にクロロホルム 20mL を加えてよくかき混ぜた後，ろ過し，水浴上でクロロホルムを留去する。残留物の半量をとり，硫酸 2mL を加えるとき，初めに帯黄緑色の蛍光を発し，徐々にだいだい色を経て暗赤色に変わる。この液に水 10mL を加えるとき，液は黄色からだいだい黄色に変わり，緑色の蛍光を発する（ヒドロコルチゾン酢酸エステル）。

（２）　（１）で得た残留物半量にメタノール 1mL を加え，加温して振り混ぜた後，ろ過し，ろ液にフェーリング試液 1mL を加えて加熱するとき，だいだい色～赤色の沈殿を生じる（ヒドロコルチゾン酢酸エステル）。

（３）　本品 1g にジエチルエーテル 20mL を加えてよくかき混ぜた後，ろ過する。残留物をジエチルエーテル 10mL ずつで 2 回洗った後，乾燥する。これを強熱するとき黄色を呈し，この色は冷えると消える。また，これを希塩酸 10mL に溶かし，ヘキサシアノ鉄（Ⅱ）酸カリウム試液を加えるとき，白色の沈殿を生じる（酸化亜鉛）。

【 150 】　外皮用薬 61—①

成分及び分量 又は本質	日本薬局方	*dl* - カンフル	5.0g
	〃	トコフェロール酢酸エステル	0.5g
	〃	*l* - メントール	2.0g
	基剤　〃	白色ワセリン	適量
		全量	100g
製造方法	以上をとり，軟膏剤の製法により製する。		
用法及び用量	適宜，患部に塗布する。		
効能又は効果	ひび，あかぎれ，しもやけ，肌あれ		
貯蔵方法及び 有効期間	遮光した気密容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考			

規 格 及 び 試 験 方 法

本品を定量するとき，トコフェロール酢酸エステル（$C_{31}H_{52}O_3$：472.75）0.45～0.55%を含む。

性　　状　本品は白色でそう快な芳香がある。

確認試験　（1）　本品 5g をとり，ジエチルエーテルを 10mL 加えて振り混ぜた後，ジエチルエーテル層を分取し，脱脂綿を用いてろ過する。脱脂綿をジエチルエーテル少量で洗い，洗液はジエチルエーテル液に合わせ，水浴上で注意しながらジエチルエーテルを留去する。残留物にメタノール 5mL を加えて振り混ぜた後，ろ過する。ろ液に 2,4 - ジニトロフェニルヒドラジン試液 1mL を加え，約 2 分間水浴上で加熱する。冷後，水を加えて約 5mL とし，放置した後，生成した沈殿をガラスろ過器（G4）でろ過する。ろ過器上の残留物を洗液が無色になるまで水洗し，エタノール（95）10mL を加えて溶かし，水酸化ナトリウム試液 5mL を加えて，2 分間放置するとき，液は赤色を呈する（カンフル）。

（2）　本品 1g にエタノール（95）10mL を加え，よく振り混ぜた後，ろ過する。ろ液に硝酸 2mL を加え，75℃で 15 分間加熱するとき，液はだいだい色を呈する（トコフェロール酢酸エステル）。

（3）　本品 5g にエタノール（95）10mL を加えてよく振り混ぜた後，ろ過する。ろ液に硫酸 10mL を加えて振り混ぜるとき，液は混濁して淡黄赤色を呈する（メントール）。

定 量 法　本品約 10g を精密に量り，クロロホルム 100mL を正確に加え，還流冷却器を付けて水浴上で約 30 分間ときどき振り混ぜながら加熱する。冷後，クロロホルム層を分取し，ろ過する。ろ液 80mL を正確にとり，水浴上で加温してクロロホルムを留去し，残留物に硫酸のエタノール（95）溶液（3→800）100mL を加えて振り混ぜ，水 20mL を加

え，0.01mol/L 硫酸四アンモニウムセリウム（Ⅳ）液でよくかき混ぜながら滴定する（指示薬：ジフェニルアミン試液 2 滴）。ただし，滴定の終点は液の青紫色が 10 秒間持続するときとし，操作は直射日光を避け，なるべく暗所で行い，滴加速度は 10 秒間に 25 滴とする。別に空試験を行い補正する。

0.01mol/L 硫酸四アンモニウムセリウム（Ⅳ）液 1mL＝2.3638mg　$C_{31}H_{52}O_3$

【 151 】　外皮用薬 62—①

成分及び分量 又は本質	日本薬局方	尿　素	5.0g
	〃	トコフェロール酢酸エステル	0.5g
	基　剤　〃	親水クリーム	適　量
		全　　量	100g
製造方法	以上をとり，クリーム剤の製法により製する。		
用法及び用量	適宜，患部に塗布する。		
効能又は効果	皮膚乾燥症（肌あれ，さめ肌，かゆみ），ひび，あかぎれ，しもやけ		
貯蔵方法及び有効期間	遮光した気密容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考			

規 格 及 び 試 験 方 法

本品は定量するとき，トコフェロール酢酸エステル（$C_{31}H_{52}O_3$：472.75）0.45～0.55%を含む。

性　　状　本品は白色で，わずかに特異なにおいがある。

確認試験　（1）　本品 10g にエタノール（95）10mL を加えて加温して振り混ぜた後，ろ過する。ろ液を冷却し，硝酸 2mL を加えるとき，白色の結晶性の沈殿を生じる（尿素）。

（2）　本品 10g にエタノール（95）10mL を加えて加温して振り混ぜた後，ろ過する。ろ液をとり加温してエタノール（95）を留去した後，残留物を加熱するとき赤色リトマス紙を青変する（尿素）。

（3）　本品 1g にエタノール（99.5）10mL を加え，よく振り混ぜた後，ろ過する。ろ液に硝酸 2mL を加え，75℃で 15 分間加熱するとき，液はだいだい色を呈する（トコフェロール酢酸エステル）。

定 量 法　本品約 10g を精密に量り，クロロホルム 100mL を正確に加え，還流冷却器を付けて水浴上で約 30 分間ときどき振り混ぜながら加熱する。冷後，クロロホルム層を分取し，ろ過する。ろ液 80mL を正確にとり，水浴上で加温してクロロホルムを留去し，残留物に硫酸のエタノール（95）溶液（3→200）100mL を加えて振り混ぜ，水 20mL を加え，0.01mol/L 硫酸四アンモニウムセリウム（Ⅳ）液でよくかき混ぜながら滴定する（指示薬：ジフェニルアミン試液 2 滴）。ただし，滴定の終点は液の青紫色が 10 秒間持続するときとし，操作は直射日光を避け，なるべく暗所で行い，滴加速度は 10 秒間に 25 滴とする。別に空試験を行い補正する。

0.01mol/L 硫酸四アンモニウムセリウム（Ⅳ）液 1mL＝2.3638mg　$C_{31}H_{52}O_3$

【 152 】　外皮用薬 63

成分及び分量 又は本質	日本薬局方	抱水クロラール	5.0g
	〃	サリチル酸	1.0g
	〃	*dl* - 又は *l* - メントール	0.5g
	溶　剤　〃	ヒマシ油	10.0mL
		芳　香　剤	微　量
	着色剤	厚生省令で定めた医薬品等に使用することができるタール色素別表 1 又は 2（緑色色素）	微　量
	溶　剤　日本薬局方	エタノール	適　量
		全　　量	100mL
製造方法	以上をとり，酒精剤の製法により製する。		
用法及び用量	適宜，患部に塗布する。		
効能又は効果	ふけ，かゆみ		
貯蔵方法及び有効期間	気密容器		
規格及び試験方法	第十二改正日本薬局方による。		
備　　考	クロラール・サリチル酸精		

【 153 】　外皮用薬 64—①

成分及び分量又は本質		日本薬局方　トウガラシチンキ	4.0mL
		〃　サリチル酸	5.0g
		〃　液状フェノール	2.0mL
	溶　剤	〃　ヒマシ油	10.0mL
		芳　香　剤	微　量
	溶　剤	日本薬局方　エタノール	適　量
		全　　量	100mL
製造方法	以上をとり，酒精剤の製法により製する。		
用法及び用量	適宜，患部に塗布する。		
効能又は効果	ふけ，かゆみ		
貯蔵方法及び有効期間	気密容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	トウガラシ・サリチル酸精		

規 格 及 び 試 験 方 法

本品は定量するとき，サリチル酸（$C_7H_6O_3$：138.12）4.5～5.5w/v%及びフェノール（C_6H_6O：94.11）1.7～2.1w/v%を含む。

性　　状　本品は淡褐黄色の液である。

比　　重　d_{20}^{20}：約 0.84

確認試験　（1）　本品 10mL に炭酸水素ナトリウム試液 15mL 及びジエチルエーテル 10mL を加えて振り混ぜた後，水層を分取する。この液 1mL に pH2.0 の塩酸・塩化カリウム緩衝液を加えて 200mL にする。この液 5mL に硝酸鉄（Ⅲ）九水和物溶液（1→200）5mL を加えるとき，液は赤紫色を呈する（サリチル酸）。

（2）　本品 0.5mL に水 20mL 及び希塩酸 5mL を加え，ジエチルエーテル 20mL で抽出し，ジエチルエーテル抽出液を炭酸水素ナトリウム試液 5mL ずつで 2 回洗った後，希水酸化ナトリウム試液 20mL で抽出する。抽出液 1mL に亜硝酸ナトリウム試液 1mL 及び希塩酸 1mL を加えて振り混ぜ，10 分間放置する。次に水酸化ナトリウム試液 3mL を加えるとき，液は黄色を呈する（フェノール）。

（3）　本品 0.2mL に希塩酸 5mL を加え，クロロホルム 5mL で抽出し，抽出液を試料溶液とする。別にサリチル酸 0.01g 及びフェノール 0.02g をそれぞれクロロホルム 5mL 及び 25mL に溶かし，標準溶液（1）及び標準溶液（2）とする。これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び標準溶液 5μL ずつを薄層クロマトグ

ラフ用シリカゲル（蛍光剤入り）を用いて調製した薄層板にスポットする。次にクロロホルム・アセトン・酢酸（100）混液（45：5：1）を展開溶媒として約 10cm 展開した後，薄層板を風乾する。これに紫外線（主波長 254nm）を照射するとき，試料溶液から得た 2 個のスポットの *Rf* 値は，標準溶液（1）及び標準溶液（2）から得たそれぞれのスポットの *Rf* 値に等しい。また，この薄層板に塩化鉄（Ⅲ）試液を均等に噴霧するとき，標準溶液（1）から得たスポット及びそれに対応する位置の試料溶液から得たスポットは，紫色を呈する。

定 量 法　本品 1mL を正確に量り，内標準溶液 5mL を正確に加え，メタノールを加えて 100mL とし，試料溶液とする。別に定量用サリチル酸をデシケーター（シリカゲル）で 3 時間乾燥し，その約 0.05g 及び定量用フェノール約 0.02g を精密に量り，内標準溶液 5mL を正確に加え，メタノールを加えて溶かし 100mL とし，標準溶液とする。試料溶液及び標準溶液 10 μL につき，次の条件で液体クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液の内標準物質のピーク面積に対するサリチル酸及びフェノールのピーク面積の比 Q_{Ta} 及び Q_{Tb} 並びに標準溶液の内標準物質のピーク面積に対するサリチル酸及びフェノールのピーク面積の比 Q_{Sa} 及び Q_{Sb} を求める。

サリチル酸（$C_7H_6O_3$）の量（mg）

$$= \text{定量用サリチル酸の量（mg）} \times \frac{Q_{Ta}}{Q_{Sa}}$$

フェノール（C_6H_6O）の量（mg）

$$= \text{定量用フェノールの量（mg）} \times \frac{Q_{Tb}}{Q_{sb}}$$

内標準溶液　カフェインのメタノール溶液（1→1000）

操作条件

検出器：紫外吸光光度計（測定波長：270nm）

カラム：内径約 4mm，長さ 15～25cm のステンレス管に 5～10μm の液体クロマトグラフ用オクタデシルシリル化シリカゲルを充てんする。

カラム温度：40℃付近の一定温度

移動相：pH7.0 の 0.1mol/L リン酸塩緩衝液・アセトニトリル混液（85：15）

流量：サリチル酸の保持時間が約 5 分になるように調整する。

カラムの選定：標準溶液 10μL につき，上記の条件で操作するとき，サリチル酸，カフェイン，フェノールの順に溶出し，それぞれのピークが完全に分離するものを用いる。

【 154 】　外皮用薬 65

成分及び分量 又は本質		日本薬局方	フェノール	3.0g
		〃	サリチル酸，細末	5.0g
			芳香剤	微　量
	基　剤	日本薬局方	白色ワセリン又は適当な軟膏基剤	適　量
			全　　量	100g
製造方法	以上をとり，軟膏剤の製法により製する。			
用法及び用量	適宜，患部に塗布する。			
効能又は効果	ふけ，かゆみ			
貯蔵方法及び 有効期間	気密容器			
規格及び試験方法	第十二改正日本薬局方による。			
備　　考	サリチル酸・フェノール軟膏			

【 155 】　外皮用薬 66

成分及び分量又は本質	日本薬局方	イオウ	6.0g
	〃	*d*- 又は *dl*- カンフル	0.5g
	懸濁化剤　〃	ヒドロキシプロピルセルロース	0.4g
	pH 調整剤　〃	水酸化カルシウム	0.1g
	溶　剤　〃	エタノール	0.4mL
	〃　〃	常水又は精製水又は精製水（容器入り）	適　量
		全　量	100mL
製造方法	「ヒドロキシプロピルセルロース」に「常水」又は「精製水又は精製水（容器入り）」20mL を加えて溶かし，これをあらかじめ「*d*- カンフル」又は「*dl*- カンフル」を「エタノール」に溶かした後，「イオウ」を加えて研和したものに少量ずつ加えて研和する。 別に「水酸化カルシウム」に「常水」又は「精製水又は精製水（容器入り）」50mL を加え，密栓して振り混ぜた後，静置し，この上澄液 30mL を前の混合物に加え，更に「常水」又は「精製水又は精製水（容器入り）」を加えて全量を 100mL とし，振り混ぜて製する。		
用法及び用量	用時よく振とうして，適宜，手のひらにとり塗布する。		
効能又は効果	にきび		
貯蔵方法及び有効期間	気密容器		
規格及び試験方法	日本薬局方による。		
備考	イオウ・カンフルローション		

【 156 】　外皮用薬 67—①

成分及び分量 又は本質	日本薬局方　尿素　10.0g 基剤　〃　親水クリーム　適量 全量　100g
製造方法	以上をとり，クリーム剤の製法により製する。
用法及び用量	1 日数回，患部に塗擦する。
効能又は効果	手指のあれ，ひじ・ひざ・かかと・くるぶしの角化症，小児乾燥性の皮膚，老人の乾皮症，さめ肌
貯蔵方法及び 有効期間	遮光した気密容器
規格及び試験方法	別記のとおり。
備考	

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は白色である。

確認試験　本品 3g にエタノール（95）10mL を加え，水浴上で加温しながらよくかき混ぜる。冷後，ろ過し，ろ液を水浴上で蒸発乾固する。残留物を加熱するとき，液化してアンモニアのにおいを発し，赤色リトマス紙を青変する。

【 157 】　外皮用薬 68—③

成分及び分量又は本質		日本薬局方	インドメタシン	1.0g
		〃	*l*- メントール	3.0g
	溶解補助剤	〃	マクロゴール 400	5.0mL
	基　　剤	〃	マクロゴール軟膏	適　量
			全　　量	100g
製造方法	インドメタシン，*l*- メントールを秤取し，あらかじめ 60～70℃に加温したマクロゴール 400 に加え撹拌溶解し，別に 60～70℃で加温溶融したマクロゴール軟膏に加え，撹拌冷却して製する。			
用法及び用量	1 日 4 回を限度として，適量を患部に塗布する。ただし，1 週間当たり 50g を超えて使用しないこと。11 才未満は使用しない。			
効能又は効果	関節痛，筋肉痛，腰痛，肩こりに伴う肩の痛み，腱鞘炎，肘の痛み，打撲，ねんざ			
貯蔵方法及び有効期間	遮光した気密容器			
規格及び試験方法	別記のとおり。			
備　　考				

規 格 及 び 試 験 方 法

本品は定量するとき，インドメタシン（$C_{19}H_{16}ClNO_4$：357.79）0.9～1.1%，*l*- メントール（$C_{10}H_{20}O$：156.27）2.7～3.3%を含む。

性　　状　本品は淡黄白色で，ハッカのにおいがある。

確認試験　（1）　本品 1g にメタノール 5mL を加え，水浴上で加温して溶かし，冷後，ろ過し，ろ液を試料溶液とする。別にインドメタシン 10mg をメタノール 5mL に溶かし，標準溶液とする。これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び標準溶液 5μL ずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲル（蛍光剤入り）を用いて調製した薄層板にスポットする。次にジエチルエーテル・酢酸（100）混液（100：3）を展開溶媒として約 10cm 展開した後，薄層板を風乾する。これに紫外線（主波長 254nm）を照射するとき，試料溶液から得たスポットは，標準溶液から得た暗紫色のスポットと色調及び *Rf* 値が等しい。

（2）　本品 2g に石油エーテル 10mL を加え，水浴上で加温しながらよくかき混ぜ，冷後，傾斜して上澄液をとり，この液を蒸発乾固する。残留物にエタノール（95）10mL を加えた後，硫酸 3mL を加えて振り混ぜるとき，液は黄赤色を呈する（メントール）。

（3）　本品 0.05g に希塩酸 5mL を加え，更に塩化バリウム試液 1mL を加えて振り混ぜ，必要ならろ過し，ろ液にリンモリブデン酸 n 水和物溶液（1→10）1mL を加えるとき，黄緑色の沈殿を生じる（マクロゴール）。

定 量 法　（1）　本品 5.0g を精密に量り，メタノール 40mL を加えて振り混ぜた後，更にメタノールを加えて正確に 50mL とする。この液をろ過し，初めのろ液 10mL を除き，次のろ液 5mL を正確に量り，内標準溶液 3mL を正確に加え，更に移動相を加えて 100mL とし，試料溶液とする。別にインドメタシン標準品を 105℃で 4 時間乾燥し，その約 50mg を精密に量り，メタノールに溶かし，正確に 50mL とする。この液 5mL を正確に量り，内標準溶液 3mL を正確に加え，更に移動相を加えて 100mL とし，標準溶液とする。試料溶液及び標準溶液 20μL につき，次の条件で液体クロマトグラフ法により試験を行い，内標準物質のピーク面積に対するインドメタシンのピーク面積の比 Q_T 及び Q_S を求める。

インドメタシン（$C_{19}H_{16}ClNO_4$）の量（mg）＝W_S×（Q_T／Q_S）

W_S：インドメタシン標準品の秤取量（mg）

内標準溶液　パラオキシ安息香酸ブチルのメタノール溶液（1→1000）

操作条件

検出器：紫外吸光光度計（測定波長：254nm）

カラム：内径約 4mm，長さ 15～25cm のステンレス管に 5～10μm のオクタデシルシリル化シリカゲルを充てんする。

カラム温度：25℃付近の一定温度

移動相：メタノール／薄めたリン酸（1→1000）混液（7：3）

流量：インドメタシンの保持時間が約 8 分になるように調整する。

カラムの選定：標準溶液 20μL につき，上記の条件で操作するとき，パラオキシ安息香酸ブチル，インドメタシンの順に溶出し，それぞれのピークが完全に分離するものを用いる。

（2）　本品約 2.0g を精密に量り，アセトン 30mL を加えて振り混ぜた後，内標準溶液 5mL を正確に加え，更にアセトンを加えて 50mL とする。この液をろ過し，初めのろ液 10mL を除き，次のろ液を試料溶液とする。別に定量用 *l*- メントール約 0.06g を精密に量り，アセトン 30mL に溶かし，内標準溶液 5mL を正確に加え，更にアセトンを加えて 50mL とし，標準溶液とする。試料溶液及び標準溶液 2μL につき，次の条件でガスクロマトグラフ法により試験を行い，内標準物質のピーク面積に対する *l*- メントールのピーク面積の比 Q_T 及び Q_S を求める。

l- メントール（$C_{10}H_{20}O$）の量（mg）＝定量用 *l*- メントールの量（mg）×Q_T／Q_S

内標準溶液　安息香酸エチルのアセトン溶液（1→100）

操作条件

検出器：水素炎イオン化検出器

カラム：内径約 3mm，長さ約 3m のガラス管に，ガスクロマトグラフ法ポリエチレングリコール 20M をシラン処理した 180～250μm のガスクロマトグラフ用ケイソウ土に 10%の割合で被覆したものを充てんする。

カラム温度：150℃付近の一定温度

キャリヤーガス：窒素

流量：*l*- メントールの保持時間が約 6 分になるように調整する。

カラムの選定：標準溶液 3μL につき，上記の条件で操作するとき，*l*- メントール，安息香酸エチルの順に流出し，完全に分離するものを用いる。

【 158 】　外皮用薬 69—②

成分及び分量 又は本質		局　外　規	デキサメタゾン酢酸エステル	0.025g
		〃	クロタミトン	5.0g
	基　剤	薬　添　規	ゲル化炭化水素	50g
	基　剤	日本薬局方	白色ワセリン	適　量
			全　　量	100.0g
製造方法	以上をとり，軟膏剤の製法により製する。			
用法及び用量	適宜，患部に塗布する。			
効能又は効果	湿疹・皮膚炎，ただれ，かぶれ			
貯蔵方法及び 有効期間	気密容器			
規格及び試験方法	別記のとおり。			
備　　考				

規 格 及 び 試 験 方 法

本品は定量するとき，デキサメタゾン酢酸エステル（$C_{24}H_{31}FO_6$：434.50）0.0225～0.0275%及びクロタミトン（$C_{13}H_{17}NO$：203.28）4.5～5.5%を含む。

性　　状　本品は白色である。

確認試験　（1）　本品 15g にエタノール（95）20mL を加え，水浴上で加温しながらよくかき混ぜる。冷後，ろ過し，ろ液に 2,6 - ジ - 第三ブチル - *p* - クレゾール試液 5mL 及び水酸化ナトリウム試液 5mL を加え，還流冷却器を付け，水浴上で 20 分間加熱するとき，液は淡緑色を呈する（デキサメタゾン酢酸エステル）。

（2）　本品 0.5g にテトラヒドロフラン 5mL を加えてかき混ぜた後，ろ過し，ろ液を試料溶液とする。別にクロタミトン 0.02g をメタノール 4mL に溶かし，標準溶液とする。これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び標準溶液 3 μL ずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲル（蛍光剤入り）を用いて調製した薄層板にスポットする。次に酢酸エチル・エタノール（99.5）・アンモニア水（28）混液（50：5：1）を展開溶媒として約 10cm 展開した後，薄層板を風乾する。これに紫外線（主波長 254nm）を照射するとき，試料溶液から得たスポットは標準溶液から得たスポットと色調及び *Rf* 値が等しい。

定 量 法　（1）　本品約 2.0g を精密に量り，テトラヒドロフラン 30mL を加えて振り混ぜた後，内標準溶液 5mL を正確に加え，更にメタノールを加えて正確に 50mL とし，試料溶液とする。別に定量用デキサメタゾン酢酸エステル約 0.005g（$C_{24}H_{31}FO_6 \cdot H_2O$）を精密に量り，メタノールに溶かし，正確に 50mL とする。この液 5mL を正確に量り，内標準溶液 5mL を正確に加え，更にメタノールを加えて正確に 50mL とし，標準溶液と

する。試料溶液及び標準溶液 25μL につき，次の条件で液体クロマトグラフ法により試験を行い，標準溶液のピーク面積 Q_S 及び試料溶液のピーク面積 Q_T を求める。

デキサメタゾン酢酸エステル（$C_{24}H_{31}FO_6 \cdot H_2O$）の量（mg）

＝定量用デキサメタゾン酢酸エステルの量（mg）×（Q_T／Q_S）×（1／10）

内標準溶液　パラオキシ安息香酸プロピルの薄めたメタノール溶液（1→8000）

操作条件

検出器：紫外吸光光度計（測定波長：254nm）

カラム：内径約 4mm，長さ約 15cm のステンレス管に約 5μm の液体クロマトグラフ用オクタデシルシリル化シリカゲルを充填する。

カラム温度：25℃付近の一定温度

移動相：水／アセトニトリル混液（2：1）

流量：デキサメタゾン酢酸エステルの保持時間が約 6 分になるように調節する。

カラムの選定：標準溶液 25μL につき，上記の条件で操作するとき，デキサメタゾン酢酸エステル，パラオキシ安息香酸プロピル（内標準物質）の順に溶出し，それぞれのピークが完全に分離するものを用いる。

（２）　本品約 1.0g を精密に量り，テトラヒドロフラン 30mL を加えて振り混ぜた後，メタノールを加えて正確に 50mL とする。この液をろ過し，初めのろ液 10mL を除き，次のろ液 5mL を正確に量り，メタノールを加えて正確に 25mL とする。この液 5mL を正確に量り，内標準溶液 5mL を正確に加え，更にメタノールを加えて 50mL とし，試料溶液とする。別に定量用クロタミトン約 0.05g を精密に量り，メタノールに溶かし，正確に 50mL とする。この液 5mL を正確に量り，メタノールを加えて正確に 25mL とする。この液 5mL を正確に量り，内標準溶液 5mL を正確に加え，更にメタノールを加えて 50mL とし，標準溶液とする。試料溶液及び標準溶液 10μL につき，次の条件で液体クロマトグラフ法により試験を行い，内標準物質のピーク面積に対するクロタミトンのピーク面積の比 Q_T 及び Q_S を求める。

クロタミトン（$C_{13}H_{17}NO$）の量（mg）＝定量用クロタミトンの量（mg）×（Q_T／Q_S）

内標準溶液　*p*-トルイル酸エチルのメタノール溶液（1→7500）

操作条件

検出器：紫外吸光光度計（測定波長：254nm）

カラム：内径約 4mm，長さ 15～25cm のステンレス管に 5～10μm の液体クロマトグラフ用オクタデシルシリル化シリカゲルを充てんする。

カラム温度：40℃付近の一定温度

移動相：メタノール・水混液（6：4）

流量：クロタミトンの保持時間が約 10 分になるように調整する。

カラムの選定：標準溶液 10μL につき，上記の条件で操作するとき，トルイル酸エチル，クロタミトンの順に溶出し，それぞれのピークが完全に分離するものを用いる。

【 159 】　外皮用薬 70—②

成分及び分量 又は本質	局　外　規　デキサメタゾン酢酸エステル　0.025g 基　剤　日本薬局方　親水クリーム　適　量 全　　量　100g
製造方法	以上をとり，クリーム剤の製法により製する。
用法及び用量	適宜，患部に塗布する。
効能又は効果	湿疹・皮膚炎，かぶれ，あせも，かゆみ，しもやけ，虫さされ，じんましん
貯蔵方法及び 有効期間	遮光した気密容器
規格及び試験方法	別記のとおり。
備考	

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は白色である。

確認試験　本品 15g にエタノール（95）20mL を加えてよくかき混ぜた後，ろ過する。ろ液に 2,6 - ジ - 第三ブチル - *p* - クレゾール試液 5mL 及び水酸化ナトリウム試液 5mL を加え，還流冷却器を付け，水浴上で 20 分間加熱するとき，液は淡緑色を呈する。

【 160 】　外皮用薬 71—①

成分及び分量又は本質		日本薬局方	ベンザルコニウム塩化物液（10%）	1.0mL
		〃	ジブカイン塩酸塩	0.1g
		〃	ナファゾリン塩酸塩	0.1g
		〃	ハッカ水	2.0mL
	溶解補助剤	〃	プロピレングリコール	3.0mL
	溶　　剤	〃	精製水又は精製水（容器入り）	適　量
			全　　量	100mL
製造方法	以上をとり，外用液剤の製法により製する。			
用法及び用量	1日数回，適宜患部に塗布するか，又は脱脂綿・ガーゼにしませて清拭する。			
効能又は効果	すり傷，きり傷，靴ずれ，創傷面の殺菌・消毒，痔疾時の肛門消毒			
貯蔵方法及び有効期間	遮光した気密容器			
規格及び試験方法	別記のとおり。			
備考				

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は無色澄明の液である。

確認試験　（1）　本品 1mL に水 1mL，ブロモフェノールブルー溶液（1→2000）0.2mL 及び水酸化ナトリウム試液 0.5mL の混液を加えるとき，液は青色を呈し，これにクロロホルム 4mL を加えて激しく振り混ぜるとき，青色はクロロホルム層に移る。このクロロホルム層を分取し，振り混ぜながらラウリル硫酸ナトリウム溶液（1→1000）を滴加するとき，クロロホルム層は無色となる（ベンザルコニウム塩化物）。

（2）　本品そのままを試料溶液とする。別にジブカイン塩酸塩 5mg 及びナファゾリン塩酸塩 5mg をそれぞれ水 5mL に溶かし，標準溶液（1）及び標準溶液（2）とする。これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び標準溶液 5μL ずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲル（蛍光剤入り）を用いて調製した薄層板にスポットする。次にクロロホルム・エタノール（95）・酢酸（100）混液（7：3：1）を展開溶媒として約 10cm 展開した後，薄層板を風乾する。これに紫外線（主波長 254nm）を照射するとき，試料溶液から得た 2 個のスポットは，標準溶液（1）及び標準溶液（2）から得たスポットと色調及び *Rf* 値が等しい。

【 161 】　鎮暈薬 2—①

成分及び分量又は本質	日本薬局方	タンニン酸ジフェンヒドラミン	0.05g
	〃	スコポラミン臭化水素酸塩水和物	0.00015g
	局　外　規	ジプロフィリン	0.03g
	日本薬局方	カフェイン水和物	0.03g
	〃	*l*—メントール	0.03g
	〃	ピリドキシン塩酸塩	0.01g
	賦形剤　〃	デンプン，乳糖水和物又はこれらの混合物	適　量
		全　　量	2.5g
製造方法	以上をとり，散剤の製法により製する。		
用法及び用量	1 回量を次のとおりとし，乗物酔いの予防には乗車船 30 分前に服用する。ただし，追加服用する場合は 4 時間以上の間をおいて服用する。なお，1 日の服用回数は 3 回までとする。 大人（15 才以上）1 包 2.5g，11 才以上 15 才未満　大人の 2/3，7 才以上 11 才未満　大人の 1/2，3 才以上 7 才未満　大人の 1/3		
効能又は効果	乗物酔いによるめまい・吐き気・頭痛の予防及び緩和		
貯蔵方法及び有効期間	遮光した気密容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考			

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は白色の粉末で，ハッカのにおいがする。

確認試験　（1）　本品 0.5g にメタノール 10mL を加えて振り混ぜた後，ろ過する。ろ液を蒸発乾固し，残留物をメタノール 2mL に溶かし，試料溶液とする。別にタンニン酸ジフェンヒドラミン 0.015g，ジプロフィリン 0.01g 及びカフェイン水和物 0.01g をそれぞれ薄めたメタノール（8→10）3mL に溶かし，標準溶液（1），標準溶液（2）及び標準溶液（3）とする。これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び標準溶液 5μL ずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲル（蛍光剤入り）を用いて調製した薄層板にスポットする。次に酢酸エチル・エタノール（99.5）・アンモニア水（28）混液（50：5：1）を展開溶媒として約 10cm 展開した後，薄層板を風乾する。これに紫外線（主波長 254nm）を照射するとき，試料溶液から得た 3 個のスポットは，標準溶液（1），標準溶液（2）及び標準溶液（3）から得たそれぞれのスポットと色調及び *Rf* 値が等しい。また，この薄層板に噴霧用ドラーゲンドルフ試液を均等に噴霧するとき，標準溶液（1）から得たスポット及びそれに対応する位置の試料溶液から得たスポットは，黄赤色を呈する。

（２）　本品 8g にメタノール 50mL を加えて振り混ぜた後，ろ過する。ろ液を蒸発乾固し，残留物に水 10mL 及び希硫酸 2mL を加えて分液漏斗に移す。これにジクロルメタン 10mL を加えて，振り混ぜて洗う。水層にアンモニア試液を加えて弱アルカリ性とし，ジクロルメタン 10mL ずつで 2 回抽出する。抽出液を合わせ，無水硫酸ナトリウムを加えて振り混ぜた後，ろ過する。ろ液を蒸発乾固し，残留物をメタノール 1mL に溶かし，試料溶液とする。別にスコポラミン臭化水素酸塩水和物 2mg をメタノール 4mL に溶かし，標準溶液とする。これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び標準溶液 10μL ずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲルを用いて調製した薄層板にスポットする。次にクロロホルム・メタノール・アセトン・アンモニア水（28）混液（45：5：5：1）を展開溶媒として約 10cm 展開した後，薄層板を 80℃で 10 分間乾燥する。これに噴霧用ドラーゲンドルフ試液を均等に噴霧するとき，試料溶液から得た数個のスポットのうち 1 個のスポットは，標準溶液から得た黄赤色のスポットと色調及び *Rf* 値が等しい。

（３）　本品 1g にエタノール（99.5）10mL を加え，振り混ぜた後，ろ過する。ろ液に硫酸 3mL を加えて振り混ぜるとき，液は黄赤色を呈する（メントール）。

（４）　本品 1g にメタノール 20mL を加え，10 分間振り混ぜた後，ろ過する。ろ液を蒸発乾固し，残留物をメタノール 2mL に溶かし，試料溶液とする。別にピリドキシン塩酸塩 0.01g をメタノール 5mL に溶かし，標準溶液とする。これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び標準溶液 5μL ずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲル（混合蛍光剤入り）を用いて調製した薄層板にスポットする。次にクロロホルム・エタノール（99.5）・酢酸（100）混液（100：50：1）を展開溶媒として約 10cm 展開した後，薄層板を風乾する。これに紫外線（広域波長）を照射するとき，試料溶液から得たスポットは，標準溶液から得た青色のスポットと色調及び *Rf* 値が等しい。

【 162 】　駆虫薬 1—①

成分及び分量 又は本質	日本薬局方　サントニン　10.0g 〃　カイニン酸水和物　2.0g 賦形剤　〃　デンプン，乳糖水和物又はこれらの混合物　適　量 全　量　100g
製造方法	以上をとり，散剤の製法により製する。ただし，分包散剤とする。
用法及び用量	1 日 1～2 回，空腹時に服用する。あるいは夕食をできるだけ軽くして，就寝前と翌朝の 2 回服用する。なお，3 回以上続けて服用しないこと。ただし，1 回量は次のとおりとする。 大人（15 才以上）1 包 0.5g，11 才以上 15 才未満　大人の 2/3，8 才以上 11 才未満　大人の 1/2，5 才以上 8 才未満　大人の 1/3，3 才以上 5 才未満　大人の 1/4，1 才以上 3 才未満　大人の 1/5，3 カ月以上 1 才未満　大人の 1/7
効能又は効果	回虫の駆除
貯蔵方法及び有効期間	遮光した密閉容器
規格及び試験方法	日本薬局方による。
備考	カイニン酸・サントニン散

【 163 】　駆虫薬 2—①

成分及び分量 又は本質	日本薬局方　サントニン　0.1g 賦形剤　〃　デンプン，乳糖水和物又はこれらの混合物　適　量 全　量　1.0g
製造方法	以上をとり，散剤の製法により製する。ただし，分包散剤とする。
用法及び用量	1 日 1～2 回，空腹時に服用する。あるいは夕食をできるだけ軽くして，就寝前と翌朝の 2 回服用する。なお，3 回以上続けて服用しないこと。ただし，1 回量は次のとおりとする。 大人（15 才以上）1 包 0.5g，11 才以上 15 才未満　大人の 2/3，8 才以上 11 才未満　大人の 1/2，5 才以上 8 才未満　大人の 1/3，3 才以上 5 才未満　大人の 1/4，1 才以上 3 才未満　大人の 1/5，3 カ月以上 1 才未満　大人の 1/7
効能又は効果	回虫の駆除
貯蔵方法及び 有効期間	遮光した密閉容器
規格及び試験方法	別記のとおり。
備考	

規 格 及 び 試 験 方 法

本品は定量するとき，サントニン（$C_{15}H_{18}O_3$：246.31）9.0～11.0%を含む。

性　　状　本品は白色である。

確認試験　（1）　定量法で得たサントニンの融点は 171～175℃である。

（2）　定量法で得た残留物 0.01g に薄めた硫酸（1→2）1mL を加えて振り混ぜた後，煮沸し，冷後，希塩化鉄（Ⅲ）試液 1 滴を加えるとき，液は紫色を呈する（サントニン）。

定 量 法　本品約 3g を精密に量り，ソックスレー抽出器に入れ，クロロホルム 80mL を加えて水浴上で 1 時間抽出し，抽出液を水浴上で加温してクロロホルムを留去する。残留物にエタノール（99.5）2mL を加え，水浴上で空気を送りながら蒸発乾固し，105℃で 3 時間乾燥し，冷後，重量を量り，サントニン（$C_{15}H_{18}O_3$）の量とする。

【 164 】　ビタミン主薬製剤 6

成分及び分量 又は本質		*d*- α -トコフェロール酢酸エステル	0.6g
	局外規	イノシトールヘキサニコチネート	0.4g
	〃	コンドロイチン硫酸ナトリウム	0.9g
	賦形剤　日本薬局方	デンプン，乳糖水和物又はこれらの混合物	適　量
		全　　量	6.0g
製造方法	以上をとり，散剤の製法により製する。ただし，分包散剤とする。		
用法及び用量	大人（15 才以上）1 回 2.0g，1 日 3 回，食後服用する。		
効能又は効果	○末梢血行障害による次の諸症状の緩和：肩・首すじのこり，手足のしびれ・冷え，しもやけ ○更年期における次の諸症状の緩和：肩・首すじのこり，冷え，手足のしびれ，のぼせ ○月経不順 「ただし，これらの症状について，1 カ月ほど使用しても改善がみられない場合は，医師又は薬剤師に相談すること。」 ○次の場合のビタミン E の補給：老年期		
貯蔵方法及び 有効期間	遮光した密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考			

規 格 及 び 試 験 方 法

本品は定量するとき，トコフェロール酢酸エステル（$C_{31}H_{52}O_3$：472.75）4.5～5.5%及びイノシトールヘキサニコチネート（$C_{42}H_{30}N_6O_{12}$：810.73）6.0～7.3%を含む。

性　　状　本品は白色の粉末である。

確認試験　（1）　本品 0.5g にクロロホルム 10mL を加えて振り混ぜた後，ろ過する。ろ液 3mL を蒸発乾固し，残留物に塩酸ヒドロキシルアミンの飽和エタノール溶液 1mL 及び水酸化カリウム・エタノール試液 1mL を加え，水浴上で 3～5 分間加温する。冷後，0.5mol/L 塩酸試液 3mL 及び塩化鉄（Ⅲ）試液 1～2 滴を加えるとき，液は赤紫色を呈する（イノシトールヘキサニコチネート）。

（2）　本品 0.1g に水 10mL を加えて振り混ぜた後，ろ過する。ろ液 1mL に硫酸 6mL を加え，水浴中で 10 分間加熱する。冷後，カルバゾール・エタノール溶液*0.2mL を加えて放置するとき，赤色～赤紫色を呈する（コンドロイチン硫酸ナトリウム）。

［注］＊　カルバゾール・エタノール溶液：カルバゾール 0.1g にエタノール（95）を加えて溶かし，100mL とする。

（３）　本品 1.0g にエタノール（99.5）5mL を加えて振り混ぜた後，ろ過し，ろ液を試料溶液とする。別にトコフェロール酢酸エステル 0.05g をエタノール（99.5）5mL に溶かし標準溶液とする。これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び標準溶液 5 μL ずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲル（蛍光剤入り）を用いて調製した薄層板にスポットする。次にクロロホルムを展開溶媒として約 10cm 展開した後，薄層板を風乾する。これに紫外線（主波長 254nm）を照射するとき，試料溶液から得たスポットは，標準溶液から得たスポットと色調及び *Rf* 値が等しい。

定 量 法　（１）　本品約 0.5g を精密に量り，エタノール（99.5）30mL を加えて振り混ぜた後，内標準溶液 5mL を正確に加え，更にエタノール（99.5）を加えて 50mL とする。この液をろ過し，ろ液を試料溶液とする。別にトコフェロール酢酸エステル標準品約 0.025g を精密に量り，内標準溶液 5mL を正確に加えた後，エタノール（99.5）に溶かして 50mL とし，標準溶液とする。試料溶液及び標準溶液 10μL につき，次の条件で液体クロマトグラフ法により試験を行い，内標準物質のピーク面積に対するトコフェロール酢酸エステルのピーク面積の比 Q_T 及び Q_S を求める。

トコフェロール酢酸エステル（$C_{31}H_{52}O_3$）の量（mg）

$$= \text{トコフェロール酢酸エステル標準品の量（mg）} \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

内標準溶液　フタル酸ジ *n* - オクチルのエタノール（99.5）溶液（1→200）

操作条件

検出器：紫外吸光光度計（測定波長：280nm）

カラム：内径約 4mm，長さ 15～25cm のステンレス管に 5～10μm のオクタデシルシリル化シリカゲルを充てんする。

カラム温度：40℃付近の一定温度

移動相：メタノール

流量：トコフェロール酢酸エステルの保持時間が約 8 分になるように調整する。

カラムの選定：標準溶液 10μL につき，上記の条件で操作するとき，フタル酸ジ *n* - オクチル，トコフェロール酢酸エステルの順に溶出し，それぞれのピークが完全に分離するものを用いる。

（２）　本品約 0.3g を精密に量り，クロロホルム 30mL を加えて振り混ぜた後，内標準溶液 5mL を正確に加え，更にクロロホルムを加えて 50mL とする。この液をろ過し，ろ液を試料溶液とする。別に定量用イノシトールヘキサニコチネート約 0.02g を精密に量り，内標準溶液 5mL を正確に加えた後，クロロホルムに溶かして 50mL とし，標準溶液とする。試料溶液及び標準溶液 10μL につき，次の条件で液体クロマトグラフ法により試験を行い，内標準物質のピーク面積に対するイノシトールヘキサニコチネートのピーク面積の比 Q_T 及び Q_S を求める。

イノシトールヘキサニコチネート（$C_{42}H_{30}N_6O_{12}$）の量（mg）

$$= \text{イノシトールヘキサニコチネートの量（mg）} \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

内標準溶液　パラオキシ安息香酸メチルのクロロホルム溶液（1→1200）

操作条件

検出器：紫外吸光光度計（測定波長：260nm）

カラム：内径約 4mm，長さ 15～25cm のステンレス管に 5～10μm のオクタデシルシリル化シリカゲルを充てんする。

カラム温度：40℃付近の温度

移動相：薄めたリン酸（1→1000）・アセトニトリル混液（7：3）

流量：イノシトールヘキサニコチネートの保持時間が約 7 分になるように調整する。

カラムの選定：標準溶液 10μL につき，上記の条件で操作するとき，パラオキシ安息香酸メチル，イノシトールヘキサニコチネートの順に溶出し，それぞれのピークが完全に分離するものを用いる。

【 165 】　その他 1—①

成分及び分量又は本質		日本薬局方	ヨクイニン末	3.0g
		〃	リボフラビン酪酸エステル	0.012g
		〃	ピリドキシン塩酸塩	0.04g
	甘味剤	〃	カンゾウ末	0.15g
	賦形剤	〃	リン酸水素カルシウム水和物	適　量
			全　　量	4.5g
製造方法	以上をとり，散剤の製法により製する。ただし，分包散剤とする。			
用法及び用量	1 回量を次のとおりとし，1 日 3 回，食後服用する。 大人（15 才以上）1 包 1.5g，11 才以上 15 才未満　大人の 2/3，8 才以上 11 才未満　大人の 1/2，5 才以上 8 才未満　大人の 1/3，3 才以上 5 才未満　大人の 1/4			
効能又は効果	いぼ，皮膚のあれ			
貯蔵方法及び有効期間	遮光した密閉容器			
規格及び試験方法	別記のとおり。			
備考				

規 格 及 び 試 験 方 法

本品は定量するとき，リボフラビン酪酸エステル（$C_{33}H_{44}N_4O_{10}$：656.73）0.24～0.30%及びピリドキシン塩酸塩（$C_8H_{11}NO_3$・HCl：205.64）0.8～1.0%を含む。

性　　状　本品はだいだい黄色の粉末で，味はわずかに苦い。

確認試験　（1）　本品 1.5g にメタノール 20mL を加え，水浴上で 5 分間加温する。冷後，ろ過し，ろ液を蒸発乾固し，残留物をメタノール 1mL に溶かし，試料溶液とする。別にヨクイニン末 1.0g にメタノール 20mL を加え，以下，試料溶液と同様に操作し，標準溶液とする。これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び標準溶液 10μL ずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲルを用いて調製した薄層板にスポットする。次にヘキサン・アセトン混液（9：1）を展開溶媒として約 10cm 展開した後，薄層板を風乾する。これに 4 - メトキシベンズアルデヒド・硫酸試液を均等に噴霧した後，105℃で 10 分間加熱するとき，試料溶液から得た数個のスポットのうち 1 個のスポットは，標準溶液から得た暗紫青色のスポットと色調及び *Rf* 値が等しい。

（2）　本品 1.5g に薄めたメタノール（7→10）5mL を加えて振り混ぜた後，ろ過し，ろ液を試料溶液とする。別にリボフラビン酪酸エステル 4mg，ピリドキシン塩酸塩 0.013g 及びグリチルリチン酸 2mg をそれぞれ薄めたメタノール（7→10）5mL に溶かし，標準溶液（1），標準溶液（2）及び標準溶液（3）とする。これらの液につき，薄層クロマトグラ

フ法により試験を行う。試料溶液及び標準溶液 10μL ずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲル（蛍光剤入り）を用いて調製した薄層板にスポットする。次に 1 - ブタノール・水・酢酸（100）混液（7：2：1）を展開溶媒として約 10cm 展開した後，薄層板を風乾する。これに紫外線（波長 254nm 及び 365nm）を照射するとき，試料溶液から得た数個のスポットのうち 3 個のスポットは，標準溶液（1），標準溶液（2）及び標準溶液（3）から得たスポットと色調及び *Rf* 値が等しい。

定 量 法 （1） 本品 1.0g を精密に量り，メタノール 30mL を加えて 10 分間振り混ぜた後，内標準溶液 5mL を正確に加え，更にメタノールを加えて 50mL とする。この液をろ過し，ろ液を試料溶液とする。別に定量用リボフラビン酪酸エステル 0.01g を精密に量り，メタノールに溶かし，正確に 20mL とする。この液 5mL を正確に量り，内標準溶液 5mL を正確に加え，メタノールを加えて 50mL とし，標準溶液とする。試料溶液及び標準溶液 10μL につき，次の条件で液体クロマトグラフ法により試験を行う。内標準物質のピーク面積に対するリボフラビン酪酸エステルのピーク面積の比 Q_T 及び Q_S を求める。

リボフラビン酪酸エステル（$C_{33}H_{44}N_4O_{10}$）の量（mg）

$$= \text{定量用リボフラビン酪酸エステルの量（mg）} \times \frac{Q_T}{Q_S} \times \frac{1}{4}$$

内標準溶液　フタル酸ジ *n* - アミルのメタノール溶液（1→300）

操作条件

検出器：紫外吸光光度計（測定波長：254nm）

カラム：内径約 4mm，長さ 15～25cm のステンレス管に 5～10μm のオクタデシルシリル化シリカゲルを充てんする。

カラム温度：40℃付近の一定温度

移動相：メタノール・水混液（4：1）

流量：リボフラビン酪酸エステルの保持時間が約 5 分になるように調整する。

カラムの選定：標準溶液 10μL につき，上記の条件で操作するとき，リボフラビン酪酸エステル，フタル酸ジ *n* - アミルの順に溶出し，それぞれのピークが完全に分離するものを用いる。

（2） 本品約 0.2g を精密に量り，薄めたアセトニトリル（1→10）30mL を加えて 10 分間振り混ぜ，内標準溶液 5mL を正確に加え，薄めたアセトニトリル（1→10）を加えて 50mL とする。この液をろ過し，ろ液を試料溶液とする。別にピリドキシン塩酸塩標準品約 0.01g を精密に量り，薄めたアセトニトリル（1→10）に溶かし，正確に 25mL とする。この液 5mL を正確に量り，内標準溶液 5mL を正確に加え，更に薄めたアセトニトリル（1→10）を加えて 50mL とし，標準溶液とする。試料溶液及び標準溶液 10μL につき，次の条件で液体クロマトグラフ法により試験を行う。内標準物質のピーク面積に対するピリドキシン塩酸塩のピーク面積の比 Q_T 及び Q_S を求める。

ピリドキシン塩酸塩（$C_8H_{11}NO_3$・HCl）の量（mg）

$$= \text{ピリドキシン塩酸塩標準品の量（mg）} \times \frac{Q_T}{Q_S} \times \frac{1}{5}$$

内標準溶液　パラオキシ安息香酸のアセトニトリル溶液（1→5000）

操作条件

検出器：紫外吸光光度計（測定波長：270nm）

カラム：内径約 4mm，長さ 15～25cm のステンレス管に 5～10μm のオクタデシルシリル化シリカゲルを充てんする。

カラム温度：40℃付近の一定温度

移動相：1 - ヘプタンスルホン酸ナトリウム 1g 及びリン酸二水素カリウム 6.8g を水 1000mL に溶かし，リン酸を加えて pH2.5 に調整する。この液 900mL にアセトニトリル 100mL を加える。

流量：ピリドキシン塩酸塩の保持時間が約 6 分になるように調整する。

カラムの選定：標準溶液 10μL につき，上記の条件で操作するとき，ピリドキシン塩酸塩，パラオキシ安息香酸の順に溶出し，それぞれのピークが完全に分離するものを用いる。

【 166 】　かぜ薬 8—①

成分及び分量又は本質	日本薬局方	アリメマジン酒石酸塩	0.005g
	〃	アセトアミノフェン	0.45g
	〃	イソプロピルアンチピリン	0.3g
	〃	*dl* - メチルエフェドリン塩酸塩散 10%	0.6g
	〃	カフェイン水和物	0.075g
	〃	ジヒドロコデインリン酸塩散 1%	2.4g
	賦形剤　〃	デンプン，乳糖水和物又はこれらの混合物	適　量
		全　　量	4.5g
製造方法	以上をとり，散剤の製法により製する。ただし，分包散剤とする。 アリメマジン酒石酸塩に替えて，アリメマジン酒石酸塩散 1%を用いてもよい。		
用法及び用量	1 回量を次のとおりとし，1 日 3 回，食後なるべく 30 分以内に服用する。 大人（15 才以上）1 包 1.5g，12 才以上 15 才未満　大人の 2/3		
効能又は効果	かぜの諸症状（鼻水，鼻づまり，くしゃみ，のどの痛み，せき，たん，悪寒，発熱，頭痛，関節の痛み，筋肉の痛み）の緩和		
貯蔵方法及び有効期間	遮光した密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考			

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は白色の粉末で，味はわずかに苦い。

確認試験　（1）　本品 1g にメタノール 10mL を加えて振り混ぜた後，ろ過する。ろ液を蒸発乾固し，残留物をメタノール 1mL に溶かし，試料溶液とする。別にアリメマジン酒石酸塩 1mg 及びイソプロピルアンチピリン 0.06g をそれぞれメタノール 1mL に溶かして標準溶液（1）及び標準溶液（2）とする。これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び標準溶液 5μL ずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲル（蛍光剤入り）を用いて調製した薄層板にスポットする。次にクロロホルム・アセトン・アンモニア水（28）混液（45：5：1）を展開溶媒として約 10cm 展開した後，薄層板を風乾する。これに紫外線（主波長 254nm）を照射するとき，試料溶液から得た数個のスポットのうち 2 個のスポットは，標準溶液（1）及び標準溶液（2）から得たそれぞれのスポットと色調及び *Rf* 値が等しい。また，この薄層板に噴霧用ドラーゲンドルフ試液を均等に噴霧するとき，これらのスポットは黄赤色を呈する。

（２）　本品 0.5g にメタノール 5mL を加えて振り混ぜた後，ろ過し，ろ液を試料溶液とする。別にアセトアミノフェン 0.05g，イソプロピルアンチピリン 0.03g 及びカフェイン水和物 8mg をそれぞれメタノール 5mL に溶かして標準溶液（1），標準溶液（2）及び標準溶液（3）とする。これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び標準溶液 2μL ずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲル（蛍光剤入り）を用いて調製した薄層板にスポットする。次にクロロホルム・アセトン・アンモニア水（28）混液（45：5：1）を展開溶媒として約 10cm 展開した後，薄層板を風乾する。これに紫外線（主波長 254nm）を照射するとき，試料溶液から得た 3 個のスポットは，標準溶液（1），標準溶液（2）及び標準溶液（3）から得たそれぞれのスポットと色調及び *Rf* 値が等しい。

（３）　（１）の試料溶液を試料溶液とする。別に *dl* - メチルエフェドリン塩酸塩散 10% 0.08g にメタノール 6mL を加えて振り混ぜた後，ろ過し，ろ液を標準溶液（1）とする。ジヒドロコデインリン酸塩散 1%0.5g にメタノール 5mL を加えて振り混ぜた後，ろ過し，ろ液を標準溶液（2）とする。これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び標準溶液 5μL ずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲル（蛍光剤入り）を用いて調製した薄層板にスポットする。次に酢酸エチル・エタノール（99.5）・アンモニア水（28）混液（45：5：1）を展開溶媒として約 10cm 展開した後，薄層板を 80℃で 10 分間乾燥する.これに噴霧用ドラーゲンドルフ試液を均等に噴霧するとき，試料溶液から得た数個のスポットのうち 2 個のスポットは，標準溶液（1）及び標準溶液（2）から得た黄赤色のそれぞれのスポットと色調及び *Rf* 値が等しい。

【 167 】　解熱鎮痛薬 10

成分及び分量 又は本質	日本薬局方　イブプロフェン　0.15g 賦形剤　〃　デンプン，乳糖水和物又はこれらの混合物　適　量 全　量　1.0g
製造方法	以上をとり，散剤の製法により製する。
用法及び用量	大人（15 才以上）1 回 1.0g，1 日 3 回を限度としてなるべく空腹時をさけて服用する。服用間隔は 4 時間以上おくこと。
効能又は効果	○頭痛，歯痛・抜歯後の疼痛・咽喉痛・耳痛・関節痛・神経痛・腰痛・筋肉痛・肩こり痛・打撲痛・骨折痛・ねんざ痛・月経痛（生理痛）・外傷痛の鎮痛 ○悪寒・発熱時の解熱
貯蔵方法及び 有効期間	密閉容器
規格及び試験方法	別記のとおり。
備考	

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は白色の粉末である。

確認試験　本品 0.3g にメタノール 5mL を加え，振り混ぜた後，ろ過し，ろ液を試料溶液とする。別にイブプロフェン 0.01g をメタノール 1mL に溶かし，標準溶液とする。これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び標準溶液 5μL ずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲル（蛍光剤入り）を用いて調製した薄層板にスポットする。次にヘキサン・酢酸エチル・酢酸（100）混液（15：5：1）を展開溶媒として約 10cm 展開した後，薄層板を風乾する。これに紫外線（主波長 254nm）を照射するとき，試料溶液から得たスポットは，標準溶液から得たスポットと色調及び *Rf* 値が等しい。

【 168 】　解熱鎮痛薬 10－①

成分及び分量又は本質	日本薬局方　イブプロフェン　0.15g 賦形剤　〃　デンプン，乳糖水和物又はこれらの混合物　適　量 全　量　0.4g
製造方法	以上をとり，散剤の製法により製し，日本薬局方カプセル 1 個に充填し，カプセル剤として製する。
用法及び用量	大人（15 才以上）1 回 1 個，1 日 3 回を限度としてなるべく空腹時をさけて服用する。服用間隔は 4 時間以上おくこと。
効能又は効果	○頭痛，歯痛・抜歯後の疼痛・咽喉痛・耳痛・関節痛・神経痛・腰痛・筋肉痛・肩こり痛・打撲痛・骨折痛・ねんざ痛・月経痛（生理痛）・外傷痛の鎮痛 ○悪寒・発熱時の解熱
貯蔵方法及び有効期間	気密容器
規格及び試験方法	別記のとおり。
備考	

規 格 及 び 試 験 方 法

本品はカプセルに充填された粉末を定量するとき，イブプロフェン（$C_{13}H_{18}O_2$：206.28）33.75～41.25%を含む。

性　　状　本品は白色の粉末を充填したカプセル剤である。

確認試験　本品 1 個を取り，カプセルを開いて充填された粉末を取り出す。取り出した粉末 0.2g にメタノール 5mL を加え，振り混ぜた後，ろ過し，ろ液を試料溶液とする。別にイブプロフェン 0.01g をメタノール 1mL に溶かし，標準溶液とする。これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び標準溶液 5μL ずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲル（蛍光剤入り）を用いて調整した薄層板にスポットする。次にヘキサン・酢酸エチル・酢酸（100）混液（15：5：1）を展開溶媒として約 10cm 展開した後，薄層板を風乾する。これに紫外線（主波長 254nm）を照射するとき，試料溶液から出たスポットは，標準溶液から得たスポットと色調及び *Rf* 値が等しい。

定 量 法　本品 20 個以上をとり，その重量を精密に量る。カプセルを開いて充填された粉末を小さなはけなどを用いてとり出し，20 個以上とった空のカプセルの重量を精密に量る。全体の重量から空カプセルの重量を差し引いてとり出した粉末の重量を計算して，1 カプセル当たりの粉末量を計算する。イブプロフェン（$C_{13}H_{18}O_2$）約 0.15g に対応する量を精密に量り，移動相 140mL を加え，10 分間超音波処理を行なった後，移動相を加えて正確に 200mL とし，遠心分離する。上澄液 5mL を正確に量り，内部標準溶液 5mL を正確に加え，更に移動相を加えて 100mL とし，孔径 0.5μm 以下のメンブランフィルターでろ過し，初めのろ液を除き，次のろ液を試料溶液とする。別に，定量用イブプロフェンを

デシケータ（減圧・0.67kPa 以下，五酸化リン）で 4 時間乾燥し，その約 0.075g を精密に量り，移動相に溶かし，正確に 100mL とする。この液 5mL を正確に量り，内部標準溶液 5mL を正確に加え，更に移動相を加えて 100mL とし，標準溶液とする。試料溶液及び標準溶液 5μL につき，次の条件で液体クロマトグラフ法により試験を行なう。試料溶液の内部標準物質のピーク面積に対するイブプロフェンのピーク面積の比 Q_T 並びに標準溶液の内部標準物質のピーク面積に対するイブプロフェンのピーク面積の比 Q_S を求める。

イブプロフェン（$C_{13}H_{18}O_2$）の量（mg）

＝定量用イブプロフェンの量（mg）×（Q_T／Q_S）×2

内部標準液　安息香酸エチルの移動相溶液（3→4000）

操作条件

検出器：紫外吸光光度計（測定波長：210nm）

カラム：内径 4mm，長さ約 15cm のステンレス管に約 5μm の液体クロマトグラフ用オクタデシルシリル化シリカゲルを充填する。

カラム温度：50℃付近の一定温度

移動相：薄めたリン酸（1→1000）／アセトニトリル混液（3：2）

流量：イブプロフェンの保持時間が約 17 分になるように調節する。

カラムの選定：標準溶液 5μL につき，上記の条件で操作するとき，安息香酸エチル（内部標準），イブプロフェンの順に溶出し，それぞれのピークが完全に分離するものを用いる。

質量偏差試験　質量偏差試験を行うとき，適合する。

【 169 】　解熱鎮痛薬 11—①

成分及び分量又は本質	日本薬局方		イブプロフェン	0.45g
	〃		カフェイン水和物	0.2g
	〃		ケイヒ末	1.0g
	〃		ショウキョウ末	0.3g
	〃		カンゾウ末	1.0g
	賦形剤	〃	デンプン，乳糖水和物又はこれらの混合物	適　量
			全　　量	4.5g
製造方法	以上をとり，散剤の製法により製する。			
用法及び用量	大人（15 才以上）1 回 1.5g，1 日 3 回を限度とし，なるべく空腹時をさけて服用する。服用間隔は 4 時間以上おくこと。			
効能又は効果	○頭痛・歯痛・抜歯後の疼痛・咽喉痛・耳痛・関節痛・神経痛・腰痛・筋肉痛・肩こり痛・打撲痛・骨折痛・ねんざ痛・月経痛（生理痛）・外傷痛の鎮痛 ○悪寒・発熱時の解熱			
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器			
規格及び試験方法	別記のとおり。			
備考				

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は淡褐色の粉末で，特異なにおいがある。

確認試験　（1）　本品 0.5g にメタノール 5mL を加え，振り混ぜた後，ろ過し，ろ液を試料溶液とする。別にイブプロフェン 0.01g をメタノール 1mL に溶かし，標準溶液とする。これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び標準溶液 5μL ずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲル（蛍光剤入り）を用いて調製した薄層板にスポットする。次にヘキサン・酢酸エチル・酢酸（100）混液（15：5：1）を展開溶媒として約 10cm 展開した後，薄層板を風乾する。これに紫外線（主波長 254nm）を照射するとき，試料溶液から得たスポットは，標準溶液から得たスポットと色調及び *Rf* 値が等しい。

（2）　本品 0.2g にメタノール 10mL を加えて振り混ぜた後，ろ過し，ろ液を試料溶液とする。別にカフェイン水和物 5mg をメタノール 5mL に溶かし，標準溶液とする。これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び標準溶液 5μL ずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲル（蛍光剤入り）を用いて調製した薄層板にスポットする。次にクロロホルム・アセトン・アンモニア水（28）混液（30：5：1）を展開溶媒として約 10cm 展開した後，薄層板を風乾する。これに紫外線（主波長 254nm）を照射すると

き，試料溶液から得たスポットは，標準溶液から得た暗紫色のスポットと色調及び *Rf* 値が等しい。

（３）　本品 1.5g にジエチルエーテル 20mL を加えて振り混ぜた後，ろ過する。ろ液を蒸発乾固し，残留物をエタノール（95）1mL に溶かし試料溶液とする。別にケイヒ末 0.3g をとり，試料溶液と同様に操作し，標準溶液とする。これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び標準溶液 5μL ずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲル（蛍光剤入り）を用いて調製した薄層板にスポットする。次にヘキサン・クロロホルム・酢酸エチル混液（4：1：1）を展開溶媒として約 10cm 展開した後，薄層板を風乾する。これに 2,4 - ジニトロフェニルヒドラジン試液を噴霧するとき，試料溶液から得た主スポットは，標準溶液から得た黄赤色の主スポットと色調及び *Rf* 値が等しい。

（４）　本品 1g にジエチルエーテル 5mL を加えて振り混ぜた後，ろ過し，ろ液を試料溶液とする。別にショウキョウ末 0.02g にジエチルエーテル 2mL を加えて振り混ぜた後，ろ過し，ろ液を標準溶液とする。これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び標準溶液 10μL ずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲルを用いて調製した薄層板にスポットする。次に四塩化炭素・アセトン混液（5：1）を展開溶媒として約 10cm 展開した後，薄層板を風乾する。これにバニリン・硫酸溶液*を均等に噴霧し，105℃で 5 分間加熱するとき，試料溶液から得た数個のスポットのうち 1 個のスポットは，標準溶液から得た紫色の主スポットと色調及び *Rf* 値が等しい。

［注］*　バニリン・硫酸溶液：バニリン 0.5g にメタノール 25mL 及び希硫酸 25mL を加える。

（５）　本品 1g にメタノール 5mL を加えて振り混ぜた後，ろ過し，ろ液を試料溶液とする。別にグリチルリチン酸 5mg をメタノール 5mL に溶かし，標準溶液とする。これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び標準溶液 5μL ずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲル（蛍光剤入り）を用いて調製した薄層板にスポットする。次に 1 - ブタノール・水・酢酸（100）混液（7：2：1）を展開溶媒として約 10cm 展開した後，薄層板を風乾する。これに紫外線（254nm）を照射するとき，試料溶液から得た数個のスポットのうち 1 個のスポットは，標準溶液から得た暗紫色のスポットと色調及び *Rf* 値が等しい。

【 170 】　ビタミン主薬製剤 1—①

成分及び分量又は本質	日本薬局方	リボフラビン酪酸エステル	0.02g
	〃	ピリドキシン塩酸塩	0.1g
	〃	パントテン酸カルシウム	0.03g
	〃	ヨクイニン末	3.0g
	賦形剤　〃	デンプン，乳糖水和物又はこれらの混合物	適　量
		全　　量	4.5g
製造方法	以上をとり，散剤の製法により製する。ただし，分包散剤とする。		
用法及び用量	1 回量を次のとおりとし，1 日 3 回，食後服用する。 大人（15 才以上）1 包 1.5g，11 才以上 15 才未満　大人の 2/3，7 才以上 11 才未満　大人の 1/2，3 才以上 7 才未満　大人の 1/3，1 才以上 3 才未満　大人の 1/4		
効能又は効果	○次の諸症状の緩和：口角炎，口唇炎，口内炎，舌炎，湿疹，皮膚炎，かぶれ，ただれ，にきび，肌あれ 「ただし，これらの症状について，1 カ月ほど使用しても改善がみられない場合は，医師又は薬剤師に相談すること。」 ○次の場合のビタミン B_2B_6 の補給：肉体疲労時，妊娠・授乳期，病中病後の体力低下時		
貯蔵方法及び有効期間	遮光した密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考			

規 格 及 び 試 験 方 法

本品は定量するとき，リボフラビン酪酸エステル（$C_{33}H_{44}N_4O_{10}$：656.73）0.40～0.49%，ピリドキシン塩酸塩（$C_8H_{11}NO_3$・HCl：205.64）2.00～2.44%及びパントテン酸カルシウム（$C_{18}H_{32}CaN_2O_{10}$：476.54）0.60～0.73%を含む。

性　　状　本品はだいだい黄色の粉末で，味はわずかに苦い。

確認試験　（1）　本品 1.5g にメタノール 20mL を加え，水浴上で 5 分間加温する。冷後，ろ過し，ろ液を蒸発乾固し，残留物をメタノール 1mL に溶かし，試料溶液とする。別にヨクイニン末 1.0g にメタノール 20mL を加え，以下，試料溶液と同様に操作し，標準溶液とする。これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び標準溶液 10μL ずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲルを用いて調製した薄層板にスポットする。次にヘキサン・アセトン混液（9：1）を展開溶媒として約 10cm 展開した後，薄層板を風乾する。これに 4 - メトキシベンズアルデヒド・硫酸試液を均等に噴霧した

後，105℃で 10 分間加熱するとき，試料溶液から得た数個のスポットのうち 1 個のスポットは，標準溶液から得た暗紫青色のスポットと色調及び *Rf* 値が等しい。

（２）　本品 1.0g に薄めたメタノール（7→10）5mL を加えて振り混ぜた後，ろ過し，ろ液を試料溶液とする。別にリボフラビン酪酸エステル 4mg，ピリドキシン塩酸塩 0.02g 及びパントテン酸カルシウム 7mg をそれぞれ薄めたメタノール（7→10）5mL に溶かし，標準溶液（1），標準溶液（2）及び標準溶液（3）とする。これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び標準溶液 5μL ずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲル（蛍光剤入り）を用いて調製した薄層板にスポットする。次にアセトン・ヘキサン・メタノール・酢酸（100）混液（10：8：1：1）を展開溶媒として約 10cm 展開した後，薄層板を風乾する。これに紫外線（波長 254nm 及び 365nm）を照射するとき，試料溶液から得た数個のスポットのうち 2 個のスポットは，標準溶液（1）及び標準溶液（2）から得たスポットと色調及び *Rf* 値が等しい。また，この薄層板にニンヒドリンのエタノール（95）溶液（1→200）を均等に噴霧した後，160℃で 5 分間加熱するとき，標準溶液（3）から得たスポット及びこれに対応する位置の試料溶液から得たスポットは紫色を呈する。

定 量 法　（１）　本品 0.5g を精密に量り，メタノール 30mL を加えて 10 分間振り混ぜた後，内標準溶液 5mL を正確に加え，更にメタノールを加えて正確に 50mL とする。この液をろ過し，初めのろ液 10mL を除き，次のろ液を試料溶液とする。別に定量用リボフラビン酪酸エステル 0.01g を精密に量り，メタノールに溶かし，正確に 20mL とする。この液 5mL を正確に量り，内標準溶液 5mL を正確に加え，メタノールを加えて 50mL とし，標準溶液とする。試料溶液及び標準溶液 10μL につき，次の条件で液体クロマトグラフ法により試験を行い，内標準物質のピーク面積に対するリボフラビン酪酸エステルのピーク面積の比 Q_T 及び Q_S を求める。

リボフラビン酪酸エステル（$C_{33}H_{44}N_4O_{10}$）の量（mg）

＝定量用リボフラビン酪酸エステルの量（mg）$\times\dfrac{\boldsymbol{Q_T}}{\boldsymbol{Q_S}}\times\dfrac{\boldsymbol{1}}{\boldsymbol{4}}$

内標準溶液　フタル酸ジ *n* - アミルのメタノール溶液（1→300）

操作条件

検出器：紫外吸光光度計（測定波長：254nm）

カラム：内径約 4mm，長さ 15～25cm のステンレス管に 5～10μm のオクタデシルシリル化シリカゲルを充てんする。

カラム温度：40℃付近の一定温度

移動相：メタノール・水混液（4：1）

流量：リボフラビン酪酸エステルの保持時間が約 5 分になるように調整する。

カラムの選定：標準溶液 10μL につき，上記の条件で操作するとき，リボフラビン酪酸エステル，フタル酸ジ *n* - アミルの順に溶出し，それぞれのピークが完全に分離するものを用いる。

（２）　本品約 0.1g を精密に量り，薄めたアセトニトリル（1→10）30mL を加えて 10 分間振り混ぜた後，内標準溶液 5mL を正確に加え，更に薄めたアセトニトリル（1→10）を加えて 50mL とする。この液をろ過し，初めのろ液 10mL を除き，次のろ液を試料溶液とする。別にピリドキシン塩酸塩標準品約 0.01g を精密に量り，薄めたアセトニトリル（1→10）に溶かし，正確に 25mL とする。この液 5mL を正確に量り，内標準溶液 5mL

を正確に加え，薄めたアセトニトリル（1→10）を加えて 50mL とし，標準溶液とする。試料溶液及び標準溶液 10μL につき，次の条件で液体クロマトグラフ法により試験を行い，内標準物質のピーク面積に対するピリドキシン塩酸塩のピーク面積の比 Q_T 及び Q_S を求める。

ピリドキシン塩酸塩（$C_8H_{11}NO_3$・HCl）の量（mg）

$$= \text{ピリドキシン塩酸塩標準品の量（mg）} \times \frac{Q_T}{Q_S} \times \frac{1}{5}$$

内標準溶液　パラオキシ安息香酸の薄めたアセトニトリル（1→10）溶液（1→5000）

操作条件

検出器：紫外吸光光度計（測定波長：270nm）

カラム：内径約 4mm，長さ 15～25cm のステンレス管に 5～10μm のオクタデシルシリル化シリカゲルを充てんする。

カラム温度：40℃付近の一定温度

移動相：1 - ヘプタンスルホン酸ナトリウム 1g 及びリン酸二水素カリウム 6.8g を水 1000mL に溶かし，リン酸を加えて pH2.5 に調整する。この液 900mL にアセトニトリル 100mL を加える。

流量：ピリドキシン塩酸塩の保持時間が約 6 分になるように調整する。

カラムの選定：標準溶液 10μL につき，上記の条件で操作するとき，ピリドキシン塩酸塩，パラオキシ安息香酸の順に溶出し，それぞれのピークが完全に分離するものを用いる。

（3）　本品約 1.5g を精密に量り，薄めたアセトニトリル（1→20）30mL を加えて 10 分間振り混ぜた後，内標準溶液 5mL を正確に加え，更に薄めたアセトニトリル（1→20）を加えて 50mL とする。この液をろ過し，初めのろ液 10mL を除き，次のろ液を試料溶液とする。別に定量用パントテン酸カルシウム約 0.01g を精密に量り，薄めたアセトニトリル（1→20）30mL に溶かし，次に内標準溶液 5mL を正確に加えた後，薄めたアセトニトリル（1→20）を加えて 50mL とし，標準溶液とする。試料溶液及び標準溶液 10μL につき，次の条件で液体クロマトグラフ法により試験を行い，内標準物質のピーク面積に対するパントテン酸カルシウムのピーク面積の比 Q_T 及び Q_S を求める。

パントテン酸カルシウムの量（mg）

$$= \text{定量用パントテン酸カルシウムの量（mg）} \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

内標準溶液　ニコチン酸の薄めたアセトニトリル（1→20）溶液（1→6000）

操作条件

検出器：紫外吸光光度計（測定波長：210nm）

カラム：内径約 4mm，長さ 15～25cm のステンレス管に 5～10μm のオクタデシルシリル化シリカゲルを充てんする。

カラム温度：40℃付近の一定温度

移動相：1 - オクタンスルホン酸ナトリウム 1.1g 及びリン酸二水素カリウム 6.8g を水 1000mL に溶かし，リン酸を加えて pH3 に調整する。この液 950mL とアセトニトリル 50mL を加える。

流量：パントテン酸カルシウムの保持時間が約 6 分になるように調整する。

カラムの選定：標準溶液 10μL につき，上記の条件で操作するとき，ニコチン酸，パントテン酸カルシウムの順に溶出し，それぞれのピークが完全に分離するものを用いる。

【 171 】　ビタミン主薬製剤 2—①

成分及び分量又は本質	日本薬局方	チアミン硝化物	0.03g
	〃	リボフラビン酪酸エステル	0.012g
	〃	ピリドキシン塩酸塩	0.05g
	〃	ニコチン酸アミド	0.06g
	賦形剤　〃	デンプン，乳糖水和物又はこれらの混合物	適　量
		全　　量	3.0g
製造方法	以上をとり，散剤の製法により製する。ただし，分包散剤とする。		
用法及び用量	1 回量を次のとおりとし，1 日 3 回，食後服用する。 大人（15 才以上）1 包 1.0g，11 才以上 15 才未満　大人の 2/3，7 才以上 11 才未満　大人の 1/2，3 才以上 7 才未満　大人の 1/3，1 才以上 3 才未満　大人の 1/4		
効能又は効果	○次の諸症状の緩和：神経痛，筋肉痛・関節痛（腰痛，肩こり，五十肩など），手足のしびれ，便秘，眼精疲労 ○脚気 「ただし，これらの症状について，1 カ月ほど使用しても改善がみられない場合は，医師又は薬剤師に相談すること。」 ○次の場合のビタミン B_1 の補給：肉体疲労時，妊娠・授乳期，病中病後の体力低下時		
貯蔵方法及び有効期間	遮光した密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考			

規 格 及 び 試 験 方 法

本品は定量するとき，チアミン硝化物（$C_{12}H_{17}N_5O_4S$：327.36）0.9～1.1%，リボフラビン酪酸エステル（$C_{33}H_{44}N_4O_{10}$：656.73）0.36～0.44%，ピリドキシン塩酸塩（$C_8H_{11}NO_3$・HCl：205.64）1.50～1.83%及びニコチン酸アミド（$C_6H_6N_2O$：122.13）1.8～2.2%を含む。

性　　状　本品はだいだい黄色の粉末で，味はわずかに苦い。

確認試験　本品 0.5g にメタノール 5mL を加えて振り混ぜた後，ろ過し，ろ液を試料溶液とする。別にチアミン硝化物 5mg，リボフラビン酪酸エステル 2mg，ピリドキシン塩酸塩 8mg 及びニコチン酸アミド 0.01g をそれぞれメタノール 5mL に溶かし，標準溶液（1），標準溶液（2），標準溶液（3）及び標準溶液（4）とする。これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び標準溶液 10μL ずつを薄層クロマトグラフ用

シリカゲル（蛍光剤入り）を用いて調製した薄層板にスポットする。次にアセトン・ヘキサン・メタノール・酢酸（100）混液（10：8：1：1）を展開溶媒として約 10cm 展開した後，薄層板を風乾する。これに紫外線（波長 254nm 及び 365nm）を照射するとき，試料溶液から得た 4 個のスポットは，標準溶液（1），標準溶液（2），標準溶液（3）及び標準溶液（4）から得たそれぞれのスポットと色調及び *Rf* 値が等しい。

定 量 法　（1）　本品約 0.1g を精密に量り，移動相 30mL を加えて 10 分間振り混ぜた後，内標準溶液 5mL を正確に加え，更に移動相を加えて 50mL とする。この液をろ過し，初めのろ液 10mL を除き，次のろ液を試料溶液とする。別に塩酸チアミン標準品約 0.01g，ピリドキシン塩酸塩標準品約 0.017g，ニコチン酸アミド標準品約 0.02g をそれぞれ精密に量り，水を加えて溶かし，正確に 50mL とする。この液 5mL を正確に量り，内標準溶液 5mL を正確に加え，更に移動相を加えて 50mL とし，標準溶液とする。試料溶液及び標準溶液 10μL につき，次の条件で液体クロマトグラフ法により試験を行い，内標準物質のピーク面積に対するチアミン硝化物，ピリドキシン塩酸塩及びニコチン酸アミドのピーク面積の比 Q_{Ta}，Q_{Tb}，Q_{Tc}，Q_{Sa}，Q_{Sb} 及び Q_{Sc} を求める。

チアミン硝化物（$C_{12}H_{17}N_5O_4S$）の量（mg）

$$= \text{塩酸チアミン標準品の量（mg）} \times \frac{Q_{Ta}}{Q_{Sa}} \times \frac{1}{10} \times 0.9706$$

ピリドキシン塩酸塩（$C_8H_{11}NO_3$・HCl）の量（mg）

$$= \text{ピリドキシン塩酸塩標準品の量（mg）} \times \frac{Q_{Tb}}{Q_{sb}} \times \frac{1}{10}$$

ニコチン酸アミド（$C_6H_6N_2O$）の量（mg）

$$= \text{ニコチン酸アミド標準品の量（mg）} \times \frac{Q_{Tc}}{Q_{Sc}} \times \frac{1}{10}$$

内標準溶液　パラオキシ安息香酸のメタノール溶液（1→5000）

操作条件

検出器：紫外吸光光度計（測定波長：275nm）

カラム：内径約 4mm，長さ 15～25cm のステンレス管に 5～10μm のオクタデシルシリル化シリカゲルを充てんする。

カラム温度：40℃付近の一定温度

移動相：1 - ヘプタンスルホン酸ナトリウム 1g 及びリン酸二水素カリウム 6.8g を水 1000mL に溶かし，リン酸を加えて pH2.5 に調整する。この液 900mL にアセトニトリル 100mL を加える。

流量：ニコチン酸アミドの保持時間が約 4 分になるように調整する。

カラムの選定：標準溶液 10μL につき，上記の条件で操作するとき，ニコチン酸アミド，ピリドキシン塩酸塩，パラオキシ安息香酸，チアミン硝化物の順に溶出し，それぞれのピークが完全に分離するものを用いる。

（2）　本品 0.5g を精密に量り，メタノール 30mL を加えて 10 分間振り混ぜた後，内標準溶液 5mL を正確に加え，更にメタノールを加えて 50mL とする。この液をろ過し，初めのろ液 10mL を除き，次のろ液を試料溶液とする。別に定量用リボフラビン酪酸エステル 0.01g を精密に量り，メタノールに溶かし，正確に 25mL とする。この液 5mL を正確に量り，内標準溶液 5mL を正確に加え，更にメタノールを加えて 50mL とし，標準溶液

とする。試料溶液及び標準溶液 10μL につき，次の条件で液体クロマトグラフ法により試験を行う。内標準物質のピーク面積に対するリボフラビン酪酸エステルのピーク面積の比 Q_T 及び Q_S を求める。

リボフラビン酪酸エステル（$C_{33}H_{44}N_4O_{10}$）の量（mg）

$$= \text{定量用リボフラビン酪酸エステルの量（mg）} \times \frac{Q_T}{Q_S} \times \frac{1}{5}$$

内標準溶液　フタル酸ジ *n* - アミルのメタノール溶液（1→300）

操作条件

検出器：紫外吸光光度計（測定波長：254nm）

カラム：内径約 4mm，長さ 15～25cm のステンレス管に 5～10μm のオクタデシルシリル化シリカゲルを充てんする。

カラム温度：40℃付近の一定温度

移動相：メタノール・水混液（4：1）

流量：リボフラビン酪酸エステルの保持時間が約 5 分になるように調整する。

カラムの選定：標準溶液 10μL につき，上記の条件で操作するとき，リボフラビン酪酸エステル，フタル酸ジ *n* - アミルの順に溶出し，それぞれのピークが完全に分離するものを用いる。

【 172 】　ビタミン主薬製剤 3—①

成分及び分量又は本質	日本薬局方	リボフラビン酪酸エステル	0.02g
	〃	ピリドキシン塩酸塩	0.1g
	〃	パントテン酸カルシウム	0.03g
	〃	ニコチン酸アミド	0.06g
	賦形剤　〃	デンプン，乳糖水和物又はこれらの混合物	適　量
		全　　量	4.5g
製造方法	以上をとり，散剤の製法により製する。ただし，分包散剤とする。		
用法及び用量	1回量を次のとおりとし，1日3回，食後服用する。 大人（15才以上）1包1.5g，11才以上15才未満　大人の2/3，7才以上11才未満　大人の1/2，3才以上7才未満　大人の1/3，1才以上3才未満　大人の1/4		
効能又は効果	○次の諸症状の緩和：口角炎，口唇炎，口内炎，舌炎，湿疹，皮膚炎，かぶれ，ただれ，にきび，肌あれ 「ただし，これらの症状について，1カ月ほど使用しても改善がみられない場合は，医師又は薬剤師に相談すること。」 ○次の場合のビタミン B_2B_6 の補給：肉体疲労時，妊娠・授乳期，病中病後の体力低下時		
貯蔵方法及び有効期間	遮光した密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考			

規 格 及 び 試 験 方 法

本品は定量するとき，リボフラビン酪酸エステル（$C_{33}H_{44}N_4O_{10}$：656.73）0.40～0.49%，ピリドキシン塩酸塩（$C_8H_{11}NO_3$・HCl：205.64）2.00～2.44%，パントテン酸カルシウム（$C_{18}H_{32}CaN_2O_{10}$：476.54）0.60～0.73%及びニコチン酸アミド（$C_6H_6N_2O$：122.13）1.20～1.47%を含む。

性　　状　本品はだいだい黄色の粉末で，味はわずかに苦い。

確認試験　本品0.5gにメタノール5mLを加えて振り混ぜた後，ろ過し，ろ液を試料溶液とする。別にリボフラビン酪酸エステル2mg，ピリドキシン塩酸塩0.01g，パントテン酸カルシウム3mg及びニコチン酸アミド0.01gをそれぞれメタノール5mLに溶かして標準溶液（1），標準溶液（2），標準溶液（3）及び標準溶液（4）とする。これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び標準溶液10μLずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲル（蛍光剤入り）を用いて調製した薄層板にスポットする。次にアセ

トン・ヘキサン・メタノール・酢酸（100）混液（10：8：1：1）を展開溶媒として約10cm展開した後，薄層板を風乾する。これに紫外線（波長254nm及び365nm）を照射するとき，試料溶液から得た4個のスポットは，標準溶液（1），標準溶液（2），標準溶液（3）及び標準溶液（4）から得たそれぞれのスポットと色調及び*Rf*値が等しい。また，この薄層板にニンヒドリンのエタノール（95）溶液（1→200）を均等に噴霧した後，160℃で5分間加熱するとき，標準溶液（3）から得たスポット及びこれに対応する位置の試料溶液から得たスポットは紫色を呈する。

定 量 法 **（1）** 本品0.5gを精密に量り，メタノール30mLを加えて10分間振り混ぜた後，内標準溶液5mLを正確に加え，更にメタノールを加えて正確に50mLとする。この液をろ過し，初めのろ液10mLを除き，次のろ液を試料溶液とする。別に定量用リボフラビン酪酸エステル0.01gを精密に量り，メタノールに溶かして正確に25mLとする。この液5mLを正確に量り，内標準溶液5mLを正確に加え，移動相を加えて50mLとし，標準溶液とする。試料溶液及び標準溶液10μLにつき，次の条件で液体クロマトグラフ法により試験を行い，内標準物質のピーク面積に対するリボフラビン酪酸エステルのピーク面積の比Q_T及びQ_Sを求める。

リボフラビン酪酸エステル（$C_{33}H_{44}N_4O_{10}$）の量（mg）

＝定量用リボフラビン酪酸エステルの量（mg）$\times\frac{Q_T}{Q_S}\times\frac{1}{5}$

内標準溶液　フタル酸ジ*n*-アミルのメタノール溶液（1→300）

操作条件

検出器：紫外吸光光度計（測定波長：254nm）

カラム：内径約4mm，長さ15～25cmのステンレス管に5～10μmのオクタデシルシリル化シリカゲルを充てんする。

カラム温度：40℃付近の一定温度

移動相：メタノール・水混液（4：1）

流量：リボフラビン酪酸エステルの保持時間が約5分になるように調整する。

カラムの選定：標準溶液10μLにつき，上記の条件で操作するとき，リボフラビン酪酸エステル，フタル酸ジ*n*-アミルの順に溶出し，それぞれのピークが完全に分離するものを用いる。

（2） 本品約0.1gを精密に量り，薄めたアセトニトリル（1→10）30mLを加えて10分間振り混ぜ，内標準溶液5mLを正確に加え，更に薄めたアセトニトリル（1→10）を加えて50mLとする。この液をろ過し，初めのろ液10mLを除き，次のろ液を試料溶液とする。別にピリドキシン塩酸塩標準品約0.02g，ニコチン酸アミド標準品約0.01gをそれぞれ精密に量り，薄めたアセトニトリル（1→10）を加えて溶かし，正確に50mLとする。この液5mLを正確に量り，内標準溶液5mLを正確に加え，薄めたアセトニトリル（1→10）を加えて50mLとし，標準溶液とする。試料溶液及び標準溶液10μLにつき，次の条件で液体クロマトグラフ法により試験を行い，内標準物質のピーク面積に対するピリドキシン塩酸塩及びニコチン酸アミドのピーク面積の比Q_{Ta}，Q_{Tb}，Q_{Sa}及びQ_{Sb}を求める。

ピリドキシン塩酸塩（$C_8H_{11}NO_3$・HCl）の量（mg）

＝ピリドキシン塩酸塩標準品の量（mg）$\times\frac{Q_{Ta}}{Q_{Sa}}\times\frac{1}{10}$

ニコチン酸アミド（$C_6H_6N_2O$）の量（mg）

$$= \text{ニコチン酸アミド標準品の量（mg）} \times \frac{Q_{Tb}}{Q_{sb}} \times \frac{1}{10}$$

内標準溶液　パラオキシ安息香酸の薄めたアセトニトリル（1→10）溶液（1→5000）

操作条件

検出器：紫外吸光光度計（測定波長：270nm）

カラム：内径約 4mm，長さ 15～25cm のステンレス管に 5～10μm のオクタデシルシリル化シリカゲルを充てんする。

カラム温度：40℃付近の一定温度

移動相：1 - ヘプタンスルホン酸ナトリウム 1g 及びリン酸二水素カリウム 6.8g を水 1000mL に溶かし，リン酸を加えて pH2.5 に調整する。この液 900mL にアセトニトリル 100mL を加える。

流量：ニコチン酸アミドの保持時間が約 4 分になるように調整する。

カラムの選定：標準溶液 10μL につき，上記の条件で操作するとき，ニコチン酸アミド，ピリドキシン塩酸塩，パラオキシ安息香酸の順に溶出し，それぞれのピークが完全に分離するものを用いる。

（３）　本品約 1.5g を精密に量り，薄めたアセトニトリル（1→20）30mL を加えて 10 分間振り混ぜた後，内標準溶液 5mL を正確に加え，更に薄めたアセトニトリル（1→20）を加えて 50mL とし，ろ過する。初めのろ液 10mL を除き，次のろ液を試料溶液とする。別に定量用パントテン酸カルシウム約 0.01g を精密に量り，内標準溶液 5mL を正確に加え，薄めたアセトニトリル（1→20）を加えて溶かして 50mL とし，標準溶液とする。試料溶液及び標準溶液 10μL につき，次の条件で液体クロマトグラフ法により試験を行い，内標準物質のピーク面積に対するパントテン酸カルシウムのピーク面積の比 Q_T 及び Q_S を求める。

パントテン酸カルシウムの量（mg）

$$= \text{定量用パントテン酸カルシウムの量（mg）} \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

内標準溶液　ニコチン酸の薄めたアセトニトリル（1→20）溶液（1→6000）

操作条件

検出器：紫外吸光光度計（測定波長：210nm）

カラム：内径約 4mm，長さ 15～25cm のステンレス管に 5～10μm のオクタデシルシリル化シリカゲルを充てんする。

カラム温度：40℃付近の一定温度

移動相：1 - オクタンスルホン酸ナトリウム 1.1g 及びリン酸二水素カリウム 6.8g を水 1000mL に溶かし，リン酸を加えて pH3 に調整する。この液 950mL にアセトニトリル 50mL を加える。

流量：パントテン酸カルシウムの保持時間が約 6 分になるように調整する。

カラムの選定：標準溶液 10μL につき，上記の条件で操作するとき，ニコチン酸，パントテン酸カルシウムの順に溶出し，それぞれのピークが完全に分離するものを用いる。

【 173 】　ビタミン主薬製剤 4—①

成分及び分量又は本質		日本薬局方	フラビンアデニンジヌクレオチドナトリウム	0.045g
		〃	ピリドキシン塩酸塩	0.1g
		別紙規格	L - 塩酸システイン	0.16g
		日本薬局方	ニコチン酸アミド	0.06g
	賦形剤	〃	デンプン，乳糖水和物又はこれらの混合物	適　量
			全　　量	4.5g
製造方法	以上をとり，散剤の製法により製する。ただし，分包散剤とする。			
用法及び用量	1回量を次のとおりとし，1日3回，食後服用する。 大人（15才以上）1包1.5g，11才以上15才未満　大人の2/3，7才以上11才未満　大人の1/2，3才以上7才未満　大人の1/3，1才以上3才未満　大人の1/4			
効能又は効果	○次の諸症状の緩和：口角炎，口唇炎，口内炎，舌炎，湿疹，皮膚炎，かぶれ，ただれ，にきび，肌あれ 「ただし，これらの症状について，1カ月ほど使用しても改善がみられない場合は，医師又は薬剤師に相談すること。」 ○次の場合のビタミン B_2B_6 の補給：肉体疲労時，妊娠・授乳期，病中病後の体力低下時			
貯蔵方法及び有効期間	遮光した密閉容器			
規格及び試験方法	別記のとおり。			
備考				

規 格 及 び 試 験 方 法

本品は定量するとき，フラビンアデニンジヌクレオチドナトリウム（$C_{27}H_{31}N_9Na_2O_{15}P_2$：829.52）0.9～1.1%，ピリドキシン塩酸塩（$C_8H_{11}NO_3$・HCl：205.64）2.0～2.4%，L - 塩酸システイン（$C_3H_7NO_2S$・HCl：157.62）3.2～3.9%及びニコチン酸アミド（$C_6H_6N_2O$：122.13）1.2～1.5%を含む。

性　　状　本品は白色の粉末である。

確認試験　本品1gに薄めたメタノール（1→2）10mLを加えて振り混ぜた後，ろ過し，ろ液を試料溶液とする。別にフラビンアデニンジヌクレオチドナトリウム0.01g，ピリドキシン塩酸塩0.02g，L - 塩酸システイン0.035g及びニコチン酸アミド0.013gをそれぞれ薄めたメタノール（1→2）10mLに溶かして標準溶液（1），標準溶液（2），標準溶液（3）及び標準溶液（4）とする。これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び標準溶液10μLずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲル（蛍光剤入

り）を用いて調製した薄層板にスポットする。次に 1 - ブタノール・水・酢酸（100）混液（5：2：1）を展開溶媒として約 10cm 展開した後，薄層板を風乾する。これに紫外線（主波長 254nm）を照射するとき，試料溶液から得た 3 個のスポットは，標準溶液（1），標準溶液（2）及び標準溶液（4）から得たそれぞれのスポットと色調及び *Rf* 値が等しい。また，この薄層板にニンヒドリンのアセトン溶液（1→50）を均等に噴霧した後，80℃で 5 分間加熱するとき，標準溶液（3）から得たスポット及びそれに対応する位置の試料溶液から得たスポットは，赤紫色を呈する。

定 量 法 （1） 本品約 0.1g を精密に量り，薄めたメタノール（1→10）30mL を加えて振り混ぜた後，内標準溶液 5mL を正確に加え，更に薄めたメタノール（1→10）を加えて 50mL とし，ろ過する。初めのろ液 10mL を除き，次のろ液を試料溶液とする。別に定量用フラビンアデニンジヌクレオチドナトリウム約 0.01g，ピリドキシン塩酸塩標準品 0.02g 及びニコチン酸アミド標準品 0.13g を精密に量り，薄めたメタノール（1→10）に溶かして正確に 50mL とする。この液 5mL を正確に量り，内標準溶液 5mL を正確に加え，薄めたメタノール（1→10）を加えて溶かし 50mL とし，標準溶液とする。試料溶液及び標準溶液 10μL につき，次の条件で液体クロマトグラフ法により試験を行い，内標準物質のピーク面積に対するフラビンアデニンジヌクレオチドナトリウム，ピリドキシン塩酸塩及びニコチン酸アミドのピーク面積の比 Q_{Ta}，Q_{Tb}，Q_{Tc}，Q_{Sa}，Q_{Sb} 及び Q_{Sc} を求める。

フラビンアデニンジヌクレオチドナトリウム（$C_{27}H_{31}N_9Na_2O_{15}P_2$）の量（mg）

＝定量用フラビンアデニンジヌクレオチドナトリウムの量（mg）$\times\frac{Q_{Ta}}{Q_{Sa}}\times\frac{1}{10}$

ピリドキシン塩酸塩（$C_8H_{11}NO_3$・HCl）の量（mg）

＝ピリドキシン塩酸塩標準品の量（mg）$\times\frac{Q_{Tb}}{Q_{sb}}\times\frac{1}{10}$

ニコチン酸アミド（$C_6H_6N_2O$）の量（mg）

＝ニコチン酸アミド標準品の量（mg）$\times\frac{Q_{Tc}}{Q_{Sc}}\times\frac{1}{10}$

内標準溶液　7 - （2 - ヒドロキシエチル）テオフィリンの薄めたメタノール（1→10）溶液（1→8000）

操作条件

検出器：紫外吸光光度計（測定波長：275nm）

カラム：内径約 4mm，長さ 15～25cm のステンレス管に 5～10μm のオクタデシルシリル化シリカゲルを充てんする。

カラム温度：40℃付近の一定温度

移動相：1 - ペンタンスルホン酸ナトリウム 1g 及びリン酸二水素カリウム 1.3g を水 1000mL に溶かす。この液 900mL にメタノール 100mL を加える。

流量：フラビンアデニンジヌクレオチドナトリウムの保持時間が約 3 分になるように調整する。

カラムの選定：標準溶液 10μL につき，上記の条件で操作するとき，フラビンアデニンジヌクレオチドナトリウム，ニコチン酸アミド，ピリドキシン塩酸

塩，7 - （2 - ヒドロキシエチル）テオフィリンの順に溶出し，それぞれのピークが完全に分離するものを用いる。

（２）　本品約 1.0g を精密に量り，移動相 30mL を加えて振り混ぜた後，内標準溶液 5mL を正確に加え，更に移動相を加えて 50mL とし，ろ過する。初めのろ液 10mL を除き，次のろ液を試料溶液とする。別に定量用 L - 塩酸システイン約 0.035g を精密に量り，内標準溶液 5mL を正確に加え，移動相を加えて 50mL とし，標準溶液とする。試料溶液及び標準溶液 10μL につき，次の条件で液体クロマトグラフ法により試験を行い，内標準物質のピーク面積に対する L - 塩酸システインのピーク面積の比 Q_T 及び Q_S を求める。

L - 塩酸システイン（$C_3H_7NO_2S$・HCl）の量（mg）

＝脱水物に換算した定量用 L - 塩酸システインの量（mg）× $\frac{Q_T}{Q_S}$

内標準溶液　イソニコチン酸の水溶液（1→6000）

操作条件

検出器：紫外吸光光度計（測定波長：220nm）

カラム：内径約 4mm，長さ 15～25cm のステンレス管に

5～10μm のオクタデシルシリル化シリカゲルを充てんする。

カラム温度：40℃付近の一定温度

移動相：1 - オクタンスルホン酸ナトリウム 1.5g を薄めたリン酸（1→1000）1000mL に溶かす。この液 950mL にアセトニトリル 50mL を加える。

流量：塩酸システインの保持時間が約 7 分になるように調整する。

カラムの選定：標準溶液 10μL につき，上記の条件で操作するとき，イソニコチン酸，塩酸システインの順に溶出し，それぞれのピークが完全に分離するものを用いる。

別紙規格　　L - 塩酸システインの規格及び試験方法

本品を定量するとき，換算した脱水物に対し，L - 塩酸システイン（$C_3H_7NO_2S$・HCl：157.62）98.0～102.0%を含む。

性　　状　本品は無色～白色の結晶又は結晶性の粉末で，特異なにおいがある。

確認試験　（１）　本品の水溶液（1→1000）5mL にピリジン 0.5mL 及びニンヒドリン溶液（1→1000）1mL を加え，5 分間加熱するとき，液は紫～紫褐色を呈する。

（２）　本品の水溶液（1→1000）10mL に水酸化ナトリウム試液 2mL 及びニトロプルシッドナトリウム試液 2 滴を加えるとき，液は赤紫色を呈する。

（３）　本品の水溶液（1→50）10mL に過酸化水素 1mL を加え，水浴中で 10 分間加熱した液は，塩化物の定性反応（2）を呈する。

旋 光 度　〔α〕$_D^{20}$：＋5.0～＋8.0°（乾燥物に換算したもの 4g，塩酸（1→10），50mL）

純度試験　（１）　溶状　本品 1.0g を水 20mL に溶かすとき，液は無色澄明である。

（２）　重金属　本品 1.0g をとり，第 2 法により操作し，試験を行う。比較液には鉛標準液 2.0mL を加える（20ppm 以下）。

（３）　ヒ素　本品 1.0g を分解フラスコに入れ，硝酸 5mL 及び硫酸 2mL を加え，白煙が発生するまで注意して加熱する。冷後，硝酸 2mL ずつを 2 回加えて加熱し，更に強過酸化水素水 2mL ずつを数回加え，液が無色～微黄色となるまで加熱する。冷後，飽和シュウ酸アンモニウム溶液 2mL を加え，再び白煙が発生するまで加熱する。冷後，水を加えて 5mL とし，これを検液とし，装置Ｂを用いる方法により試験を行う（2ppm 以下）。

（４）　シスチン　本品 0.10g を量り，*N*- エチルマレイミド溶液（1→50）50mL を加えて溶かし，2 時間放置し，試料溶液とする。この液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液 5μL ずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲルを用いて調製した薄層板にスポットする。風乾後直ちに 1 - ブタノール・水・酢酸（100）混液（3：1：1）を展開溶媒として約 10cm 展開した後，薄層板を風乾する。これにニンヒドリンのアセトン溶液（1→50）を均等に噴霧した後，80℃で 5 分間加熱するとき，試料溶液から得た主スポット以外のスポットは認めない。

乾燥減量　8.0～12.0%（0.5g，減圧・0.67kPa 以下，シリカゲル，24 時間）

強熱残分　0.20%以下（1g）

定 量 法　本品約 0.25g を精密に量り，共栓フラスコに入れ，水 20mL を加えて溶かし，更にヨウ化カリウム 4g を加えて溶かす。この液に塩酸（1→4）5mL 及び 0.1mol/L ヨウ素液 25mL を正確に加え，密栓し，氷水中で 20 分間暗所に放置した後，過量のヨウ素を 0.1mol/L チオ硫酸ナトリウム液で滴定する（指示薬：デンプン試液 2mL）。同様の方法で空試験を行う。

0.1mol/L ヨウ素液 1mL＝15.762mg $C_3H_7NO_2S$・HCl

【 174 】　ビタミン主薬製剤 5—①

成分及び分量 又は本質		*d*-α-トコフェロール酢酸エステル	0.6g
	日本薬局方	ニンジン末	1.5g
	賦形剤　〃	デンプン，乳糖水和物又はこれらの混合物	適　量
		全　　量	3.0g
製造方法	以上をとり，散剤の製法により製する。ただし，分包散剤とする。		
用法及び用量	1回量を次のとおりとし，1日3回，食後服用する。 大人（15才以上）1包1.0g，11才以上15才未満　大人の2/3，7才以上11才未満　大人の1/2，3才以上7才未満　大人の1/3，1才以上3才未満　大人の1/4		
効能又は効果	○末梢血行障害による次の諸症状の緩和：肩・首すじのこり，手足のしびれ・冷え，しもやけ ○更年期における次の諸症状の緩和：肩・首すじのこり，冷え，手足のしびれ，のぼせ ○月経不順 「ただし，これらの症状について，1カ月ほど使用しても改善がみられない場合は，医師又は薬剤師に相談すること。」 ○次の場合のビタミンEの補給：老年期		
貯蔵方法及び有効期間	遮光した密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考			

規格及び試験方法

本品は定量するとき，トコフェロール酢酸エステル（$C_{31}H_{52}O_3$：472.75）9.0～11.0%を含む。

性　　状　本品は白色の粉末である。

確認試験　（1）　本品0.5gにエタノール（99.5）5mLを加えて振り混ぜた後，ろ過し，ろ液を試料溶液とする。別にトコフェロール酢酸エステル0.05gをエタノール（99.5）5mLに溶かし，標準溶液とする。これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び標準溶液10μLずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲル（蛍光剤入り）を用いて調製した薄層板にスポットする。次にクロロホルムを展開溶媒として約10cm展開した後，薄層板を風乾する。これに紫外線（主波長254nm）を照射するとき，試料溶液から得たスポットは，標準溶液から得たスポットと色調及び*Rf*値が等しい。

（２）　本品 2.0g にメタノール 20mL を加え，還流冷却器を付け，水浴上で 15 分間穏やかに煮沸し，冷後，ろ過し，ろ液を試料溶液とする。別にニンジン末 1.0g にメタノール 20mL を加え，試料溶液と同様に操作し，標準溶液とする。これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び標準溶液 10μL ずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲルを用いて調製した薄層板にスポットする。次にクロロホルム・メタノール・水混液（13：7：2）の下層を展開溶媒として約 10cm 展開した後，薄層板を風乾する。これに希硫酸を均等に噴霧し，110℃で 10 分間加熱するとき，試料溶液から得た数個のスポットのうち 6 個のスポットは，標準溶液から得た赤紫色のスポットと色調及び *Rf* 値が等しい。

定 量 法　本品約 0.25g を精密に量り，エタノール（99.5）30mL を加えて振り混ぜた後，内標準溶液 5mL を正確に加え，更にエタノール（99.5）を加えて 50mL とする。この液をろ過し，ろ液を試料溶液とする。別にトコフェロール酢酸エステル標準品約 0.025g を精密に量り，内標準溶液 5mL を正確に加えた後，エタノール（99.5）に溶かして 50mL とし，標準溶液とする。試料溶液及び標準溶液 10μL につき，次の条件で液体クロマトグラフ法により試験を行い，内標準物質のピーク面積に対するトコフェロール酢酸エステルのピーク面積の比 Q_T 及び Q_S を求める。

トコフェロール酢酸エステル（$C_{31}H_{52}O_3$）の量（mg）

＝トコフェロール酢酸エステル標準品の量（mg）×

$$\frac{Q_T}{Q_S}$$

内標準溶液　フタル酸ジオクチルのエタノール（99.5）溶液（1→200）

操作条件

検出器：紫外吸光光度計（測定波長：280nm）

カラム：内径約 4mm，長さ 15～25cm のステンレス管に 5～10μm のオクタデシルシリル化シリカゲルを充てんする。

カラム温度：40℃付近の一定温度

移動相：メタノール

流量：トコフェロール酢酸エステルの保持時間が約 8 分になるように調整する。

カラムの選定：標準溶液 10μL につき，上記の条件で操作するとき，フタル酸ジオクチル，トコフェロール酢酸エステルの順に溶出し，それぞれのピークが完全に分離するものを用いる。

【 175 】　かぜ薬 10

成分及び分量又は本質	日本薬局方	イブプロフェン	0.45g
	〃	*dl*-メチルエフェドリン塩酸塩散 10%	0.6g
	〃	*dl*-クロルフェニラミンマレイン酸塩	0.0075g
	〃	カフェイン水和物	0.075g
	〃	ジヒドロコデインリン酸塩散 1%	2.4g
	賦形剤　〃	デンプン，乳糖水和物又はこれらの混合物	適　量
		全　　量	4.5g
製造方法	以上をとり，散剤の製法により製する。ただし，分包散剤とする。 ただし，*dl*-クロルフェニラミンマレイン酸塩に替えて，*dl*-クロルフェニラミンマレイン酸塩散1%を用いてもよい。		
用法及び用量	大人（15才以上）1回1.5gを1日3回，食後服用する。		
効能又は効果	かぜの諸症状（鼻水，鼻づまり，くしゃみ，のどの痛み，せき，たん，悪寒，発熱，頭痛，関節の痛み，筋肉の痛み）の緩和		
貯蔵方法及び有効期間	遮光した密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考			

規格及び試験方法

本品を定量するとき，イブプロフェン($C_{13}H_{18}O_2$:206.28)8～12%，*dl*－メチルエフェドリン塩酸塩($C_{11}H_{17}NO\cdot HCl$:215.72)1.1～1.6%，*dl*-クロルフェニラミンマレイン酸塩($C_{16}H_{19}ClN_2\cdot C_4H_4O_4$:390.87)0.13～0.20%，カフェイン水和物($C_8H_{10}N_4O_2\cdot H_2O$:212.21)1.3～2.0%，ジヒドロコデインリン酸塩($C_{18}H_{23}NO_3\cdot H_3PO_4$:399.38)0.43～0.64%を含む。

性　　状　本品は白色の粉末である。

確認試験　（1）　本品 1.0 g をアンモニア試液 1mol/L 1mL で湿潤した後，ジエチルエーテル 40mL を加えて 15 分間振とうし，遠心分離して上清を除く。沈殿物にメタノール 40mL を加え振とうした後，ろ過し，ろ液を約 2mL となるまで減圧濃縮し，試料溶液とする。別にイブプロフェン 0.5 g をメタノール 2mL に溶かし，標準溶液とする。これらの

液につき，薄層クロマトグラフィー法により試験を行う。試料溶液及び標準溶液 5μL ずつを薄層クロマトグラフィー用シリカゲル（蛍光剤入り）を用いて調製した薄層板にスポットする。次にクロロホルム：メタノール：水混液(65:35:10)下層を展開溶媒として約 10cm 展開した後，薄層板を風乾する。これにニンヒドリン試薬を均等に噴霧し，105℃で 5 分間加熱するとき，試料溶液から得られたスポットのうち 1 個は，イブプロフェン標準液から得た紅色のスポットと色調及び *Rf* 値が等しい。

（2） 本品 1.0g をアンモニア試液 1mol/L 1mL で湿潤した後，ジエチルエーテル 40mL を加えて 15 分間振とうし，遠心分離して上清を除く。沈殿物にメタノール 40mL を加え振とうした後，ろ過し，ろ液を約 2mL となるまで減圧濃縮し，試料溶液とする。別にカフェイン水和物 0.1g をメタノール 2mL に溶かし，標準溶液とする。これらの液につき，薄層クロマトグラフィー法により試験を行う。試料溶液及び標準溶液 5μL ずつを薄層クロマトグラフィー用シリカゲル（蛍光剤入り）を用いて調製した薄層板にスポットする。次にクロロホルム：メタノール：水混液(65:35:10)下層を展開溶媒として約 10cm 展開した後，薄層板を風乾する。これに紫外線（主波長 254nm）を照射するとき，試料溶液から得られたスポットのうち 1 個は，カフェイン水和物標準品から得た黒色吸収スポットと *Rf* 値が等しい。

（3） 本品 1.0g をアンモニア試液 1mol/L 40mL を加え，クロロホルム 40mL で 15 分間振とうし，遠心分離し，得られたクロロホルム層を硫酸ナトリウムで乾燥後，約 2mL となるまで減圧濃縮し，試料溶液とする。別に *dl*-メチルエフェドリン塩酸塩散 10% 0.1g（同原末 0.01g 相当量）をメタノール 2mL に溶かし，標準溶液とする。これらの液につき，薄層クロマトグラフィー法により試験を行う。試料溶液及び標準溶液 5μL ずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲル（蛍光剤入り）を用いて調製した薄層板にスポットする。次に 1-ブタノール：酢酸：水混液(7:2:1)を展開溶媒として約 10cm 展開した後，薄層板を風乾する。これに噴霧用ドラーゲンドルフ試液を均等に噴霧するとき，試料溶液から得られたスポットのうち 1 個は，*dl*-メチルエフェドリン塩酸塩から得た黄褐色のスポットと色調及び *Rf* 値が等しい。

（4） 本品 1.0g をアンモニア試液 1mol/L 1mL で湿潤した後，ジエチルエーテル 40mL を加えて 15 分間振とうし，遠心分離して上清を除く。沈殿物にメタノール 40mL を加え振とうした後，ろ過し，ろ液を約 2mL となるまで減圧濃縮し，試料溶液とする。別にジヒドロコデインリン酸塩散 1% 0.5g（同原末 0.005g 相当量）をメタノール 2mL に溶かし，標準溶液とする。これらの液につき，薄層クロマトグラフィー法により試験を行う。試料溶液及び標準溶液 5μL ずつを薄層クロマトグラフィー用シリカゲル（蛍光剤入り）を用いて調製した薄層板にスポットする。次に酢酸エステル：エタノール：アンモニア水(28)混液(15:5:1) を展開溶媒として約 10cm 展開した後，薄層板を風乾する。これに噴霧用ドラーゲンドルフ試液を均等に噴霧するとき，試料溶液から得られたスポットのうち 1 個は，ジヒドロコデインリン酸塩から得た黄褐色のスポットと色調及び *Rf* 値が等しい。

（5） 本品 1.0g をアンモニア試液 1mol/L 1mL で湿潤した後，ジエチルエーテル 40mL を加えて 15 分間振とうし，遠心分離して上清を除く。沈殿物にメタノール 40mL を加え振とうした後，ろ過し，ろ液を約 2mL となるまで減圧濃縮し，試料溶液とする。別に *dl*-クロルフェニラミンマレイン酸塩 0.01g をメタノール 2mL に溶かし，標準溶液とする。これらの液につき，薄層クロマトグラフィー法により試験を行う。試料溶液及び標準溶液 5μL ずつを薄層クロマトグラフィー用シリカゲル（蛍光剤入り）を用いて調製した薄層板にスポットする。次に酢酸エステル：エタノール：アンモニア水(28)混液(15:5:1) を展開溶媒として約 10cm 展開した後，薄層板を風乾する。これに噴霧用ドラーゲンドル

フ試液を均等に噴霧するとき，試料溶液から得たスポットのうち 1 個のスポットは，標準溶液から得た黄褐色のスポットと色調及び *Rf* 値が等しい。

定 量 法 （1） 本品約 1.0g を精密に量り，希エタノール 80mL を加え約 10 分間振り混ぜた後，更に希エタノールを加えて正確に 100mL とし試料溶液とする。別に約 500mg の *dl*-メチルエフェドリン塩酸塩散 10%を精密に量り，希エタノールに溶解し正確に 50mL とし，標準溶液とする。同様に，約 500mg のジヒドロコデインリン酸塩散 1%を精密に量り，希エタノールに溶解し正確に 50mL とし，標準溶液とする。試料溶液および標準溶液はそれぞれ 0.45μL のフィルターでろ過し，その 10μL につき次の条件で液体クロマトグラフィーによりピーク高さによる絶対検量線法で試験を行う。それぞれの標準溶液は希エタノールで段階的に希釈し検量線を求め，これをもとに成分含量を算出する。

操作条件

検出器：紫外吸光光度計(測定波長：210nm)

カラム：内径 4.6mm，長さ 150mm のステンレス管に 5μmの液体クロマトグラフィー用オクタデシルシリル化シリカゲルを充てんする。

カラム温度: 40℃付近の一定温度

移動相：ラウリル硫酸ナトリウム(1→128)/アセトニトリル/リン酸(640:440:1)

流量：1.0mL/min

カラムの選定：標準溶液 10μL につき上記の条件で操作するとき，*dl*-メチルエフェドリン，ジヒドロコデインの順に溶出し，その分離度は 2 以上である。

（2） 本品約 1.0 g を精密に量り，希エタノール 80mL を加え約 10 分間振り混ぜた後，更に希エタノールを加えて正確に 100mL とし，試料溶液とする。別にイブプロフェン標準品約 20mg を精密に量り，希エタノールに溶解し正確に 100mL としたものを標準溶液とする。試料溶液および標準溶液はそれぞれ 0.45μL のフィルターでろ過し，その 10μL につき次の条件で液体クロマトグラフィーによりピーク高さによる絶対検量線法で試験を行う。それぞれの標準溶液は希エタノールで段階的に希釈し検量線を求め，これをもとに成分含量を算出する。

操作条件

検出器：紫外吸光光度計(測定波長：235nm)

カラム：内径 4.6mm，長さ 150mm のステンレス管に 5μmの液体クロマトグラフィー用オクタデシルシリル化シリカゲルを充てんする。

カラム温度：40℃付近の一定温度

移動相：水/アセトニトリル/リン酸(100:100:1)

流量：1.0mL/min

カラムの選定：標準溶液 10μL につき上記の条件で操作するとき，イブプロフェンの理論段数およびシンメトリー係数は，5,000 段以上，1.5 以下である。

（3） 本品約 1.0g を精密に量り，希エタノール 80mL を加え約 10 分間振り混ぜた後，更に希エタノールを加えて正確に 100mL とする。この液をろ過して試料原液とし，これを 10 倍に希釈し試料溶液とする。別に *dl*-クロルフェニラミンマレイン酸塩標準品約 10mg を精密に量り，希エタノールに溶解し正確に 100mL としたものを標準溶液とする。試料溶液および標準溶液はそれぞれ 0.45μL のフィルターでろ過し，その 10μL につき次の

条件で液体クロマトグラフィーによりピーク面積による絶対検量線法で試験を行う。それぞれの標準溶液は希エタノールで段階的に希釈し検量線を求め，これをもとに成分含量を算出する。

操作条件

検出器：紫外吸光光度計(測定波長：254nm)

カラム：内径 4.6mm，長さ 150mm のステンレス管に 5μmの液体クロマトグラフィー用オクタデシルシリル化シリカゲルを充てんする。

カラム温度：40℃付近の一定温度

移動相：水/アセトニトリル/リン酸(850:150:1)

流量：1.0mL/min

カラムの選定：標準溶液 10μL につき上記の条件で操作するとき，*dl*-クロルフェニラミンマレイン酸塩の理論段数およびシンメトリー係数は，5,000 段以上，1.5 以下である。

（4） 本品約 1.0g を精密に量り，希エタノール 80mL を加え約 10 分間振り混ぜた後，更に希エタノールを加えて正確に 100mL とする。この液をろ過して試料原液とし，これを 10 倍に希釈し試料溶液とする。別にカフェイン水和物標準品約 10mg を精密に量り，希エタノールに溶解し正確に 100mL としたものを標準溶液とする。試料溶液および標準溶液はそれぞれ 0.45μL のフィルターでろ過し，その 10μL につき次の条件で液体クロマトグラフィーによりピーク面積による絶対検量線法で試験を行う。それぞれの標準溶液は希エタノールで段階的に希釈し検量線を求め，これをもとに成分含量を算出する。

操作条件

検出器：紫外吸光光度計(測定波長：280nm)

カラム：内径 4.6mm，長さ 150mm のステンレス管に 5μmの液体クロマトグラフィー用オクタデシルシリル化シリカゲルを充てんする。

カラム温度：40℃付近の一定温度

移動相：0.1%リン酸/アセトニトリル(9:1)

流量：1.0mL/min

カラムの選定：標準溶液 10μL につき上記の条件で操作するとき，カフェイン水和物の理論段数およびシンメトリー係数は，5,000 段以上，1.5 以下である。

【 176 】　抗ヒスタミン薬 6

成分及び分量又は本質	日本薬局方　*dl*-クロルフェニラミンマレイン酸塩　0.009g 〃　リン酸水素カルシウム水和物　2.4g 賦形剤　デンプン，乳糖水和物又はこれらの混合物　適量 全　量　3.0g
製造方法	以上をとり，散剤の製法により製する。ただし，分包散剤とする。
用法及び用量	１回量を次のとおりとし，１日３回服用する 大人(15 才以上)1 包 1g，11 才以上 15 才未満　大人の 2/3，7 才以上 11 才未満 大人の 1/2，3 才以上 7 才未満 大人の 1/3，1 才以上 3 才未満 大人の 1/4，6 ヶ月以上 1 才未満 大人の 1/5，3 ヶ月以上 6 ヶ月未満 大人の 1/6
効能又は効果	湿疹・かぶれによるかゆみ，じんましん，鼻炎
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器
規格及び試験方法	第十六改正日本薬局方による。
備考	クロルフェニラミン・カルシウム散

【 177 】　鎮咳去痰薬 15

成分及び分量又は本質		桜皮エキス A	6mL
	日本薬局方	セネガシロップ	15mL
	防腐剤　〃	パラオキシ安息香酸エチル	0.03g
	溶剤　〃	精製水又は精製水（容器入り）	適　量
		全　　量	60mL
製造方法	以上をとり，用時溶解混和して製する。ただし，1 回量を量り得るように画線を施した容器に収めるか，適当な計量器を添付する。全容量は，成人の 1～2 日分とする。 本品の容器としてプラスチック製容器を使用する場合は，当該容器は，昭和47年2月17日薬製第225号通知に適合する。		
用法及び用量	1 回量を次のとおりとし，1 日 6 回服用する。 服用間隔は，4 時間以上おくこと。 大人（15 才以上）1 回 10mL，12 才以上 15 才未満 大人の 2/3		
効能又は効果	せき		
貯蔵方法及び有効期間	気密容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考			

規格及び試験方法

本品は定量するとき，コデインリン酸塩水和物（$C_{18}H_{21}NO_3 \cdot H_3PO_4 \cdot 1/2H_2O$：406.37）0.085～0.115%を含む。

性　　状　赤褐色の液で，特異な甘味と芳香がある。

確認試験（1）　本品 10mL を量り，アンモニア試液を加えて pH9.0～9.5 に調製した後，ジエチルエーテル 10mL を加え抽出する。抽出液は水浴上でジエチルエーテルを留去し，残留物に硫酸 1 滴及び塩化鉄（Ⅲ）試液 1 滴を加えた後，乾固させないように注意して加熱するとき紫色を呈し，硝酸 1 滴を加えると赤色に変わる。

（２）　本品 20mL を量り，アンモニア試液を加えて pH9.0～9.5 に調製した後，ジエチルエーテル 20mL を加えて抽出する。抽出液は水浴上で蒸発乾固し，残留物にメタノール 0.2mL を加えて溶かし試料溶液とする。別に桜皮エキスＡ 2mL を量り，水を加えて 20mL とし，アンモニア試液を加えて pH9.0～9.5 に調製した後，ジエチルエーテル 20mL を加えて抽出する。抽出液は水浴上で蒸発乾固し，残留物にメタノール 0.2mL を加えて溶かし標準溶液とする。これらの液につき，薄層クロマトグラフィー法により試験を行う。試料溶液及び標準溶液 10μL ずつを薄層クロマトグラフィー用シリカゲルを用いて調製した薄層板にスポットする。次に酢酸エチル/メタノール/水混液（8：2：1）を展開溶媒として約 10cm 展開した後，薄層板を風乾する。これにエタノール（95）で薄めた 4-メトキシベンズアルデヒド・硫酸試液（1→4）を均等に噴霧し，110℃で 10 分間加熱するとき，試料溶液から得たスポットの 1 個は，桜皮エキスＡ標準溶液から得た紅色～橙色のスポットと色調及び *Rf* 値が等しい。

（３）　本品溶液を試料溶液とする。別にセネガシロップ 15mL に水を加えて 60mL として標準溶液とする。これらの液について，薄層クロマトグラフィー法により試験を行う。試料溶液及び標準溶液 5μＬずつを薄層クロマトグラフィー用シリカゲルを用いて調製した薄層板にスポットする。次にブタノール/酢酸/水混液（5：1：4）の上層を展開溶媒として約 10cm 展開した後，薄層板を風乾する。これにエタノール（95）で薄めた 4-メトキシベンズアルデヒド・硫酸試液（1→4）を均等に噴霧し，110℃で 10 分間加熱するとき，試料溶液から得たスポットのうち 1 個のスポットは，セネガシロップ標準溶液から得た赤紫から速やかに緑色に変色するスポットと色調及び *Rf* 値が等しい

定 量 法　本品 25mL を正確に量り，水を加えて正確に 50mL とする。この液 5mL を正確に量り，内標準溶液 5mL を正確に加え，試料溶液とする。別に定量用コデインリン酸塩（別途水分を測定しておく）約 20ｍｇを精密に量り，水にとかし，正確に 20mL とする。この液 10mL を正確に量り，水を加えて正確に 20mL とし，その 5mL を正確に量り，内標準溶液 5mL を正確に加え，標準溶液とする。試料溶液及び標準溶液 20μL につき，次の条件で液体クロマトグラフィーにより試験を行い，内標準物質のピーク面積に対するコデインのピーク面積の比Ｑｔ及びＱｓを求める。

コデインリン酸塩水和物（$C_{18}H_{21}NO_3 \cdot H_3PO_4 \cdot 1/2H_2O$）の量（mg）

＝　Ｗｓ×（Ｑｔ/Ｑｓ）×1.0227×1.25

Ｗｓ：脱水物に関残した定量用コデインリン酸塩の量（mg）

内標準溶液　エチレフリン塩酸塩の水溶液（1→10000）

操作条件

検出器：紫外吸光光度計（測定波長：280nm）

カラム：内径 4.6mm，長さ 15cm のステンレス管に 5μm の液体クロマトグラフィー用オクタデシルシリル化シリカゲルを充てんする。

カラム温度：40℃付近の一定温度

移動相：ラウリル硫酸ナトリウム 1.0g を薄めたリン酸（1→1000）500mL に溶かした後，水酸化ナトリウム試液を加えて pH3.0 に調製する。この液 240mL にテトラヒドロフラン 70 mL を混和する。

流量：コデインの保持時間が約 10 分になるように調整する。

カラムの選定：標準溶液 20μL につき，上記の条件で操作するとき，コデイン，内標準の順に溶出し，その分離度は 4 以上である。

【 178 】　歯科口腔用薬 6

成分及び分量 又は本質	局　外　規　アズレンスルホン酸ナトリウム　0.002g 日本薬局方　炭酸水素ナトリウム　1.998g 全　　量　2.0g
製造方法	以上をとり，散剤の製法により製する。ただし，分包散剤とする。
用法及び用量	通常，1 包（2.0g）を水又は微温水約 100mL に入れ，よくかき混ぜて溶かした後，数回うがいする。これを 1 日数回行う。
効能又は効果	口腔・咽喉のはれ，口腔内の洗浄
貯蔵方法及び 有効期間	遮光した気密容器
規格及び試験方法	別記のとおり。
備考	

規格及び試験方法

本品は定量するとき，アズレンスルホン酸ナトリウム（$C_{15}H_{17}NaO_3S$・1/2H_2O：309.36）0.09%～0.11%，炭酸水素ナトリウム（$NaHCO_3$：84.01）89.91～109.89%を含む。

性　状　本品は淡青白色の粉末である。

確認試験　（1）本品の水溶液（1→50）1mL に塩酸 0.5mL を滴加するとき，液の色はしだいに淡黄色になるか，又は脱色する（アズレンスルホン酸ナトリウム）.

（2）　本品の pH7.0 のリン酸塩緩衝液*（3→50）につき，紫外可視吸光度測定法により吸光スペクトルを測定するとき，波長 567～571nm に吸収の極大を示す（アズレンスルホン酸ナトリウム）.

（3）　本品の水溶液（10→300）に希塩酸を加えるとき，泡立ってガスを発生する．このガスを水酸化カルシウム試液中に通じるとき，直ちに白色の沈殿を生じる（炭酸水素ナトリウム）.

（4）　本品の水溶液（1→30）に硫酸マグネシウム試液 10mL を加えるとき沈殿を生じないが，煮沸するとき，淡青白色の沈殿を生じる（炭酸水素ナトリウム）.

（5）　本品の水溶液（1→30）の冷溶液にフェノールフタレン試液 1 滴を加えるとき，液は赤色を呈しないか，又は赤色を呈しても極めてうすい（炭酸水素ナトリウム）.

（６）　本品につき，炎色反応試験（１）〈1.04〉を行うとき，黄色を呈する（炭酸水素ナトリウム）．

（７）　本品の中性又は弱アルカリ性濃溶液にヘキサヒドロキソアンチモン（Ⅴ）酸カリウム試液を加えるとき，白色の結晶性の沈殿を生じる．沈殿の生成を速くするには，ガラス棒で試験管の内壁をこする（炭酸水素ナトリウム）．

定 量 法　（１）　本品約 2g を精密に量り，水 25mL に溶かし，0.5mol/L 硫酸を滴下し，液の青色が黄緑色に変わったとき，注意して煮沸し，冷後，帯緑黄色を呈するまで滴定〈2.50〉する（指示薬：ブロモクレゾールグリン試液２滴）．

0.5mol/L 硫酸 1 mL ＝ 84.01 mg $NaHCO_3$

（２）本品約 2g を精密に量り，水に溶かし，正確に 100mL とする．この液 10mL を正確に量り，水を加えて正確に 100mL とし，試料溶液とする．別にアズレンスルホン酸ナトリウム標準品をデシケータ（シリカゲル）で 24 時間乾燥し，その約 0.02g を精密に量り，水を加えて正確に 100mL とする．この液 1mL を正確に量り，水を加えて正確に 100mL とし，標準溶液とする．試料溶液及び標準溶液につき，紫外可視吸光度測定法により，試験を行ない，波長 292nm における吸光度 A_T 及び A_S を測定する．

アズレンスルホン酸ナトリウムの量（mg）

$$= \text{アズレンスルホン酸ナトリウム標準品の量（mg）} \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{1}{10}$$

リン酸塩緩衝液*：pH7.0　緩衝液用 0.2mol/L リン酸二水素カリウム試液 50mL に 0.2mol/L 水酸化ナトリウム 29.54mL 及び水を加えて 200mL とする．

リン酸二水素カリウム試液：0.2mol/L 緩衝液用 pH 測定用リン酸二水素カリウム 27.218g を水に溶かし，1000mL とする．

【 179 】　歯科口腔用薬 7

成分及び分量又は本質	日本薬局方　ポビドンヨード　0.45g 矯味剤　〃　ハッカ水　4.5mL 湿潤剤　〃　グリセリン　50.0mL 溶　剤　〃　精製水又は精製水（容器入り）　適　量 全　量　100mL
製造方法	以上をとり，溶解混和して製する。
用法及び用量	1日数回，のどの粘膜面に塗布又は噴射塗布する。
効能又は効果	のどの炎症によるのどのあれ・のどの痛み・のどのはれ・のどの不快感・声がれ
貯蔵方法及び有効期間	気密容器
規格及び試験方法	別記のとおり。
備考	

規格及び試験方法

本品は定量するとき，有効ヨウ素（Ｉ：126.90）0.041～0.054％を含む。

性　　状　赤褐色の粘性を有する液で，特異な芳香を有する。

確認試験　（1）　本品 5 滴を薄めたデンプン試液（1→10）1mL に加えるとき，液は濃い青色を呈する。

（2）　本品 1ｍＬにチオ硫酸ナトリウム試液を液の色が消えるまで滴下した後，チオシアン酸アンモニウム・硝酸コバルト（Ⅱ）試液 5 滴及び 1mol/Ｌ塩酸試液 2 滴を加えるとき，液は青色を呈し，徐々に青色の沈殿を生じる。

定 量 法　本品 10mL を正確に量り，0.002mol/Ｌチオ硫酸ナトリウム液で滴定する（指示薬：デンプン試液 2mL）。

0.002mol/Ｌチオ硫酸ナトリウム 1mL　＝　0.25380mg Ｉ

【 180 】　胃腸薬 39

成分及び分量 又は本質	日本薬局方　酸化マグネシウム　2.0g 全　量　2.0g
製造方法	以上をとり，散剤の製法により製する。ただし，1包0.66gの分包散剤とする。
用法及び用量	大人（15才以上）1日1～3包を就寝前（又は空腹時）コップ1杯の水で服用する。ただし，初回は1包とし，必要に応じ増量又は減量すること。
効能又は効果	便秘，便秘に伴う次の症状の緩和：頭重，のぼせ，肌あれ，吹出物，食欲不振（食欲減退），腹部膨満，腸内異常醗酵，痔
貯蔵方法及び 有効期間	密閉容器
規格及び試験方法	日本薬局方による。
備考	酸化マグネシウム

【 181 】　外皮用薬 72

成分及び分量 又は本質		脱脂大豆の乾留タール	0.5 g
	日本薬局方	酸化亜鉛	5.0 g
	基剤　〃	吸水クリーム	適　量
		全　　量	100 g
製造方法	以上をとり，クリーム剤の製法により製する。		
用法及び用量	適宜，適量を患部に塗布する。		
効能又は効果	湿疹，皮膚炎，あせも，かぶれ，かゆみ		
貯蔵方法及び 有効期間	気密容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考			

規格及び試験方法

本品は定量するとき，酸化亜鉛(ZnO：81.41)4.5～5.5%を含む。

性　　状　本品は淡黄褐色の軟膏で，特異なにおいがある。

確認試験　（1）　本品１g を磁製るつぼにとり，ゆっくり加熱して融解し，徐々に温度を高めて全く炭化し，さらにこれを強熱するとき，黄色を呈する。この色は冷えると消える。さらにこれに希塩酸10mL を加えてよくかき混ぜた後，ヘキサシアノ鉄（Ⅱ）酸カリウム試液を２～３滴加えるとき，白色の沈殿を生じる。（酸化亜鉛）

（2）　本品１g をとり，ジエチルエーテル20mL を加えよく振り混ぜ，定量分析用ろ紙（５種C）でろ過する。このろ液に0.1mol/L 塩酸試液5mL を加えよく振り混ぜ，静置し，水層を別の試験管にとる。この液について，氷冷しながら亜硝酸ナトリウム試液３滴を加えて振り混ぜ，２分間放置し，次にアミド硫酸アンモニウム試液2mL を加えてよく振り混ぜ，１分間放置した後，N,N-ジエチル-N'-1-ナフチルエチレンジアミンシュウ酸塩試液1mL を加えるとき，液は赤紫色を呈する。(脱脂大豆の乾留タール，芳香族第一アミン)

定 量 法　本品約3g を磁性るつぼに精密に量り，はじめゆっくり加熱して融解し，徐々に温度を高めて全く炭化し，更に残留物が黄色となるまで強熱する。冷後，残留物に水1mL および塩酸1mL を加えて溶かした後，水を加えて正確に50mL とし，ろ過する。ろ液

20mLを正確に量り，水80mL を加え，水酸化ナトリウム溶液(1→50)を液がわずかに沈殿を生じるまで加え，次にpH10.7 のアンモニア・塩化アンモニウム緩衝液5mL を加えた後，0.05mol/Lエチレンジアミン四酢酸二ナトリウム溶液で滴定する。（指示薬：エリオクロムブラックT・塩化ナトリウム指示薬0.04g）

0.05mol/L エチレンジアミン四酢酸二ナトリウム溶液 1mL ＝ 4.071mg ZnO

【 182 】　外皮用薬 73

成分及び分量又は本質		日本薬局方	トルナフタート	2.0g
		〃	サリチル酸	3.0g
	溶解補助剤	〃	マクロゴール 400	50mL
	溶　　剤	〃	エタノール	適　量
			全　　量	100mL
製造方法	以上をとり，液剤の製法により製する。			
用法及び用量	患部を清潔にして，1日2～3回塗布する。			
効能又は効果	みずむし，ぜにたむし，いんきんたむし			
貯蔵方法及び有効期間	気密容器			
規格及び試験方法	別記のとおり。			
備考				

規格及び試験方法

本品は定量するとき，トルナフタート($C_{19}H_{17}NOS$:307.41)1.8～2.2%及びサリチル酸($C_7H_6O_3$:138.12)2.7～3.3%を含む。

性　状　本品は無色澄明な液である。

確認試験（1）　本品 1mL にメタノール 50mL を加えて振り混ぜた後，ろ過し，ろ液を試料溶液とする。別にトルナフタート 0.02g をメタノール 50mL に溶かし，標準溶液とする．これらの液につき，薄層クロマトグラフィーにより試験を行う。試料溶液及び標準溶液 10μL ずつを薄層クロマトグラフィー用シリカゲル（蛍光剤入り）を用いて調製した薄層板にスポットする。次にトルエンを展開溶媒として約 10cm 展開した後，薄層板を風乾する。これに紫外線（主波長 254nm）を照射するとき，試料溶液及び標準溶液から得たスポットの *Rf* 値は等しい。

（2）　本品 0.6mL にメタノール 10mL を加えて振り混ぜた後，ろ過し，ろ液を試料溶液とする。別にサリチル酸 0.02g をメタノール 10mL に溶かし，標準溶液とする。これらの液につき，薄層クロマトグラフィーにより試験を行う。試料溶液及び標準溶液 5μL ずつを薄層クロマトグラフィー用シリカゲル（蛍光剤入り）を用いて調製した薄層板にスポットする。次にクロロホルム/アセトン/酢酸(100)混液(45:5:1)を展開溶媒として約 10cm 展開

した後，薄層板を風乾する。これに紫外線（主波長 254nm）を照射するとき，試料溶液及び標準溶液から得たスポットの *Rf* 値は等しい。また，この薄層板に塩化鉄(Ⅲ)試液を均等に噴霧するとき，標準溶液から得たスポット及びそれに対応する位置の試料溶液から得たスポットは，紫色を呈する。

定 量 法 （1） 本品 1mL を正確に量り，内標準溶液 4mL を正確に加え，更にメタノールを加えて 50mL とし，試料溶液とする。別に定量用トルナフタートを 65℃で 3 時間減圧（067kPa）乾燥し，その約 0.1g を精密に量り，メタノールに溶かし，正確に 25mL とする。この液 5mL を正確に量り，内標準溶液 4mL を正確に加え，更にメタノールを加えて 50mL とし，標準溶液とする。試料溶液及び標準溶液 10μL につき，次の条件で液体クロマトグラフィーにより試験を行い，内標準物質のピーク面積に対するトルナフタートのピーク面積比 Q_T 及び Q_S を求める。

トルナフタート($C_{19}H_{17}NOS$)の量(mg) ＝ $W_S \times Q_T/Q_S \times 1/5$

W_S：定量用トルナフタートの秤取量(mg)

内標準溶液　フタル酸ジフェニルのメタノール溶液(3→200)

操作条件

検出器：紫外吸光光度計（測定波長：254nm）

カラム：内径 4.6mm，長さ 15cm のステンレス管に 5μm の液体クロマトグラフィー用オクタデシルシリル化シリカゲルを充てんする。

カラム温度：40℃付近の一定温度

移動相：メタノール/水混液(7:3)

流量：トルナフタートの保持時間が約 15 分になるように調整する。

カラムの選定：標準溶液 10μL につき，上記の条件で操作するとき，フタル酸ジフェニル，トルナフタートの順に溶出し，それぞれのピークが完全に分離するものを用いる。

（2） 本品 1mL を正確に量り，内標準溶液 5mL を正確に加え，更に薄めたメタノール(1→2)を加えて 100mL とし，ろ過する。初めのろ液 5mL を除き，次のろ液を試料溶液とする。別に定量用サリチル酸をデシケーター（シリカゲル）で 3 時間乾燥し，その約 0.15g を精密に量り，薄めたメタノール(1→2)に溶かし，正確に 100mL とする．この液 20mL を正確に量り，内標準溶液 5mL を正確に加え，更に薄めたメタノール(1→2)を加えて 100mL とし，標準溶液とする。試料溶液及び標準溶液 15μL につき，次の条件で液体クロマトグラフィーにより試験を行い，内標準物質のピーク面積に対するサリチル酸のピーク面積比 Q_T 及び Q_S を求める。

サリチル酸($C_7H_6O_3$)の量(mg) ＝ $W_S \times Q_T/Q_S \times 1/5$

W_S：定量用サリチル酸の秤取量(mg)

内標準溶液　テオフィリンの薄めたメタノール(1→2)溶液(1→1600)

操作条件

検出器：紫外吸光光度計（測定波長：270nm）

カラム：内径 4.6mm，長さ 25cm のステンレス管に 5μm の液体クロマトグラフィー用オクタデシルシリル化シリカゲルを充てんする。

カラム温度：40℃付近の一定温度

移動相：pH7.0 の 0.1mol/L リン酸塩緩衝液/メタノール混液(3:1)

流量：サリチル酸の保持時間が約 6 分になるように調整する。

カラムの選定：安息香酸 0.2g，サリチル酸 0.2g 及びテオフィリン 0.05g を薄めたメタノール(1→2) 100mL に溶かす。この液 10mL に薄めたメタノール(1→2) 90mL を加える。この液 10μL につき，上記の条件で操作するとき，安息香酸，テオフィリン，サリチル酸の順に溶出し，それぞれのピークが完全に分離するものを用いる。

【 183 】　外皮用薬 74

成分及び分量又は本質		日本薬局方	サリチル酸	2.0g
		〃	液状フェノール	0.5mL
	湿潤剤	〃	グリセリン	4.0mL
		〃	クロトリマゾール	1.0g
	溶　剤	〃	エタノール	80mL
	溶　剤	〃	常水，精製水又は精製水（容器入り）	適　量
			全　　量	100mL
製造方法	以上をとり，酒精剤の製法により製する。			
用法及び用量	患部を清潔にして，1日2～3回塗布する			
効能又は効果	みずむし，いんきんたむし，ぜにたむし			
貯蔵方法及び有効期間	気密容器			
規格及び試験方法	別記のとおり。			
備考				

規格及び試験方法

本品は定量するとき，サリチル酸($C_7H_6O_3$:138.12)1.8～2.2w/v%，フェノール(C_6H_6O:94.11)0.40～0.55w/v%，クロトリマゾール($C_{22}H_{17}ClN_2$:344.84)0.9～1.1%を含む。

性　　状　本品は無色澄明な液で，特異なにおいがある。

確認試験　（1）　本品 3mL に水 20mL 及び希塩酸 5mL を加え，ジエチルエーテル 10mL で抽出し，試料溶液とする。別にサリチル酸 30mg 及びフェノール 7mg をそれぞれジエチルエーテル 5mL に溶かし，標準溶液(1)及び標準溶液(2)とする。これらの液につき，薄層クロマトグラフィーにより試験を行う。試料溶液，標準溶液(1)及び標準溶液(2) 5μL ずつを薄層クロマトグラフィー用シリカゲル（蛍光剤入り）を用いて調製した薄層板にスポットする。次にクロロホルム/アセトン/酢酸(100)混液(45:5:1)を展開溶媒として約 10cm 展開した後，薄層板を風乾する。これに紫外線（主波長 254nm）を照射するとき，試料溶液から得た 2 個のスポットの *Rf* 値は，標準溶液(1)及び標準溶液(2)から得たそれぞれのスポットの *Rf* 値に等しい。また，この薄層板に塩化鉄(Ⅲ)試液を均等に噴霧すると

き，標準溶液(1)から得たスポット及びそれに対応する位置の試料溶液から得たスポットは，紫色を呈する。

（２）　本品 10mL をとり，減圧乾固する．残留物に 5mol/L 塩酸試液 10mL を加え，時々振り混ぜながら 10 分間加温する．冷後，ろ過する。ろ液にライネッケ塩試液 3 滴を加えるとき，淡赤色の沈澱を生じる（クロトリマゾール）。

定 量 法　（１）　本品 4mL を正確に量り，内標準溶液 20mL を正確に加え，更に薄めたメタノール(1→2)を加えて 200mL とし，ろ過する。初めのろ液 5mL を除き，次のろ液を試料溶液とする。別にデシケーター（シリカゲル）で 3 時間乾燥した定量用サリチル酸約 0.16g 及び定量用フェノール約 0.040g それぞれ精密に量り，薄めたメタノール(1→2)に溶かし，正確に 50mL とする．この液 25mL を正確に量り，内標準溶液 20mL を正確に加え，更に薄めたメタノール(1→2)を加えて 200mL とし，標準溶液とする。試料溶液及び標準溶液 3μL につき，次の条件で液体クロマトグラフィーにより試験を行い，試料溶液の内標準物質のピーク面積に対するサリチル酸及びフェノールのピーク面積比 Q_{Ta} 及び Q_{Tb} 並びに標準溶液の内標準物質のピーク面積に対するサリチル酸及びフェノールのピーク面積比 Q_{Sa} 及び Q_{Sb} を求める。

サリチル酸($C_7H_6O_3$)の量(mg) ＝ $W_{sa} \times Q_{Ta}/Q_{Sa} \times 1/2$

フェノール(C_6H_6O)の量(mg) ＝ $W_{sb} \times Q_{Tb}/Q_{Sb} \times 1/2$

W_{Sa}：定量用サリチル酸の秤取量(mg)

W_{Sb}：定量用フェノールの秤取量(mg)

内標準溶液　テオフィリンのメタノール溶液(0.3→1000)

操作条件

検出器：紫外吸光光度計（測定波長：270nm）

カラム：内径 4.6mm，長さ 25cm のステンレス管に 5μm の液体クロマトグラフィー用オクタデシルシリル化シリカゲルを充てんする。

カラム温度：40℃付近の一定温度

移動相：pH7.0 の 0.1mol/L リン酸塩緩衝液/メタノール混液(3:1)

流量：サリチル酸の保持時間が約 6 分になるように調整する。

カラムの選定：標準溶液 3μL につき，上記の条件で操作するとき，テオフィリン，サリチル酸，フェノールの順に溶出し，それぞれピークが完全に分離するものを用いる。

（２）　本品 5mL を正確に量り，メタノールを加えて 100mL とし，ろ過する。初めのろ液 5mL を除き，次のろ液 10mL を正確に量り，内標準溶液 5mL を正確に加え，更にメタノールを加えて 100mL とし，試料溶液とする．別に定量用クロトリマゾールを 105℃で 2 時間乾燥し，その約 0.050g を精密に量り，メタノールに溶かし，正確に 100mL とする。この液 10mL を正確に量り，内標準溶液 5mL を正確に加え，更にメタノールを加えて 100mL とし，標準溶液とする。試料溶液及び標準溶液 10μL につき，次の条件で液体クロマトグラフィーにより試験を行い，内標準物質のピーク面積に対するクロトリマゾールのピーク面積比 Q_T 及び Q_S を求める。

クロトリマゾール($C_{22}H_{17}ClN_2$)の量(mg) ＝ $W_S \times Q_T/Q_S$

W_S：定量用クロトリマゾールの秤取量(mg)

内標準溶液　キサントンのメタノール溶液(1.6→10000)

操作条件

検出器：紫外吸光光度計（測定波長：230nm）

カラム：内径 4.6mm，長さ 15cm のステンレス管に 5μm の液体クロマトグラフィー用オクタデシルシリル化シリカゲルを充てんする。

カラム温度：40℃付近の一定温度

移動相：メタノール/リン酸塩緩衝液*混液(3:1)

流量：キサントンの保持時間が約 6 分になるように調整する。

カラムの選定：標準溶液 10μL につき，上記の条件で操作するとき，キサントン，クロトリマゾールの順に溶出し，それぞれピークが完全に分離するものを用いる。

［注］*：リン酸塩緩衝液：リン酸二水素ナトリウム二水和物 1.56g 及び無水リン酸二ナトリウム 0.71g を水に溶かし，1000mL とする.

【 184 】　外皮用薬 75

成分及び分量 又は本質		日本薬局方	クロトリマゾール	1.0g
	溶解補助剤	〃	マクロゴール 400	50mL
	溶剤	〃	エタノール	適量
			全量	100mL
製造方法	以上をとり，液剤の製法により製する。			
用法及び用量	患部を清潔にして，1日2～3回塗布する。			
効能又は効果	みずむし，ぜにたむし，いんきんたむし			
貯蔵方法及び 有効期間	遮光した気密容器			
規格及び試験方法	別記のとおり。			
備考				

規格及び試験方法

本品を定量するとき，クロトリマゾール（$C_{22}H_{17}ClN_2$:344.84）0.8～1.2%を含む。

性　状　本品は無色透明の液体である。

確認試験　本品 2mL をとり，含有するエタノール（95）を減圧留去後，クロロホルム 50mL および精製水 150mL で分配する。クロロホルム層はさらに精製水 150mL で分配した後，0.1mol 塩酸溶液 50mL を加え振り混ぜ，水層を分取する。得られた水層はアンモニア水(28)でアルカリ性とした後，新たにクロロホルム 50mL を加え振り混ぜ，クロロホルム層を分取する。クロロホルム層は硫酸ナトリウムで乾燥し，ろ過後，約 1mL となるまで減圧濃縮し，試料溶液とする。別に，クロトリマゾール 0.05g をメタノール 2mL に溶解し標準溶液とする。これらの液につき薄層クロマトグラフィー法により試験を行う。試料溶液および標準溶液 5μL ずつを薄層クロマトグラフィー用シリカゲル（蛍光剤入り）を用いて調製した薄層板にスポットする。次に酢酸エステル：エタノール（95）：アンモニア水（28）混液（50：5：1）を展開溶媒として約 10cm 展開した後，薄層板を風乾する。この薄層板に噴霧用ドラーゲンドルフ試液を均等に噴霧するとき，試料溶液から得られたスポットは，標準溶液から得た黄褐色のスポットと色調及び *Rf* 値が等しい。

定量法　本品 5.0mL を正確に量り，希エタノールに溶解し正確に 50mL とする。この液を希エタノールを用い 10 倍希釈を 2 回繰り返し，試料溶液とする。別にクロトリマゾール標準品約 10mg を精密に量り，希エタノールに溶解し正確に 100mL としたものを標準

溶液とする。試料溶液および標準溶液はそれぞれ 0.45μL のフィルターでろ過し，その 10μL につき次の条件で液体クロマトグラフィーによりピーク高さによる絶対検量線法で試験を行う。それぞれの標準溶液は希エタノールで段階的に希釈し検量線を求め，これをもとに成分含量を算出する。

操作条件

検出器：紫外吸光光度計(測定波長：230nm)

カラム：内径 4.6mm，長さ 150mm のステンレス管に 5μmの液体クロマトグラフィー用オクタデシルシリル化シリカゲルを充てんする。

カラム温度：40℃付近の一定温度

移動相：ラウリル硫酸ナトリウム(1→128)/アセトニトリル／リン酸(400:600:1)

流量：1.0mL/min

カラムの選定：標準溶液 10μL につき上記の条件で操作するとき，クロトリマゾールの理論段数およびシンメトリー係数は，10,000 段以上，1.5 以下である。

【 185 】　外皮用薬 76

成分及び分量又は本質		日本薬局方	ジブカイン塩酸塩	0.5g
		局　外　規	デキサメタゾン酢酸エステル	0.025g
		日本薬局方	*l*-メントール	1.0g
		〃	*dl*-カンフル	1.0g
		局　外　規	クロタミトン	5.0g
	基　剤	日本薬局方	親水クリーム	適　量
			全　　量	100g
製造方法	以上をとり，クリーム剤の製法により製する。			
用法及び用量	1日数回，適量を患部に塗布する			
効能又は効果	虫ささされ，かゆみ，じんましん			
貯蔵方法及び有効期間	遮光した気密容器			
規格及び試験方法	別記のとおり。			
備考				

規格及び試験方法

本品は定量するとき，ジブカイン塩酸塩($C_{20}H_{29}N_3O_2$・HCl:379.92) 0.45～0.55%，デキサメタゾン酢酸エステル($C_{24}H_{31}FO_6$:434.50) 0.022～0.028%，*l*-メントール($C_{10}H_{20}O$:156.27) 0.9～1.1%，*dl*-カンフル($C_{10}H_{16}O$:152.23) 0.9～1.1%及びクロタミトン($C_{13}H_{17}NO$:203.28)4.5～5.5%を含む。

性　　状　白色の軟膏で特異なにおいがある。

確認試験　（1）　本品 0.5g にテトラヒドロフラン 5mL を加えて振り混ぜた後，ろ過し，ろ液を試料溶液とする。別にジブカイン塩酸塩 2mg 及びクロタミトン 20mg をそれぞれメタノール 4mL に溶かし，標準溶液(1)及び標準溶液(2)とする．これらの液につき，薄層クロマトグラフィーにより試験を行う。試料溶液，標準溶液(1)及び標準溶液(2) 2μL ずつを薄層クロマトグラフィー用シリカゲル（蛍光剤入り）を用いて調製した薄層板にスポットする。次に酢酸エチル/エタノール(99.5)/アンモニア水(28)混液(50:5:1)を展開溶媒として約 10cm 展開した後，薄層板を風乾する。これに紫外線（主波長 254nm）を照射する

とき，試料溶液から得た 2 個のスポットの *Rf* 値は，標準溶液(1)及び標準溶液(2)から得たそれぞれのスポットと *Rf* 値が等しい。

（2）　本品 15g をとり，酢酸エチル 30mL を加えて振り混ぜた後，酢酸エチルを分取し，水浴上で酢酸エチルを留去する．残留物をエタノール(95) 20mL に溶かし，ろ過する。ろ液に 2,6-ジ-t-ブチルクレゾール試液 10mL 及び水酸化ナトリウム試液 10mL を加え，還流冷却器を付け，水浴上で 20 分間加熱するとき，液は青紫色を呈する（デキサメタゾン酢酸エステル)。

（3）　本品 6g にテトラヒドロフラン 5mL を加えて振り混ぜた後，更にメタノール 10mL を加えて混和し，ろ過する．ろ液に硫酸 5mL を加えるとき，液は黄褐色を呈する（*l*-メントール)。

（4）　本品 2.5g にジエチルエーテル 30mL を加えて振り混ぜた後，ジエチルエーテル層を分取し，水浴上でジエチルエーテルを留去する．残留物に薄めたメタノール(6→10) 4mL を加え，振り混ぜた後，ろ過する．ろ液に 2,4-ジニトロフェニルヒドラジン試液 0.5mL を加え，水浴上で 5 分間加熱する．冷後，水 5mL を加えて，放置した後，生成した沈殿をろ過する．ろ紙上の残留物を洗液が無色となるまで水洗した後，残留物をエタノール(95) 5mL に溶かし，水酸化ナトリウム試液 2.5mL を加えるとき，液は赤褐色を呈する（*dl*-カンフル)．

定 量 法　（1）　本品約 1.0g を精密に量り，テトラヒドロフラン 30mL を加えて振り混ぜた後，更にテトラヒドロフランを加えて正確に 50mL とする。この液 5mL を正確に量り，内標準溶液 3mL を正確に加え，更にメタノールを加えて 25mL とし，ろ過する。初めのろ液 5mL を除き，次のろ液を試料溶液とする．別に定量用ジブカイン塩酸塩を酸化リン(V)を用いて 80℃で 5 時間減圧乾燥し，その約 0.02g を精密に量り，テトラヒドロフランを加えて，正確に 20mL とする。この液 2mL を正確に量り，テトラヒドロフランを加えて，正確に 20mL とする．この液 5mL を正確に量り，内標準溶液 3mL を正確に加え，更にメタノールを加えて 25mL とし，標準溶液とする．試料溶液及び標準溶液 10μL につき，次の条件で液体クロマトグラフィーにより試験を行い，内標準物質のピーク面積に対するジブカイン塩酸塩のピーク面積比 Q_T 及び Q_S を求める。

ジブカイン塩酸塩($C_{20}H_{29}N_3O_2$・HCl)の量(mg) ＝ $W_S \times Q_T/Q_S \times 1/4$

W_S：定量用ジブカイン塩酸塩の秤取量(mg)

内標準溶液　パラオキシ安息香酸ヘキシルのメタノール溶液(1→6000)

操作条件

検出器：紫外吸光光度計（測定波長：240nm）

カラム：内径 4.6mm，長さ 15cm のステンレス管に 5μm の液体クロマトグラフィー用オクタデシルシリル化シリカゲルを充てんする。

カラム温度：40℃付近の一定温度

移動相：ドデシル硫酸ナトリウム 3g を薄めたリン酸(1→1000)に溶かして 1000mL とする．この液 270mL にメタノール 730mL を加える。

流量：ジブカインの保持時間が約 10 分になるように調整する。

カラムの選定：標準溶液 10μL につき，上記の条件で操作するとき，パラオキシ安息香酸ヘキシル，ジブカインの順に溶出し，それぞれのピークが完全に分離するものを用いる。

（2）　本品約 2.0g を精密に量り，テトラヒドロフラン 25mL を加えて振り混ぜた後，内標準溶液 5mL を正確に加え，更にメタノールを加えて 50mL とし，ろ過する。初めのろ液 5mL を除き，次のろ液を試料溶液とする．別に定量用デキサメタゾン酢酸エステルを 105℃で 3 時間乾燥し，その約 0.01g を精密に量り，メタノールに溶かし，正確に 100mL とする。この液 5mL を正確に量り，内標準溶液 5mL を正確に加え，更にテトラヒドロフラン 25mL 及びメタノールを加えて 50mL とし，標準溶液とする。試料溶液及び標準溶液 10μL につき，次の条件で液体クロマトグラフィーにより試験を行い，内標準物質のピーク面積に対するデキサメタゾン酢酸エステルのピーク面積比 Q_T 及び Q_S を求める。

デキサメタゾン酢酸エステル($C_{24}H_{31}FO_6$)の量(mg) ＝ $W_S \times Q_T/Q_S \times 1/20$

W_S：定量用デキサメタゾン酢酸エステルの秤取量(mg)

内標準溶液　パラオキシ安息香酸イソアミルのメタノール溶液(1→25000)

操作条件

検出器：紫外吸光光度計（測定波長：254nm）

カラム：内径 4.6mm，長さ 25cm のステンレス管に 5μm の液体クロマトグラフィー用オクタデシルシリル化シリカゲルを充てんする。

カラム温度：40℃付近の一定温度

移動相：水/アセトニトリル混液(55:45)

流量：デキサメタゾン酢酸エステルの保持時間が約 10 分になるように調整する。

カラムの選定：標準溶液 10μL につき，上記の条件で操作するとき，デキサメタゾン酢酸エステル，パラオキシ安息香酸イソアミルの順に溶出し，その分離度が 15 以上のものを用いる。

（3）　本品約 2.5g を精密に量り，テトラヒドロフラン 25mL を加えて振り混ぜた後，内標準溶液 5mL を正確に加え，更にメタノールを加えて 50mL とし，ろ過する．初めのろ液 5mL を除き，次のろ液を試料溶液とする．別に定量用 *l*-メントール約 0.025g 及び定量用 *dl*-カンフル約 0.025g をそれぞれ精密に量り，テトラヒドロフラン 25mL に溶かし，内標準溶液 5mL を正確に加え，更にメタノールを加えて 50mL とし，標準溶液とする。試料溶液及び標準溶液 2μL につき，次の条件でガスクロマトグラフィーにより試験を行い，試料溶液の内標準物質のピーク面積に対する *l*-メントール及び *dl*-メントールのピーク面積比 Q_{Ta} 及び Q_{Tb} 並びに標準溶液の内標準溶液のピーク面積に対する *l*-メントール及び *dl*-メントールのピーク面積比 Q_{Sa} 及び Q_{Sb} を求める。

l-メントール($C_{10}H_{20}O$）の量(mg) ＝ $W_{Sa} \times Q_{Ta}/Q_{Sa}$

dl-カンフル($C_{10}H_{16}O$）の量(mg) ＝ $W_{Sb} \times Q_{Tb}/Q_{Sb}$

W_{Sa}：定量用 *l*-メントールの秤取量(mg)

W_{Sb}：定量用 *dl*-カンフルの秤取量(mg)

内標準溶液　サリチル酸メチルのメタノール溶液(0.8→100)

操作条件

検出器：水素炎イオン化検出器

カラム：内径約 3mm，長さ 3m のガラス管にガスクロマトグラフィー用ポリエチレングリコール 20M をシラン処理した 180～250μm のガスクロマトグラフィー用ケイソウ土に 10% の割合で被覆したものを充てんする。

カラム温度：145℃付近の一定温度

キャリヤーガス：窒素

流量：*dl*-カンフルの保持時間が約 7 分になるように調整する。

カラムの選定：標準溶液 2μL につき，上記の条件で操作するとき，*dl*-カンフル，*l*-メントール，サリチル酸メチルの順に流出し，*l*-メントールとサリチル酸メチルの分離度が 6 以上のものを用いる。

（4）　本品 1.0g を精密に量り，テトラヒドロフラン 30mL を加えて振り混ぜた後，更にテトラヒドロフランを加えて正確に 50mL とする。この液 5mL を正確に量り，メタノールを加えて正確に 25mL とし，ろ過する。初めのろ液 5mL を除き，次のろ液 5mL を正確に量り，内標準溶液 5mL を正確に加え，更にメタノールを加えて 50mL とし，試料溶液とする。別に定量用クロタミトン約 0.05g を精密に量り，テトラヒドロフランに溶かし，正確に 50mL とする。この液 5mL を正確に量り，メタノールを加えて正確に 25mL とする。この液 5mL を正確に量り，内標準溶液 5mL を正確に加え，更にメタノールを加えて 50mL とし，標準溶液とする．試料溶液及び標準溶液 10μL につき，次の条件で液体クロマトグラフィーにより試験を行い，内標準物質のピーク面積に対するクロタミトンのピーク面積比 Q_T 及び Q_S を求める。

クロタミトン($C_{13}H_{17}NO$)の量(mg) ＝ $W_S \times Q_T/Q_S$

W_S：定量用クロタミトンの秤取量(mg)

内標準溶液　*p*-トルイル酸エチルのメタノール溶液(1→7500)

操作条件

検出器：紫外吸光光度計（測定波長：254nm）

カラム：内径 4.6mm，長さ 15cm のステンレス管に 5μm の液体クロマトグラフィー用オクタデシルシリル化シリカゲルを充てんする。

カラム温度：40℃付近の一定温度

移動相：メタノール/水混液(6:4)

流量：クロタミトンの保持時間が約 10 分になるように調整する。

カラムの選定：標準溶液 10μL につき，上記の条件で操作するとき，クロタミトン，*p*-トルイル酸エチルの順に溶出し，それぞれのピークが完全に分離するものを用いる。

【 186 】　外皮用薬 77

成分及び分量又は本質		局　外　規	デキサメタゾン酢酸エステル	0.025g
		日本薬局方	トコフェロール酢酸エステル	2.0g
	基　剤	〃	親水クリーム	30.0g
		局　外　規	クロタミトン	5.0g
	防腐剤	日本薬局方	パラオキシ安息香酸メチル	0.013g
	防腐剤	〃	パラオキシ安息香酸プロピル	0.007g
	溶　剤	〃	精製水又は精製水（容器入り）	適　量
			全　　量	100mL
製造方法	以上をとり，ローション剤の製法により製する。			
用法及び用量	1 日数回，適量を患部に塗布する。			
効能又は効果	湿疹，皮膚炎，あせも，かぶれ，かゆみ，しもやけ，虫ささされ，じんましん			
貯蔵方法及び有効期間	気密容器			
規格及び試験方法	別記のとおり。			
備考				

規格及び試験方法

本品は定量するとき，デキサメタゾン酢酸エステル($C_{24}H_{31}FO_6$:434.50)0.022～0.028%，トコフェロール酢酸エステル($C_{31}H_{52}O_3$:472.74)1.8～2.2%及びクロタミトン($C_{13}H_{17}NO$:203.28)4.5～5.5%を含む。

性　　状　本品は白色のローションである。

確認試験　（1）　本品 15mL をとり，蒸発乾固する．残留物にエタノール(95) 20mL を加え，水浴上で加温しながらよくかき混ぜる。冷後，ろ過し，ろ液に 2,6-ジ-t-ブチルクレゾール試液 10mL 及び水酸化ナトリウム試液 10mL を加え，還流冷却器を付け，水浴上で 20 分間加熱するとき，液は青紫色を呈する（デキサメタゾン酢酸エステル)。

（2）　本品 2.5mL にエタノール(99.5) 5mL を加えて振り混ぜた後，ろ過し，ろ液を試料溶液とする。別にトコフェロール酢酸エステル 0.05g をエタノール(99.5) 5mL に溶か

し，標準溶液とする。これらの液につき，薄層クロマトグラフィーにより試験を行う。試料溶液及び標準溶液 5μL ずつを薄層クロマトグラフィー用シリカゲル（蛍光剤入り）を用いて調製した薄層板にスポットする。次にクロロホルムを展開溶媒として約 10cm 展開した後，薄層板を風乾する。これに紫外線（主波長 254nm）を照射するとき，試料溶液から得たスポットは，標準溶液から得たスポットと *Rf* 値が等しい。

（３） 本品 0.5mL にメタノール 5mL を加えて振り混ぜた後，ろ過し，ろ液を試料溶液とする。別にクロタミトン 25mg をメタノール 5mL に溶かし，標準溶液とする．これらの液につき，薄層クロマトグラフィーにより試験を行う。試料溶液及び標準溶液 3μL ずつを薄層クロマトグラフィー用シリカゲル（蛍光剤入り）を用いて調製した薄層板にスポットする。次に酢酸エチル/エタノール(99.5)/アンモニア水(28)混液(50:5:1)を展開溶媒として約 10cm 展開した後，薄層板を風乾する．これに紫外線（主波長 254nm）を照射するとき，試料溶液から得たスポットは，標準溶液から得たスポットと *Rf* 値が等しい。

定 量 法 （１） 本品 2mL を正確に量り，メタノール 30mL を加えて振り混ぜた後，内標準溶液 5mL を正確に加え，更にメタノールを加えて 50mL とし，遠心分離後，ろ過する。初めのろ液 3mL を除き，次のろ液を試料溶液とする．別に定量用デキサメタゾン酢酸エステルを 105℃で 3 時間乾燥し，その約 0.01g を精密に量り，メタノールに溶かし，正確に 100mL とする．この液 5mL を正確に量り，内標準溶液 5mL を正確に加え，更にメタノールを加えて 50mL とし，標準溶液とする．試料溶液及び標準溶液 25μL につき，次の条件で液体クロマトグラフィーにより試験を行い，内標準物質のピーク面積に対する酢酸デキサメタゾンのピーク面積比 Q_T 及び Q_S を求める。

デキサメタゾン酢酸エステル($C_{24}H_{31}FO_6$)の量(mg) ＝ $W_S \times Q_T/Q_S \times 1/20$

W_S：定量用デキサメタゾン酢酸エステルの秤取量(mg)

内標準溶液　パラオキシ安息香酸イソアミルのメタノール溶液(1→25000)

操作条件

検出器：紫外吸光光度計（測定波長：254nm）

カラム：内径 4.6mm，長さ 25cm のステンレス管に 5μm の液体クロマトグラフィー用オクタデシルシリル化シリカゲルを充てんする。

カラム温度：40℃付近の一定温度

移動相：水/アセトニトリル混液(55:45)

流量：デキサメタゾン酢酸エステルの保持時間が約 10 分になるように調整する。

カラムの選定：標準溶液 25μL につき，上記の条件で操作するとき，デキサメタゾン酢酸エステル，パラオキシ安息香酸イソアミルの順に溶出し，その分離度は 15 以上のものを用いる。

（２） 本品 1mL を正確に量り，メタノール 30mL を加えて振り混ぜた後，内標準溶液 5mL を正確に加え，更にメタノールを加えて 50mL とし，遠心分離後，ろ過する。初めのろ液 3mL を除き，次のろ液を試料溶液とする。別に定量用トコフェロール酢酸エステル約 0.02g を精密に量り，内標準溶液 5mL を正確に加え，更にメタノールを加えて 50mL とし，標準溶液とする。試料溶液及び標準溶液 10μL につき，次の条件で液体クロ

マトグラフィーにより試験を行い，内標準物質のピーク面積に対するトコフェロール酢酸エステルのピーク面積比 Q_T 及び Q_S を求める。

トコフェロール酢酸エステル($C_{31}H_{52}O_3$)の量(mg) ＝ $W_S \times Q_T/Q_S$

W_S：定量用トコフェロール酢酸エステルの秤取量(mg)

内標準溶液　フタル酸ジ-n-オクチルのメタノール溶液(5→1000)

操作条件

検出器：紫外吸光光度計（測定波長：280nm）

カラム：内径 4.6mm，長さ 25cm のステンレス管に 5μm の液体クロマトグラフィー用オクタデシルシリル化シリカゲルを充てんする。

カラム温度：40℃付近の一定温度

移動相：メタノール

流量：トコフェロール酢酸エステルの保持時間が約 13 分になるように調整する。

カラムの選定：標準溶液 10μL につき，上記の条件で操作するとき，フタル酸ジ-n-オクチル，トコフェロール酢酸エステルの順に溶出し，それぞれのピークが完全に分離するものを用いる。

（3）　本品 1mL を正確に量り，メタノール 30mL を加えて振り混ぜた後，更にメタノールを加えて正確に 50mL とし，遠心分離後，ろ過する．初めのろ液 5mL を除き，次のろ液 5mL を正確に量り，メタノールを加えて正確に 25mL とする。この液 5mL を正確に量り，内標準溶液 5mL を正確に加え，更にメタノールを加えて 50mL とし，試料溶液とする。別に定量用クロタミトン約 0.05g を精密に量り，メタノールに溶かし，正確に 50mL とする。この液 5mL を正確に量り，メタノールを加えて正確に 25mL とする。この液 5mL を正確に量り，内標準溶液 5mL を正確に加え，更にメタノールを加えて 50mL とし，標準溶液とする。試料溶液及び標準溶液 10μL につき，次の条件で液体クロマトグラフィーにより試験を行い，内標準物質のピーク面積に対するクロタミトンのピーク面積比 Q_T 及び Q_S を求める。

クロタミトン($C_{13}H_{17}NO$)の量(mg) ＝ $W_S \times Q_T/Q_S$

W_S：定量用クロタミトンの秤取量(mg)

内標準溶液　*p*-トルイル酸エチルのメタノール溶液(1→7500)

操作条件

検出器：紫外吸光光度計（測定波長：254nm）

カラム：内径 4.6mm，長さ 15cm のステンレス管に 5μm の液体クロマトグラフィー用オクタデシルシリル化シリカゲルを充てんする。

カラム温度：40℃付近の一定温度

移動相：メタノール/水混液(6:4)

流量：クロタミトンの保持時間が約 10 分になるように調整する。

カラムの選定：標準溶液 10μL につき，上記の条件で操作するとき，クロタミトン，*p*-トルイル酸エチルの順に溶出し，それぞれのピークが完全に分離するものを用いる。

【 187 】　外皮用薬 78

成分及び分量又は本質	日本薬局方	サリチル酸，細末	10.0g
	〃	薬用炭	10.0g
	基剤　〃	単軟膏	適　量
		全　　量	100g
製造方法	以上をとり，軟膏剤の製法により製する。		
用法及び用量	適宜，適量を患部に塗布するか，又はガーゼなどに展延し，患部に貼付する。		
効能又は効果	おでき・面ちょう・吹出物などのはれものの吸出し		
貯蔵方法及び有効期間	気密容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考			

規格及び試験方法

本品は定量するとき，サリチル酸（$C_7H_6O_3$:138.12）9～11%を含む。

性　状　本品は黒色である。

確認試験　（1）　本品２g にジエチルエーテル 20 mL を加えてよくかき混ぜ，ろ過する．ろ液に炭酸水素ナトリウム試液 10mL を加えて振り混ぜた後，水層を分取する．この液１mL をとり，「複方サリチル酸精」の確認試験（１）を準用する。(サリチル酸)

（2）　本品 0.2g に，テトラヒドロフラン 10 mL を加えてよくかき混ぜ，ろ過し，試験溶液とする．別にサリチル酸 0.01g をテトラヒドロフラン 5mL に溶かし，標準溶液とする。これらの液につき，薄層クロマトグラフィーにより試験を行なう。試験溶液及び標準溶液 5μL ずつを薄層クロマトグラフィー用シリカゲル（蛍光剤入り）を用いて調製した薄層板にスポットする。次にクロロホルム/アセトン/酢酸（100）混液（45：5：1）を展開溶媒とし約 10cm 展開した後，薄層版を風乾する。これに紫外線（主波長 254nm）を照射するとき，試料溶液及び標準溶液から得たスポットの *Rf* 値は等しい。また，薄層板に塩化鉄（Ⅲ）試液を均等に噴霧するとき，標準溶液から得たスポット及びそれに対応する位置の試料溶液から得たスポットは，紫色を呈する。

定 量 法　本品約 1g を精密に量り，テトラヒドロフラン 50mL を加えて振り混ぜた後，メタノールを加えて 100 mL とする。この液をろ過し，初めのろ液 10 mL を除き，次のろ液 10 mL を正確に量り，内部標準液 5mL を正確に加え，更に薄めたメタノール（1→2）を加えて正確に 100 mL とし，孔径 0.45μm 以下のメンブランフィルターでろ過し，初めのろ液 10 mL を除き，次のろ液を試料溶液とする。別に定量用サリチル酸をデシケーター（シリカゲル）で 3 時間乾燥し，その約 0.1g を精密に量り，薄めたメタノール（1→2）に溶かし，正確に 100 mL とする。この液 10 mL を正確に量り，内部標準液 5mL を正確に加え，更に薄めたメタノール（1→2）を加えて 100 mL とし，標準溶液とする。試料溶液及び標準溶液 15μL につき，次の条件で液体クロマトグラフィーにより試験を行ない，内標準物質のピーク面積に対するサリチル酸のピーク面積の比 Q_T 及び Q_S を求める。

サリチル酸の量（$C_7H_6O_3$）の量（mg）　＝ $Ws \times Q_T / Q_S$

Ws：定量用サリチル酸の秤取量（mg）

内部標準液　テオフィリンの薄めたメタノール（1→2）溶液（1→5000）

操作条件

検出器：紫外吸光光度計（測定波長：270nm）

カラム：内径約 4.6mm，長さ 25cm のステンレス管に 5μm の液体クロマトグラフィー用オクタデシルシリル化シリカゲルを充てんする。

カラム温度：40℃付近の一定温度

移動相：ｐH7.0 の 0.1mol/L リン酸塩緩衝液/メタノール混液（3：1）

流量：サリチル酸の保持時間が約 17 分になるように調整する。

カラムの選定：安息香酸 0.2g，サリチル酸 0.2g 及びテオフィリン 0.05g を薄めたメタノール（1→2）100 mL に溶かす。この液 10 mL に薄めたメタノール（1→2）90 mL を加える。この液 10μL につき，上記の条件で操作するとき，安息香酸，テオフィリン，サリチル酸の順で溶出し，それぞれのピークが完全に分離するものを用いる。

【 188 】　K1

成分及び分量又は本質	日本薬局方	ケイヒ	3.0g
	〃	ボレイ	3.0g
	〃	シュクシャ	2.0g
	〃	エンゴサク	3.0g
	〃	ウイキョウ	2.0g
	〃	カンゾウ	1.0～2.0g
	〃	リョウキョウ	1.0g
		全　　量	15.0～16.0g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。		
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。		
効能又は効果	体力中等度以下で，腹部は力がなくて，胃痛又は腹痛があって，ときに胸やけや，げっぷ，胃もたれ，食欲不振，はきけ，嘔吐などを伴うものの次の諸症：神経性胃炎，慢性胃炎，胃腸虚弱		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	安中散料		

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品1包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　ケイヒ　外面は暗赤褐色を呈し，内面は赤褐色を呈し，平滑である。横断面はやや繊維性で赤褐色を呈し淡褐色の薄層が見られる。特異なにおいがあり，味は甘く，辛く，後にやや粘液性で，わずかに収れん性である。

横切片を鏡検するとき，一次皮部と二次皮部はほとんど連続した石細胞環で区分され，環の外辺にはほぼ円形に結集した繊維束を伴い，環の各石細胞の壁はしばしばU字形に肥厚する。二次皮部中には石細胞を認めず，まばらに少数の厚膜繊維を認める。柔組織中には油細胞，粘液細胞及びでんぷん粒を含む。放射組織中には微細なシュウ酸カルシウムの針晶を含む細胞がある。

（２）　ボレイ　薄い小片に砕いた貝がらで，外面は淡緑灰褐色，内面は乳白色を呈する。ほとんどにおい及び味はない。

必要に応じて，「ボレイ」の確認試験を準用する。

（３）　シュクシャ　ほぼ球形又はだ円形を呈し，長さ 1～1.5cm，径 0.8～1cm，外面は灰褐色～暗褐色を呈し，石灰を散布して乾燥したものは白粉を付けている。種子塊は薄い膜で三部に分かれ，各部には仮種皮によって接合する 10～20 粒の種子がある。種子は多角形の粒状で，長さ 0.3～0.5cm，径約 0.3cm，外面には暗褐色で多数の細かい突起があり，質は堅い。種子を縫線に沿って縦断し，ルーペ視するとき，切面は細長く，へそは深くくぼみ，合点はややくぼんでいる。外乳は白色で，淡黄色の内乳及び胚を包み，胚は細長い。かめば特異な芳香があり，味は辛い。

（４）　エンゴサク　ほぼ偏球形又はこぶ状突起のある多角形を呈し，径 1～2cm で，一端に茎の跡がある。外面は灰黄色又は灰褐色で質は堅く，切断面は黄色で平滑又は灰黄緑色で粒状である。味は苦い。

必要に応じて，「エンゴサク」の確認試験を準用する。

（５）　ウイキョウ　双懸果で長円柱形を呈し，長さ 3.5～8mm，幅 1～2.5mm である。外面は灰黄緑色～灰黄色で，互いに密接する 2 個の分果の各々には 5 本の隆起線がある。双懸果はしばしば長さ 2～10mm の果柄を付ける。特異なにおい及び味がある。

横切片を鏡検するとき，腹面に近い隆起線は背面のものより著しく隆起し，各隆起線間に 1 個の大きな油道があり，腹面には 2 個の油道がある。

（６）　カンゾウ　外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現わす。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に 1～3 細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には 3～10 細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞中にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

（７）　リョウキョウ　やや湾曲した円柱形を呈し，しばしば分枝する。長さ 2～8cm，径 6～15mm である。外面は赤褐色～暗褐色を呈し，細かい縦じわ及び灰白色の輪節があり，ところどころに細根の跡がある。質は堅くて折りにくい。折面は淡褐色を呈し，繊維性で，皮層部の厚さは中心柱の径とほぼ等しい。特異なにおいがあり，味は極めて辛い。

横切片を鏡検するとき，最外層は表皮からなり，表皮細胞にはしばしば樹脂様物質を含む。表皮につづき，皮層，内皮，中心柱が認められる。皮層と中心柱は 1 層の内皮によって区分される。皮層及び中心柱は柔組織からなり，繊維で囲まれた維管束が散在する。柔組織中には褐色の油様物質を含む油細胞が散在し，柔細胞中にはシュウ酸カルシウムの単晶を含み，単粒のでんぷん粒は，卵円形，楕円形，又は長卵形でへそは偏在し，径 10～40μm である。2～8 粒からなる複粒も含まれる。

必要に応じて，「リョウキョウ」の確認試験を準用する。

【 189 】　K1—①

成分及び分量又は本質	日本薬局方	ケイヒ	3.0g
	〃	ボレイ	3.0g
	〃	シュクシャ	2.0g
	〃	エンゴサク	3.0g
	〃	ウイキョウ	2.0g
	〃	カンゾウ	1.0～2.0g
	〃	リョウキョウ	1.0g
		全　　量	15.0～16.0g
製造方法	以上の生薬をそれぞれ末とし，散剤の製法により製して，1包 2.0g とする。		
用法及び用量	大人 1 日 3 回 1 回 1 包宛，食前又は空腹時に服用する。 15 才未満 7 才以上　大人の 2/3，7 才未満 4 才以上　大人の 1/2，4 才未満 2 才以上　大人の 1/3，2 才未満　大人の 1/4 を服用する。		
効能又は効果	体力中等度以下で，腹部は力がなくて，胃痛又は腹痛があって，ときに胸やけや，げっぷ，胃もたれ，食欲不振，はきけ，嘔吐などを伴うものの次の諸症：神経性胃炎，慢性胃炎，胃腸虚弱		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	安中散		

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は褐色の粉末で，特異なにおいがあり，味はわずかに甘い。

確認試験

（1）　ケイヒ　本品 5g にヘキサン 10mL を加え，3 分間振り混ぜた後，ろ過し，ろ液を試料溶液とする。別に，ケイヒ末 0.9g をとり試料溶液と同様に操作して標準溶液とする。これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び標準溶液 20μL ずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲル（蛍光剤入り）を用いて調製した薄層板にスポットする。次にヘキサン・酢酸エチル混液（4：1）を展開溶媒として約 10cm 展開した後，薄層板を風乾する。これに紫外線（主波長 254nm）を照射するとき，試料溶液から得た数個のスポットのうち 1 個のスポットは，標準溶液から得た主スポットと色調及び *Rf* 値が等しい。また，このスポットは 2,4 - ジニトロフェニルヒドラジン試液を噴霧するとき，黄だいだい色を呈する。

（２）　ウイキョウ　本品 5g にヘキサン 10mL を加え，3 分間振り混ぜた後，ろ過し，ろ液を試料溶液とする。別に，ウイキョウ末 0.6g をとり試料溶液と同様に操作して標準溶液とする。これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び標準溶液 5μL ずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲル（蛍光剤入り）を用いて調製した薄層板にスポットする。次にヘキサン・酢酸エチル混液（20：1）を展開溶媒として約 10cm 展開した後，薄層板を風乾する。これに紫外線（主波長 254nm）を照射するとき，試料溶液から得た数個のスポットのうち 1 個のスポットは，標準溶液から得た主スポットと色調及び *Rf* 値が等しい。

（３）　シュクシャ　本品 20g にジエチルエーテル 50mL を加え，還流冷却器をつけて，水浴上で 10 分間加熱する。冷後，ろ過し，ろ液を蒸発乾固し，残留物にヘキサン 2mL を加えて溶かし，必要ならば，ろ過して試料溶液とする。別にシュクシャ末 2.5g をとり試料溶液と同様に操作して標準溶液とする。これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び標準溶液 20μL ずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲルを用いて調製した薄層板にスポットする。次にヘキサン・酢酸エチル混液（20：1）を展開溶媒として約 10cm 展開した後，薄層板を風乾する。これに 4‐メトキシベンズアルデヒド・硫酸試液を均等に噴霧し，105℃で 5 分間加熱するとき，試料溶液から得た数個のスポットのうち 1 個のスポットは，標準溶液から得た緑色のスポットと色調及び *Rf* 値が等しい。

（４）　リョウキョウ　本品 10g にアセトン 50mL を加え，還流冷却器をつけて，水浴上で 10 分間加熱し，冷後，ろ過する。ろ液を蒸発乾固し，残留物にクロロホルム 2mL を加えて溶かし，必要ならば，ろ過して試料溶液とする。別にリョウキョウ，細末 0.6g をとり試料溶液と同様に操作して標準溶液とする。これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び標準溶液 5μL ずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲル（蛍光剤入り）を用いて調製した薄層板にスポットする。次にヘキサン・酢酸エチル混液（1：1）を展開溶媒として約 10cm 展開した後，薄層板を風乾する。これに紫外線（主波長 254nm）を照射するとき，試料溶液から得たスポットのうち 1 個のスポットは，標準溶液から得た主スポットと色調及び *Rf* 値が等しい。また紫外線（主波長 365nm）を照射するとき，このスポットは黄白色の蛍光を発する。

（５）　カンゾウ　本品 5g にメタノール 10mL を加え，3 分間振り混ぜた後，ろ過する。ろ液 5mL をとり，水を加えて 50mL とした後，オクタデシルシリル化シリカゲル約 0.4g を充塡したカートリッジカラム*に注入し，メタノール 2mL で溶出し，この溶出液を試料溶液とする。別にカンゾウ末 0.6g をとり試料溶液と同様に操作して標準溶液とする。これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び標準溶液 10μL ずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲル（蛍光剤入り）を用いて調製した薄層板にスポットする。次に 1‐ブタノール・水・酢酸（100）混液（7：2：1）を展開溶媒として約 10cm 展開した後，薄層板を風乾する。これに紫外線（主波長 254nm）を照射するとき，試料溶液から得たクロマトグラムの中に，標準溶液から得た暗紫色のスポットと色調及び *Rf* 値が等しい数個のスポットが存在する。またこの薄層板に 4‐メトキシベンズアルデヒド・硫酸試液を均等に噴霧し，105℃で 5 分間加熱するとき，これらのスポットは同一の色調を呈する。

（６）　エンゴサク　本品 10g にメタノール 50mL を加え，3 分間振り混ぜた後，ろ過する。ろ液を蒸発乾固し，残留物にメタノール 2mL を加えて溶かし，必要ならばろ過して試料溶液とする。別にエンゴサク細末 1.9g をとり試料溶液と同様に操作して標準溶液とする。これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び標準溶液 10μL ずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲルを用いて調製した薄層板にスポットする。次にヘキサン・酢酸エチル・アンモニア水（28）混液（25：25：1）を展開溶媒として約

10cm 展開した後，薄層板を風乾する。更に 110℃で 10 分間加熱した後，これに紫外線（主波長 365nm）を照射するとき，試料溶液から得た数個のスポットのうち 1 個のスポットは，標準溶液から得た黄白色蛍光を発するスポットと色調及び *Rf* 値が等しい。また，これらのスポットは噴霧用ドラーゲンドルフ試液を均等に噴霧するとき，黄だいだい色を呈する。

（7）　ボレイ末　本品 5g をとり，水 20mL を加えて振り混ぜた後，希塩酸 5mL を加えるとガスを発生する。

［注］*ウォーターズ社製セップパック C18 又はこれと同等の性能を有するもの。

【 190 】　K2

成分及び分量 又は本質	日本薬局方　トウキ　3.0g 〃　シャクヤク　3.0g 〃　センキュウ　3.0g 〃　ニンジン　3.0g 〃　ビャクジュツ　3.0g 〃　ブクリョウ　4.0g 〃　ケイヒ　2.0g 別紙規格　粟　2.0g 全　量　23.0g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，熱いうちに煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。 本剤は必ず1日分ずつ煎じ，数日分をまとめて煎じないこと。
効能又は効果	体力中等度以下で，顔色悪くて食欲なく，疲れやすいものの次の諸症：急・慢性胃腸炎，冷えによる下痢
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器
規格及び試験方法	別記のとおり。
備考	胃風湯

規格及び試験方法

性　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品1包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　トウキ　外面は暗褐色～赤褐色で，縦じわがあり，切断面は暗褐色～黄褐色を呈する。特異なにおいがあり，味はわずかに甘く，後にやや辛い。

横切片を鏡検するとき，コルク層は4～10層からなり，その内側に数層の厚角組織がある。皮部には分泌細胞に囲まれた多数の油道及びしばしば大きなすき間がある。皮部と木部の境界は明らかで，木部では多数の道管と放射組織とが交互に放射状に配列し，外方の道管は単独又は数個集まってやや密に配列してくさび状をなすが，中心部付近の道管は極

めてまばらに存在する。でんぷん粒は単粒又はまれに 2～5 個の複粒で，単粒の径は 20μm 以下，複粒は 25μm に達する。でんぷん粒はしばしばのり化している。

（２）　シャクヤク　外面は褐色～淡灰褐色を呈し，横断面はち密で淡灰褐色を呈し，木部には淡褐色の放射状の線がある。わずかに特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後に渋くてわずかに苦い。

必要に応じて，「シャクヤク」の確認試験を準用する。

（３）　センキュウ　外面は灰褐色～暗褐色で，切断面は灰白色～灰褐色，半透明で，ときにはうつろがある。質は密で堅い。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，皮部及び髄には油道が散在する。木部には厚膜で木化した木部繊維が大小不同の群をなして存在する。でんぷん粒は，通例，のり化していて，まれに径 5～25μm の粒として認めることがある。シュウ酸カルシウム結晶は認めない。

（４）　ニンジン　外面は淡黄褐色～淡灰褐色を呈し，縦じわがあり，横断面は淡黄褐色を呈し，形成層の付近は褐色を呈する。特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後にやや苦い。

必要に応じて，「ニンジン」の確認試験を準用する。

（５）　ビャクジュツ　外面は淡灰黄色～淡黄白色で，ところどころ灰褐色を呈し，横切面には淡黄褐色～褐色の分泌物による細点がある。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，皮部の柔組織中にはしばしば師部の外側に接して繊維束があり，放射組織の末端部には淡褐色～褐色の内容物を含む油室がある。木部には大きい髄を囲んで放射状に配列した短径の道管とそれを囲む著しい繊維束がある。髄及び放射組織中には皮部と同様な油室があり，柔組織中にはイヌリンの結晶及びシュウ酸カルシウムの小針晶を含む。

必要に応じて，「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。

（６）　ブクリョウ　白色又はわずかに淡赤色を帯びた白色である。外層が残存するものは暗褐色～暗赤褐色で，きめがあらく，裂け目がある。質は堅いが砕きやすい。味はないがやや粘液ようである。

必要に応じて，「ブクリョウ」の確認試験を準用する。

（７）　ケイヒ　外面は暗赤褐色を呈し，内面は赤褐色を呈し，平滑である。切面はやや繊維性で赤褐色を呈し淡褐色の薄層がある。特異なにおいがあり，味は甘く，辛く，後にやや粘液性で，わずかに収れん性である。

横切片を鏡検するとき，一次皮部と二次皮部はほとんど連続した石細胞環で区分され，環の外辺にはほぼ円形に結集した繊維束を伴い，環の各石細胞の壁はしばしばU字形に肥厚する。二次皮部中には石細胞を認めず，まばらに少数の厚膜繊維を認める。柔組織中には油細胞，粘液細胞及びでんぷん粒を含む。放射組織中には微細なシュウ酸カルシウムの針晶を含む細胞がある。

（８）　アワ　類円形を呈し，直径 2mm，一端はややとがり一端は丸みを帯びている。外面は淡黄色で，やや角質である。内部は淡黄色あるいは黄白色で，粉性である。味はわずかに甘い。

乾燥減量　14%以下。

灰　　分　4%以下。

別紙規格　　**粟の規格及び試験方法**

本品はアワ *Setaria italica* Beauv（*Gramineae*）の種皮を除いた種子である。

性　　状　本品は類円形を呈し，直径 2mm，一端はややとがり一端は丸みを帯びている。外面は淡黄色で，やや角質である。内部は淡黄色あるいは黄白色で，粉性である。本品はわずかににおいがあり，わずかに甘い。

確認試験　本品の粉末にヨウ素試液を加えるとき，暗青紫色を呈する。

乾燥減量　14%以下（6 時間）。

灰　　分　2%以下。

【 191 】　K3

成分及び分量又は本質	日本薬局方	ソウジュツ	2.5g
	〃	チンピ	2.5g
	〃	タクシャ	2.5g
	〃	ビャクジュツ	2.5g
	〃	コウボク	2.5g
	〃	チョレイ	2.5g
	〃	シャクヤク	2.5g
	〃	ブクリョウ	2.5g
	〃	ケイヒ	2.0g
	〃	タイソウ	1.5g
	〃	カンゾウ	1.0g
	〃	ショウキョウ	1.5g
		全　　量	26.0g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。		
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。		
効能又は効果	体力中等度で，水様性の下痢，嘔吐があり，口渇，尿量減少を伴うものの次の諸症：食あたり，暑気あたり，冷え腹，急性胃腸炎，腹痛		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	胃苓湯		

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品1包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（１）　ソウジュツ　外面は暗灰褐色～暗黄褐色である。横断面は淡褐色～赤褐色の分泌物による細点を認める。しばしば白色綿状の結晶を析出する。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，皮部の柔組織中には，通例，繊維束を欠き，放射組織の末端部には淡褐色～黄褐色の内容物を含む油室がある。木部は形成層に接して道管を囲んだ繊維束が放射状に配列し，髄及び放射組織中には皮部と同様な油室がある。柔細胞中にはイヌリンの球晶及びシュウ酸カルシウムの針晶を含む。

（２）　チンピ　外面は黄赤色～暗黄褐色で，油室による多数の小さいくぼみがあり，内面は白色～淡灰黄褐色である。厚さ約 2mm で，質は軽くてもろい。芳香があり，味は苦くて，わずかに刺激性である。

必要に応じて，「チンピ」の確認試験を準用する。

（３）　タクシャ　淡黄褐色～淡褐色でコルク層をつける部位はやや暗色を呈する。ルーペ視するとき，褐色～淡褐色のはん点が散在する。切面は粒状で，繊維性ではない。わずかににおい及び味がある。

（４）　ビャクジュツ　外面は淡灰黄色～淡黄白色で，ところどころ灰褐色を呈し，横切面には淡黄褐色～褐色の分泌物による細点がある。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，皮部の柔組織中にはしばしば師管の外側に接して繊維束があり，放射組織の末端部には淡褐色～褐色の内容物を含む油室がある。木部には大きい髄を囲んで放射状に配列した短径の道管とそれを囲む著しい繊維束がある。髄及び放射組織中には皮部と同様な油室があり，柔組織中にはイヌリンの小球晶及びシュウ酸カルシウムの針晶を含む。

必要に応じて，「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。

（５）　コウボク　外面は灰白色～灰褐色を呈し，内面は淡褐色～褐色，切断面は淡赤褐色を呈し，繊維性である。わずかに芳香があり，味は苦い。

横切片を鏡検するとき，コルク層は厚く，ほぼ等径性の石細胞が環状に内接する。一次皮部は狭く，内しょう部には繊維群が点在し，二次皮部の放射組織間には師部繊維群が階段状に並ぶ。油細胞の多数は一次皮部に，少数は二次皮部に散在し，狭い放射組織内にも認められることがある。

必要に応じて，「コウボク」の確認試験を準用する。

（６）　チョレイ　外面は黒褐色を呈し，切断面はやや柔らかくコルクようで，ほぼ白色～淡褐色を呈し，内部には白色のまだら模様がある。質は軽い。味がない。

必要に応じて，「チョレイ」の確認試験を準用する。

（７）　シャクヤク　外面は褐色～淡灰褐色を呈し，横断面はち密で淡灰褐色を呈し，木部には淡褐色の放射状の線がある。わずかに特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後に渋くてわずかに苦い。

必要に応じて，「シャクヤク」の確認試験を準用する。

（８）　ブクリョウ　白色又はわずかに淡赤色を帯びた白色で質は堅いが砕きやすい。味はないがやや粘液ようである。

必要に応じて，「ブクリョウ」の確認試験を準用する。

（９）　ケイヒ　外面は暗赤褐色を呈し，内面は赤褐色を呈し，平滑である。横断面は赤褐色を呈し淡褐色の薄層が見られる。特異なにおいがあり，味は甘く，辛く，後にやや粘液性で，わずかに収れん性である。

横切片を鏡検するとき，一次皮部と二次皮部はほとんど連続した石細胞環で区分され，環の外辺にはほぼ円形に結集した繊維束を伴い，環の各石細胞の膜はしばしばU字形に肥厚する。二次皮部中には石細胞を認めず，まばらに少数の厚膜繊維を認める。柔組織中には油細胞，粘液細胞及び微細なシュウ酸カルシウムの針晶を含む細胞があり，柔細胞中にはでんぷん粒を含む。

（10）　タイソウ　外面は赤褐色であらいしわがあるか，又は暗灰赤色で細かいしわがあり，いずれもつやがある。外果皮は薄く革質で，中果皮は暗灰褐色を呈し，海綿ようで柔らかく粘着性があり，内果皮は極めて堅く，種子は偏平である。わずかに特異なにおいがあり，味は甘い。

（11）　カンゾウ　外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現わす。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に 1～3 細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には 3～10 細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞中にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

（12）　ショウキョウ　淡灰黄色の周皮を付けたままか，又はその一部をはぎとってあり，表面は灰白色～淡灰褐色で，しばしば白粉を付けている。横断面は繊維性，粉性で，淡帯褐色を呈し，皮層と中心柱とに分かれる。横断面をルーペ視するとき，その全面に維管束及び分泌物が褐色の細点として散在している。特異なにおいがあり，味は極めて辛い。

乾燥減量　15％以下。

灰　　分　5％以下。

【 192 】　K4

成分及び分量 又は本質	日本薬局方	インチンコウ	6.0g
	〃	サンシシ	1.4～2.0g
	〃	ダイオウ	1.0～2.0g
		全　量	8.4～10.0g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。		
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。		
効能又は効果	体力中等度以上で，口渇があり，尿量少なく，便秘するものの次の諸症：じんましん，口内炎，湿疹・皮膚炎，皮膚のかゆみ		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	茵蔯蒿湯		

規格及び試験方法

性　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品1包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　インチンコウ　ほぼ球形を呈する径約2mmの頭花（頭状花序）を主とし，糸状の葉，花序軸及び細い茎の切片からなり，質は軽く，緑褐色～暗褐色を呈する。頭花（頭状花序）をルーペ視すると，膜質の総ほう片及び筒花又はそう果が見られる。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

必要に応じて，「インチンコウ」の確認試験を準用する。

（2）　サンシシ　果皮は薄く砕きやすく，その外面は黄褐色，黄赤色又は黒褐色を呈し，内面は黄褐色を呈し，平らでつやがある。果実の内部は2室に分かれ，黄赤色～暗赤色の果肉中に黒褐色又は黄赤色で長径約5mmの偏平な種子の団塊を含む。質は軽い。特異なにおいがあり，味は苦い。

必要に応じて，「サンシシ」の確認試験を準用する。

（3）　ダイオウ　暗褐色～黄褐色～淡褐色を呈し，ルーペ視すると入り組んだ不規則な模様がある。質はおおむね粗で繊維性ではない。特異なにおいがあり，味はわずかに渋くて苦い。かめば細かい砂をかむような感じがあり，だ液を黄色に染める。

必要に応じて，「ダイオウ」の確認試験を準用する。

乾燥減量　10%以下。

灰　　分　7%以下。

【 193 】　K5

成分及び分量又は本質	日本薬局方	タクシャ	5.0g
	〃	チョレイ	3.0g
	〃	ケイヒ	2.0g
	〃	ブクリョウ	3.0g
	〃	ビャクジュツ	3.0g
	〃	インチンコウ	4.0g
		全　　量	20.0g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。		
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，熱いうちに煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。 本剤は必ず1日分ずつ煎じ，数日分をまとめて煎じないこと。		
効能又は効果	体力中等度以上をめやすとして，のどが渇いて，尿量が少ないものの次の諸症：嘔吐，じんましん，二日酔，むくみ		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	茵蔯五苓散料		

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品1包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　タクシャ　淡黄褐色～淡褐色でコルク層をつける部位はやや暗色を呈する。ルーペ視するとき，褐色～淡褐色のはん点が散在する。切面は粒状で，繊維性ではない。わずかににおい及び味がある。

（2）　チョレイ　外面は黒褐色～灰褐色を呈し，切断面はやや柔らかくコルクようで，ほぼ白色～淡褐色を呈し，内部には白色のまだら模様がある。質は軽い。味がない。

必要に応じて，「チョレイ」の確認試験を準用する。

（３）　ケイヒ　外面は暗赤褐色を呈し，内面は赤褐色を呈し，平滑である。折面はやや繊維性で赤褐色を呈し淡褐色の薄層がある。特異なにおいがあり，味は甘く，辛く，後にやや粘液性で，わずかに収れん性である。

横切片を鏡検するとき，一次皮部と二次皮部はほとんど連続した石細胞環で区分され，環の外辺にはほぼ円形に結集した繊維束を伴い，環の各石細胞の壁はしばしばU字形に肥厚する。二次皮部中には石細胞を認めず，まばらに少数の厚膜繊維を認める。柔組織中には油細胞，粘液細胞及びでんぷん粒を含む。放射組織中には微細なシュウ酸カルシウムの針晶を含む細胞がある。

（４）　ブクリョウ　白色又はわずかに淡赤色を帯びた白色である。外層が残存するものは暗褐色～暗赤褐色で，きめがあらく，裂け目がある。質は堅いが砕きやすい。味はないがやや粘液ようである。

必要に応じて，「ブクリョウ」の確認試験を準用する。

（５）　ビャクジュツ　外面は淡灰黄色～淡黄白色で，ところどころ灰褐色を呈し，横切面には淡黄褐色～褐色の分泌物による細点がある。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，皮部の柔組織中にはしばしば師部の外側に接して繊維束があり，放射組織の末端部には淡褐色～褐色の内容物を含む油室がある。木部には大きい髄を囲んで放射状に配列した短径の道管とそれを囲む著しい繊維束がある。髄及び放射組織中には皮部と同様な油室があり，柔組織中にはイヌリンの結晶及びシュウ酸カルシウムの小針晶を含む。

必要に応じて，「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。

（６）　インチンコウ　卵形～球形の長さ 1.5～2mm，径約 2mm の頭花を主とし，糸状の葉と花序軸からなる。頭花の外面は淡緑色～淡黄褐色，葉の外面は緑色～緑褐色，花序軸の外面は緑褐色～暗褐色を呈する。頭花をルーペ視するとき，膜質の総ほう片及び筒花又はそう果が見られる。特異な弱いにおいがあり，味はやや辛く，わずかに麻ひ性である。

必要に応じて，「インチンコウ」の確認試験を準用する。

乾燥減量　15%以下。

灰　　分　5%以下。

【 194 】　K5—①

成分及び分量又は本質	日本薬局方	タクシャ	0.5g
	〃	チョレイ	0.4g
	〃	ケイヒ	0.3g
	〃	ブクリョウ	0.4g
	〃	ビャクジュツ	0.4g
	〃	インチンコウ	4.0g
		全　　量	6.0g
製造方法	以上の生薬をそれぞれ末とし，散剤の製法により製する。ただし，分包散剤とする。		
用法及び用量	1回量を次のとおりとし，1日3回食前又は空腹時に服用する。 大人（15才以上）1包2.0g，15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満大人の1/4を服用する。		
効能又は効果	体力中等度以上をめやすとして，のどが渇いて，尿量が少ないものの次の諸症：嘔吐，じんましん，二日酔，むくみ		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	茵蔯五苓散		

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験

（1）　ケイヒ　本品の粉末2gにジエチルエーテル10mLを加え，還流冷却器を付け，水浴上で10分間加熱し，冷後，ろ過し，ろ液を試料溶液とする。

別に，「ケイヒ」の粉末1gをとり，試料溶液と同様に操作して対照溶液とする。

これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び対照溶液10μLずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲルを用いて調製した薄層板にスポットする。次にヘキサン・クロロホルム・酢酸エチル混液（4：1：1）を展開溶媒として約10cm展開した後，薄層板を風乾する。これに2,4 - ジニトロフェニルヒドラジン試液を均等に噴霧し，105℃で30分間加熱するとき，*Rf*値約0.50付近に橙色のスポットを認める。

（2）　ビャクジュツ　本品の粉末2gにヘキサン10mLを加え，還流冷却器を付け，水浴上で10分間加熱し，冷後，ろ過し，試料溶液とする。

別に「ビャクジュツ」の粉末 1g をとり，試料溶液と同様に操作して対照溶液とする。

これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び対照溶液 10μL ずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲルを用いて調製した薄層板にスポットする。次にヘキサン・ベンゼン・酢酸エチル混液（14：3：3）を展開溶媒として約 10cm 展開した後，薄層板を風乾する。

これに *p* - ジメチルアミノベンズアルデヒド試液を均等に噴霧し，105℃で 5 分間加熱するとき，*Rf* 値約 0.80 付近に紫色のスポットを認める。

（３）　インチンコウ　本品の粉末 2g にメタノール 10mL を加え，還流冷却器を付け，水浴上で 10 分間加熱し，冷後，ろ過し，ろ液を試料溶液とする。

別に「インチンコウ」の粉末 1g をとり，試料溶液と同様に操作して対照溶液とする。

これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び対照溶液 10μL ずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲル（蛍光剤入り）を用いて調製した薄層板にスポットする。次にクロロホルム・メタノール混液（3：1）を展開溶媒として約 10cm 展開した後，薄層板を風乾する。

これに 4 - メトキシベンズアルデヒド・硫酸試液を均等に噴霧し，105℃で 30 分間加熱するとき，*Rf* 値約 0.70 付近に紫色のスポットを認める。

乾燥減量　15%以下。

灰　　分　5%以下。

【 195 】　K6

成分及び分量 又は本質	日本薬局方	ハンゲ	5.0g
	〃	バクモンドウ	10.0g
	〃	トウキ	2.0g
	〃	センキュウ	2.0g
	〃	シャクヤク	2.0g
	〃	ニンジン	2.0g
	〃	ケイヒ	2.0g
	〃	ボタンピ	2.0g
	〃	カンゾウ	2.0g
	〃	ショウキョウ	0.3g
	〃	ゴシュユ	3.0g
		全　量	32.3g
	局外生規	アキョウ	2.0g
製造方法	アキョウを除く以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製し，これにアキョウ 2.0g を添付する。		
用法及び用量	本品 1 包に水約 500mL を加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，添付のアキョウを煎液に入れ，再び 5 分ほど熱して溶かし，煎液を 3 回に分けて食間に服用する。上記は大人の 1 日量である。 15 才未満 7 才以上　大人の 2/3，7 才未満 4 才以上　大人の 1/2，4 才未満 2 才以上　大人の 1/3，2 才未満　大人の 1/4 以下を服用する。		
効能又は効果	体力中等度以下で，手足がほてり，唇がかわくものの次の諸症：月経不順，月経困難，こしけ（おりもの），更年期障害，不眠，神経症，湿疹・皮膚炎，足腰の冷え，しもやけ，手あれ（手の湿疹・皮膚炎）		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器，ただし，アキョウは気密容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	温経湯		

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品 1 包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　ハンゲ　外面は白色～灰白黄色，上部には茎の跡がくぼみとなり，その周辺には根の跡がくぼんだ細点となっている。横断面は白色，粉性である。味は初めなく，やや粘液性で，後に強いえぐ味を残す。

横切片を鏡検するとき，主としてでんぷん粒を充満した柔組織からなり，わずかにシュウ酸カルシウムの束晶を含んだ粘液細胞がその間に認められる。でんぷん粒は主として 2～3 個の複粒で，通例，径 10～15μm，単粒は通例径 3～7μm である。束晶は長さ 25～150μm である。

（2）　バクモンドウ　紡錘形を呈し，長さ 10～25mm，径 3～5mm，一端はややとがり，他端はやや丸みをもち，外面は淡黄色～淡黄褐色で，大小の縦じわがある。皮層は柔軟性でもろく，中心柱は強じんで折りにくい。皮層の折面は淡黄褐色を呈し，やや半透明で粘着性がある。味はわずかに甘く，粘着性がある。

（3）　トウキ　外面は暗褐色～赤褐色で，縦じわがあり，切断面は淡黄色～黄褐色を呈する。特異なにおいがあり，味はわずかに甘く，後にやや辛い。

横切片を鏡検するとき，コルク層は 4～10 層からなり，その内側に数層の厚角組織が続いている。皮部には分泌細胞に囲まれた多数の樹脂道並びにしばしば大きなすき間がある。形成層は長方形に偏圧された数層の細胞からなり，明らかに皮部と木部とを区別する。木部では多数の道管と放射組織とが交互に放射状に配列し，その外方の道管は単独又は数個集まってやや密に配列してくさび状をなすが，中心部付近の道管は極めてまばらに存在する。でんぷん粒は径 19μm 以下，まれに 2～5 個の複粒があり，複粒の径は 25μm に達し，しばしばのり化している。

（4）　センキュウ　外面は灰褐色～暗褐色で，切断面は灰白色～灰褐色，半透明で，ときにはうつろがある。質は密で堅い。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，皮部及び髄には油道が散在する。木部には厚膜で木化した木部繊維が大小不同の群をなして存在する。でんぷん粒は，通例，のり化していて，まれに径 5～25μm のでんぷん粒を認めることがある。シュウ酸カルシウム結晶は認めない。

（5）　シャクヤク　外面は褐色～淡灰褐色を呈し，横断面はち密で淡灰褐色を呈し，木部には淡褐色の放射状の線がある。わずかに特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後に渋くてわずかに苦い。

必要に応じて，「シャクヤク」の確認試験を準用する。

（6）　ニンジン　外面は淡黄褐色～淡灰褐色を呈し，縦じわがあり，横断面は淡黄褐色を呈し，形成層の付近は褐色を呈する。特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後にやや苦い。

必要に応じて，「ニンジン」の確認試験を準用する。

（7）　ケイヒ　外面は暗赤褐色を呈し，内面は赤褐色を呈し，平滑である。横断面はやや繊維性で赤褐色を呈し淡褐色の薄層が見られる。特異なにおいがあり，味は甘く，辛く，後にやや粘液性で，わずかに収れん性である。

横切片を鏡検するとき，一次皮部と二次皮部はほとんど連続した石細胞環で区分され，環の外辺にはほぼ円形に結集した繊維束を伴い，環の各石細胞の膜はしばしば U 字形に肥厚する。二次皮部中には石細胞を認めず，まばらに少数の厚膜繊維を認める。柔組織中に

は油細胞，粘液細胞及びでんぷん粒を含む。放射組織中には微細なシュウ酸カルシウムの針晶を含む細胞がある。

（８）　ボタンピ　外面は暗褐色～帯紫褐色，内面は淡灰褐色～暗紫色を呈する。内面及び切断面にはしばしば白色の結晶を付着する。特異なにおいがあり，味はわずかに辛くて苦い。

必要に応じて，「ボタンピ」の確認試験を準用する。

（９）　カンゾウ　外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現わす。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に 1～3 細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には 3～10 細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞中にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

（10）　ショウキョウ　淡灰黄色の周皮を付けたままか，又はその一部をはぎとってあり，表面は灰白色～淡灰褐色で，しばしば白粉を付けている。横断面は繊維性，粉性で，淡帯黄褐色を呈し，皮層と中心柱とに分かれる。横断面をルーペ視するとき，その全面に維管束及び分泌物が褐色の細点として散在している。特異なにおいがあり，味は極めて辛い。

（11）　ゴシュユ　偏球形又は球形を呈し，外面は暗褐色～灰褐色，多くの油室がくぼんだ小点として認められ，その中心には花柱の残基があるが，しばしばこれは脱落している。果柄は長さ 2～5mm で，灰緑色の毛を密生している。果皮は，通例，開裂し，子房は 5 室に分かれ，各室中には倒卵球形又は球形の褐色～黒褐色又は帯青黒色のつやのある種子が存在する。特異なにおいがあり，味は辛く，後に残留性の苦味がある。

必要に応じて，「ゴシュユ」の確認試験を準用する。

乾燥減量　15%以下。

灰　　分　5%以下。

【 196 】　K7

成分及び分量又は本質	日本薬局方	トウキ	4.0g
	〃	ジオウ	4.0g
	〃	シャクヤク	3.0g
	〃	センキュウ	3.0g
	〃	オウゴン	3.0g
	〃	サンシシ	1.5～2.0g
	〃	オウレン	1.5g
	〃	オウバク	1.5g
		全　　量	21.5～22.0g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。		
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。		
効能又は効果	体力中等度で，皮膚はかさかさして色つやが悪く，のぼせるものの次の諸症：月経不順，月経困難，血の道症，更年期障害，神経症，湿疹・皮膚炎		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	温清飲		

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品1包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　トウキ　外面は暗褐色～赤褐色で，縦じわがあり，切断面は淡黄色～黄褐色を呈する。特異なにおいがあり，味はわずかに甘く，後にやや辛い。

横切片を鏡検するとき，コルク層は4～10層からなり，その内側に数層の厚角組織が続いている。皮部には分泌細胞に囲まれた多数の樹脂道並びにしばしば大きなすき間がある。形成層は長方形に偏圧された数層の細胞からなり，明らかに皮部と木部とを区別する。木部では多数の道管と放射組織とが交互に放射状に配列し，その外方の道管は単独又

は数個集まってやや密に配列してくさび状をなすが，中心部付近の道管は極めてまばらに存在する。でんぷん粒は径 19μm 以下，まれに 2～5 個の複粒があり，複粒の径は 25μm に達し，しばしばのり化している。

（２）　ジオウ　外面は黄褐色～黒褐色を呈し，深い縦みぞ及びくびれがある。質は柔らかく粘性である。横断面は黄褐色～黒褐色で，皮部は木部より色が濃く，ほとんど髄を認めない。特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後にやや苦い。

横切片を鏡検するとき，コルク層は 7～15 層で，皮部はすべて柔細胞からなり，外皮部に褐色の分泌物を含む細胞が散在する。木部はほとんど柔細胞で満たされ，放射状に並ぶ道管は側孔のある網紋があり，弱い木化反応を呈する。

（３）　シャクヤク　外面は褐色～淡灰褐色を呈し，横断面はち密で淡灰褐色を呈し，木部には淡褐色の放射状の線がある。わずかに特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後に渋くてわずかに苦い。

必要に応じて，「シャクヤク」の確認試験を準用する。

（４）　センキュウ　外面は灰褐色～暗褐色で，切断面は灰白色～灰褐色，半透明で，ときにはうつろがある。質は密で堅い。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，皮部及び髄には油道が散在する。木部には厚膜で木化した木部繊維が大小不同の群をなして存在する。でんぷん粒は，通例，のり化していて，まれに径 5～25μm のでんぷん粒を認めることがある。シュウ酸カルシウム結晶は認めない。

（５）　オウゴン　外面は黄褐色～暗褐色を呈し，切断面は黄色～帯褐黄色を呈し，縦に繊維性のすじが見られる。味はわずかに苦い。

必要に応じて，「オウゴン」の確認試験を準用する。

（６）　サンシシ　果皮は薄く砕きやすく，その外面は赤褐色，黄褐色を呈し，内面は黄褐色を呈し，平らでつやがある。果実の内部は 2 室に分かれ，黄赤色～暗赤色の果肉中に黒褐色又は黄赤色で長径約 5mm の偏平な種子の団塊を含む。質は軽い。特異なにおいがあり，味は苦い。

必要に応じて，「サンシシ」の確認試験を準用する。

（７）　オウレン　根茎の径は 2～7mm で，外面は灰黄褐色～褐色を呈し，輪節及び多数の根の基部を認め，横断面はやや繊維性で，コルク層は淡灰褐色，皮部は黄褐色，木部は黄色，髄は黄褐色である。味は極めて苦く，残留性で，だ液を黄色に染める。

横切片を鏡検するとき，コルク層は薄膜のコルク細胞からなり，皮部柔組織中にはコルク層に近い部位に石細胞群，形成層に近い部位に黄色の師部繊維の認められるものが多い。木部は主として道管，仮道管，木部繊維からなり，放射組織は明らかで，髄は大きく，髄中には石細胞あるいは厚膜木化した細胞を伴った石細胞を認めることがある。柔細胞には細かいでんぷん粒を含むが，結晶を含まない。

必要に応じて，「オウレン」の確認試験を準用する。

（８）　オウバク　外面は灰黄褐色～灰褐色で，内面は黄色～暗黄褐色で，細かい縦線がある。横断面は鮮黄色でやや繊維性である。横切面をルーペ視するとき，皮部外層は黄色で薄く，石細胞が黄褐色の点状に分布する。皮部内層は厚く，一次放射組織は外方に向かうにしたがい幅が広がり，それらの一次放射組織の間に，多くの二次放射組織が集まってほぼ三角形の師部を形成し，この組織に褐色を呈する師部繊維束が層積して接線方向に並び，放射組織と交錯して格子状を呈する。味は極めて苦く，粘液性で，だ液を黄色に染める。

必要に応じて，「オウバク」の確認試験を準用する。

乾燥減量　10%以下。

灰　　分　7%以下。

【 197 】　K8

成分及び分量又は本質	日本薬局方	ハンゲ	4.0g
	〃	ショウキョウ	1.0g
	〃	チンピ	2.0g
	〃	キジツ	1.5g
	〃	ブクリョウ	4.0g
	局外生規	チクジョ	2.0g
	日本薬局方	カンゾウ	1.0g
		全　量	15.5g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。		
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。		
効能又は効果	体力中等度以下で，胃腸が虚弱なものの次の諸症：不眠症，神経症		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	温胆湯		

規格及び試験方法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品1包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　ハンゲ　外面は白色～灰白黄色，上部には茎の跡がくぼみとなり，その周辺には根の跡がくぼんだ細点となっている。横断面は白色，粉性である。味は初めなく，やや粘液性で，後に強いえぐ味を残す。

横切片を鏡検するとき，主としてでんぷん粒を充満した柔組織からなり，わずかにシュウ酸カルシウムの束晶を含んだ粘液細胞がその間に認められる。でんぷん粒は主として2～3個の複粒で，通例，径10～15μm，単粒は通例径3～7μmである。束晶は長さ25～150μmである。

（2）　ショウキョウ　淡灰黄色の周皮を付けたままか，又はその一部をはぎとってあり，表面は灰白色～淡灰褐色で，しばしば白粉を付けている。横断面は繊維性，粉性で，

淡帯黄褐色を呈し，皮層と中心柱とに分かれる。横断面をルーペ視するとき，その全面に維管束及び分泌物が褐色の細点として散在している。特異なにおいがあり，味は極めて辛い。

（３）　チンピ　外面は黄赤色～暗黄褐色で，油室による多数の小さいくぼみがあり，内面は白色～淡灰黄褐色である。厚さ約 2mm で，質は軽くてもろい。芳香があり，味は苦くて，わずかに刺激性である。

必要に応じて，「チンピ」の確認試験を準用する。

（４）　キジツ　外面は濃緑褐色～褐色で，つやがなく，油室による多数のくぼんだ小点がある。切断面は淡灰褐色を呈し，内果皮を付ける部分は褐色を呈する。特異なにおいがあり，味は苦い。

必要に応じて，「キジツ」の確認試験を準用する。

（５）　ブクリョウ　白色又はわずかに淡赤色を帯びた白色で，質は堅いが砕きやすい。味はないがやや粘液ようである。

必要に応じて，「ブクリョウ」の確認試験を準用する。

（６）　チクジョ　淡緑黄色～淡黄白色～灰白色を呈し，通例つやがある。質は軽く繊維性である。味はやや苦い。

必要に応じて，局外生規「チクジョ」の確認試験を準用する。

（７）　カンゾウ　外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現わす。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に 1～3 細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には 3～10 細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞中にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

乾燥減量　15%以下。

灰　　分　5%以下。

【 198 】　K9

成分及び分量又は本質	日本薬局方	ケイヒ	3.0g
	〃	タイソウ	3.0g
	〃	シャクヤク	6.0g
	〃	カンゾウ	2.0～3.0g
	〃	ショウキョウ	1.0g
	〃	オウギ	1.5g
		全　　量	16.5～17.5g
	日本薬局方	コウイ	20.0g
製造方法	コウイを除く以上の切断又は破砕した生薬をとり，1 包として製し，これにコウイ 20g を添付する。		
用法及び用量	本品 1 包に水約 500mL を加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，熱いうちに煎じかすを除き，添付の膠飴を煎液に入れ，かきまぜながら 5 分ほど熱して膠飴を溶かし，3 回に分けて食間に服用する。上記は大人の 1 日量である。 15 才未満 7 才以上　大人の 2/3，7 才未満 4 才以上　大人の 1/2，4 才未満 2 才以上　大人の 1/3，2 才未満　大人の 1/4 以下を服用する。 本剤は必ず 1 日分ずつ煎じ，数日分をまとめて煎じないこと。		
効能又は効果	体力虚弱で，疲労しやすいものの次の諸症：虚弱体質，病後の衰弱，ねあせ，湿疹・皮膚炎，皮膚のただれ，腹痛，冷え症		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	黄耆建中湯		

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品 1 包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　ケイヒ　外面は暗赤褐色を呈し，内面は赤褐色を呈し，平滑である。折面はやや繊維性で赤褐色を呈し淡褐色の薄層がある。特異なにおいがあり，味は甘く，辛く，後にやや粘液性で，わずかに収れん性である。

横切片を鏡検するとき，一次皮部と二次皮部はほとんど連続した石細胞環で区分され，環の外辺にはほぼ円形に結集した繊維束を伴い，環の各石細胞の壁はしばしばU字形に肥厚する。二次皮部中には石細胞を認めず，まばらに少数の厚膜繊維を認める。柔組織中には油細胞，粘液細胞及びでんぷん粒を含む。放射組織中には微細なシュウ酸カルシウムの針晶を含む細胞がある。

（２）　タイソウ　外面は赤褐色であらいしわがあるか，又は暗灰赤色で細かいしわがあり，いずれもつやがある。外果皮は薄く革質で，中果皮は暗灰褐色を呈し，海綿ようで柔らかく粘着性があり，内果皮は極めて堅く，種子は偏平である。わずかに特異なにおいがあり，味は甘い。

（３）　シャクヤク　外面は褐色～淡灰褐色を呈し，横断面はち密で淡灰褐色を呈し，木部には淡褐色の放射状の線がある。わずかに特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後に渋くてわずかに苦い。

必要に応じて，「シャクヤク」の確認試験を準用する。

（４）　カンゾウ　外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現わす。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に1～3細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には3～10細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞中にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

（５）　ショウキョウ　淡灰黄色の周皮を付けたままか，又はその一部をはぎとってあり，表面は灰白色～淡灰褐色で，しばしば白粉を付けている。横断面は繊維性，粉性で，淡黄褐色を呈し，皮層と中心柱とに分かれる。横断面をルーペ視するとき，その全面に維管束及び分泌物が暗褐色の細点として散在している。特異なにおいがあり，味は極めて辛い。

（６）　オウギ　外面は淡灰黄色～淡褐黄色で，不規則なあらい縦じわがあり，折面は繊維性である。横断面をルーペ視するとき，最外層には周皮があり，皮部は淡黄白色，木部は淡黄色，形成層付近はやや褐色を帯びる。木部から皮部にわたって白色の放射組織が認められるが，太いものではしばしば放射状の裂け目となっている。わずかに弱いにおいがあり，味は甘い。

乾燥減量　18%以下。

灰　　分　5%以下。

【 199 】　K10

成分及び分量 又は本質	日本薬局方	オウゴン	4.0g
	〃	シャクヤク	3.0g
	〃	カンゾウ	2.0～3.0g
	〃	タイソウ	4.0g
		全　量	13.0～14.0g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。		
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。		
効能又は効果	体力中等度で，腹痛，みぞおちのつかえがあり，ときにさむけ，発熱などがあるものの次の諸症：下痢，胃腸炎		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	黄芩湯		

規格及び試験方法

性　状　本品は弱い特異なにおいがある。

確認試験　本品1包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　オウゴン　外面は黄褐色～暗褐色を呈し，切断面は黄色～帯褐黄色を呈し，縦に繊維性のすじが見られる。味はわずかに苦い。

必要に応じて，「オウゴン」の確認試験を準用する。

（2）　シャクヤク　外面は褐色～淡灰褐色を呈し，横断面はち密で淡灰褐色を呈し，木部には淡褐色の放射状の線がある。わずかに特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後に渋くてわずかに苦い。

必要に応じて，「シャクヤク」の確認試験を準用する。

（3）　カンゾウ　外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現わす。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に 1～3 細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には 3～10 細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞中にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

（4） タイソウ 外面は赤褐色であらいしわがあるか，又は暗灰赤色で細かいしわがあり，いずれもつやがある。外果皮は薄く革質で，中果皮は暗灰褐色を呈し，海綿ようで柔らかく粘着性があり，内果皮は極めて堅く，種子は偏平である。わずかに特異なにおいがあり，味は甘い。

乾燥減量 15%以下。

灰　　分 10%以下。

【 200 】　K11

成分及び分量 又は本質	日本薬局方　ダイオウ　1.0g 〃　センキュウ　2.0g 全　量　3.0g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，熱いうちに煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。 本剤は必ず1日分ずつ煎じ，数日分をまとめて煎じないこと。
効能又は効果	体力中等度以上のものの次の諸症：便秘，便秘に伴うのぼせ・肩こり
貯蔵方法及び 有効期間	密閉容器
規格及び試験方法	別記のとおり。
備考	応鐘散料

規格及び試験方法

性　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品1包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　ダイオウ　暗褐色～黄褐色～淡褐色を呈し，ルーペ視すると入り組んだ不規則な模様がある。質はおおむね粗で繊維性ではない。特異なにおいがあり，味はわずかに渋くて苦い。かめば細かい砂をかむような感じがあり，だ液を黄色に染める。

必要に応じて，「ダイオウ」の確認試験を準用する。

（2）　センキュウ　外面は灰褐色～暗褐色で，切断面は灰白色～灰褐色，半透明で，ときにはうつろがある。質は密で堅い。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，皮部及び髄には油道が散在する。木部には厚膜で木化した木部繊維が大小不同の群をなして存在する。でんぷん粒は，通例，のり化していて，まれに径5～25μmの粒として認めることがある。シュウ酸カルシウム結晶は認めない。

乾燥減量　10%以下。

灰　分　5%以下。

【 201 】　K11—①

成分及び分量 又は本質	日本薬局方　ダイオウ　1.0g 〃　センキュウ　2.0g 全　量　3.0g
製造方法	以上の生薬をそれぞれ末とし，散剤の製法により製し，1包とする。
用法及び用量	1回量を次のとおりとし，1日1回，食前又は空腹時に服用する。 大人（15才以上）1包3.0g，15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4を服用する。
効能又は効果	体力中等度以上のものの次の諸症：便秘，便秘に伴うのぼせ・肩こり
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器
規格及び試験方法	別記のとおり。
備考	応鐘散

規格及び試験方法

性　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験

（1）　ダイオウ　本品の粉末2gにメタノール10mLを加え，還流冷却器をつけ，水浴上で10分間加熱し，冷後，ろ過し，ろ液を試料溶液とする。

別にダイオウの粉末1gをとり，試料溶液と同様に操作して対照溶液とする。

これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び対照溶液10μLずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲルを用いて調製した薄層板にスポットする。次にクロロホルム・メタノール混液（3：1）を展開溶媒として約10cm展開した後，薄層板を風乾する。*Rf*値約0.87付近に黄色のスポットを認める。

（2）　センキュウ　本品の粉末2gにジエチルエーテル10mLを加え，還流冷却器をつけ，水浴上で10分間加熱し，冷後，ろ過し，ろ液を試料溶液とする。

別に「センキュウ」の粉末1gをとり，試料溶液と同様に操作して対照溶液とする。

これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び対照溶液10μLずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲル（蛍光剤入り）を用いて調製した薄層板にスポットする。次にクロロホルムを展開溶媒として約10cm展開した後，薄層板を風乾する。

これに紫外線（主波長365nm）を照射するとき，*Rf*値約0.59付近に紫色のスポットを認める。

乾燥減量　10%以下。

灰　　分　5%以下。

【 202 】　K12

成分及び分量 又は本質	日本薬局方	オウレン	4.0g
	〃	オウゴン	2.0g
	〃	シャクヤク	2.0g
		全　量	8.0g
	局外生規	アキョウ	3.0g
製造方法	アキョウを除く以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製し，これにアキョウ 3.0g を添付する。		
用法及び用量	本品 1 包に水約 240mL を加えて，80mL ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，添付のアキョウを加えて溶かし，少し冷えてから卵黄 1 個を入れてかきまぜ，3 回に分けて食間に服用する。上記は大人の 1 日量である。 15 才未満 7 才以上　大人の 2/3，7 才未満 4 才以上　大人の 1/2，4 才未満 2 才以上　大人の 1/3，2 才未満　大人の 1/4 以下を服用する。		
効能又は効果	体力中等度以下で，冷えやすくのぼせ気味で胸苦しく不眠の傾向のあるものの次の諸症：鼻血，不眠症，かさかさした湿疹・皮膚炎，皮膚のかゆみ		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器，ただし，アキョウは気密容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	黄連阿膠湯		

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品 1 包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　オウレン　根茎の径は 2～7mm で，外面は灰黄褐色～褐色を呈し，輪節及び多数の根の基部を認め，横断面はやや繊維性で，コルク層は淡灰褐色，皮部は黄褐色，木部は黄色，髄は黄褐色である。味は極めて苦く，残留性で，だ液を黄色に染める。

横切片を鏡検するとき，コルク層は薄膜のコルク細胞からなり，皮部柔組織中にはコルク層に近い部位に石細胞群，形成層に近い部位に黄色の師部繊維の認められるものが多い。木部は主として道管，仮道管，木部繊維からなり，放射組織は明らかで，髄は大きく，髄中には石細胞あるいは厚膜木化した細胞を伴った石細胞を認めることがある。柔細胞には細かいでんぷん粒を含むが，結晶を含まない。

必要に応じて，「オウレン」の確認試験を準用する。

（２）　オウゴン　外面は黄褐色～暗褐色を呈し，切断面は黄色～帯褐黄色を呈し，縦に繊維性のすじが見られる。味はわずかに苦い。

必要に応じて，「オウゴン」の確認試験を準用する。

（３）　シャクヤク　外面は褐色～淡灰褐色を呈し，横断面はち密で淡灰褐色を呈し，木部には淡褐色の放射状の線がある。わずかに特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後に渋くてわずかに苦い。

必要に応じて，「シャクヤク」の確認試験を準用する。

乾燥減量　15%以下。

灰　　分　5%以下。

【 203 】　K13

成分及び分量 又は本質	日本薬局方	オウレン	1.5g
	〃	オウゴン	3.0g
	〃	オウバク	3.0g
	〃	サンシシ	2.0～3.0g
		全　量	9.5～10.5g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する		
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。		
効能又は効果	体力中等度以上で，のぼせぎみで顔色赤く，いらいらして落ち着かない傾向のあるものの次の諸症：鼻出血，不眠症，神経症，胃炎，二日酔，血の道症，めまい，動悸，更年期障害，湿疹・皮膚炎，皮膚のかゆみ，口内炎		
貯蔵方法及び 有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	黄連解毒湯		

規格及び試験方法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品1包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　オウレン　根茎の径は2～7mmで，外面は灰黄褐色～褐色を呈し，輪節及び多数の根の基部を認め，横断面はやや繊維性で，コルク層は淡灰褐色，皮部は黄褐色，木部は黄色，髄は黄褐色である。味は極めて苦く，残留性で，だ液を黄色に染める。

横切片を鏡検するとき，コルク層は薄膜のコルク細胞からなり，皮部柔組織中にはコルク層に近い部位に石細胞群，形成層に近い部位に黄色の師部繊維の認められるものが多い。木部は主として道管，仮道管，木部繊維からなり，放射組織は明らかで，髄は大きく，髄中には石細胞あるいは厚膜木化した細胞を伴った石細胞を認めることがある。柔細胞には細かいでんぷん粒を含むが，結晶を含まない。

必要に応じて，「オウレン」の確認試験を準用する。

（２）　オウゴン　外面は黄褐色～暗褐色を呈し，切断面は黄色～帯褐黄色を呈し，縦に繊維性のすじが見られる。味はわずかに苦い。

必要に応じて，「オウゴン」の確認試験を準用する。

（３）　オウバク　外面は灰黄褐色～灰褐色で，内面は黄色～暗黄褐色で，細かい縦線がある。横断面は鮮黄色でやや繊維性である。横切面をルーペ視するとき，皮部外層は黄色で薄く，石細胞が黄褐色の点状に分布する。皮部内層は厚く，一次放射組織は外方に向かうにしたがい幅が広がり，それらの一次放射組織の間に，多くの二次放射組織が集まってほぼ三角形の師部を形成し，この組織に褐色を呈する師部繊維束が層積して接線方向に並び，放射組織と交錯して格子状を呈する。味は極めて苦く，粘液性で，だ液を黄色に染める。

必要に応じて，「オウバク」の確認試験を準用する。

（４）　サンシシ　果皮は薄く砕きやすく，その外面は赤褐色～黄褐色又は黒褐色を呈し，内面は黄褐色を呈し，平らでつやがある。果実の内部は 2 室に分かれ，黄赤色～暗赤色の果肉中に黒褐色又は黄赤色で長径約 5mm の偏平な種子の団塊を含む。質は軽い。特異なにおいがあり，味は苦い。

必要に応じて，「サンシシ」の確認試験を準用する。

乾燥減量　15%以下。

灰　　分　6%以下。

【 204 】　K13—①

成分及び分量 又は本質	日本薬局方　オウレン　1.0g 〃　オウゴン　1.5g 〃　オウバク　1.0g 〃　サンシシ　1.0g 全　量　4.5g
製造方法	以上の生薬をそれぞれ末とし，散剤の製法により製する。ただし，分包散剤とする。
用法及び用量	1回量を次のとおりとし，1日3回，食前又は空腹時に服用する。 大人（15才以上）1包1.5g，15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4を服用する。
効能又は効果	体力中等度以上で,，のぼせぎみで顔色赤く，いらいらして落ち着かない傾向のあるものの次の諸症：鼻出血，不眠症，神経症，胃炎，二日酔，血の道症，めまい，動悸，更年期障害，湿疹・皮膚炎，皮膚のかゆみ，口内炎
貯蔵方法及び 有効期間	密閉容器
規格及び試験方法	別記のとおり。
備考	黄連解毒散

規格及び試験方法

性　　状　本品は黄色の粉末で，特異なにおいがある。

確認試験

（1）　オウレン　本品の粉末2gにメタノール10mLを加え，還流冷却器を付け，水浴上で10分間加熱し，冷後，ろ過し，ろ液を試料溶液とする。

別に，「オウレン」の粉末1gをとり，試料溶液と同様に操作して，対照溶液とする。

これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び対照溶液10μLずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲルを用いて調製した薄層板にスポットする。次に1-ブタノール・水・酢酸（100）混液（7：2：1）を展開溶媒として約10cm展開した後，薄層板を風乾する。これに4-メトキシベンズアルデヒド・硫酸試液を均等に噴霧し，105℃で30分間加熱するとき，*Rf*値約0.16付近に黄色のスポットを認める。

（2）　オウゴン　本品の粉末2gにメタノール10mLを加え，還流冷却器を付け，水浴上で10分間加熱し，冷後，ろ過し，ろ液を試料溶液とする。

別に，「オウゴン」の粉末1gをとり，試料溶液と同様に操作して，対照溶液とする。

これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び対照溶液10μLずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲルを用いて調製した薄層板にスポットする。次にクロロホルム・メタノール混液（3：1）を展開溶媒として約10cm展開した後，薄層板を風乾する。これに塩化鉄（Ⅲ）試液を均等に噴霧するとき，*Rf*値約0.77付近に暗緑色のスポットを認める。

（３）　オウバク　本品の粉末2gにメタノール10mLを加え，還流冷却器を付け，水浴上で10分間加熱し，冷後，ろ過し，ろ液を試料溶液とする。

別に，「オウバク」の粉末1gをとり，試料溶液と同様に操作して，対照溶液とする。

これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び対照溶液10μLずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲルを用いて調製した薄層板にスポットする。次にクロロホルム・メタノール混液（3：1）を展開溶媒として約10cm展開した後，薄層板を風乾する。これに4‐メトキシベンズアルデヒド・硫酸試液を均等に噴霧し，105℃で30分間加熱するとき，*Rf*値約0.80付近に紫褐色のスポットを認める。

（４）　サンシシ　本品の粉末2gにメタノール10mLを加え，還流冷却器を付け，水浴上で10分間加熱し，冷後，ろ過し，ろ液を試料溶液とする。

別に，「サンシシ」の粉末1gをとり，試料溶液と同様に操作して，対照溶液とする。

これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び対照溶液10μLずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲルを用いて調製した薄層板にスポットする。次にクロロホルム・メタノール混液（3：1）を展開溶媒として約10cm展開した後，薄層板を風乾する。これに4‐メトキシベンズアルデヒド・硫酸試液を均等に噴霧し，105℃で30分間加熱するとき，*Rf*値約0.41付近に紫色のスポットを認める。

乾燥減量　15%以下。

灰　　分　6%以下。

【 205 】　K14

成分及び分量又は本質	日本薬局方	オウレン	3.0g
	〃	カンキョウ	3.0g
	〃	ケイヒ	3.0g
	〃	ハンゲ	5.0g
	〃	カンゾウ	3.0g
	〃	ニンジン	3.0g
	〃	タイソウ	3.0g
		全　　量	23.0g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。		
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。		
効能又は効果	体力中等度で，胃部の停滞感や重圧感，食欲不振があり，ときにはきけや嘔気のあるものの次の諸症：胃痛，急性胃炎，二日酔，口内炎		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	黄連湯		

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品1包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　オウレン　根茎の径は2～7mmで，外面は灰黄褐色～褐色を呈し，輪節及び多数の根の基部を認め，横断面はやや繊維性で，コルク層は淡灰褐色，皮部は黄褐色，木部は黄色，髄は黄褐色である。味は極めて苦く，残留性で，だ液を黄色に染める。

横切片を鏡検するとき，コルク層は薄膜のコルク細胞からなり，皮部柔組織中にはコルク層に近い部位に石細胞群，形成層に近い部位に黄色の師部繊維の認められるものが多い。木部は主として道管，仮道管，木部繊維からなり，放射組織は明らかで，髄は大きく，髄中には石細胞あるいは厚膜木化した細胞を伴った石細胞を認めることがある。柔細胞には細かいでんぷん粒を含むが，結晶を含まない。

必要に応じて，「オウレン」の確認試験を準用する。

（２）　カンキョウ　偏圧した不規則な塊状でしばしば分枝する。分枝した各部はやや湾曲した卵形又は長卵形を呈し，長さ 2～4cm，径 1～2cm である。外面は灰黄色～灰黄褐色で，しわ及び輪節がある。折面は褐色～暗褐色で透明感があり角質である。横切面をルーペ視するとき皮層と中心柱は区分され，全面に維管束が散在する。特異なにおいがあり，味は極めて辛い。

横切片を鏡検するとき，外側よりコルク層，皮層，内皮，中心柱が認められる。皮層と中心柱は一層の内皮によって区別される。皮層及び中心柱は柔組織からなり，繊維束で囲まれた維管束が散在する。柔組織中には黄色の油様物質を含む油細胞が散在し，柔細胞中にはシュウ酸カルシウムの単晶が含まれ，でんぷんは糊化している。

必要に応じて，「カンキョウ」の確認試験を準用する。

（３）　ケイヒ　外面は暗赤褐色を呈し，内面は赤褐色を呈し，平滑である。横断面は赤褐色を呈し淡褐色の薄層が見られる。特異なにおいがあり，味は甘く，辛く，後にやや粘液性で，わずかに収れん性である。

横切片を鏡検するとき，一次皮部と二次皮部はほとんど連続した石細胞環で区分され，環の外辺にはほぼ円形に結集した繊維束を伴い，環の各石細胞の膜はしばしばU字形に肥厚する。二次皮部中には石細胞を認めず，まばらに少数の厚膜繊維を認める。柔組織中には油細胞，粘液細胞及び微細なシュウ酸カルシウムの針晶を含む細胞があり，柔細胞中にはでんぷん粒を含む。

（４）　ハンゲ　外面は白色～灰白黄色，上部には茎の跡がくぼみとなり，その周辺には根の跡がくぼんだ細点となっている。横断面は白色，粉性である。味は初めなく，やや粘液性で，後に強いえぐ味を残す。

横切片を鏡検するとき，主としてでんぷん粒を充満した柔組織からなり，わずかにシュウ酸カルシウムの束晶を含んだ粘液細胞がその間に認められる。でんぷん粒は主として 2～3 個の複粒で，通例，径 10～15μm，単粒は通例径 3～7μm である。束晶は長さ 25～150μm である。

（５）　カンゾウ　外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現わす。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に 1～3 細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には 3～10 細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞中にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

（６）　ニンジン　外面は淡黄褐色～淡灰褐色を呈し，縦じわがあり，横断面は淡黄褐色を呈し，形成層の付近は褐色を呈する。特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後にやや苦い。

必要に応じて，「ニンジン」の確認試験を準用する。

（７）　タイソウ　外面は赤褐色であらいしわがあるか，又は暗灰赤色で細かいしわがあり，いずれもつやがある。外果皮は薄く革質で，中果皮は暗灰褐色を呈し，海綿ようで柔

らかく粘着性があり，内果皮は極めて堅く，種子は偏平である。わずかに特異なにおいがあり，味は甘い。

乾燥減量　15%以下。

灰　　分　5%以下。

【 206 】　K15

成分及び分量又は本質	日本薬局方	トウキ	6.0g
	〃	サイコ	5.0g
	〃	オウゴン	3.0g
	〃	カンゾウ	1.5～2.0g
	〃	ダイオウ	0.5g
	〃	ショウマ	1.5g
		全　　量	17.5～18.0g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。		
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。		
効能又は効果	体力中等度以上で，大便がかたく，便秘傾向のあるものの次の諸症：痔核（いぼ痔），きれ痔，便秘，軽度の脱肛		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	乙字湯		

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は芳香性のにおいがある。

確認試験　本品1包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　トウキ　外面は暗褐色～赤褐色で，縦じわがあり，切断面は淡黄色～黄褐色を呈する。特異なにおいがあり，味はわずかに甘く，後にやや辛い。

横切片を鏡検するとき，コルク層は4～10層からなり，その内側に数層の厚角組織が続いている。皮部には分泌細胞に囲まれた多数の樹脂道並びにしばしば大きなすき間がある。形成層は長方形に偏圧された数層の細胞からなり，明らかに皮部と木部とを区別する。木部では多数の道管と放射組織とが交互に放射状に配列し，その外方の道管は単独又は数個集まってやや密に配列してくさび状をなすが，中心部付近の道管は極めてまばらに存在する。でんぷん粒は径19μm以下，まれに2～5個の複粒があり，複粒の径は25μmに達し，しばしばのり化している。

（２）　サイコ　外面は灰褐色～褐色で，深いしわがあるものがあり，横断面では，皮部は褐色，木部は淡褐色を呈する。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，皮部にはしばしば接線方向に長い裂け目があり，皮部の厚さは半径の 1/3～1/2 で，径 15～35μm の胞間性離生油道がやや多数散在し，木部には道管が放射状若しくはほぼ階段状に配列し，ところどころに繊維群があり，根頭部の髄には皮部と同様の油道がある。柔細胞中にはでんぷん粒を満たし，また油滴を認める。

必要に応じて，「サイコ」の確認試験を準用する。

（３）　オウゴン　外面は黄褐色～暗褐色を呈し，切断面は黄色～帯褐黄色を呈し，縦に繊維性のすじが見られる。味はわずかに苦い。

必要に応じて，「オウゴン」の確認試験を準用する。

（４）　カンゾウ　外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現わす。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に 1～3 細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には 3～10 細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞中にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

（５）　ダイオウ　暗褐色～黄褐色～淡褐色を呈し，ルーペ視すると入り組んだ不規則な模様がある。質はおおむね粗で繊維性ではない。特異なにおいがあり，味はわずかに渋くて苦い。かめば細かい砂をかむような感じがあり，だ液を黄色に染める。

必要に応じて，「ダイオウ」の確認試験を準用する。

（６）　ショウマ　外面は暗褐色を呈し，切断面では木部は淡褐色～灰褐色繊維性で，網目状を呈する。質は軽い。味は苦くてわずかに渋い。

乾燥減量　10%以下。

灰　　分　10%以下。

【 207 】　K16

成分及び分量又は本質	日本薬局方	ニンジン	4.0g
	〃	ビャクジュツ	4.0g
	〃	ブクリョウ	4.0g
	〃	ハンゲ	4.0g
	〃	チンピ	2.0g
	〃	タイソウ	2.0g
	別紙規格	シンキク	2.0g
	日本薬局方	バクガ	2.0g
	〃	サンザシ	2.0g
	〃	シュクシャ	1.5g
	〃	ショウキョウ	1.0g
	〃	カンゾウ	1.0g
		全　量	29.5g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。		
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，熱いうちに煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。 本剤は必ず1日分ずつ煎じ，数日分をまとめて煎じないこと。		
効能又は効果	体力中等度以下で，胃腸が弱く，食欲がなく，みぞおちがつかえ，疲れやすいものの次の症状：胃炎，胃腸虚弱，胃下垂，消化不良，食欲不振，胃痛，嘔吐		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	化食養脾湯		

規格及び試験方法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品1包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（１）　ニンジン　外面は淡黄褐色～淡灰褐色を呈し，縦じわがあり，横断面は淡黄褐色を呈し，形成層の付近は褐色を呈する。特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後にやや苦い。

必要に応じて，「ニンジン」の確認試験を準用する。

（２）　ビャクジュツ　外面は淡灰黄色～淡黄白色で，ところどころ灰褐色を呈し，横切面には淡黄褐色～褐色の分泌物による細点がある。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，皮部の柔組織中にはしばしば師部の外側に接して繊維束があり，放射組織の末端部には淡褐色～褐色の内容物を含む油室がある。木部には大きい髄を囲んで放射状に配列した短径の道管とそれを囲む著しい繊維束がある。髄及び放射組織中には皮部と同様な油室があり，柔組織中にはイヌリンの結晶及びシュウ酸カルシウムの小針晶を含む。

必要に応じて，「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。

（３）　ブクリョウ　白色又はわずかに淡赤色を帯びた白色である。外層が残存するものは暗褐色～暗赤褐色で，きめがあらく，裂け目がある。質は堅いが砕きやすい。味はないがやや粘液ようである。

必要に応じて，「ブクリョウ」の確認試験を準用する。

（４）　ハンゲ　外面は白色～灰白黄色，上部には茎の跡がくぼみとなり，その周辺には根の跡がくぼんだ細点となっている。横断面は白色，粉性である。味は初めなく，やや粘液性で，後に強いえぐ味を残す。

横切片を鏡検するとき，主としてでんぷん粒を充満した柔組織からなり，わずかにシュウ酸カルシウムの束晶を含んだ粘液細胞がその間に認められる。でんぷん粒は主として 2～3 個の複粒で，通例，径 10～15μm，単粒は通例径 3～7μm である。束晶は長さ 25～150μm である。

（５）　チンピ　外面は黄赤色～暗黄褐色で，油室による多数の小さいくぼみがあり，内面は白色～淡灰黄褐色である。質は軽くてもろい。特異な芳香があり，味は苦くて，わずかに刺激性である。

必要に応じて，「チンピ」の確認試験を準用する。

（６）　タイソウ　外面は赤褐色であらいしわがあるか，又は暗灰赤色で細かいしわがあり，いずれもつやがある。外果皮は薄く革質で，中果皮は暗灰褐色を呈し，海綿ようで柔らかく粘着性があり，内果皮は極めて堅く，種子は偏平である。わずかに特異なにおいがあり，味は甘い。

（７）　シンキク　灰黄色～褐色の不整の塊片もしくはブロック状の塊状である。表面は粗く，平滑でなく，ところどころに暗赤色の粒が認められる。わずかに発酵臭があり，味はわずかに甘い。

（８）　バクガ　卵形を呈し，長さ約 10mm，径 3～4mm で，片面に縦に腹溝が認められる。外面は淡黄色を呈し，幼芽を伴うことがあり，他端には毛があり，根をつけることがある。えい果の横切面は白色，粉性であり，質はつぶれやすく，軽い。わずかににおいがあり，味はわずかに甘い。

えい果の横切片を鏡検するとき，外側からえい（穎），果皮，種皮，内乳が認められる。内乳の周辺部には 2～4 層のアリューロン層を認め，内乳の内側にはでんぷん粒が充満し

ている。でんぷん粒は，円形～楕円形で，径約 20μm と径約 2μm の大小が混在している。

必要に応じて，「バクガ」の確認試験を準用する。

（９） サンザシ ほぼ球状で，径 8～14mm である。外面は黄褐色～灰褐色を呈し，細かい網目状のしわがあり，一端には径 4～6mm のくぼみがあって，その周辺にはしばしばがくの基部が残存し，他端には短い果柄又はその残基がある。真果は通例 5 室でしばしば 5 個に分裂する。この分果の長さは 5～8mm，淡褐色を呈し，通例，各々1 個の種子を含む。ほとんどにおいがなく，わずかに酸味がある。

中央部の横切片を鏡検するとき，最外層は比較的厚いクチクラ層で覆われた表皮からなる。クチクラは表皮細胞の側壁まで入り込みくさび状を呈する。表皮細胞及びその直下の 2～3 層の柔細胞中には黄褐色～赤褐色の内容物が認められる。その内側は柔組織からなり，維管束が散在し，単独又は 2～数個集まった石細胞が多数出現する。シュウ酸カルシウムの集晶及び単晶が認められる。真果の果皮は主として厚壁細胞よりなる。種子は種皮で覆われ，その内側に周乳，内乳，子葉を認める。真果の果皮の厚壁細胞中及び種皮の細胞中にシュウ酸カルシウム単晶が認められる。

必要に応じて，「サンザシ」の確認試験を準用する。

（10） シュクシャ ほぼ球形又はだ円形を呈し，長さ 1～1.5cm，径 0.8～1cm，外面は灰褐色～暗褐色を呈し，石灰を散布して乾燥したものは白粉を付けている。種子塊は薄い膜で三部に分かれ，各部には仮種皮によって接合する 10～20 粒の種子がある。種子は多角形の粒状で，長さ 0.3～0.5cm，径約 0.3cm，外面には暗褐色で多数の細かい突起があり，質は堅い。種子を縫線に沿って縦断し，ルーペ視するとき，切面は細長く，へそは深くくぼみ，合点はややくぼんでいる。外乳は白色で，淡黄色の内乳及び胚を包み，胚は細長い。かめば特異な芳香があり，味は辛い。

（11） ショウキョウ 淡灰黄色の周皮を付けたままか，又はその一部をはぎとってあり，表面は灰白色～淡灰褐色で，しばしば白粉を付けている。横断面は繊維性，粉性で，淡黄褐色を呈し，皮層と中心柱とに分かれる。横断面をルーペ視するとき，その全面に維管束及び分泌物が暗褐色の細点として散在している。特異なにおいがあり，味は極めて辛い。

（12） カンゾウ 外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現わす。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に 1～3 細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には 3～10 細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞中にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

乾燥減量 14%以下。

灰　　分 4%以下。

別紙規格　　シンキクの規格及び試験方法

本品は通例白麹（又は小麦粉），赤小豆，杏仁，青蒿汁，蒼茸汁，野蓼汁を混合したものを圧縮して成型し，数日間発酵させた後，乾燥したものである。

性　　状　本品は灰黄色～褐色の不整の塊片もしくはブロック状の塊状である。表面は粗く，平滑でなく，ところどころに暗赤色の粒が認められる。本品はわずかに発酵臭があり，味はわずかに甘い。

確認試験　（１）　本品の粉末 2.0g に水 10mL を加え，水浴上で 5 分間加温した後，ろ過する。ろ液にヨウ素試液 1 滴を加えるとき，液は赤紫色を呈する。

（２）　本品の粉末 2.0g に水 20mL を加え，水浴中で 2～3 分加熱した後，ろ過する。ろ液 4mL にフェーリング試液 2mL を加え，水浴中で加熱するとき赤色の沈殿を生じる。

純度試験　（１）　重金属　本品 1.0g をとり，重金属試験法，第 3 法により操作し，試験を行う。比較液には鉛標準液 2.0mL を加える（20ppm 以下）。

（２）　ヒ素　本品 1.0g をとり，ヒ素試験法，第 3 法により検液を調製し，装置 B を用いる方法により操作し，試験を行う（2ppm 以下）。

乾燥減量　15%以下（2g，105℃，6 時間）。

灰　　分　7%以下。

酸不溶性灰分　2%以下。

エキス含量　希エタノールエキス 8%以上。

【 208 】　K17

成分及び分量 又は本質	日本薬局方	ビャクジュツ	3.0g
	〃	ブクリョウ	3.0g
	〃	チンピ	2.0g
	〃	ビャクシ	1.0g
	〃	カッコウ	1.0g
	〃	タイソウ	2.0g
	〃	カンゾウ	1.0g
	〃	ハンゲ	3.0g
	〃	コウボク	2.0g
	〃	キキョウ	1.5g
	〃	ソヨウ	1.0g
	局外生規	ダイフクヒ	1.0g
	日本薬局方	ショウキョウ	1.0g
		全　量	22.5g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。		
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。		
効能又は効果	体力中等度以下のものの次の諸症：感冒，暑さによる食欲不振，急性胃腸炎，下痢，全身倦怠		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	藿香正気散料		

規格及び試験方法

性　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品1包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　ビャクジュツ　外面は淡灰黄色～淡黄白色で，ところどころ灰褐色を呈し，横切面には淡黄褐色～褐色の分泌物による細点がある。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，皮部の柔組織中にはしばしば師管の外側に接して繊維束があり，放射組織の末端部には淡褐色～褐色の内容物を含む油室がある。木部には大きい髄を囲んで放射状に配列した短径の道管とそれを囲む著しい繊維束がある。髄及び放射組織中には皮部と同様な油室があり，柔組織中にはイヌリンの小球晶及びシュウ酸カルシウムの針晶を含む。

必要に応じて，「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。

（2）　ブクリョウ　白色又はわずかに淡赤色を帯びた白色で，質は堅いが砕きやすい。味はないがやや粘液ようである。

必要に応じて，「ブクリョウ」の確認試験を準用する。

（3）　チンピ　外面は黄赤色～暗黄褐色で，油室による多数の小さいくぼみがあり，内面は白色～淡灰黄褐色である。厚さ約 2mm で，質は軽くてもろい。芳香があり，味は苦くて，わずかに刺激性である。

必要に応じて，「チンピ」の確認試験を準用する。

（4）　ビャクシ　外面は灰褐色～暗褐色を呈し，縦じわがあり，横断面の周辺は灰白色で空げきが多く，中央部は暗褐色である。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

必要に応じて，「ビャクシ」の確認試験を準用する。

（5）　カッコウ　茎及びこれに対生した葉からなる。葉はしわがよって縮み，水に浸してしわを伸ばすと，卵形～卵状長楕円形を呈し，長さ 2.5～10cm，幅 2.5～7cm，辺縁に鈍きょ歯があり，基部は広いくさび形で葉柄を付ける。葉の上面は暗褐色，下面は灰褐色を呈し，両面に密に毛がある。茎は方柱形，中実で，表面は灰緑色を呈し，灰白色～黄白色の毛があり，髄は大きく，類白色で海綿状を呈する。ルーペ視するとき，毛，腺毛及び腺りんを認める。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

葉柄の横切片を鏡検するとき，向軸面中央は大きく突出し，その表皮の内側に厚角細胞が認められる。中央部の維管束は 2 群に分かれる。葉身主脈部の横切片を鏡検するとき，主脈の向軸面は大きく突出し，その表皮の内側に厚角細胞が認められる。中央部には扇状に配列した維管束がある。茎の横切片を鏡検するとき，表皮の内側に数細胞層の厚角組織が認められる。ときに表皮下にコルク層が発達することがある。皮層の内側には並立維管束が環状に配列し，師部の外側に師部繊維群が認められる。皮層の柔細胞中に油滴が，髄の柔細胞中にシュウ酸カルシウムの針晶，単晶又は柱状晶が認められる。

必要に応じて，「カッコウ」の確認試験を準用する。

（6）　タイソウ　外面は赤褐色であらいしわがあるか，又は暗灰赤色で細かいしわがあり，いずれもつやがある。外果皮は薄く革質で，中果皮は暗灰褐色を呈し，海綿ようで柔らかく粘着性があり，内果皮は極めて堅く，種子は偏平である。わずかに特異なにおいがあり，味は甘い。

（7）　カンゾウ　外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現わす。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に 1～3 細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部

には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には 3～10 細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞中にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

（８）　ハンゲ　外面は白色～灰白黄色，上部には茎の跡がくぼみとなり，その周辺には根の跡がくぼんだ細点となっている。横断面は白色，粉性である。味は初めなく，やや粘液性で，後に強いえぐ味を残す。

横切片を鏡検するとき，主としてでんぷん粒を充満した柔組織からなり，わずかにシュウ酸カルシウムの束晶を含んだ粘液細胞がその間に認められる。でんぷん粒は主として 2～3 個の複粒で，通例，径 10～15μm，単粒は通例径 3～7μm である。束晶は長さ 25～150μm である。

（９）　コウボク　外面は灰白色～灰褐色を呈し，内面は淡褐色～褐色，切断面は淡赤褐色を呈し，繊維性である。わずかに芳香があり，味は苦い。

横切片を鏡検するとき，コルク層は厚く，ほぼ等径性の石細胞が環状に内接する。一次皮部は狭く，内しょう部には繊維群が点在し，二次皮部の放射組織間には師部繊維群が階段状に並ぶ。油細胞の多数は一次皮部に，少数は二次皮部に散在し，狭い放射組織内にも認められることがある。

必要に応じて，「コウボク」の確認試験を準用する。

（10）　キキョウ　外面は皮付きは灰褐色，皮去りは白色～淡褐色を呈し，繊維性でない。横切面をルーペ視するとき，皮部は木部よりやや薄く，ほとんど白色で，ところどころにすき間があり，形成層の付近はしばしば褐色を帯びる。木部は白色～淡褐色を呈し，その組織は皮部よりもやや密である。味は初めなく，後にえぐくて苦い。

必要に応じて，「キキョウ」の確認試験を準用する。

（11）　ソヨウ　縮んだ葉の細片で，両面とも帯褐紫色，あるいは上面は灰緑色～帯褐緑色で下面は帯褐紫色を呈する。茎を交じえるものは，その横断面は方形である。葉をルーペ視するとき，両面にまばらに毛を認め，特に葉脈上に多く，裏面には細かい腺毛を認める。もみ砕くとき，特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

必要に応じて，「ソヨウ」の確認試験を準用する。

（12）　ダイフクヒ　淡灰褐色～暗褐色の繊維群を主とする。ルーペ視すると，繊維群が淡褐色～暗褐色の点として認められる。味はわずかに渋い。

必要に応じて，局外生規「ダイフクヒ」の確認試験を準用する。

（13）　ショウキョウ　淡灰黄色の周皮を付けたままか，又はその一部をはぎとってあり，表面は灰白色～淡灰褐色で，しばしば白粉を付けている。横断面は繊維性，粉性で，淡帯黄褐色を呈し，皮層と中心柱とに分かれる。横断面をルーペ視するとき，その全面に維管束及び分泌物が褐色の細点として散在している。特異なにおいがあり，味は極めて辛い。

乾燥減量　15％以下。

灰　　分　5％以下。

【 209 】　K18

成分及び分量 又は本質	日本薬局方　カッコン　6.0g 〃　オウレン　3.0g 〃　オウゴン　3.0g 〃　カンゾウ　2.0g 全　量　14.0g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。
効能又は効果	体力中等度のものの次の諸症：下痢，急性胃腸炎，口内炎，舌炎，肩こり，不眠
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器
規格及び試験方法	別記のとおり。
備考	葛根黄連黄芩湯

規格及び試験方法

性　状　本品は弱い特異なにおいがある。

確認試験　本品1包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　カッコン　淡灰黄色～灰白色を呈し，繊維性でやや粉性である。味はわずかに甘い。横切片を鏡検するとき，師部には結晶細胞列を伴った繊維束，木部には道管及び木部繊維が著しく，柔組織を満たすでんぷん粒は長径2～18μm，多くは8～12μmの数面からなる多面体の単粒，まれに2～3個からなる複粒で，中央にへそ又は欠裂を認め，層紋がある。

（2）　オウレン　根茎の径は2～7mmで，外面は灰黄褐色～褐色を呈し，輪節及び多数の根の基部を認め，横断面はやや繊維性で，コルク層は淡灰褐色，皮部は黄褐色，木部は黄色，髄は黄褐色である。味は極めて苦く，残留性で，だ液を黄色に染める。

横切片を鏡検するとき，コルク層は薄膜のコルク細胞からなり，皮部柔組織中にはコルク層に近い部位に石細胞群，形成層に近い部位に黄色の師部繊維の認められるものが多い。木部は主として道管，仮道管，木部繊維からなり，放射組織は明らかで，髄は大きく，髄中には石細胞あるいは厚膜木化した細胞を伴った石細胞を認めることがある。柔細胞には細かいでんぷん粒を含むが，結晶を含まない。

必要に応じて，「オウレン」の確認試験を準用する。

（３）　オウゴン　外面は黄褐色～暗褐色を呈し，切断面は黄色～帯褐黄色を呈し，縦に繊維性のすじが見られる。味はわずかに苦い。

必要に応じて，「オウゴン」の確認試験を準用する。

（４）　カンゾウ　外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現わす。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に 1～3 細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には 3～10 細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞中にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

乾燥減量　10%以下。

灰　　分　10%以下。

【 210 】　K19

成分及び分量又は本質	日本薬局方	カッコン	3.0g
	〃	ジオウ	3.0g
	〃	シャクヤク	3.0g
	〃	オウレン	1.5g
	〃	サンシシ	1.5g
	〃	コウカ	1.5g
	〃	カンゾウ	1.0g
	〃	ダイオウ	1.0g
		全　　量	15.5g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。		
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。		
効能又は効果	体力中等度以上で，便秘傾向のものの次の諸症：あかはな（酒さ），しみ		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	葛根紅花湯		

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品1包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　カッコン　淡灰黄色～灰白色を呈し，繊維性でやや粉性である。味はわずかに甘い。横切片を鏡検するとき，師部には結晶細胞列を伴った繊維束，木部には道管及び木部繊維が著しく，柔組織を満たすでんぷん粒は長径2～18μm，多くは8～12μmの数面からなる多面体の単粒，まれに2～3個からなる複粒で，中央にへそ又は欠裂を認め，層紋がある。

（２）　ジオウ　外面は黄褐色～黒褐色を呈し，深い縦みぞ及びくびれがある。質は柔らかく粘性である。横断面は黄褐色～黒褐色で，皮部は木部より色が濃く，ほとんど髄を認めない。特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後にやや苦い。

横切片を鏡検するとき，コルク層は 7～15 層で，皮部はすべて柔細胞からなり，外皮部に褐色の分泌物を含む細胞が散在する。木部はほとんど柔細胞で満たされ，放射状に並ぶ道管は側孔のある網紋があり，弱い木化反応を呈する。

（３）　シャクヤク　外面は褐色～淡灰褐色を呈し，横断面はち密で淡灰褐色を呈し，木部には淡褐色の放射状の線がある。わずかに特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後に渋くてわずかに苦い。

必要に応じて，「シャクヤク」の確認試験を準用する。

（４）　オウレン　根茎の径は 2～7mm で，外面は灰黄褐色～褐色を呈し，輪節及び多数の根の基部を認め，横断面はやや繊維性で，コルク層は淡灰褐色，皮部は黄褐色，木部は黄色，髄は黄褐色である。味は極めて苦く，残留性で，だ液を黄色に染める。

横切片を鏡検するとき，コルク層は薄膜のコルク細胞からなり，皮部柔組織中にはコルク層に近い部位に石細胞群，形成層に近い部位に黄色の師部繊維の認められるものが多い。木部は主として道管，仮道管，木部繊維からなり，放射組織は明らかで，髄は大きく，髄中には石細胞あるいは厚膜木化した細胞を伴った石細胞を認めることがある。柔細胞には細かいでんぷん粒を含むが，結晶を含まない。

必要に応じて，「オウレン」の確認試験を準用する。

（５）　サンシシ　果皮は薄く砕きやすく，その外面は赤褐色，黄褐色又は黒褐色を呈し，内面は黄褐色を呈し，平らでつやがある。果実の内部は 2 室に分かれ，黄赤色～暗赤色の果肉中に黒褐色又は黄赤色で長径約 5mm の偏平な種子の団塊を含む。質は軽い。特異なにおいがあり，味は苦い。

必要に応じて，「サンシシ」の確認試験を準用する。

（６）　コウカ　赤色～赤褐色の花冠，花柄，黄色の花柱及び雄しべからなり，全長は約 1cm，花冠は筒状で 5 裂し，雄しべは 5 本で，長い柱頭をもつ雌しべを囲んでいる。花粉はほぼ球形で，径約 50μm，黄色で表面に細かい突起がある。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

必要に応じて，「コウカ」の確認試験を準用する。

（７）　カンゾウ　外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現わす。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に 1～3 細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には 3～10 細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞中にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

（８）　ダイオウ　暗褐色～黄褐色～淡褐色を呈し，ルーペ視すると入り組んだ不規則な模様がある。質はおおむね粗で繊維性ではない。特異なにおいがあり，味はわずかに渋くて苦い。かめば細かい砂をかむような感じがあり，だ液を黄色に染める。

必要に応じて，「ダイオウ」の確認試験を準用する。

乾燥減量　15%以下。

灰　　分　6%以下。

【 211 】　K20

成分及び分量又は本質	日本薬局方	カッコン	8.0g
	〃	マオウ	3.0～4.0g
	〃	ショウキョウ	1.0g
	〃	タイソウ	4.0g
	〃	ケイヒ	3.0g
	〃	シャクヤク	3.0g
	〃	カンゾウ	2.0g
		全　　量	24.0～25.0g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。		
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。		
効能又は効果	体力中等度以上のものの次の諸症：感冒の初期（汗をかいていないもの），鼻かぜ，鼻炎，頭痛，肩こり，筋肉痛，手や肩の痛み		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	葛根湯		

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品1包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　カッコン　淡灰黄色～灰白色を呈し，繊維性でやや粉性である。味はわずかに甘い。横切片を鏡検するとき，師部には結晶細胞列を伴った繊維束，木部には道管及び木部繊維が著しく，柔組織を満たすでんぷん粒は長径2～18μm，多くは8～12μmの数面からなる多面体の単粒，まれに2～3個からなる複粒で，中央にへそ又は欠裂を認め，層紋がある。

（2）　マオウ　細い円柱状又はだ円柱を呈し，長さ3～10mm，径1～2mm，淡緑色～黄緑色である。表面に多数の平行する縦みぞがあり，節部には，長さ2～4mmの2枚のりん片状の葉が対生し，その基部は合着して筒状になっている。りん片状の葉の色は淡褐色～褐色である。茎の横断面をルーペ視するとき，円形～だ円形で，周囲部は灰緑色～黄緑

色を呈し，中心部には赤緑色の物質が充満しているか，又は中空のところがある。味は渋くてわずかに苦く，やや麻ひ性である。

必要に応じて，「マオウ」の確認試験を準用する。

（３）　ショウキョウ　淡灰黄色の周皮を付けたままか，又はその一部をはぎとってあり，表面は灰白色～淡灰褐色で，しばしば白粉を付けている。横断面は繊維性，粉性で，淡帯黄褐色を呈し，皮層と中心柱とに分かれる。横断面をルーペ視するとき，その全面に維管束及び分泌物が褐色の細点として散在している。特異なにおいがあり，味は極めて辛い。

（４）　タイソウ　外面は赤褐色であらいしわがあるか，又は暗灰赤色で細かいしわがあり，いずれもつやがある。外果皮は薄く革質で，中果皮は暗灰褐色を呈し，海綿ようで柔らかく粘着性があり，内果皮は極めて堅く，種子は偏平である。わずかに特異なにおいがあり，味は甘い。

（５）　ケイヒ　外面は暗赤褐色を呈し，内面は赤褐色を呈し，平滑である。横断面は赤褐色を呈し淡褐色の薄層が見られる。特異なにおいがあり，味は甘く，辛く，後にやや粘液性で，わずかに収れん性である。

横切片を鏡検するとき，一次皮部と二次皮部はほとんど連続した石細胞環で区分され，環の外辺にはほぼ円形に結集した繊維束を伴い，環の各石細胞の膜はしばしばU字形に肥厚する。二次皮部中には石細胞を認めず，まばらに少数の厚膜繊維を認める。柔組織中には油細胞，粘液細胞及び微細なシュウ酸カルシウムの針晶を含む細胞があり，柔細胞中にはでんぷん粒を含む。

（６）　シャクヤク　外面は褐色～淡灰褐色を呈し，横断面はち密で淡灰褐色を呈し，木部には淡褐色の放射状の線がある。わずかに特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後に渋くてわずかに苦い。

必要に応じて，「シャクヤク」の確認試験を準用する。

（７）　カンゾウ　外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現わす。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に 1～3 細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には 3～10 細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞中にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

乾燥減量　15%以下。

灰　　分　5%以下。

【 212 】　K21

成分及び分量又は本質	日本薬局方	カッコン	4.0g
	〃	マオウ	3.0～4.0g
	〃	ショウキョウ	0.3g
	〃	タイソウ	3.0g
	〃	ケイヒ	2.0g
	〃	シャクヤク	2.0g
	〃	カンゾウ	2.0g
	〃	センキュウ	3.0g
	〃	シンイ	3.0g
		全　量	22.3～23.3g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。		
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。		
効能又は効果	比較的体力があるものの次の諸症：鼻づまり，蓄膿症（副鼻腔炎），慢性鼻炎		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	葛根湯加川芎辛夷		

規格及び試験方法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品1包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　カッコン　淡灰黄色～灰白色を呈し，繊維性でやや粉性である。味はわずかに甘い。横切片を鏡検するとき，師部には結晶細胞列を伴った繊維束，木部には道管及び木部繊維が著しく，柔組織を満たすでんぷん粒は長径2～18μm，多くは8～12μmの数面からなる多面体の単粒，まれに2～3個からなる複粒で，中央にへそ又は欠裂を認め，層紋がある。

（２）　マオウ　細い円柱状又はだ円柱を呈し，長さ 3～10mm，径 1～2mm，淡緑色～黄緑色である。表面に多数の平行する縦みぞがあり，節部には，長さ 2～4mm の 2 枚のりん片状の葉が対生し，その基部は合着して筒状になっている。りん片状の葉の色は淡褐色～褐色である。茎の横断面をルーペ視するとき，円形～だ円形で，周囲部は灰緑色～黄緑色を呈し，中心部には赤緑色の物質が充満しているか，又は中空のところがある。味は渋くてわずかに苦く，やや麻ひ性である。

必要に応じて，「マオウ」の確認試験を準用する。

（３）　ショウキョウ　淡灰黄色の周皮を付けたままか，又はその一部をはぎとってあり，表面は灰白色～淡灰褐色で，しばしば白粉を付けている。横断面は繊維性，粉性で，淡帯黄褐色を呈し，皮層と中心柱とに分かれる。横断面をルーペ視するとき，その全面に維管束及び分泌物が褐色の細点として散在している。特異なにおいがあり，味は極めて辛い。

（４）　タイソウ　外面は赤褐色であらいしわがあるか，又は暗灰赤色で細かいしわがあり，いずれもつやがある。外果皮は薄く革質で，中果皮は暗灰褐色を呈し，海綿ようで柔らかく粘着性があり，内果皮は極めて堅く，種子は偏平である。わずかに特異なにおいがあり，味は甘い。

（５）　ケイヒ　外面は暗赤褐色を呈し，内面は赤褐色を呈し，平滑である。横断面は赤褐色を呈し淡褐色の薄層が見られる。特異なにおいがあり，味は甘く，辛く，後にやや粘液性で，わずかに収れん性である。

横切片を鏡検するとき，一次皮部と二次皮部はほとんど連続した石細胞環で区分され，環の外辺にはほぼ円形に結集した繊維束を伴い，環の各石細胞の膜はしばしばU字形に肥厚する。二次皮部中には石細胞を認めず，まばらに少数の厚膜繊維を認める。柔組織中には油細胞，粘液細胞及び微細なシュウ酸カルシウムの針晶を含む細胞があり，柔細胞中にはでんぷん粒を含む。

（６）　シャクヤク　外面は褐色～淡灰褐色を呈し，横断面はち密で淡灰褐色を呈し，木部には淡褐色の放射状の線がある。わずかに特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後に渋くてわずかに苦い。

必要に応じて，「シャクヤク」の確認試験を準用する。

（７）　カンゾウ　外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現わす。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に 1～3 細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には 3～10 細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞中にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

（８）　センキュウ　外面は灰褐色～暗褐色で，切断面は灰白色～灰褐色，半透明で，ときにはうつろがある。質は密で堅い。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，皮部及び髄には油道が散在する。木部には厚膜で木化した木部繊維が大小不同の群をなして存在する。でんぷん粒は，通例，のり化していて，まれに径 5～25μm のでんぷん粒を認めることがある。シュウ酸カルシウム結晶は認めない。

（９）　シンイ　紡錘形を呈し，長さ 15～45mm，中央の径 6～20mm，基部にしばしば木質の花柄を付ける。ほう葉は，通例，3 枚で，外面には毛がまばらにあって褐色～暗褐色を呈するか，又は密毛があって灰白色～淡黄褐色を呈し，内面は平滑で暗褐色を呈する。内部に 9 枚又は 12 枚の花被片があり，花被片は同形又は外側の 3 枚が小さい。雄ずいは 50～100 本あり，雌ずいも多数ある。質はもろい。特有のにおいがあり，味は辛くて，やや苦い。

必要に応じて，「シンイ」の確認試験を準用する。

乾燥減量　15%以下。

灰　　分　5%以下。

【 213 】　K22

成分及び分量 又は本質	日本薬局方	ハンゲ	5.0g
	〃	ブクリョウ	4.0g
	〃	チンピ	3.0g
	局外生規	チクジョ	3.0g
	日本薬局方	サンソウニン	2.0g
	局外生規	ゲンジン	2.0g
	日本薬局方	オンジ	2.0g
	〃	ニンジン	2.0g
	〃	ジオウ	2.0g
	〃	タイソウ	2.0g
	〃	キジツ	2.0g
	〃	ショウキョウ	2.0g
	〃	カンゾウ	1.0～2.0g
		全　量	32.0～33.0g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。		
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。		
効能又は効果	体力中等度以下で，胃腸が虚弱なものの次の諸症：神経症，不眠症		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	加味温胆湯		

規格及び試験方法

性　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品1包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（１）　ハンゲ　外面は白色～灰白黄色，上部には茎の跡がくぼみとなり，その周辺には根の跡がくぼんだ細点となっている。横断面は白色，粉性である。味は初めなく，やや粘液性で，後に強いえぐ味を残す。

横切片を鏡検するとき，主としてでんぷん粒を充満した柔組織からなり，わずかにシュウ酸カルシウムの束晶を含んだ粘液細胞がその間に認められる。でんぷん粒は主として 2～3 個の複粒で，通例，径 10～15μm，単粒は通例径 3～7μm である。束晶は長さ 25～150μm である。

（２）　ブクリョウ　白色又はわずかに淡赤色を帯びた白色で，質は堅いが砕きやすい。味はないがやや粘液ようである。

必要に応じて，「ブクリョウ」の確認試験を準用する。

（３）　チンピ　外面は黄赤色～暗黄褐色で，油室による多数の小さいくぼみがあり，内面は白色～淡灰黄褐色である。厚さ約 2mm で，質は軽くてもろい。芳香があり，味は苦くて，わずかに刺激性である。

必要に応じて，「チンピ」の確認試験を準用する。

（４）　チクジョ　淡緑黄色～淡黄白色～灰白色を呈し，通例つやがある。質は軽く繊維性である。味はやや苦い。

必要に応じて，局外生規「チクジョ」の確認試験を準用する。

（５）　サンソウニン　扁平な卵形～円形でレンズ状を呈し，長さ 5～9mm，幅 4～6mm，厚さ 2～3mm，外面は褐色～暗赤褐色を呈し，つやがある。一端にはへそ，他端には合点がある。種皮はやや柔軟で，乳白色の内乳及び淡黄色の胚を包む。100 粒の質量は 3.0～4.5g である。わずかな油臭があり，緩和でやや油様である。

横切片を鏡検するとき，種皮は外側の表皮，柔組織，内側の表皮からなる。外側の表皮は放射方向に長く厚壁化した細胞からなり，内側の表皮にはクチクラが認められる。内乳は柔組織からなり，シュウ酸カルシウムの集晶，アリューロン粒，でんぷん粒を含む。子葉は柔組織からなり，アリューロン粒，でんぷん粒，油滴を含む。

必要に応じて，「サンソウニン」の確認試験を準用する。

（６）　ゲンジン　外面は黄褐色～褐色を呈し，切断面は黒褐色を呈する。特異なにおいがあり，味はやや甘く，後わずかに苦い。

必要に応じて，局外生規「ゲンジン」の確認試験を準用する。

（７）　オンジ　外側面は淡灰褐色で横切されたものは径 2～10mm。皮部の厚さは木部の径とほぼ等しいか又は木部の径の約 1/2 で淡灰褐色を呈し，ところどころに大きな裂け目がある。木部は円形～だ円形で淡褐色を呈する。味はわずかにえぐい。

必要に応じて，「オンジ」の確認試験を準用する。

（８）　ニンジン　外面は淡黄褐色～淡灰褐色を呈し，縦じわがあり，横断面は淡黄褐色を呈し，形成層の付近は褐色を呈する。特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後にやや苦い。

必要に応じて，「ニンジン」の確認試験を準用する。

（９）　ジオウ　外面は黄褐色～黒褐色を呈し，深い縦みぞ及びくびれがある。質は柔らかく粘性である。横断面は黄褐色～黒褐色で，皮部は木部より色が濃く，ほとんど髄を認めない。特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後にやや苦い。

横切片を鏡検するとき，コルク層は 7～15 層で，皮部はすべて柔細胞からなり，外皮部に褐色の分泌物を含む細胞が散在する。木部はほとんど柔細胞で満たされ，放射状に並ぶ道管は側孔のある網紋があり，弱い木化反応を呈する。

(10)　タイソウ　外面は赤褐色であらいしわがあるか，又は暗灰赤色で細かいしわがあり，いずれもつやがある。外果皮は薄く革質で，中果皮は暗灰褐色を呈し，海綿ようで柔らかく粘着性があり，内果皮は極めて堅く，種子は偏平である。わずかに特異なにおいがあり，味は甘い。

(11)　キジツ　外面は濃緑褐色～褐色で，つやがなく，油室による多数のくぼんだ細点がある。切断面は淡灰褐色を呈し，内果皮を付ける部分は褐色を呈する。特異なにおいがあり，味は苦い。

必要に応じて，「キジツ」の確認試験を準用する。

(12)　ショウキョウ　淡灰黄色の周皮を付けたままか，又はその一部をはぎとってあり，表面は灰白色～淡灰褐色で，しばしば白粉を付けている。横断面は繊維性，粉性で，淡帯黄褐色を呈し，皮層と中心柱とに分かれる。横断面をルーペ視するとき，その全面に維管束及び分泌物が褐色の細点として散在している。特異なにおいがあり，味は極めて辛い。

(13)　カンゾウ　外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現わす。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に 1～3 細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には 3～10 細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞中にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

乾燥減量　10%以下。

灰　　分　5%以下。

【 214 】　K23

成分及び分量 又は本質	日本薬局方	ニンジン	3.0g
	〃	ブクリョウ	3.0g
	〃	リュウガンニク	3.0g
	〃	トウキ	2.0g
	〃	サイコ	3.0g
	〃	カンゾウ	1.0g
	〃	タイソウ	2.0g
	〃	ショウキョウ	0.5g
	〃	ビャクジュツ	3.0g
	〃	サンソウニン	3.0g
	〃	オウギ	3.0g
	〃	オンジ	2.0g
	〃	サンシシ	2.0g
	〃	モッコウ	1.0g
	〃	ボタンピ	2.0g
		全　量	33.5g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。		
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。		
効能又は効果	体力中等度以下で，心身が疲れ，血色が悪く，ときに熱感を伴うものの次の諸症：貧血，不眠症，精神不安，神経症		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	加味帰脾湯		

規格及び試験方法

性　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品 1 包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　ニンジン　外面は淡黄褐色～淡灰褐色を呈し，縦じわがあり，横断面は淡黄褐色を呈し，形成層の付近は褐色を呈する。特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後にやや苦い。

必要に応じて，「ニンジン」の確認試験を準用する。

（2）　ブクリョウ　白色又はわずかに淡赤色を帯びた白色で，質は堅いが砕きやすい。味はないがやや粘液ようである。

必要に応じて，「ブクリョウ」の確認試験を準用する。

（3）　リュウガンニク　偏圧された楕円体で，長さ 1～2cm，幅約 1cm である。黄赤褐色～黒褐色を呈し，質は柔らかくて粘性である。水に浸して放置するとき，鐘状を呈し，先端は数裂する。特異なにおいがあり，味は甘い。

横切片を鏡検するとき，仮種皮の最外層は 1 層の表皮からなり，その内側には偏圧された柔細胞からなる柔組織があり，最内層はやや厚壁化した表皮からなる。柔組織中には，赤褐色～褐色の内容物及びシュウ酸カルシウムの単晶，不定形の結晶及び砂晶を含む。

必要に応じて，「リュウガンニク」の確認試験を準用する。

（4）　トウキ　外面は暗褐色～赤褐色で，縦じわがあり，切断面は淡黄色～黄褐色を呈する。特異なにおいがあり，味はわずかに甘く，後にやや辛い。

横切片を鏡検するとき，コルク層は 4～10 層からなり，その内側に数層の厚角組織が続いている。皮部には分泌細胞に囲まれた多数の樹脂道並びにしばしば大きなすき間がある。形成層は長方形に偏圧された数層の細胞からなり，明らかに皮部と木部とを区別する。木部では多数の道管と放射組織とが交互に放射状に配列し，その外方の道管は単独又は数個集まってやや密に配列してくさび状をなすが，中心部付近の道管は極めてまばらに存在する。でんぷん粒は径 19μm 以下，まれに 2～5 個の複粒があり，複粒の径は 25μm に達し，しばしばのり化している。

（5）　サイコ　外面は灰褐色～褐色で，深いしわがあるものがあり，横断面では，皮部は褐色，木部は淡褐色を呈する。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，皮部にはしばしば接線方向に長い裂け目があり，皮部の厚さは半径の 1/3～1/2 で，径 15～35μm の胞間性離生油道がやや多数散在し，木部には道管が放射状若しくはほぼ階段状に配列し，ところどころに繊維群があり，根頭部の髄には皮部と同様の油道がある。柔細胞中にはでんぷん粒を満たし，また油滴を認める。

必要に応じて，「サイコ」の確認試験を準用する。

（6）　カンゾウ　外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現わす。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に 1～3 細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には 3～10 細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞中にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

（７）　タイソウ　外面は赤褐色であらいしわがあるか，又は暗灰赤色で細かいしわがあり，いずれもつやがある。外果皮は薄く革質で，中果皮は暗灰褐色を呈し，海綿ようで柔らかく粘着性があり，内果皮は極めて堅く，種子は偏平である。わずかに特異なにおいがあり，味は甘い。

（８）　ショウキョウ　淡灰黄色の周皮を付けたままか，又はその一部をはぎとってあり，表面は灰白色～淡灰褐色で，しばしば白粉を付けている。横断面は繊維性，粉性で，淡帯黄褐色を呈し，皮層と中心柱とに分かれる。横断面をルーペ視するとき，その全面に維管束及び分泌物が褐色の細点として散在している。特異なにおいがあり，味は極めて辛い。

（９）　ビャクジュツ　外面は淡灰黄色～淡黄白色で，ところどころ灰褐色を呈し，横切面には淡黄褐色～褐色の分泌物による細点がある。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，皮部の柔組織中にはしばしば師管の外側に接して繊維束があり，放射組織の末端部には淡褐色～褐色の内容物を含む油室がある。木部には大きい髄を囲んで放射状に配列した短径の道管とそれを囲む著しい繊維束がある。髄及び放射組織中には皮部と同様な油室があり，柔組織中にはイヌリンの小球晶及びシュウ酸カルシウムの針晶を含む。

必要に応じて，「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。

（10）　サンソウニン　扁平な卵形～円形でレンズ状を呈し，長さ 5～9mm，幅 4～6mm，厚さ 2～3mm，外面は褐色～暗赤褐色を呈し，つやがある。一端にはへそ，他端には合点がある。種皮はやや柔軟で，乳白色の内乳及び淡黄色の胚を包む。100 粒の質量は 3.0～4.5g である。わずかな油臭があり，緩和でやや油様である。

横切片を鏡検するとき，種皮は外側の表皮，柔組織，内側の表皮からなる。外側の表皮は放射方向に長く厚壁化した細胞からなり，内側の表皮にはクチクラが認められる。内乳は柔組織からなり，シュウ酸カルシウムの集晶，アリューロン粒，でんぷん粒を含む。子葉は柔組織からなり，アリューロン粒，でんぷん粒，油滴を含む。

必要に応じて，「サンソウニン」の確認試験を準用する。

（11）　オウギ　外面は淡灰黄色～淡褐黄色で，不規則なあらい縦じわがあり，折面は繊維性である。横断面をルーペ視するとき，最外層には周皮があり，皮部は淡黄白色，木部は淡黄色，形成層付近はやや褐色を帯びる。木部から皮部にわたって白色の放射組織が認められる。太いものではしばしば多数の放射状の裂け目となっている。わずかに特異なにおいがあり，味は甘い。

（12）　オンジ　外側面は淡灰褐色で横切されたものは径 2～10mm。皮部の厚さは木部の径とほぼ等しいか又は木部の径の約 1/2 で淡灰褐色を呈し，ところどころに大きな裂け目がある。木部は円形～だ円形で淡褐色を呈する。味はわずかにえぐい。

必要に応じて，「オンジ」の確認試験を準用する。

（13）　サンシシ　果皮は薄く砕きやすく，その外面は赤褐色，黄褐色又は黒褐色を呈し，内面は黄褐色を呈し，平らでつやがある。果実の内部は 2 室に分かれ，黄赤色～暗赤色の果肉中に黒褐色又は黄赤色で長径約 5mm の偏平な種子の団塊を含む。質は軽い。特異なにおいがあり，味は苦い。

必要に応じて，「サンシシ」の確認試験を準用する。

（14）　モッコウ　外面は黄褐色～灰褐色で，あらい縦じわがある。横断面は黄褐色～暗褐色で，ルーペ視するとき，環状暗色の形成層が認められ，木部組織と放射組織が放射状の模様を呈し，ところどころに大きな裂け目と褐色の油室が散在している。特異なにおいがあり，味は苦い。

（15）　ボタンピ　外面は暗褐色～帯紫褐色，内面は淡灰褐色～暗紫色を呈する。内面及び切断面にはしばしば白色の結晶を付着する。特異なにおいがあり，味はわずかに辛くて苦い。

必要に応じて，「ボタンピ」の確認試験を準用する。

乾燥減量　15%以下。

灰　　分　5%以下。

【 215 】　K24

成分及び分量又は本質	日本薬局方　トウキ　3.0g 〃　ビャクジュツ　3.0g 〃　サイコ　3.0g 〃　サンシシ　2.0g 〃　ショウキョウ　1.0g 〃　シャクヤク　3.0g 〃　ブクリョウ　3.0g 〃　ボタンピ　2.0g 〃　カンゾウ　1.5g 〃　ハッカ　1.0g 全　量　22.5g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。
効能又は効果	体力中等度以下で，のぼせ感があり，肩がこり，疲れやすく，精神不安やいらだちなどの精神神経症状，ときに便秘の傾向のあるものの次の諸症：冷え症，虚弱体質，月経不順，月経困難，更年期障害，血の道症，不眠症
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器
規格及び試験方法	別記のとおり。
備考	加味逍遙散料

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は芳香性のにおいがある。

確認試験　本品1包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　トウキ　外面は暗褐色～赤褐色で，縦じわがあり，切断面は淡黄色～黄褐色を呈する。特異なにおいがあり，味はわずかに甘く，後にやや辛い。

横切片を鏡検するとき，コルク層は 4～10 層からなり，その内側に数層の厚角組織が続いている。皮部には分泌細胞に囲まれた多数の樹脂道並びにしばしば大きなすき間がある。形成層は長方形に偏圧された数層の細胞からなり，明らかに皮部と木部とを区別する。木部では多数の道管と放射組織とが交互に放射状に配列し，その外方の道管は単独又は数個集まってやや密に配列してくさび状をなすが，中心部付近の道管は極めてまばらに存在する。でんぷん粒は径 19μm 以下，まれに 2～5 個の複粒があり，複粒の径は 25μm に達し，しばしばのり化している。

（２）　ビャクジュツ　外面は淡灰黄色～淡黄白色で，ところどころ灰褐色を呈し，横切面には淡黄褐色～褐色の分泌物による細点がある。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，皮部の柔組織中にはしばしば師管の外側に接して繊維束があり，放射組織の末端部には淡褐色～褐色の内容物を含む油室がある。木部には大きい髄を囲んで放射状に配列した短径の道管とそれを囲む著しい繊維束がある。髄及び放射組織中には皮部と同様な油室があり，柔組織中にはイヌリンの小球晶及びシュウ酸カルシウムの針晶を含む。

必要に応じて，「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。

（３）　サイコ　外面は灰褐色～褐色で，深いしわがあるものがあり，横断面では，皮部は褐色，木部は淡褐色を呈する。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，皮部にはしばしば接線方向に長い裂け目があり，皮部の厚さは半径の 1/3～1/2 で，径 15～35μm の胞間性離生油道がやや多数散在し，木部には道管が放射状若しくはほぼ階段状に配列し，ところどころに繊維群があり，根頭部の髄には皮部と同様の油道がある。柔細胞中にはでんぷん粒を満たし，また油滴を認める。

必要に応じて，「サイコ」の確認試験を準用する。

（４）　サンシシ　果皮は薄く砕きやすく，その外面は赤褐色，黄赤色又は黒褐色を呈し，内面は黄褐色を呈し，平らでつやがある。果実の内部は 2 室に分かれ，黄赤色～暗赤色の果肉中に黒褐色又は黄赤色で長径約 5mm の偏平な種子の団塊を含む。質は軽い。特異なにおいがあり，味は苦い。

必要に応じて，「サンシシ」の確認試験を準用する。

（５）　ショウキョウ　淡灰黄色の周皮を付けたままか，又はその一部をはぎとってあり，表面は灰白色～淡灰褐色で，しばしば白粉を付けている。横断面は繊維性，粉性で，淡帯黄褐色を呈し，皮層と中心柱とに分かれる。横断面をルーペ視するとき，その全面に維管束及び分泌物が褐色の細点として散在している。特異なにおいがあり，味は極めて辛い。

（６）　シャクヤク　外面は褐色～淡灰褐色を呈し，横断面はち密で淡灰褐色を呈し，木部には淡褐色の放射状の線がある。わずかに特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後に渋くてわずかに苦い。

必要に応じて，「シャクヤク」の確認試験を準用する。

（７）　ブクリョウ　白色又はわずかに淡赤色を帯びた白色で，質は堅いが砕きやすい。味はないがやや粘液ようである。

必要に応じて，「ブクリョウ」の確認試験を準用する。

（８）　ボタンピ　外面は暗褐色～帯紫褐色，内面は淡灰褐色～暗紫色を呈する。内面及び切断面にはしばしば白色の結晶を付着する。特異なにおいがあり，味はわずかに辛くて苦い。

必要に応じて，「ボタンピ」の確認試験を準用する。

（９）　カンゾウ　外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現わす。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に 1～3 細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には 3～10 細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞中にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

（10）　ハッカ　上面は淡褐黄色～淡緑黄色，下面は淡緑色～淡緑黄色である。葉をルーペ視するとき，両面に毛，腺毛及び腺りんをまばらに認め，腺毛及び腺りんは下面に多い。特異な芳香があり，口に含むと清涼感がある。

必要に応じて，「ハッカ」の確認試験を準用する。

乾燥減量　15%以下。

灰　　分　6%以下。

【 216 】　K25

成分及び分量又は本質	日本薬局方	トウキ	3.0g
	〃	シャクヤク	3.0g
	〃	サイコ	3.0g
	〃	ブクリョウ	3.0g
	〃	ビャクジュツ	3.0g
	〃	センキュウ	3.0g
	〃	ジオウ	3.0g
	〃	カンゾウ	1.5g
	〃	ボタンピ	2.0g
	〃	サンシシ	2.0g
	〃	ショウキョウ	1.0g
	〃	ハッカ	1.0g
		全　　量	28.5g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。		
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。		
効能又は効果	体力中等度以下で，皮膚があれてかさかさし，ときに色つやが悪く，胃腸障害はなく，肩がこり，疲れやすく精神不安やいらだちなどの精神神経症状，ときにかゆみ，便秘の傾向のあるものの次の諸症：湿疹・皮膚炎，しみ，冷え症，虚弱体質，月経不順，月経困難，更年期障害，血の道症		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	加味逍遥散料加川芎地黄（加味逍遙散合四物湯）		

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品1包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（１）　トウキ　外面は暗褐色～赤褐色で，縦じわがあり，切断面は淡黄色～黄褐色を呈する。特異なにおいがあり，味はわずかに甘く，後にやや辛い。

横切片を鏡検するとき，コルク層は 4～10 層からなり，その内側に数層の厚角組織が続いている。皮部には分泌細胞に囲まれた多数の樹脂道並びにしばしば大きなすき間がある。形成層は長方形に偏圧された数層の細胞からなり，明らかに皮部と木部とを区別する。木部では多数の道管と放射組織とが交互に放射状に配列し，その外方の道管は単独又は数個集まってやや密に配列してくさび状をなすが，中心部付近の道管は極めてまばらに存在する。でんぷん粒は径 19μm 以下，まれに 2～5 個の複粒があり，複粒の径は 25μm に達し，しばしばのり化している。

（２）　シャクヤク　外面は褐色～淡灰褐色を呈し，横断面はち密で淡灰褐色を呈し，木部には淡褐色の放射状の線がある。わずかに特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後に渋くてわずかに苦い。

必要に応じて，「シャクヤク」の確認試験を準用する。

（３）　サイコ　外面は灰褐色～褐色で，深いしわがあるものがあり，横断面では，皮部は褐色，木部は淡褐色を呈する。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，皮部にはしばしば接線方向に長い裂け目があり，皮部の厚さは半径の 1/3～1/2 で，径 15～35μm の胞間性離生油道がやや多数散在し，木部には道管が放射状若しくはほぼ階段状に配列し，ところどころに繊維群があり，根頭部の髄には皮部と同様の油道がある。柔細胞中にはでんぷん粒を満たし，また油滴を認める。

必要に応じて，「サイコ」の確認試験を準用する。

（４）　ブクリョウ　白色又はわずかに淡赤色を帯びた白色で，質は堅いが砕きやすい。味はないがやや粘液ようである。

必要に応じて，「ブクリョウ」の確認試験を準用する。

（５）　ビャクジュツ　外面は淡灰黄色～淡黄白色で，ところどころ灰褐色を呈し，横切面には淡黄褐色～褐色の分泌物による細点がある。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，皮部の柔組織中にはしばしば師管の外側に接して繊維束があり，放射組織の末端部には淡褐色～褐色の内容物を含む油室がある。木部には大きい髄を囲んで放射状に配列した短径の道管とそれを囲む著しい繊維束がある。髄及び放射組織中には皮部と同様な油室があり，柔組織中にはイヌリンの小球晶及びシュウ酸カルシウムの針晶を含む。

必要に応じて，「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。

（６）　センキュウ　外面は灰褐色～暗褐色で，切断面は灰白色～灰褐色，半透明で，ときにはうつろがある。質は密で堅い。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，皮部及び髄には油道が散在する。木部には厚膜で木化した木部繊維が大小不同の群をなして存在する。でんぷん粒は，通例，のり化していて，まれに径 5～25μm のでんぷん粒を認めることがある。シュウ酸カルシウム結晶は認めない。

（７）　ジオウ　外面は黄褐色～黒褐色を呈し，深い縦みぞ及びくびれがある。質は柔らかく粘性である。横断面は黄褐色～黒褐色で，皮部は木部より色が濃く，ほとんど髄を認めない。特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後にやや苦い。

横切片を鏡検するとき，コルク層は 7～15 層で，皮部はすべて柔細胞からなり，外皮部に褐色の分泌物を含む細胞が散在する。木部はほとんど柔細胞で満たされ，放射状に並ぶ道管は側孔のある網紋があり，弱い木化反応を呈する。

（８）　カンゾウ　外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現わす。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に 1～3 細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には 3～10 細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞中にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

（９）　ボタンピ　外面は暗褐色～帯紫褐色，内面は淡灰褐色～暗紫色を呈する。内面及び切断面にはしばしば白色の結晶を付着する。特異なにおいがあり，味はわずかに辛くて苦い。

必要に応じて，「ボタンピ」の確認試験を準用する。

（10）　サンシシ　果皮は薄く砕きやすく，その外面は赤褐色，黄赤色又は黒褐色を呈し，内面は黄褐色を呈し，平らでつやがある。果実の内部は 2 室に分かれ，黄赤色～暗赤色の果肉中に黒褐色又は黄赤色で長径約 5mm の偏平な種子の団塊を含む。質は軽い。特異なにおいがあり，味は苦い。

必要に応じて，「サンシシ」の確認試験を準用する。

（11）　ショウキョウ　淡灰黄色の周皮を付けたままか，又はその一部をはぎとってあり，表面は灰白色～淡灰褐色で，しばしば白粉を付けている。横断面は繊維性，粉性で，淡帯黄褐色を呈し，皮層と中心柱とに分かれる。横断面をルーペ視するとき，その全面に維管束及び分泌物が褐色の細点として散在している。特異なにおいがあり，味は極めて辛い。

（12）　ハッカ　上面は淡褐黄色～淡緑黄色，下面は淡緑色～淡緑黄色である。葉をルーペ視するとき，両面に毛，腺毛及び腺りんをまばらに認め，腺毛及び腺りんは下面に多い。特異な芳香があり，口に含むと清涼感がある。

必要に応じて，「ハッカ」の確認試験を準用する。

乾燥減量　15％以下。

灰　　分　5％以下。

【 217 】　K26

成分及び分量 又は本質	日本薬局方　カンキョウ　3.0g 〃　ニンジン　3.0g 〃　ハンゲ　6.0g 全　量　12.0g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，熱いうちに煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。 本剤は必ず1日分ずつ煎じ，数日分をまとめて煎じないこと。
効能又は効果	体力中等度以下で，はきけ・嘔吐が続きみぞおちのつかえを感じるものの次の諸症：つわり，胃炎，胃腸虚弱
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器
規格及び試験方法	別記のとおり。
備考	乾姜人参半夏丸料

規格及び試験方法

性　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品1包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　カンキョウ　偏圧した不規則な塊状でしばしば分枝する。分枝した各部はやや湾曲した卵形又は長卵形を呈し，長さ2～4cm，径1～2cmである。外面は灰黄色～灰黄褐色で，しわ及び輪節がある。折面は褐色～暗褐色で透明感があり角質である。横切面をルーペ視するとき皮層と中心柱は区分され，全面に維管束が散在する。特異なにおいがあり，味は極めて辛い。

横切片を鏡検するとき，外側よりコルク層，皮層，内皮，中心柱が認められる。皮層と中心柱は一層の内皮によって区分される。皮層及び中心柱は柔組織からなり，繊維束で囲まれた維管束が散在する。柔組織中には黄色の油様物質を含む油細胞が散在し，柔細胞中にはシュウ酸カルシウムの単晶が含まれ，でんぷんは糊化している。

必要に応じて，「カンキョウ」の確認試験を準用する。

（２）　ニンジン　外面は淡黄褐色～淡灰褐色を呈し，縦じわがあり，横断面は淡黄褐色を呈し，形成層の付近は褐色を呈する。特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後にやや苦い。

必要に応じて，「ニンジン」の確認試験を準用する。

（３）　ハンゲ　外面は白色～灰白黄色，上部には茎の跡がくぼみとなり，その周辺には根の跡がくぼんだ細点となっている。横断面は白色，粉性である。味は初めなく，やや粘液性で，後に強いえぐ味を残す。

横切片を鏡検するとき，主としてでんぷん粒を充満した柔組織からなり，わずかにシュウ酸カルシウムの束晶を含んだ粘液細胞がその間に認められる。でんぷん粒は主として 2～3 個の複粒で，通例，径 10～15μm，単粒は通例径 3～7μm である。束晶は長さ 25～150μm である。

乾燥減量　10%以下。

灰　　分　4%以下。

【 218 】　K26—①

成分及び分量 又は本質	日本薬局方　カンキョウ　3.0g 〃　ニンジン　3.0g 〃　ハンゲ　6.0g 全　量　12.0g
製造方法	以上の生薬をそれぞれ末とし，「生姜汁」と「米糊」を結合剤として丸剤の製法により丸剤 120 個とする。
用法及び用量	1 回量を次のとおりとし，1 日 3 回，食前又は空腹時に服用する。 大人（15 才以上）1 回 20 個，15 才未満 7 才以上　大人の 2/3，7 才未満 5 才以上　大人の 1/2 を服用する。
効能又は効果	体力中等度以下で，はきけ・嘔吐が続きみぞおちのつかえを感じるものの次の諸症：つわり，胃炎，胃腸虚弱
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器
規格及び試験方法	別記のとおり。
備考	乾姜人参半夏丸

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は淡黄白色～淡黄褐色で，ショウガのにおいがある。

確認試験

（1）　カンキョウ　本品 1 個を 50%グリセリン液で溶解し，鏡検するとき，径が大きく，細胞壁は淡黄色で斜めの壁孔が明瞭な繊維細胞を認める。

（2）　ニンジン　本品の粉末 5g にメタノール 20mL を加え，還流冷却器を付け，水浴上で 15 分間穏やかに煮沸し，冷後，ろ過し，ろ液を試料溶液とする。別に薄層クロマトグラフ用ジンセノサイド Rg_1 1mg をメタノール 1mL に溶かし，標準溶液とする。これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び標準溶液 10μL ずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲルを用いて調製した薄層板にスポットする。次にクロロホルム・メタノール・水混液（13：7：2）の下層を展開溶媒として約 10cm 展開した後，薄層板を風乾する。このうちの 1 個のスポットは，標準溶液から得た赤紫色のスポットと色調及び *Rf* 値が等しい。

乾燥減量　26%以下。

灰　　分　8%以下。

【 219 】　K27

成分及び分量又は本質	日本薬局方	ハンゲ	5.0g
	〃	カンキョウ	2.5g
	〃	ニンジン	2.5g
	〃	タイソウ	2.5g
	〃	オウゴン	2.5g
	〃	カンゾウ	2.5～3.5g
	〃	オウレン	1.0g
		全　　量	18.5～19.5g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。		
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。		
効能又は効果	体力中等度で，みぞおちがつかえた感じがあり，ときにイライラ感，下痢，はきけ，腹が鳴るものの次の諸症：胃腸炎，口内炎，口臭，不眠症，神経症，下痢		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	甘草瀉心湯		

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品1包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　オウレン　根茎の径は2～7mmで，外面は灰黄褐色～褐色を呈し，輪節及び多数の根の基部を認め，横断面はやや繊維性で，コルク層は淡灰褐色，皮部は黄褐色，木部は黄色，髄は黄褐色である。味は極めて苦く，残留性で，だ液を黄色に染める。

横切片を鏡検するとき，コルク層は薄膜のコルク細胞からなり，皮部柔組織中にはコルク層に近い部位に石細胞群，形成層に近い部位に黄色の師部繊維の認められるものが多い。木部は主として道管，仮道管，木部繊維からなり，放射組織は明らかで，髄は大きく，髄中には石細胞あるいは厚膜木化した細胞を伴った石細胞を認めることがある。柔細胞には細かいでんぷん粒を含むが，結晶を含まない。

必要に応じて，「オウレン」の確認試験を準用する。

（２）　カンゾウ　外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現わす。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に 1～3 細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には 3～10 細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞中にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

（３）　オウゴン　外面は黄褐色～暗褐色を呈し，切断面は黄色～帯褐黄色を呈し，縦に繊維性のすじが見られる。味はわずかに苦い。

必要に応じて，「オウゴン」の確認試験を準用する。

（４）　タイソウ　外面は赤褐色であらいしわがあるか，又は暗灰赤色で細かいしわがあり，いずれもつやがある。外果皮は薄く革質で，中果皮は暗灰褐色を呈し，海綿ようで柔らかく粘着性があり，内果皮は極めて堅く，種子は偏平である。わずかに特異なにおいがあり，味は甘い。

（５）　ニンジン　外面は淡黄褐色～淡灰褐色を呈し，縦じわがあり，横断面は淡黄褐色を呈し，形成層の付近は褐色を呈する。特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後にやや苦い。

必要に応じて，「ニンジン」の確認試験を準用する。

（６）　カンキョウ　偏圧した不規則な塊状でしばしば分枝する。分枝した各部はやや湾曲した卵形又は長卵形を呈し，長さ 2～4ｃｍ，径 1～2ｃｍである。外面は灰黄色～灰黄褐色で，しわ及び輪節がある。折面は褐色～暗褐色で透明感があり角質である。横切面をルーペ視するとき皮層と中心柱は区分され，全面に維管束が散在する。特異なにおいがあり，味は極めて辛い。

横切片を鏡検するとき，外側よりコルク層，皮層，内皮，中心柱が認められる。皮層と中心柱は一層の内皮によって区分される。皮層及び中心柱は柔組織からなり，繊維束で囲まれた維管束が散在する。柔組織中には黄色の油様物質を含む油細胞が散在し，柔細胞中にはシュウ酸カルシウムの単晶が含まれ，でんぷんは糊化している。

必要に応じて，「カンキョウ」の確認試験を準用する。

（７）　ハンゲ　外面は白色～灰白黄色，上部には茎の跡がくぼみとなり，その周辺には根の跡がくぼんだ細点となっている。横断面は白色，粉性がある。味は初めなく，やや粘液性で，後に強いえぐ味を残す。

横切片を鏡検するとき，主としてでんぷん粒を充満した柔組織からなり，わずかにシュウ酸カルシウムの束晶を含んだ粘液細胞がその間に認められる。でんぷん粒は主として 2～3 個の複粒で，通例，径 10～15μm，単粒は通例径 3～7μm である。束晶は長さ 25～150μm である。

乾燥減量　15％以下。

灰　　分　5％以下。

【 220 】　K28

成分及び分量 又は本質	日本薬局方　カンゾウ　2.0～5.0g 全　量　2.0～5.0g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。 外用で用いる場合は，煎液で患部を温湿布する。
効能又は効果	激しいせき，口内炎，しわがれ声 外用：痔・脱肛の痛み
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器
規格及び試験方法	日本薬局方による。
備考	甘草湯

【 221 】　K29

成分及び分量 又は本質	日本薬局方	カンゾウ	3.0～5.0g
	〃	タイソウ	6.0g
	別紙規格	小麦	20.0g
		全　量	29.0～31.0g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。		
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。		
効能又は効果	体力中等度以下で，神経が過敏で，驚きやすく，ときにあくびが出るものの次の諸症：不眠症，小児の夜泣き，ひきつけ		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	甘麦大棗湯		

規格及び試験方法

性　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品1包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　カンゾウ　外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現わす。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に1～3細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には3～10細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞中にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

（2）　タイソウ　外面は赤褐色であらいしわがあるか，又は暗灰赤色で細かいしわがあり，いずれもつやがある。外果皮は薄く革質で，中果皮は暗灰褐色を呈し，海綿ようで柔らかく粘着性があり，内果皮は極めて堅く，種子は偏平である。わずかに特異なにおいがあり，味は甘い。

（３）　小麦　長さ 5～7mm，径約 2mm の長卵形を呈し，ときに破片を含む。1g は約 32 粒である。一端は太く，徐々に細くなり，表面の片面には一本の大きな縦溝がある。外面は淡類褐色を呈し，砕くと内部は白色である。におい及び味はない。

また，別紙規格「小麦」の確認試験を準用する。

乾燥減量　15%以下。

灰　　分　5%以下。

別紙規格　　小麦の規格及び試験方法

本品はコムギ *Triticum Aestivum* Linné（*Gramineae*）の種子である。

性　　状　本品は長さ 5～7mm，径約 2mm の長卵形を呈し，ときに破片を含む。本品 1g は約 32 粒である。一端は太く，徐々に細くなり，表面の片面には一本の大きな縦溝がある。外面は淡類褐色を呈し，砕くと内部は白色である。

本品はにおい及び味はない。

確認試験　**（１）**　本品の粉末 1g に水 50mL を加えて煮沸し，放冷するとき，混濁した中性ののり状の液となる。

（２）　本品の粉末にヨウ素試液を加えるとき，暗青紫色を呈する。

乾燥減量　15.0%以下（6 時間）。

灰　　分　2.0%以下。

【 222 】　K30

成分及び分量 又は本質	日本薬局方	キキョウ	2.0g
	〃	カンゾウ	2.0～3.0g
		全　量	4.0～5.0g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。		
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。		
効能又は効果	体力に関わらず使用でき，のどがはれて痛み，ときにせきがでるものの次の諸症：扁桃炎，扁桃周囲炎		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	桔梗湯		

規格及び試験方法

性　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品1包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　キキョウ　外面は皮付きは灰褐色，皮去りは白色～淡褐色を呈し，繊維性でない。横切面をルーペ視するとき，皮部は木部よりやや薄く，ほとんど白色で，ところどころにすき間があり，形成層の付近はしばしば褐色を帯びる。木部は白色～淡褐色を呈し，その組織は皮部よりもやや密である。味は初めなく，後にえぐくて苦い。

必要に応じて，「キキョウ」の確認試験を準用する。

（2）　カンゾウ　外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現わす。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に1～3細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には3～10細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞中にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

乾燥減量　10%以下。

灰　　分　5%以下。

【 223 】　K31

成分及び分量又は本質	日本薬局方	トウキ	4.0g
	〃	ケイヒ	4.0g
	〃	ショウキョウ	1.0g
	〃	タイソウ	4.0g
	〃	シャクヤク	5.0g
	〃	カンゾウ	2.0g
	〃	オウギ	2.0g
		全　　量	22.0g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。		
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。		
効能又は効果	体力虚弱で，疲労しやすいものの次の諸症：虚弱体質，病後・術後の衰弱，ねあせ，湿疹・皮膚炎，化膿性皮膚疾患		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	帰耆建中湯		

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品1包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　トウキ　外面は暗褐色～赤褐色で，縦じわがあり，切断面は淡黄色～黄褐色を呈する。特異なにおいがあり，味はわずかに甘く，後にやや辛い。

横切片を鏡検するとき，コルク層は4～10層からなり，その内側に数層の厚角組織が続いている。皮部には分泌細胞に囲まれた多数の樹脂道並びにしばしば大きなすき間がある。形成層は長方形に偏圧された数層の細胞からなり，明らかに皮部と木部とを区別する。木部では多数の道管と放射組織とが交互に放射状に配列し，その外方の道管は単独又は数個集まってやや密に配列してくさび状をなすが，中心部付近の道管は極めてまばらに存在する。でんぷん粒は径19μm以下，まれに2～5個の複粒があり，複粒の径は25μmに達し，しばしばのり化している。

（２）　ケイヒ　外面は暗赤褐色を呈し，内面は赤褐色を呈し，平滑である。横断面は赤褐色を呈し淡褐色の薄層が見られる。特異なにおいがあり，味は甘く，辛く，後にやや粘液性で，わずかに収れん性である。

横切片を鏡検するとき，一次皮部と二次皮部はほとんど連続した石細胞環で区分され，環の外辺にはほぼ円形に結集した繊維束を伴い，環の各石細胞の膜はしばしばU字形に肥厚する。二次皮部中には石細胞を認めず，まばらに少数の厚膜繊維を認める。柔組織中には油細胞，粘液細胞及び微細なシュウ酸カルシウムの針晶を含む細胞があり，柔細胞中にはでんぷん粒を含む。

（３）　ショウキョウ　淡灰黄色の周皮を付けたままか，又はその一部をはぎとってあり，表面は灰白色～淡灰褐色で，しばしば白粉を付けている。横断面は繊維性，粉性で，淡帯黄褐色を呈し，皮層と中心柱とに分かれる。横断面をルーペ視するとき，その全面に維管束及び分泌物が褐色の細点として散在している。特異なにおいがあり，味は極めて辛い。

（４）　タイソウ　外面は赤褐色であらいしわがあるか，又は暗灰赤色で細かいしわがあり，いずれもつやがある。外果皮は薄く革質で，中果皮は暗灰褐色を呈し，海綿ようで柔らかく粘着性があり，内果皮は極めて堅く，種子は偏平である。わずかに特異なにおいがあり，味は甘い。

（５）　シャクヤク　外面は褐色～淡灰褐色を呈し，横断面はち密で淡灰褐色を呈し，木部には淡褐色の放射状の線がある。わずかに特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後に渋くてわずかに苦い。

必要に応じて，「シャクヤク」の確認試験を準用する。

（６）　カンゾウ　外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現わす。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に 1～3 細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には 3～10 細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞中にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

（７）　オウギ　外面は淡灰黄色～淡褐黄色で，不規則なあらい縦じわがあり，折面は繊維性である。横断面をルーペ視するとき，最外層には周皮があり，皮部は淡黄白色，木部は淡黄色，形成層付近はやや褐色を帯びる。木部から皮部にわたって白色の放射組織が認められる。太いものではしばしば多数の放射状の裂け目となっている。わずかに特異なにおいがあり，味は甘い。

乾燥減量　15％以下。

灰　　分　5％以下。

【 224 】　K32

成分及び分量又は本質	日本薬局方	ニンジン	2.0g
	〃	ブクリョウ	2.0g
	〃	トウキ	2.0g
	〃	カンゾウ	1.0g
	〃	タイソウ	1.5g
	〃	ビャクジュツ	2.0g
	〃	オウギ	2.0g
	〃	オンジ	1.0g
	〃	モッコウ	1.0g
	〃	ショウキョウ	0.5g
	〃	リュウガンニク	2.0g
	〃	サンソウニン	2.0g
		全　　量	19.0g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。		
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。		
効能又は効果	体力中等度以下で，心身が疲れ，血色が悪いものの次の諸症：貧血，不眠症，神経症，精神不安		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	帰脾湯		

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品1包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　ニンジン　外面は淡黄褐色～淡灰褐色を呈し，縦じわがあり，横断面は淡黄褐色を呈し，形成層の付近は褐色を呈する。特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後にやや苦い。

必要に応じて，「ニンジン」の確認試験を準用する。

（2）　ブクリョウ　白色又はわずかに淡赤色を帯びた白色で，質は堅いが砕きやすい。味はないがやや粘液ようである。

必要に応じて，「ブクリョウ」の確認試験を準用する。

（3）　トウキ　外面は暗褐色～赤褐色で，縦じわがあり，切断面は淡黄色～黄褐色を呈する。特異なにおいがあり，味はわずかに甘く，後にやや辛い。

横切片を鏡検するとき，コルク層は 4～10 層からなり，その内側に数層の厚角組織が続いている。皮部には分泌細胞に囲まれた多数の樹脂道並びにしばしば大きなすき間がある。形成層は長方形に偏圧された数層の細胞からなり，明らかに皮部と木部とを区別する。木部では多数の道管と放射組織とが交互に放射状に配列し，その外方の道管は単独又は数個集まってやや密に配列してくさび状をなすが，中心部付近の道管は極めてまばらに存在する。でんぷん粒は径 19μm 以下，まれに 2～5 個の複粒があり，複粒の径は 25μm に達し，しばしばのり化している。

（4）　カンゾウ　外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現わす。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に 1～3 細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には 3～10 細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞中にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

（5）　タイソウ　外面は赤褐色であらいしわがあるか，又は暗灰赤色で細かいしわがあり，いずれもつやがある。外果皮は薄く革質で，中果皮は暗灰褐色を呈し，海綿ようで柔らかく粘着性があり，内果皮は極めて堅く，種子は偏平である。わずかに特異なにおいがあり，味は甘い。

（6）　ビャクジュツ　外面は淡灰黄色～淡黄白色で，ところどころ灰褐色を呈し，横切面には淡黄褐色～褐色の分泌物による細点がある。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，皮部の柔組織中にはしばしば師管の外側に接して繊維束があり，放射組織の末端部には淡褐色～褐色の内容物を含む油室がある。木部には大きい髄を囲んで放射状に配列した短径の道管とそれを囲む著しい繊維束がある。髄及び放射組織中には皮部と同様な油室があり，柔組織中にはイヌリンの小球晶及びシュウ酸カルシウムの針晶を含む。

必要に応じて，「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。

（7）　オウギ　外面は淡灰黄色～淡褐黄色で，不規則なあらい縦じわがあり，折面は繊維性である。横断面をルーペ視するとき，最外層には周皮があり，皮部は淡黄白色，木部は淡黄色，形成層付近はやや褐色を帯びる。木部から皮部にわたって白色の放射組織が認

められる。太いものではしばしば多数の放射状の裂け目となっている。わずかに特異なにおいがあり，味は甘い。

（８）　オンジ　外側面は淡灰褐色で横切されたものは径 2～10mm。皮部の厚さは木部の径とほぼ等しいか又は木部の径の約 1/2 で淡灰褐色を呈し，ところどころに大きな裂け目がある。木部は円形～だ円形で淡褐色を呈する。味はわずかにえぐい。

必要に応じて，「オンジ」の確認試験を準用する。

（９）　モッコウ　外面は黄褐色～灰褐色で，あらい縦じわがある。横断面は黄褐色～暗褐色で，ルーペ視するとき，環状暗色の形成層が認められ，木部組織と放射組織が放射状の模様を呈し，ところどころに大きな裂け目と褐色の油室が散在している。特異なにおいがあり，味は苦い。

（10）　ショウキョウ　淡灰黄色の周皮を付けたままか，又はその一部をはぎとってあり，表面は灰白色～淡灰褐色で，しばしば白粉を付けている。横断面は繊維性，粉性で，淡帯黄褐色を呈し，皮層と中心柱とに分かれる。横断面をルーペ視するとき，その全面に維管束及び分泌物が褐色の細点として散在している。特異なにおいがあり，味は極めて辛い。

（11）　リュウガンニク　偏圧された楕円体で，長さ 1～2cm，幅約 1cm である。黄赤褐色～黒褐色を呈し，質は柔らかくて粘性である。水に浸して放置するとき，鐘状を呈し，先端は数裂する。特異なにおいがあり，味は甘い。

横切片を鏡検するとき，仮種皮の最外層は 1 層の表皮からなり，その内側には偏圧された柔細胞からなる柔組織があり，最内層はやや厚壁化した表皮からなる。柔組織中には，赤褐色～褐色の内容物及びシュウ酸カルシウムの単晶，不定形の結晶及び砂晶を含む。

必要に応じて，「リュウガンニク」の確認試験を準用する。

（12）　サンソウニン　扁平な卵形～円形でレンズ状を呈し，長さ 5～9mm，幅 4～6mm，厚さ 2～3mm，外面は褐色～暗赤褐色を呈し，つやがある。一端にはへそ，他端には合点がある。種皮はやや柔軟で，乳白色の内乳及び淡黄色の胚を包む。100 粒の質量は 3.0～4.5g である。わずかな油臭があり，緩和でやや油様である。

横切片を鏡検するとき，種皮は外側の表皮，柔組織，内側の表皮からなる。外側の表皮は放射方向に長く厚壁化した細胞からなり，内側の表皮にはクチクラが認められる。内乳は柔組織からなり，シュウ酸カルシウムの集晶，アリューロン粒，でんぷん粒を含む。子葉は柔組織からなり，アリューロン粒，でんぷん粒，油滴を含む。

必要に応じて，「サンソウニン」の確認試験を準用する。

乾燥減量　15％以下。

灰　　分　5％以下。

【 225 】　K33

成分及び分量又は本質	日本薬局方	センキュウ	3.0g
	〃	カンゾウ	3.0g
	〃	トウキ	4.0g
	〃	シャクヤク	4.0g
	〃	ジオウ	5.0g
	〃	ガイヨウ	3.0g
		全　　量	22.0g
	局外生規	アキョウ	3.0g
製造方法	アキョウを除く以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製し，これにアキョウ 3.0g を添付する。		
用法及び用量	本品 1 包に，水約 500mL を加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，添付のアキョウを煎液に入れ，再び 5 分ほど熱して溶かし，煎液を 3 回に分けて食間に服用する。上記は大人の 1 日量である。 15 才未満 7 才以上　大人の 2/3，7 才未満 4 才以上　大人の 1/2，4 才未満 2 才以上　大人の 1/3，2 才未満　大人の 1/4 以下を服用する。		
効能又は効果	体力中等度以下で，冷え症で，出血傾向があり胃腸障害のないものの次の諸症：痔出血，貧血，月経異常・月経過多・不正出血，皮下出血		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器，ただし，アキョウは気密容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	芎帰膠艾湯		

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品 1 包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　センキュウ　外面は灰褐色～暗褐色で，切断面は灰白色～灰褐色，半透明で，ときにはうつろがある。質は密で堅い。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，皮部及び髄には油道が散在する。木部には厚膜で木化した木部繊維が大小不同の群をなして存在する。でんぷん粒は，通例，のり化していて，まれに径 5～25μm のでんぷん粒を認めることがある。シュウ酸カルシウム結晶は認めない。

（２）　カンゾウ　外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現わす。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に 1～3 細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には 3～10 細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞中にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

（３）　トウキ　外面は暗褐色～赤褐色で，縦じわがあり，切断面は淡黄色～黄褐色を呈する。特異なにおいがあり，味はわずかに甘く，後にやや辛い。

横切片を鏡検するとき，コルク層は 4～10 層からなり，その内側に数層の厚角組織が続いている。皮部には分泌細胞に囲まれた多数の樹脂道並びにしばしば大きなすき間がある。形成層は長方形に偏圧された数層の細胞からなり，明らかに皮部と木部とを区別する。木部では多数の道管と放射組織とが交互に放射状に配列し，その外方の道管は単独又は数個集まってやや密に配列してくさび状をなすが，中心部付近の道管は極めてまばらに存在する。でんぷん粒は径 19μm 以下，まれに 2～5 個の複粒があり，複粒の径は 25μm に達し，しばしばのり化している。

（４）　シャクヤク　外面は褐色～淡灰褐色を呈し，横断面はち密で淡灰褐色を呈し，木部には淡褐色の放射状の線がある。わずかに特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後に渋くてわずかに苦い。

必要に応じて，「シャクヤク」の確認試験を準用する。

（５）　ジオウ　外面は黄褐色～黒褐色を呈し，深い縦みぞ及びくびれがある。質は柔らかく粘性である。横断面は黄褐色～黒褐色で，皮部は木部より色が濃く，ほとんど髄を認めない。特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後にやや苦い。

横切片を鏡検するとき，コルク層は 7～15 層で，皮部はすべて柔細胞からなり，外皮部に褐色の分泌物を含む細胞が散在する。木部はほとんど柔組織からなり，道管は放射状に配列し，主として，網状道管である。

（６）　ガイヨウ　縮んだ葉及びその破片からなり，しばしば細い茎を含む。葉の上面は暗緑色を呈し，下面は灰白色の綿毛を密生する。水に浸して広げると，形の整った葉身は長さ 4～15cm，幅 4～12cm，1～2 回羽状中裂又は羽状深裂する。裂片は 2～4 対で，長楕円状ひ針形又は長楕円形で鋭尖頭，ときに鈍頭，辺縁は不揃いに切れ込むか全縁である。小型の葉は 3 中裂又は全縁で，ひ針形を呈する。特異なにおいがあり，味はやや苦い。

横切片を鏡検するとき，主脈部の表皮の内側には数層の厚角組織がある。主脈部の中央部には維管束があり，師部と木部に接して繊維束が認められることがある。葉肉部は上面表皮，柵状組織，海綿状組織，下面表皮からなり，葉肉部の表皮には長柔毛，T 字状毛，腺毛が認められる。表皮細胞はタンニン様物質を含み，柔細胞は油状物質，タンニン様物質などを含む。

必要に応じて，「ガイヨウ」の確認試験を準用する。

乾燥減量　15%以下。

灰　　分　5%以下。

【 226 】　K34

成分及び分量 又は本質	日本薬局方	トウキ	2.0g
	〃	センキュウ	2.0g
	〃	ジオウ	2.0g
	〃	ビャクジュツ	2.0g
	〃	ブクリョウ	2.0g
	〃	チンピ	2.0g
	〃	コウブシ	2.0g
	〃	ボタンピ	2.0g
	〃	タイソウ	1.5g
	〃	カンゾウ	1.0g
	〃	ショウキョウ	1.0g
	〃	ウヤク	2.0g
	〃	ヤクモソウ	1.5g
		全　量	23.0g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。		
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。		
効能又は効果	体力中等度以下のものの次の諸症。ただし産後の場合は体力に関わらず使用できる。：月経不順，産後の神経症・体力低下		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	芎帰調血飲		

規格及び試験方法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品1包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（１）　トウキ　外面は暗褐色～赤褐色で，縦じわがあり，切断面は淡黄色～黄褐色を呈する。特異なにおいがあり，味はわずかに甘く，後にやや辛い。

横切片を鏡検するとき，コルク層は 4～10 層からなり，その内側に数層の厚角組織が続いている。皮部には分泌細胞に囲まれた多数の樹脂道並びにしばしば大きなすき間がある。形成層は長方形に偏圧された数層の細胞からなり，明らかに皮部と木部とを区別する。木部では多数の道管と放射組織とが交互に放射状に配列し，その外方の道管は単独又は数個集まってやや密に配列してくさび状をなすが，中心部付近の道管は極めてまばらに存在する。でんぷん粒は径 19μm 以下，まれに 2～5 個の複粒があり，複粒の径は 25μm に達し，しばしばのり化している。

（２）　センキュウ　外面は灰褐色～暗褐色で，切断面は灰白色～灰褐色，半透明で，ときにはうつろがある。質は密で堅い。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，皮部及び髄には油道が散在する。木部には厚膜で木化した木部繊維が大小不同の群をなして存在する。でんぷん粒は，通例，のり化していて，まれに径 5～25μm のでんぷん粒を認めることがある。シュウ酸カルシウム結晶は認めない。

（３）　ジオウ　外面は黄褐色～黒褐色を呈し，深い縦みぞ及びくびれがある。質は柔らかく粘性である。横断面は黄褐色～黒褐色で，皮部は木部より色が濃く，ほとんど髄を認めない。特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後にやや苦い。

横切片を鏡検するとき，コルク層は 7～15 層で，皮部はすべて柔細胞からなり，外皮部に褐色の分泌物を含む細胞が散在する。木部はほとんど柔細胞で満たされ，放射状に並ぶ道管は側孔のある網紋があり，弱い木化反応を呈する。

（４）　ビャクジュツ　外面は淡灰黄色～淡黄白色で，ところどころ灰褐色を呈し，横切面には淡黄褐色～褐色の分泌物による細点がある。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，皮部の柔組織中にはしばしば師管の外側に接して繊維束があり，放射組織の末端部には淡褐色～褐色の内容物を含む油室がある。木部には大きい髄を囲んで放射状に配列した短径の道管とそれを囲む著しい繊維束がある。髄及び放射組織中には皮部と同様な油室があり，柔組織中にはイヌリンの小球晶及びシュウ酸カルシウムの針晶を含む。

必要に応じて，「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。

（５）　ブクリョウ　白色又はわずかに淡赤色を帯びた白色で，質は堅いが砕きやすい。味はないがやや粘液ようである。

必要に応じて，「ブクリョウ」の確認試験を準用する。

（６）　チンピ　外面は黄赤色～暗黄褐色で，油室による多数の小さいくぼみがあり，内面は白色～淡灰黄褐色である。厚さ約 2mm で，質は軽くてもろい。芳香があり，味は苦くて，わずかに刺激性である。

必要に応じて，「チンピ」の確認試験を準用する。

（７）　コウブシ　外面は灰褐色～灰黒褐色を呈し，不整な輪節があり，その部分に一方に向かって多数の毛がある。質は堅く，横断面は赤褐色～淡黄色を呈し，ろうようのつやを帯び，皮層部の厚さは中心柱の径とほぼ等しいか又はわずかに薄い。横断面をルーペ視するとき，外面は繊維束が褐色のはん点として輪状に並び，皮層部にはところどころに維管束が赤褐色のはん点として，また分泌細胞が黄褐色の微小なはん点として多数存在す

る。中心柱には多数の維管束が点又は線として散在する。わずかに特異なにおい及び味がある。

（８）　ボタンピ　外面は暗褐色～帯紫褐色，内面は淡灰褐色～暗紫色を呈する。内面及び切断面にはしばしば白色の結晶を付着する。特異なにおいがあり，味はわずかに辛くて苦い。

必要に応じて，「ボタンピ」の確認試験を準用する。

（９）　タイソウ　外面は赤褐色であらいしわがあるか，又は暗灰赤色で細かいしわがあり，いずれもつやがある。外果皮は薄く革質で，中果皮は暗灰褐色を呈し，海綿ようで柔らかく粘着性があり，内果皮は極めて堅く，種子は偏平である。わずかに特異なにおいがあり，味は甘い。

（10）　カンゾウ　外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現わす。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に 1～3 細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には 3～10 細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞中にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

（11）　ショウキョウ　淡灰黄色の周皮を付けたままか，又はその一部をはぎとってあり，表面は灰白色～淡灰褐色で，しばしば白粉を付けている。横断面は繊維性，粉性で，淡帯黄褐色を呈し，皮層と中心柱とに分かれる。横断面をルーペ視するとき，その全面に維管束及び分泌物が褐色の細点として散在している。特異なにおいがあり，味は極めて辛い。

（12）　ウヤク　紡錘形又はところどころくびれた連珠状を呈し，長さ 10～15cm，径 10～25mm である。外面は黄褐色～褐色を呈し，わずかに細根の跡がある。横断面の皮部は褐色，木部は淡黄褐色を呈し，褐色の同心性の輪及び放射状の線がある。質はち密で堅い。樟脳様のにおいがあり，味は苦い。

横切片を鏡検するとき，周皮を残すものでは数層のコルク層がありコルク層の一部はコルク石細胞からなる。油細胞及び繊維を含む皮部柔組織が認められることがある。木部では道管及び木部繊維と，放射組織が交互に配列する。皮部及び木部の柔細胞中にはシュウ酸カルシウムの砂晶及び柱状晶，径 1～15μm の単粒のでんぷん粒及び 2～4 粒からなる複粒のでんぷん粒を含む。

必要に応じて，「ウヤク」の確認試験を準用する。

（13）　ヤクモソウ　茎，葉及び花からなり，通例，横切したもの。茎は方柱形で，径 0.2～3cm，黄緑色～緑褐色を呈し，白色の短毛を密生する。髄は白色で断面中央部の多くを占める。質は軽い。葉は対生し，有柄で 3 全裂～3 深裂し，裂片は羽状に裂け，終裂片は線状ひ針形で鋭頭，又は鋭尖頭，上面は淡緑色を呈し，下面は白色の短毛を密生し，灰緑色を呈する。花は輪生し，がくは筒状で上端は針状に 5 裂し，淡緑色～淡緑褐色，花冠は唇形で淡赤紫色～淡褐色を呈する。わずかににおいがあり，味はわずかに苦く，収れん性である。

茎の横切片を鏡検するとき，四稜を認め，Leonurus sibiricus Linné の稜は一部がこぶ状に突出する。表皮には，1～3 細胞からなる非腺毛，頭部が 1～4 細胞からなる腺毛及び 8 細胞からなる腺りんが認められる。稜部では表皮下に厚角組織が発達し，木部繊維の発達が著しい。皮層は数層の柔細胞からなる。維管束は並立維管束で，ほぼ環状に配列する。師部の外側には師部繊維を認める。皮層及び髄中の柔細胞にシュウ酸カルシウムの針晶又は板状晶が認められる。

必要に応じて，「ヤクモソウ」の確認試験を準用する。

乾燥減量　10%以下。

灰　　分　5%以下。

【 227 】　K35

成分及び分量又は本質	日本薬局方	トウキ	2.0g
	〃	ジオウ	2.0g
	〃	ブクリョウ	2.0g
	〃	ウヤク	2.0g
	〃	ボタンピ	2.0g
	〃	タイソウ	1.5g
	〃	ショウキョウ	1.0g
	〃	センキュウ	2.0g
	〃	ビャクジュツ	2.0g
	〃	チンピ	2.0g
	〃	コウブシ	2.0g
	〃	ヤクモソウ	1.5g
	〃	カンゾウ	1.0g
	〃	トウニン	1.5g
	〃	コウカ	1.5g
	〃	キジツ	1.5g
	〃	ケイヒ	1.5g
	〃	ゴシツ	1.5g
	〃	モッコウ	1.5g
	〃	エンゴサク	1.5g
	〃	シャクヤク	1.5g
		全　量	35.0g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。		
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。		
効能又は効果	体力中等度以下のものの次の諸症。ただし産後の場合は体力に関わらず使用できる。：血の道症，月経不順，産後の体力低下		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		

規格及び試験方法	別記のとおり。
備　　考	芎帰調血飲第一加減

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品 1 包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　トウキ　外面は暗褐色～赤褐色で，縦じわがあり，切断面は淡黄色～黄褐色を呈する。特異なにおいがあり，味はわずかに甘く，後にやや辛い。

横切片を鏡検するとき，コルク層は 4～10 層からなり，その内側に数層の厚角組織が続いている。皮部には分泌細胞に囲まれた多数の樹脂道並びにしばしば大きなすき間がある。形成層は長方形に偏圧された数層の細胞からなり，明らかに皮部と木部とを区別する。木部では多数の道管と放射組織とが交互に放射状に配列し，その外方の道管は単独又は数個集まってやや密に配列してくさび状をなすが，中心部付近の道管は極めてまばらに存在する。でんぷん粒は径 19μm 以下，まれに 2～5 個の複粒があり，複粒の径は 25μm に達し，しばしばのり化している。

（2）　ジオウ　外面は黄褐色～黒褐色を呈し，深い縦みぞ及びくびれがある。質は柔らかく粘性である。横断面は黄褐色～黒褐色で，皮部は木部より色が濃く，ほとんど髄を認めない。特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後にやや苦い。

横切片を鏡検するとき，コルク層は 7～15 層で，皮部はすべて柔細胞からなり，外皮部に褐色の分泌物を含む細胞が散在する。木部はほとんど柔細胞で満たされ，放射状に並ぶ道管は側孔のある網紋があり，弱い木化反応を呈する。

（3）　ブクリョウ　白色又はわずかに淡赤色を帯びた白色である。外層が残存するものは暗褐色～暗赤褐色で，きめがあらく，裂け目がある。質は堅いが砕きやすい。ほとんどにおいがなく，味はないがやや粘液ようである。

必要に応じて，「ブクリョウ」の確認試験を準用する。

（4）　ウヤク　紡錘形又はところどころくびれた連珠状を呈し，長さ 10～15cm，径 10～25mm である。外面は黄褐色～褐色を呈し，わずかに細根の跡がある。横断面の皮部は褐色，木部は淡黄褐色を呈し，褐色の同心性の輪及び放射状の線がある。質はち密で堅い。樟脳様のにおいがあり，味は苦い。

横切片を鏡検するとき，周皮を残すものでは数層のコルク層がありコルク層の一部はコルク石細胞からなる。油細胞及び繊維を含む皮部柔組織が認められることがある。木部では道管及び木部繊維と，放射組織が交互に配列する。皮部及び木部の柔細胞中にはシュウ酸カルシウムの砂晶及び柱状晶，径 1～15μm の単粒のでんぷん粒及び 2～4 粒からなる複粒のでんぷん粒を含む。

必要に応じて，「ウヤク」の確認試験を準用する。

（5）　ボタンピ　外面は暗褐色～帯紫褐色，内面は淡灰褐色～暗紫色を呈する。内面及び切断面にはしばしば白色の結晶を付着する。特異なにおいがあり，味はわずかに辛くて苦い。

必要に応じて，「ボタンピ」の確認試験を準用する。

（６）　タイソウ　外面は赤褐色であらいしわがあるか，又は暗灰赤色で細かいしわがあり，いずれもつやがある。外果皮は薄く革質で，中果皮は暗灰褐色を呈し，海綿ようで柔らかく粘着性があり，内果皮は極めて堅く，種子は偏平である。わずかに特異なにおいがあり，味は甘い。

（７）　ショウキョウ　淡灰黄色の周皮を付けたままか，又はその一部をはぎとってあり，表面は灰白色～淡灰褐色で，しばしば白粉を付けている。横断面は繊維性，粉性で，淡帯黄褐色を呈し，皮層と中心柱とに分かれる。横断面をルーペ視するとき，その全面に維管束及び分泌物が褐色の細点として散在している。特異なにおいがあり，味は極めて辛い。

（８）　センキュウ　外面は灰褐色～暗褐色で，切断面は灰白色～灰褐色，半透明で，ときにはうつろがある。質は密で堅い。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，皮部及び髄には油道が散在する。木部には厚膜で木化した木部繊維が大小不同の群をなして存在する。でんぷん粒は，通例，のり化していて，まれに径5～25μm のでんぷん粒を認めることがある。シュウ酸カルシウム結晶は認めない。

（９）　ビャクジュツ　外面は淡灰黄色～淡黄白色で，ところどころ灰褐色を呈し，横切面には淡黄褐色～褐色の分泌物による細点がある。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，皮部の柔組織中にはしばしば師管の外側に接して繊維束があり，放射組織の末端部には淡褐色～褐色の内容物を含む油室がある。木部には大きい髄を囲んで放射状に配列した短径の道管とそれを囲む著しい繊維束がある。髄及び放射組織中には皮部と同様な油室があり，柔組織中にはイヌリンの小球晶及びシュウ酸カルシウムの針晶を含む。

必要に応じて，「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。

（10）　チンピ　外面は黄赤色～暗黄褐色で，油室による多数の小さいくぼみがあり，内面は白色～淡灰黄褐色である。厚さ約 2mm で，質は軽くてもろい。芳香があり，味は苦くて，わずかに刺激性である。

必要に応じて，「チンピ」の確認試験を準用する。

（11）　コウブシ　外面は灰褐色～灰黒褐色を呈し，不整な輪節があり，その部分に一方に向かって多数の毛がある。質は堅く，横断面は赤褐色～淡黄色を呈し，ろうようのつやを帯び，皮層部の厚さは中心柱の径とほぼ等しいか又はわずかに薄い。横断面をルーペ視するとき，外面は繊維束が褐色のはん点として輪状に並び，皮層部にはところどころに維管束が赤褐色のはん点として，また分泌細胞が黄褐色の微小なはん点として多数存在する。中心柱には多数の維管束が点又は線として散在する。わずかに特異なにおい及び味がある。

（12）　ヤクモソウ　茎，葉及び花からなり，通例，横切したもの。茎は方柱形で，径0.2～3cm，黄緑色～緑褐色を呈し，白色の短毛を密生する。髄は白色で断面中央部の多くを占める。質は軽い。葉は対生し，有柄で 3 全裂～3 深裂し，裂片は羽状に裂け，終裂片は線状ひ針形で鋭頭，又は鋭尖頭，上面は淡緑色を呈し，下面は白色の短毛を密生し，灰緑色を呈する。花は輪生し，がくは筒状で上端は針状に 5 裂し，淡緑色～淡緑褐色，花冠は唇形で淡赤紫色～淡褐色を呈する。わずかににおいがあり，味はわずかに苦く，収れん性である。

茎の横切片を鏡検するとき，四稜を認め，Leonurus sibiricus Linné の稜は一部がこぶ状に突出する。表皮には，1～3 細胞からなる非腺毛，頭部が 1～4 細胞からなる腺毛及び 8 細胞からなる腺りんが認められる。稜部では表皮下に厚角組織が発達し，木部繊維の発達が著しい。皮層は数層の柔細胞からなる。維管束は並立維管束で，ほぼ環状に配列する。師部の外側には師部繊維を認める。皮層及び髄中の柔細胞にシュウ酸カルシウムの針晶又は板状晶が認められる。

必要に応じて，「ヤクモソウ」の確認試験を準用する。

（13） カンゾウ 外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現わす。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に 1～3 細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には 3～10 細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞中にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

（14） トウニン 種皮は薄く，外面は赤褐色を帯び，表面にはすれて落ちやすい石細胞となった表皮細胞があって，粉をふいたようである。切断面は類白色である。味はわずかに苦く，油ようである。

表皮の表面を鏡検するとき，数個ずつ集合する石細胞はおおむね円形で，その細胞膜は均等に厚く，側面視では方形又は長方形を呈する。

必要に応じて，「トウニン」の確認試験を準用する。

（15） コウカ 赤色～赤褐色の花冠，花柄，黄色の花柱及び雄しべからなり，全長は約 1cm，花冠は筒状で 5 裂し，雄しべは 5 本で，長い柱頭をもつ雌しべを囲んでいる。花粉はほぼ球形で，径約 50μm，黄色で表面に細かい突起がある。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

必要に応じて，「コウカ」の確認試験を準用する。

（16） キジツ 外面は濃緑褐色～褐色で，つやがなく，油室による多数のくぼんだ細点がある。切断面は淡灰褐色を呈し，内果皮を付ける部分は褐色を呈する。特異なにおいがあり，味は苦い。

必要に応じて，「キジツ」の確認試験を準用する。

（17） ケイヒ 外面は暗赤褐色を呈し，内面は赤褐色を呈し，平滑である。横断面は赤褐色を呈し淡褐色の薄層が見られる。特異なにおいがあり，味は甘く，辛く，後にやや粘液性で，わずかに収れん性である。

横切片を鏡検するとき，一次皮部と二次皮部はほとんど連続した石細胞環で区分され，環の外辺にはほぼ円形に結集した繊維束を伴い，環の各石細胞の膜はしばしばU字形に肥厚する。二次皮部中には石細胞を認めず，まばらに少数の厚膜繊維を認める。柔組織中には油細胞，粘液細胞及び微細なシュウ酸カルシウムの針晶を含む細胞があり，柔細胞中にはでんぷん粒を含む。

（18） ゴシツ 表面は灰黄色～黄褐色で，多数の縦じわがある。切断面は灰白色～淡褐色を呈し，黄白色の木部を認める。味はわずかに甘く，粘液性である。

横切片を鏡検するとき，皮部はやや明らかな形成層によって木部と区別できる。木部の中心には小さい原生木部があり，これを囲んで同心円状の環状維管束が外方に配列し，柔細胞中にはシュウ酸カルシウムの砂晶を含み，でんぷん粒は認めない。

必要に応じて，「ゴシツ」の確認試験を準用する。

(19)　モッコウ　外面は黄褐色～灰褐色で，あらい縦じわがある。横断面は黄褐色～暗褐色で，ルーペ視するとき，環状暗色の形成層が認められ，木部組織と放射組織が放射状の模様を呈し，ところどころに大きな裂け目と褐色の油室が散在している。特異なにおいがあり，味は苦い。

(20)　エンゴサク　外面は灰黄色～灰褐色で，切断面は黄色～灰黄緑色を呈する。味は苦い。

必要に応じて，「エンゴサク」の確認試験を準用する。

(21)　シャクヤク　外面は褐色～淡灰褐色を呈し，横断面はち密で淡灰褐色を呈し，木部には淡褐色の放射状の線がある。わずかに特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後に渋くてわずかに苦い。

必要に応じて，「シャクヤク」の確認試験を準用する。

乾燥減量　15％以下。

灰　　分　5％以下。

【 228 】　K36

成分及び分量 又は本質	日本薬局方	レンギョウ	2.5g
	〃	カンゾウ	2.5g
	〃	キキョウ	2.5g
	〃	ハッカ	4.0g
	〃	アセンヤク	2.0g
	〃	シュクシャ	1.0g
	〃	センキュウ	1.0g
	〃	ダイオウ	1.0g
	局外生規	カシ	1.0g
		全　量	17.5g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。		
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。		
効能又は効果	しわがれ声，咽喉不快		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	響声破笛丸料		

規格及び試験方法

性　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品1包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　レンギョウ　外面は淡褐色～暗褐色を呈し，淡灰色の小隆起点が散在し，内面は黄褐色である。特異な芳香があり，味はわずかに収れん性である。

必要に応じて，「レンギョウ」の確認試験を準用する。

（2）　カンゾウ　外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現わす。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に 1～3 細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には 3～10 細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞中にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

（３）　キキョウ　外面は皮付きは灰褐色，皮去りは白色～淡褐色を呈し，繊維性でない。横切片をルーペ視するとき，皮部は木部よりやや薄く，ほとんど白色で，ところどころにすき間があり，形成層の付近はしばしば褐色を帯びる。木部は白色～淡褐色を呈し，その組織は皮部よりもやや密である。味は初めなく，後にえぐくて苦い。

必要に応じて，「キキョウ」の確認試験を準用する。

（４）　ハッカ　上面は淡褐黄色～淡緑黄色，下面は淡緑色～淡緑黄色である。葉をルーペ視するとき，両面に毛，腺毛及び腺りんをまばらに認め，腺毛及び腺りんは下面に多い。特異な芳香があり，口に含むと清涼感がある。

必要に応じて，「ハッカ」の確認試験を準用する。

（５）　アセンヤク　淡褐色～暗褐色の塊で，味は極めて渋く苦い。

必要に応じて，「アセンヤク」の確認試験を準用する。

（６）　シュクシャ　ほぼ球形又はだ円形を呈し，長さ 1～1.5cm，径 0.8～1cm，外面は灰褐色～暗褐色を呈し，石灰を散布して乾燥したものは白粉を付けている。種子塊は薄い膜で三部に分かれ，各部には仮種皮によって接合する 10～20 粒の種子がある。種子は多角形の粒状で，長さ 0.3～0.5cm，径約 0.3cm，外面には暗褐色で多数の細かい突起があり，質は堅い。種子を縫線に沿って縦断し，ルーペ視するとき，切面は細長く，へそは深くくぼみ，合点はややくぼんでいる。外乳は白色で，淡黄色の内乳及び胚を包み，胚は細長い。かめば特異な芳香があり，味は辛い。

（７）　センキュウ　外面は灰褐色～暗褐色で，切断面は灰白色～灰褐色，半透明で，ときにはうつろがある。質は密で堅い。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，皮部及び髄には油道が散在する。木部には厚膜で木化した木部繊維が大小不同の群をなして存在する。でんぷん粒は，通例，のり化していて，まれに径 5～25μm のでんぷん粒を認めることがある。シュウ酸カルシウム結晶は認めない。

（８）　ダイオウ　暗褐色～黄褐色～淡褐色を呈し，ルーペ視すると入り組んだ不規則な模様がある。質はおおむね粗で繊維性はない。特異なにおいがあり，味はわずかに渋くて苦い。かめば細かい砂をかむような感じがあり，だ液を黄色に染める。

必要に応じて，「ダイオウ」の確認試験を準用する。

（９）　カシ　ほぼ長卵形体～卵形体で，長さ 2.5～3.5cm，径 1.5～2.5cm である。外面は黄褐色～褐色を呈し，ややつやがあり，縦に 5 稜及びその間に不規則な稜があり，基部に果柄の脱落した小円状の跡がある。質は堅い。横切すると，果肉は厚さ 2～5mm で，暗褐色を呈し，内果皮は厚さ約 5mm で，黄褐色を呈し，その質は極めて堅く，褐色の縫合線が見られ，中央部には径約 5mm の種子 1 個がある。特異な弱いにおいがあり，味は苦く酸味があり，渋い。

乾燥減量　15%以下。

灰　　分　6%以下。

成分及び分量 又は本質	日本薬局方	レンギョウ	2.5g
	〃	カンゾウ	2.5g
	〃	キキョウ	2.5g
	〃	ハッカ	4.0g
	〃	アセンヤク	2.0g
	〃	シュクシャ	1.0g
	〃	センキュウ	1.0g
	〃	ダイオウ	1.0g
	局外生規	カシ	1.0g
		全　量	17.5g
製造方法	以上の生薬をそれぞれ末とし，「ハチミツ」を結合剤として丸剤の製法により丸剤 175 個とする。		
用法及び用量	大人 1 日数回，1 回 20 個を口に含み，徐々に溶かして服用する。 15 才未満 7 才以上　大人の 2/3，7 才未満 5 才以上　大人の 1/2 を服用する。		
効能又は効果	しわがれ声，咽喉不快		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	響声破笛丸		

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は黄褐色～淡黄褐色で，ハッカのにおいがある。

確認試験

（1）　レンギョウ　（ⅰ）　本品の粉末 1g に無水酢酸 10mL を加えてよく振り混ぜ，2 分間放置した後，ろ過する。ろ液 1mL に硫酸 0.5mL を穏やかに加えるとき，境界面は赤紫色を呈する（トリテルペノイド）。

（ⅱ）　本品の粉末 2g にメタノール 10mL を加え，水浴上で 2 分間加温した後，ろ過する。ろ液 5mL にリボン状マグネシウム 0.1g 及び塩酸 1mL を加えて放置するとき，液は淡赤色～黄赤色を呈する（フラボノイド）。

（2）　カンゾウ　本品の粉末 2g にエタノール（95）・水混液（7：3）10mL を加え，水浴上で 5 分間振り混ぜながら加熱し，冷後，ろ過し，ろ液を試料溶液とする。別に薄層ク

ロマトグラフ用グリチルリチン酸 5mg をエタノール（95）・水混液（7：3）1mL に溶かし，標準溶液とする。これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液 10μL 及び標準溶液 4μL を薄層クロマトグラフ用シリカゲル（蛍光剤入り）を用いて調製した薄層板にスポットする。次に，1 - ブタノール・水・酢酸（100）混液（7：2：1）を展開溶媒として約 10cm 展開した後，薄層板を風乾する。これに紫外線（主波長 254nm）を照射するとき，試料溶液から得た数個のスポットのうち 1 個のスポットは，標準溶液から得た暗紫色のスポットと色調及び *Rf* 値が等しい。

（３）　キキョウ　本品の粉末 4g にメタノール 30mL を加え，水浴上で 10 分間加温し，冷後，ろ過する。ろ液を蒸発乾固し，残留物をメタノール 4mL に溶かし，必要ならばろ過し，試料溶液とする。別にキキョウの粉末 0.7g をとり，試料溶液と同様に操作して標準溶液とする。これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び標準溶液 10μL ずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲルを用いて調製した薄層板にスポットする。次にクロロホルム・メタノール・水混液（13：10：2）を展開溶媒として約 10cm 展開した後，薄層板を風乾する。これにバニリン・硫酸試液を均等に噴霧し，105℃で 5 分間加熱するとき試料溶液から得たクロマトグラムの中に，標準溶液から得たスポットと同一の色調及び *Rf* 値をもつスポットを認める。

（４）　カシ　本品の粉末 3g に水 10mL を加えてよく振り混ぜた後，ろ過する。ろ液に塩化鉄（Ⅲ）試液 1～2 滴を加えるとき，液は暗紫色を呈する。

（５）　シュクシャ　本品の粉末に，薄めたグリセリン（1→2）又は抱水クロラール 50g を水 15mL とグリセリン 10mL の混液に溶かした液を滴加して鏡検するとき，多角形で膜の厚い褐色の石細胞群の破片を認める。

（６）　センキュウ　本品の粉末に，薄めたグリセリン（1→2）又は抱水クロラール 50g を水 15mL とグリセリン 10mL の混液に溶かした液を滴加して鏡検するとき，無色でのり化したでんぷんの塊とこれを含む柔細胞の破片を認める。

（７）　アセンヤク　本品の粉末に，オリブ油又は流動パラフィンを滴加して鏡検するとき，針状結晶の塊又は黄褐色～赤褐色の有角性の破片を認める。

（８）　ダイオウ　本品の粉末に，薄めたグリセリン（1→2）又は抱水クロラール 50g を水 15mL とグリセリン 10mL の混液に溶かした液を滴加して鏡検するとき，30～60μm（稀に 100μm を超えるものあり）のシュウ酸カルシウムの集晶を認める。

【 230 】　K37

成分及び分量 又は本質	日本薬局方	ソヨウ	3.0g
	〃	ゴミシ	2.0g
	〃	キョウニン	2.0g
	局外生規	ダイフクヒ	2.0g
	〃	ウバイ	2.0g
	〃	シオン	1.0g
	日本薬局方	キキョウ	1.0g
	〃	ソウハクヒ	1.0g
	〃	カンゾウ	1.0g
	〃	チンピ	1.0g
	〃	マオウ	1.0g
		全　量	17.0g
	局外生規	アキョウ	1.0g
製造方法	アキョウを除く以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製し，これにアキョウ 1.0g を添付する。		
用法及び用量	本品1包に水約 500mL を加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，添付のアキョウを煎液に入れ，再び5分ほど熱して溶かし，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の 2/3，7才未満4才以上　大人の 1/2，4才未満2才以上　大人の 1/3，2才未満　大人の 1/4 以下を服用する。		
効能又は効果	体力中等度以下で，気分がすぐれず，汗がなく，ときに顔がむくむものの次の諸症：せき，たん，気管支炎		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器，ただし，アキョウは気密容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	杏蘇散料		

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品1包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　ソヨウ　縮んだ葉の細片で，両面とも帯褐紫色，あるいは上面は灰緑色～帯褐緑色で下面は帯褐紫色を呈する。茎を交じえるものは，その横断面は方形である。葉をルーペ視するとき，両面にまばらに毛を認め，特に葉脈上に多く，裏面には細かい腺毛を認める。もみ砕くとき，特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

必要に応じて，「ソヨウ」の確認試験を準用する。

（2）　ゴミシ　暗赤色～黒褐色を呈し，表面にはしわがあり，またしばしば白い粉を付ける。果肉を除くとじん臓形の種子 1～2 個を認め，その外種皮は黄褐色～暗赤褐色を呈し，つやがあり，堅くてもろい。外種皮はたやすくはがれるが，内種皮は胚乳に密着し，背面に明らかな縫線を認める。酸味があり，後に渋くて苦い。

（3）　キョウニン　種皮は褐色で，表面にはすれて落ちやすい石細胞となった表皮細胞があって，粉をふいたようである。切断面は類白色である。味は苦く，油ようである。

表皮の表面を鏡検するとき，数個ずつ集合する石細胞はおおむね円形で，その細胞膜は均等に著しく厚くなり，径 60～90μm，側面視では鈍三角形で，細胞膜は先端部で著しく厚い。

必要に応じて，「キョウニン」の確認試験を準用する。

（4）　ダイフクヒ　淡灰褐色～暗褐色の繊維群を主とする。ルーペ視すると，繊維群が淡褐色～暗褐色の点として認められる。味はわずかに渋い。

必要に応じて，局外生規「ダイフクヒ」の確認試験を準用する。

（5）　ウバイ　果肉とこれに密着した内果皮，及び種子から成り果肉は黒色，外表面をつける部分は時に白色を帯びる。質は柔らかく粘性である。内果皮は淡褐色～帯赤褐色でややつやがあり堅い。厚さは約 2mm である。種子は偏圧した左右不均等な卵形を呈し，一端は鋭くとがり，他の一端は丸みを帯びてここに合点がある。長さ約 1cm，幅約 0.8cm，厚さ約 0.5cm，種皮は暗赤褐色で，合点から先端部に向かう維管束の走行による浅い縦じわがある。胚乳は褐色を呈する。わずかに特異なにおいがあり，果肉部には強い酸味がある。

必要に応じて，局外生規「ウバイ」の確認試験を準用する。

（6）　シオン　外面は淡褐色～帯紫褐色を呈し，切断面は褐色～淡褐色である。根の径は 1～2mm で，根には細かい縦じわがあり，質はやや柔軟である。特異なにおいがあり，味はわずかに苦くてややえぐい。

必要に応じて，局外生規「シオン」の確認試験を準用する。

（7）　キキョウ　外面は皮付きは灰褐色，皮去りは白色～淡褐色を呈し，繊維性でない。横切面をルーペ視するとき，皮部は木部よりやや薄く，ほとんど白色で，ところどころにすき間があり，形成層の付近はしばしば褐色を帯びる。木部は白色～淡褐色を呈し，その組織は皮部よりもやや密である。味は初めなく，後にえぐくて苦い。

必要に応じて，「キキョウ」の確認試験を準用する。

（8）　ソウハクヒ　外面は白色～黄褐色を呈し，周皮をつけたものは，その周皮が黄褐色ではがれやすい。横切面は白色～淡褐色を呈し，繊維性で，内面は暗黄褐色である。わずかに特異なにおいがある。

横切片を鏡検するとき，周皮を付けたものでは外側は 5～12 層のコルク細胞からなり，皮部にはところどころに師部繊維又はその束があり，しばしば師部柔組織と交互にややし

ま模様を呈する。また乳管及びシュウ酸カルシウムの単晶を認め，でんぷん粒は径 1～7μm，球形又はだ円球形の単粒又は複粒からなる。

必要に応じて，「ソウハクヒ」の確認試験を準用する。

（９）　カンゾウ　外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現わす。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に 1～3 細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には 3～10 細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞中にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

（10）　チンピ　外面は黄赤色～暗黄褐色で，油室による多数の小さいくぼみがあり，内面は白色～淡灰黄褐色である。厚さ約 2mm で，質は軽くてもろい。芳香があり，味は苦くて，わずかに刺激性である。

必要に応じて，「チンピ」の確認試験を準用する。

（11）　マオウ　細い円柱状又はだ円柱を呈し，長さ 3～10mm，径 1～2mm，淡緑色～黄緑色である。表面に多数の平行する縦みぞがあり，節部には，長さ 2～4mm の 2 枚のりん片状の葉が対生し，その基部は合着して筒状になっている。りん片状の葉の色は淡褐色～褐色である。茎の横断面をルーペ視するとき，円形～だ円形で，周囲部は灰緑色～黄緑色を呈し，中心部には赤緑色の物質が充満しているか，又は中空のところがある。味は渋くてわずかに苦く，やや麻ひ性である。

必要に応じて，「マオウ」の確認試験を準用する。

乾燥減量　10%以下。

灰　　分　6%以下。

【 231 】　K38

成分及び分量 又は本質	日本薬局方　クジン　10.0g 全　量　10.0g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。
用法及び用量	1包につき 500mL の水で煮て，250mL に煮つめ，かすをこして取り去り，適宜，患部に塗布する。
効能又は効果	ただれ，あせも，かゆみ
貯蔵方法及び 有効期間	密閉容器
規格及び試験方法	日本薬局方による。
備考	苦参湯

【 232 】　K39

成分及び分量又は本質	日本薬局方	ボウフウ	3.0g
	〃	ゴボウシ	3.0g
	〃	レンギョウ	5.0g
	〃	ケイガイ	1.5g
	〃	キョウカツ	1.5g
	〃	カンゾウ	1.5g
	〃	キキョウ	3.0g
	〃	セッコウ	5.0g
		全　量	23.5g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。		
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，熱いうちに煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。 本剤は必ず1日分ずつ煎じ，数日分をまとめて煎じないこと。		
効能又は効果	体力に関わらず使用でき，のどがはれて痛むものの次の諸症：扁桃炎，扁桃周囲炎		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	駆風解毒湯		

規格及び試験方法

性　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品1包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　ボウフウ　外面は淡褐色で，多数の縦じわがある。横断面の周辺皮部は灰褐色で，空げきが多く，中央木部は円形に黄色を呈する。味はわずかに甘い。

（2）　ゴボウシ　やや湾曲した倒長卵形のそう果で，長さ5～7mm，幅2.0～3.2mm，厚さ0.8～1.5mm，外面は灰褐色～褐色で，黒色の点がある。幅広い一端は径約1mmのくぼみがあり，他端は細まり平たんで不明瞭な縦の稜線がある。100粒の質量は1.0～1.5gである。ほとんどにおいがなく，味は苦く油様である。

横切片を鏡検するとき，外果皮は１層の表皮からなり，中果皮はやや厚壁化した柔組織からなり，内果皮は１層の石細胞層からなる。種皮は放射方向に長く厚壁化した表皮と数層の柔組織からなる。種皮の内側には内乳，子葉が見られる。中果皮柔細胞中には褐色物質を，内果皮石細胞中にはシュウ酸カルシウムの単晶を，子葉にはでんぷん粒，油滴，アリューロン粒及びシュウ酸カルシウムの微小な集晶を含む。

必要に応じて，「ゴボウシ」の確認試験を準用する。

（３）　レンギョウ　外面は淡褐色～暗褐色を呈し，淡灰色の小隆起点が散在し，内面は黄褐色である。味はない。

必要に応じて，「レンギョウ」の確認試験を準用する。

（４）　ケイガイ　細長い穂状を呈し，帯紫緑褐色～緑褐色である。花穂は細かい唇形花又はしばしば果実を含むがく筒を付ける。花穂の下部にはときに葉をつけるときがあり，葉は線状又は狭ひ針形である。花軸は方柱形で紫褐色を呈する。ルーペ視するとき，類白色の短毛を認める。特異な芳香があり，口に含むとわずかに清涼感がある。

必要に応じて，「ケイガイ」の確認試験を準用する。

（５）　キョウカツ　やや湾曲した円柱形～円錐形を呈し，長さ 3～10cm，径 5～20mm，ときに根茎は分枝する。外面は黄褐色～暗褐色である。根茎はその頂端にやや円形にくぼんだ茎の跡があり，ときには短い茎の残基を付け，外面には隆起した節があり，節間は，通例，短い。節にはいぼ状突起となった根の跡がある。根の外面には粗い縦じわ及びいぼ状突起となった側根の跡がある。質は軽くややもろくて折りやすい。横切面には多くの放射状の裂け目があり，皮部は黄褐色～褐色，木部は淡黄色～淡灰黄色，髄は灰白色～淡褐色を呈し，ルーペ視するとき，皮部及び髄には油道による褐色の細点を認める。特異なにおいがあり，味は初めわずかに酸味があり，後にやや辛く，わずかに麻痺性である。

横切片を鏡検するとき，最外層は数層～十数層のコルク層からなり，その内側に数層の厚角組織がある。皮層には多数の油道があり，大きいものでは径が 300μm に達する。また皮層には放射状に大きなすき間がある。髄にも油道があり，大きいものでは径が 500μm に達する。柔組織中には単粒及び 2～3 個の複粒のでんぷん粒を含む。

必要に応じて，「キョウカツ」の確認試験を準用する。

（６）　カンゾウ　外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現わす。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に 1～3 細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には 3～10 細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞中にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

（７）　キキョウ　外面は皮付きは灰褐色，皮去りは白色～淡褐色を呈し，繊維性でない。横切面をルーペ視するとき，皮部は木部よりやや薄く，ほとんど白色で，ところどころにすき間があり，形成層の付近はしばしば褐色を帯びる。皮部の厚さは木部の径よりやや薄く，ほとんど白色で，ところどころにすき間があり，木部は白色～淡褐色を呈し，その組織は皮部よりもやや密である。味は初めなく，後にえぐくて苦い。

必要に応じて，「キキョウ」の確認試験を準用する。

（８）　セッコウ　光沢のある白色の重い繊維状結晶塊で，におい及び味はない。砕くとたやすく針状～微細結晶性の粉末となる。水に溶けにくい。

必要に応じて，「セッコウ」の確認試験を準用する。

乾燥減量　14%以下。

灰　　分　28%以下。

【 233 】　K40

成分及び分量又は本質	日本薬局方	トウキ	1.5g
	〃	ケイガイ	1.5g
	〃	シャクヤク	1.5g
	〃	ボウフウ	1.5g
	〃	センキュウ	1.5g
	〃	ハッカ	1.5g
	〃	ジオウ	1.5g
	〃	キジツ	1.5g
	〃	オウレン	1.5g
	〃	カンゾウ	1.0g
	〃	オウゴン	1.5g
	〃	ビャクシ	1.5g
	〃	オウバク	1.5g
	〃	キキョウ	1.5g
	〃	サンシシ	1.5g
	〃	サイコ	1.5g
	〃	レンギョウ	1.5g
		全　　量	25.0g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。		
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。		
効能又は効果	体力中等度以上で，皮膚の色が浅黒く，ときに手足の裏に脂汗をかきやすく腹壁が緊張しているものの次の諸症：蓄膿症（副鼻腔炎），慢性鼻炎，慢性扁桃炎，にきび		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	荊芥連翹湯		

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品 1 包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　トウキ　外面は暗褐色～赤褐色で，縦じわがあり，切断面は淡黄色～黄褐色を呈する。特異なにおいがあり，味はわずかに甘く，後にやや辛い。

横切片を鏡検するとき，コルク層は 4～10 層からなり，その内側に数層の厚角組織が続いている。皮部には分泌細胞に囲まれた多数の樹脂道並びにしばしば大きなすき間がある。形成層は長方形に偏圧された数層の細胞からなり，明らかに皮部と木部とを区別する。木部では多数の道管と放射組織とが交互に放射状に配列し，その外方の道管は単独又は数個集まってやや密に配列してくさび状をなすが，中心部付近の道管は極めてまばらに存在する。でんぷん粒は径 19μm 以下，まれに 2～5 個の複粒があり，複粒の径は 25μm に達し，しばしばのり化している。

（2）　ケイガイ　茎，輪散花序に集合したがく筒，これら及びときには葉の砕片，種子ようの微粒の分果からなる。茎は方形で外面はおおむね紫褐色，径約 1mm である。がく筒は淡褐色～黄緑色で長さ 2～3mm，ルーペ視するとき，先端はきょ歯辺，筒部には数条の線があり，唇形花又は果実を含み，茎とともに類白色の短毛を認める。分果は黄褐色～黒色，両端の細いだ円体で長さ 1～1.5mm，径は長さのほぼ 1/2 である。特異な芳香があり，口に含むとわずかに清涼感がある。

必要に応じて，「ケイガイ」の確認試験を準用する。

（3）　シャクヤク　外面は褐色～淡灰褐色を呈し，横断面はち密で淡灰褐色を呈し，木部には淡褐色の放射状の線がある。わずかに特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後に渋くてわずかに苦い。

必要に応じて，「シャクヤク」の確認試験を準用する。

（4）　ボウフウ　外面は淡褐色で，多数の縦じわがある。横断面の周辺は灰褐色で，空げきが多く，中央は円形に黄色を呈する。味はわずかに甘い。

（5）　センキュウ　外面は灰褐色～暗褐色で，切断面は灰白色～灰褐色，半透明で，ときにはうつろがある。質は密で堅い。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，皮部及び髄には油道が散在する。木部には厚膜で木化した木部繊維が大小不同の群をなして存在する。でんぷん粒は，通例，のり化していて，まれに径 5～25μm のでんぷん粒を認めることがある。シュウ酸カルシウム結晶は認めない。

（6）　ハッカ　上面は淡褐黄色～淡緑黄色，下面は淡緑色～淡緑黄色である。葉をルーペ視するとき，両面に毛，腺毛及び腺りんをまばらに認め，腺毛及び腺りんは下面に多い。特異な芳香があり，口に含むと清涼感がある。

必要に応じて，「ハッカ」の確認試験を準用する。

（7）　ジオウ　外面は黄褐色～黒褐色を呈し，深い縦みぞ及びくびれがある。質は柔らかく粘性である。横断面は黄褐色～黒褐色で，皮部は木部より色が濃く，ほとんど髄を認めない。特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後にやや苦い。

横切片を鏡検するとき，コルク層は 7～15 層で，皮部はすべて柔細胞からなり，外皮部に褐色の分泌物を含む細胞が散在する。木部はほとんど柔細胞で満たされ，放射状に並ぶ道管は側孔のある網紋があり，弱い木化反応を呈する。

（８）　キジツ　外面は濃緑褐色～褐色で，つやがなく，油室による多数のくぼんだ小点がある。切断面は淡灰褐色を呈し，内果皮を付ける部分は褐色を呈する。特異なにおいがあり，味は苦い。

必要に応じて，「キジツ」の確認試験を準用する。

（９）　オウレン　根茎の径は 2～7mm で，外面は灰黄褐色～褐色を呈し，輪節及び多数の根の基部を認め，横断面はやや繊維性で，コルク層は淡灰褐色，皮部は黄褐色，木部は黄色，髄は黄褐色である。味は極めて苦く，残留性で，だ液を黄色に染める。

横切片を鏡検するとき，コルク層は薄膜のコルク細胞からなり，皮部柔組織中にはコルク層に近い部位に石細胞群，形成層に近い部位に黄色の師部繊維の認められるものが多い。木部は主として道管，仮道管，木部繊維からなり，放射組織は明らかで，髄は大きく，髄中には石細胞あるいは厚膜木化した細胞を伴った石細胞を認めることがある。柔細胞には細かいでんぷん粒を含むが，結晶を含まない。

必要に応じて，「オウレン」の確認試験を準用する。

（10）　カンゾウ　外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現わす。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に 1～3 細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には 3～10 細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞中にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

（11）　オウゴン　外面は黄褐色～暗褐色を呈し，切断面は黄色～帯褐黄色を呈し，縦に繊維性のすじが見られる。味はわずかに苦い。

必要に応じて，「オウゴン」の確認試験を準用する。

（12）　ビャクシ　外面は灰褐色～暗褐色を呈し，縦じわがあり，横断面の周辺は灰白色で空げきが多く，中央部は暗褐色である。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

必要に応じて，「ビャクシ」の確認試験を準用する。

（13）　オウバク　外面は灰黄褐色～灰褐色で，内面は黄色～暗黄褐色で，細かい縦線がある。横断面は鮮黄色でやや繊維性である。横切面をルーペ視するとき，皮部外層は黄色で薄く，石細胞が黄褐色の点状に分布する。皮部内層は厚く，一次放射組織は外方に向かうにしたがい幅が広がり，それらの一次放射組織の間に，多くの二次放射組織が集まってほぼ三角形の師部を形成し，この組織に褐色を呈する師部繊維束が層積して接線方向に並び，放射組織と交錯して格子状を呈する。味は極めて苦く，粘液性で，だ液を黄色に染める。

必要に応じて，「オウバク」の確認試験を準用する。

（14）　キキョウ　外面は皮付きは灰褐色，皮去りは白色～淡褐色を呈し，繊維性でない。横切面をルーペ視するとき，皮部は木部よりやや薄く，ほとんど白色で，ところどころにすき間があり，形成層の付近はしばしば褐色を帯びる。木部は白色～淡褐色を呈し，その組織は皮部よりもやや密である。味は初めなく，後にえぐくて苦い。

必要に応じて，「キキョウ」の確認試験を準用する。

（15）　サンシシ　果皮は薄く砕きやすく，その外面は赤褐色，黄赤色又は黒褐色を呈し，内面は黄褐色を呈し，平らでつやがある。果実の内部は 2 室に分かれ，黄赤色～暗赤色の果肉中に黒褐色又は黄赤色で長径約 5mm の偏平な種子の団塊を含む。質は軽い。弱いにおいがあり，味は苦い。

必要に応じて，「サンシシ」の確認試験を準用する。

（16）　サイコ　外面は灰褐色～褐色で，深いしわがあるものがあり，横断面では，皮部は褐色，木部は淡褐色を呈する。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，皮部にはしばしば接線方向に長い裂け目があり，皮部の厚さは半径の 1/3～1/2 で，径 15～35μm の胞間性離生油道がやや多数散在し，木部には道管が放射状若しくはほぼ階段状に配列し，ところどころに繊維群があり，根頭部の髄には皮部と同様の油道がある。柔細胞中にはでんぷん粒を満たし，また油滴を認める。

必要に応じて，「サイコ」の確認試験を準用する。

（17）　レンギョウ　外面は淡褐色～暗褐色を呈し，淡灰色の小隆起点が散在し，内面は黄褐色である。特異な芳香があり，味はわずかに収れん性である。

必要に応じて，「レンギョウ」の確認試験を準用する。

乾燥減量　10%以下。

灰　　分　6%以下。

【 234 】　K41

成分及び分量又は本質	日本薬局方	ケイヒ	3.0g
	〃	シャクヤク	3.0g
	〃	タイソウ	4.0g
	〃	ショウキョウ	1.0g
	〃	カンゾウ	2.0g
	〃	オウギ	3.0g
		全　　量	16.0g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。		
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。		
効能又は効果	体力虚弱なものの次の諸症：ねあせ，あせも，湿疹・皮膚炎		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	桂枝加黄耆湯		

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品1包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　ケイヒ　外面は暗赤褐色を呈し，内面は赤褐色を呈し，平滑である。横断面は赤褐色を呈し淡褐色の薄層が見られる。特異なにおいがあり，味は甘く，辛く，後にやや粘液性で，わずかに収れん性である。

横切片を鏡検するとき，一次皮部と二次皮部はほとんど連続した石細胞環で区分され，環の外辺にはほぼ円形に結集した繊維束を伴い，環の各石細胞の膜はしばしばU字形に肥厚する。二次皮部中には石細胞を認めず，まばらに少数の厚膜繊維を認める。柔組織中には油細胞，粘液細胞及び微細なシュウ酸カルシウムの針晶を含む細胞があり，柔細胞中にはでんぷん粒を含む。

（2）　シャクヤク　外面は褐色～淡灰褐色を呈し，横断面はち密で淡灰褐色を呈し，木部には淡褐色の放射状の線がある。わずかに特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後に渋くてわずかに苦い。

必要に応じて，「シャクヤク」の確認試験を準用する。

（３）　タイソウ　外面は赤褐色であらいしわがあるか，又は暗灰赤色で細かいしわがあり，いずれもつやがある。外果皮は薄く革質で，中果皮は暗灰褐色を呈し，海綿ようで柔らかく粘着性があり，内果皮は極めて堅く，種子は偏平である。わずかに特異なにおいがあり，味は甘い。

（４）　ショウキョウ　淡灰黄色の周皮を付けたままか，又はその一部をはぎとってあり，表面は灰白色～淡灰褐色で，しばしば白粉を付けている。横断面は繊維性，粉性で，淡帯黄褐色を呈し，皮層と中心柱とに分かれる。横断面をルーペ視するとき，その全面に維管束及び分泌物が褐色の細点として散在している。特異なにおいがあり，味は極めて辛い。

（５）　カンゾウ　外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現わす。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に 1～3 細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には 3～10 細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞中にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

（６）　オウギ　外面は淡灰黄色～淡褐黄色で，不規則なあらい縦じわがあり，折面は繊維性である。横断面をルーペ視するとき，最外層には周皮があり，皮部は淡黄白色，木部は淡黄色，形成層付近はやや褐色を帯びる。木部から皮部にわたって白色の放射組織が認められる。太いものではしばしば多数の放射状の裂け目となっている。わずかに特異なにおいがあり，味は甘い。

乾燥減量　15％以下。

灰　　分　5％以下。

【 235 】　K42

成分及び分量又は本質	日本薬局方	ケイヒ	3.0g
	〃	シャクヤク	3.0g
	〃	タイソウ	3.0g
	〃	ショウキョウ	1.0g
	〃	カンゾウ	1.6～2.0g
	〃	カッコン	6.0g
		全　　量	17.6～18.0g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。		
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。		
効能又は効果	体力中等度以下で，汗が出て，肩こりや頭痛のあるものの次の症状：かぜの初期		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	桂枝加葛根湯		

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品1包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　ケイヒ　外面は暗赤褐色を呈し，内面は赤褐色を呈し，平滑である。横断面は赤褐色を呈し淡褐色の薄層が見られる。特異なにおいがあり，味は甘く，辛く，後にやや粘液性で，わずかに収れん性である。

横切片を鏡検するとき，一次皮部と二次皮部はほとんど連続した石細胞環で区分され，環の外辺にはほぼ円形に結集した繊維束を伴い，環の各石細胞の膜はしばしばU字形に肥厚する。二次皮部中には石細胞を認めず，まばらに少数の厚膜繊維を認める。柔組織中には油細胞，粘液細胞及び微細なシュウ酸カルシウムの針晶を含む細胞があり，柔細胞中にはでんぷん粒を含む。

（２）　シャクヤク　外面は褐色～淡灰褐色を呈し，横断面はち密で淡灰褐色を呈し，木部には淡褐色の放射状の線がある。わずかに特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後に渋くてわずかに苦い。

必要に応じて，「シャクヤク」の確認試験を準用する。

（３）　タイソウ　外面は赤褐色であらいしわがあるか，又は暗灰赤色で細かいしわがあり，いずれもつやがある。外果皮は薄く革質で，中果皮は暗灰褐色を呈し，海綿ようで柔らかく粘着性があり，内果皮は極めて堅く，種子は偏平である。わずかに特異なにおいがあり，味は甘い。

（４）　ショウキョウ　淡灰黄色の周皮を付けたままか，又はその一部をはぎとってあり，表面は灰白色～淡灰褐色で，しばしば白粉を付けている。横断面は繊維性，粉性で，淡帯黄褐色を呈し，皮層と中心柱とに分かれる。横断面をルーペ視するとき，その全面に維管束及び分泌物が褐色の細点として散在している。特異なにおいがあり，味は極めて辛い。

（５）　カンゾウ　外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現わす。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に 1～3 細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には 3～10 細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞中にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

（６）　カッコン　淡灰黄色～灰白色を呈し，繊維性でやや粉性である。味はわずかに甘い。横切片を鏡検するとき，師部には結晶細胞列を伴った繊維束，木部には道管及び木部繊維が著しく，柔組織を満たすでんぷん粒は長径 2～18μm，多くは 8～12μm の数面からなる多面体の単粒，まれに 2～3 個からなる複粒で，中央にへそ又は欠裂を認め，層紋がある。

乾燥減量　15%以下。

灰　　分　10%以下。

【 236 】　K43

成分及び分量又は本質	日本薬局方	ケイヒ	3.0g
	〃	シャクヤク	3.0g
	〃	タイソウ	3.0g
	〃	カンゾウ	1.6～2.0g
	〃	コウボク	2.0g
	〃	キョウニン	3.0g
	〃	ショウキョウ	1.0g
		全　　量	16.6～17.0g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。		
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。		
効能又は効果	体力虚弱なものの次の諸症：せき，気管支炎，気管支ぜんそく		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	桂枝加厚朴杏仁湯		

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品1包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　ケイヒ　外面は暗赤褐色を呈し，内面は赤褐色を呈し，平滑である。横断面は赤褐色を呈し淡褐色の薄層が見られる。特異なにおいがあり，味は甘く，辛く，後にやや粘液性で，わずかに収れん性である。

横切片を鏡検するとき，一次皮部と二次皮部はほとんど連続した石細胞環で区分され，環の外辺にはほぼ円形に結集した繊維束を伴い，環の各石細胞の膜はしばしばU字形に肥厚する。二次皮部中には石細胞を認めず，まばらに少数の厚膜繊維を認める。柔組織中には油細胞，粘液細胞及び微細なシュウ酸カルシウムの針晶を含む細胞があり，柔細胞中にはでんぷん粒を含む。

（２）　シャクヤク　外面は褐色～淡灰褐色を呈し，横断面はち密で淡灰褐色を呈し，木部には淡褐色の放射状の線がある。わずかに特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後に渋くてわずかに苦い。

必要に応じて，「シャクヤク」の確認試験を準用する。

（３）　タイソウ　外面は赤褐色であらいしわがあるか，又は暗灰赤色で細かいしわがあり，いずれもつやがある。外果皮は薄く革質で，中果皮は暗灰褐色を呈し，海綿ようで柔らかく粘着性があり，内果皮は極めて堅く，種子は偏平である。わずかに特異なにおいがあり，味は甘い。

（４）　カンゾウ　外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現わす。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に 1～3 細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には 3～10 細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞中にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

（５）　コウボク　外面は灰白色～灰褐色を呈し，内面は淡褐色～褐色，切断面は淡赤褐色を呈し，繊維性である。わずかに芳香があり，味は苦い。

横切片を鏡検するとき，コルク層は厚く，ほぼ等径性の石細胞が環状に内接する。一次皮部は狭く，内しょう部には繊維群が点在し，二次皮部の放射組織間には師部繊維群が階段状に並ぶ。油細胞の多数は一次皮部に，少数は二次皮部に散在し，狭い放射組織内にも認められることがある。

必要に応じて，「コウボク」の確認試験を準用する。

（６）　キョウニン　種皮は褐色で，表面にはすれて落ちやすい石細胞となった表皮細胞があって，粉をふいたようである。切断面は類白色である。味は苦く，油ようである。

表皮の表面を鏡検するとき，数個ずつ集合する石細胞はおおむね円形で，その細胞膜は均等に著しく厚くなり，径 60～90μm，側面視では鈍三角形で，細胞膜は先端部で著しく厚い。

必要に応じて，「キョウニン」の確認試験を準用する。

（７）　ショウキョウ　淡灰黄色の周皮を付けたままか，又はその一部をはぎとってあり，表面は灰白色～淡灰褐色で，しばしば白粉を付けている。横断面は繊維性，粉性で，淡帯黄褐色を呈し，皮層と中心柱とに分かれる。横断面をルーペ視するとき，その全面に維管束及び分泌物が褐色の細点として散在している。特異なにおいがあり，味は極めて辛い。

乾燥減量　15％以下。

灰　　分　5％以下。

【 237 】　K44

成分及び分量又は本質	日本薬局方	ケイヒ	3.0g
	〃	タイソウ	3.0g
	〃	シャクヤク	4.0g
	〃	ショウキョウ	1.5g
	〃	カンゾウ	1.6～2.0g
	〃	ニンジン	3.0g
		全　　量	16.1～16.5g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。		
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。		
効能又は効果	体力虚弱なものの次の諸症：みぞおちのつかえ，腹痛，手足の痛み		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	桂枝加芍薬生姜人参湯		

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品1包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　ケイヒ　外面は暗赤褐色を呈し，内面は赤褐色を呈し，平滑である。横断面は赤褐色を呈し淡褐色の薄層が見られる。特異なにおいがあり，味は甘く，辛く，後にやや粘液性で，わずかに収れん性である。

横切片を鏡検するとき，一次皮部と二次皮部はほとんど連続した石細胞環で区分され，環の外辺にはほぼ円形に結集した繊維束を伴い，環の各石細胞の膜はしばしばU字形に肥厚する。二次皮部中には石細胞を認めず，まばらに少数の厚膜繊維を認める。柔組織中には油細胞，粘液細胞及び微細なシュウ酸カルシウムの針晶を含む細胞があり，柔細胞中にはでんぷん粒を含む。

（2）　タイソウ　外面は赤褐色であらいしわがあるが，又は暗灰赤色で細かいしわがあり，いずれもつやがある。外果皮は薄く革質で，中果皮は暗灰褐色を呈し，海綿ようで柔

らかく粘着性があり，内果皮は極めて堅く，種子は偏平である。わずかに特異なにおいがあり，味は甘い。

（３）　シャクヤク　外面は褐色～淡灰褐色を呈し，横断面はち密で淡灰褐色を呈し，木部には淡褐色の放射状の線がある。わずかに特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後に渋くてわずかに苦い。

必要に応じて，「シャクヤク」の確認試験を準用する。

（４）　ショウキョウ　淡灰黄色の周皮を付けたままか，又はその一部をはぎとってあり，表面は灰白色～淡灰褐色で，しばしば白粉を付けている。横断面は繊維性，粉性で，淡帯黄褐色を呈し，皮層と中心柱とに分かれる。横断面をルーペ視するとき，その全面に維管束及び分泌物が褐色の細点として散在している。特異なにおいがあり，味は極めて辛い。

（５）　カンゾウ　外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現わす。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に 1～3 細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には 3～10 細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞中にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

（６）　ニンジン　外面は淡黄褐色～淡灰褐色を呈し，縦じわがあり，横断面は淡黄褐色を呈し，形成層の付近は褐色を呈する。特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後にやや苦い。

必要に応じて，「ニンジン」の確認試験を準用する。

乾燥減量　15％以下。

灰　　分　5％以下。

【 238 】　K45

成分及び分量又は本質	日本薬局方	ケイヒ	4.0g
	〃	シャクヤク	6.0g
	〃	タイソウ	4.0g
	〃	ショウキョウ	1.0g
	〃	カンゾウ	2.0g
	〃	ダイオウ	1.0g
		全　　量	18.0g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。		
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。		
効能又は効果	体力中等度以下で，腹部膨満感，腹痛があり，便秘するものの次の諸症：便秘，しぶり腹		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	桂枝加芍薬大黄湯		

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品1包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　ケイヒ　外面は暗赤褐色を呈し，内面は赤褐色を呈し，平滑である。横断面は赤褐色を呈し淡褐色の薄層が見られる。特異なにおいがあり，味は甘く，辛く，後にやや粘液性で，わずかに収れん性である。

横切片を鏡検するとき，一次皮部と二次皮部はほとんど連続した石細胞環で区分され，環の外辺にはほぼ円形に結集した繊維束を伴い，環の各石細胞の膜はしばしばU字形に肥厚する。二次皮部中には石細胞を認めず，まばらに少数の厚膜繊維を認める。柔組織中には油細胞，粘液細胞及び微細なシュウ酸カルシウムの針晶を含む細胞があり，柔細胞中にはでんぷん粒を含む。

（２）　シャクヤク　外面は褐色～淡灰褐色を呈し，横断面はち密で淡灰褐色を呈し，木部には淡褐色の放射状の線がある。わずかに特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後に渋くてわずかに苦い。

必要に応じて，「シャクヤク」の確認試験を準用する。

（３）　タイソウ　外面は赤褐色であらいしわがあるか，又は暗灰赤色で細かいしわがあり，いずれもつやがある。外果皮は薄く革質で，中果皮は暗灰褐色を呈し，海綿ようで柔らかく粘着性があり，内果皮は極めて堅く，種子は偏平である。わずかに特異なにおいがあり，味は甘い。

（４）　ショウキョウ　淡灰黄色の周皮を付けたままか，又はその一部をはぎとってあり，表面は灰白色～淡灰褐色で，しばしば白粉を付けている。横断面は繊維性，粉性で，淡帯黄褐色を呈し，皮層と中心柱とに分かれる。横断面をルーペ視するとき，その全面に維管束及び分泌物が褐色の細点として散在している。特異なにおいがあり，味は極めて辛い。

（５）　カンゾウ　外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現わす。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に 1～3 細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には 3～10 細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞中にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

（６）　ダイオウ　暗褐色～黄褐色～淡褐色を呈し，ルーペ視すると入り組んだ不規則な模様がある。質はおおむね粗で繊維性ではない。特異なにおいがあり，味はわずかに渋くて苦い。かめば細かい砂をかむような感じがあり，だ液を黄色に染める。

必要に応じて，「ダイオウ」の確認試験を準用する。

乾燥減量　15％以下。

灰　　分　5％以下。

【 239 】　K46

成分及び分量 又は本質	日本薬局方	ケイヒ	3.0g
	〃	タイソウ	3.0g
	〃	ショウキョウ	1.0g
	〃	シャクヤク	6.0g
	〃	カンゾウ	2.0g
		全　　量	15.0g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。		
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。		
効能又は効果	体力中等度以下で，腹部膨満感のあるものの次の諸症：しぶり腹，腹痛，下痢，便秘		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	桂枝加芍薬湯		

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品1包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　ケイヒ　外面は暗赤褐色を呈し，内面は赤褐色を呈し，平滑である。横断面は赤褐色を呈し淡褐色の薄層が見られる。特異なにおいがあり，味は甘く，辛く，後にやや粘液性で，わずかに収れん性である。

横切片を鏡検するとき，一次皮部と二次皮部はほとんど連続した石細胞環で区分され，環の外辺にはほぼ円形に結集した繊維束を伴い，環の各石細胞の膜はしばしばU字形に肥厚する。二次皮部中には石細胞を認めず，まばらに少数の厚膜繊維を認める。柔組織中には油細胞，粘液細胞及び微細なシュウ酸カルシウムの針晶を含む細胞があり，柔細胞中にはでんぷん粒を含む。

（2）　タイソウ　外面は赤褐色であらいしわがあるが，又は暗灰赤色で細かいしわがあり，いずれもつやがある。外果皮は薄く革質で，中果皮は暗灰褐色を呈し，海綿ようで柔

らかく粘着性があり，内果皮は極めて堅く，種子は偏平である。わずかに特異なにおいがあり，味は甘い。

（３）　ショウキョウ　淡灰黄色の周皮を付けたままか，又はその一部をはぎとってあり，表面は灰白色～淡灰褐色で，しばしば白粉を付けている。横断面は繊維性，粉性で，淡帯黄褐色を呈し，皮層と中心柱とに分かれる。横断面をルーペ視するとき，その全面に維管束及び分泌物が褐色の細点として散在している。特異なにおいがあり，味は極めて辛い。

（４）　シャクヤク　外面は褐色～淡灰褐色を呈し，横断面はち密で淡灰褐色を呈し，木部には淡褐色の放射状の線がある。わずかに特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後に渋くてわずかに苦い。

必要に応じて，「シャクヤク」の確認試験を準用する。

（５）　カンゾウ　外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現わす。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に 1～3 細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には 3～10 細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞中にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

乾燥減量　20%以下。

灰　　分　5%以下。

【 240 】　K47

成分及び分量又は本質	日本薬局方	ケイヒ	4.0g
	〃	シャクヤク	4.0g
	〃	タイソウ	4.0g
	〃	ショウキョウ	1.0g
	〃	カンゾウ	2.0g
	〃	ビャクジュツ	4.0g
	〃	ブシ	0.5g
		全　　量	19.5g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。		
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。		
効能又は効果	体力虚弱で，汗が出，手足が冷えてこわばり，ときに尿量が少ないものの次の諸症：関節痛，神経痛		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	桂枝加朮附湯		

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品1包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　ケイヒ　外面は暗赤褐色を呈し，内面は赤褐色を呈し，平滑である。横断面は赤褐色を呈し淡褐色の薄層が見られる。特異なにおいがあり，味は甘く，辛く，後にやや粘液性で，わずかに収れん性である。

横切片を鏡検するとき，一次皮部と二次皮部はほとんど連続した石細胞環で区分され，環の外辺にはほぼ円形に結集した繊維束を伴い，環の各石細胞の膜はしばしばU字形に肥厚する。二次皮部中には石細胞を認めず，まばらに少数の厚膜繊維を認める。柔組織中には油細胞，粘液細胞及び微細なシュウ酸カルシウムの針晶を含む細胞があり，柔細胞中にはでんぷん粒を含む。

（２）　シャクヤク　外面は褐色～淡灰褐色を呈し，横断面はち密で淡灰褐色を呈し，木部には淡褐色の放射状の線がある。わずかに特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後に渋くてわずかに苦い。

必要に応じて，「シャクヤク」の確認試験を準用する。

（３）　タイソウ　外面は赤褐色であらいしわがあるが，又は暗灰赤色で細かいしわがあり，いずれもつやがある。外果皮は薄く革質で，中果皮は暗灰褐色を呈し，海綿ようで柔らかく粘着性があり，内果皮は極めて堅く，種子は偏平である。わずかに特異なにおいがあり，味は甘い。

（４）　ショウキョウ　淡灰黄色の周皮を付けたままか，又はその一部をはぎとってあり，表面は灰白色～淡灰褐色で，しばしば白粉を付けている。横断面は繊維性，粉性で，淡帯黄褐色を呈し，皮層と中心柱とに分かれる。横断面をルーペ視するとき，その全面に維管束及び分泌物が褐色の細点として散在している。特異なにおいがあり，味は極めて辛い。

（５）　カンゾウ　外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現わす。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に 1～3 細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には 3～10 細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞中にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

（６）　ビャクジュツ　外面は淡灰黄色～淡黄白色で，ところどころ灰褐色を呈し，横切面には淡黄褐色～褐色の分泌物による細点がある。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，皮部の柔組織中にはしばしば師管の外側に接して繊維束があり，放射組織の末端部には淡褐色～褐色の内容物を含む油室がある。木部には大きい髄を囲んで放射状に配列した短径の道管とそれを囲む著しい繊維束がある。髄及び放射組織中には皮部と同様な油室があり，柔組織中にはイヌリンの小球晶及びシュウ酸カルシウムの針晶を含む。

必要に応じて，「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。

（７）　ブシ　本品はほぼ倒円錐形で，長さ 15～30mm，径 12～16mm，又は縦ときに横に切断され，長さ 20～60mm，幅 15～40mm，厚さ 200～700μm，又は径 12mm 以下の不整な多角形に破砕されている。外面は淡褐色～暗褐色又は黄褐色を呈する。質は堅く，通例，しわはなく，切面は平らで，淡褐色～暗褐色又は黄白色～淡黄褐色を呈し，通常角質，半透明で光沢がある。弱い特異なにおいがある。

横切片及び縦切片を鏡検するとき，外側から擬上皮，一次皮層，内皮，二次皮層，形成層，木部が認められる。一次皮層には楕円形～楕円状四角形，短径 30～75μm，長径 60～150μm の厚壁細胞がある。内皮は接線方向に長い 1 層の細胞からなっている。形成層輪は星形又は不整の多角形～円形であり，木部の道管群はＶ字形を呈する。二次皮層及び髄中に独立した形成層輪が認められるものもある。道管は孔紋，階紋，網紋又はらせん紋道管である。柔細胞中のでんぷん粒は糊化している。

必要に応じて，「ブシ」の確認試験を準用する。

純度試験　本品 1 包中のアコニチン（$C_{34}H_{47}O_{11}N$：645.75）の残存量は 0.01mg 以下である。

本品 1 包を粉末とし，その重量を精密に量り，これにメタノール 50mL を加え一夜放置した後，1 時間振とうし，ろ紙を用いてろ過する。残渣に再びメタノール 30mL を加え 1 時間振とうした後，前記ろ紙を用いてろ過する。またこの残渣をメタノール 30mL で 2 回洗い，全量を合わせ減圧下でメタノールをほとんど留去する。残留物に希塩酸 10mL を加え水浴上で加温溶解する。冷後，分液ろう斗に脱脂綿を用いてろ過し，水 10mL で 2 回洗う。ろ液を合わせ，これにアンモニア水（28）を加えてアルカリ性とする。これにクロロホルム 50mL を加えて良く振り混ぜた後に下層を分取する。この操作を 2 回繰り返した後，クロロホルムを合わせ，これに水 10mL を加え洗った後，クロロホルム層を分取し，無水硫酸ナトリウムを加えて脱水する。これをろ過し，減圧下で蒸発乾固する。残留物をクロロホルム 1mL に正確に溶かして試料溶液とする。

別にアコニチン 20mg を精密に量り，クロロホルム 10mL に溶かし正確にメスアップする。この溶液 1mL を正確に量り，10mL に正確に希釈し標準溶液とする。

試料溶液及び標準溶液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。あらかじめ薄層クロマトグラフ用シリカゲルを用いて 0.25mm の厚さに調製し活性化した薄層板に試料溶液 0.3mL，標準溶液 10μL 及び 15μL を正確に塗布する。次にブタノール・酢酸・水（4：1：5）の混合溶液の上層を展開溶媒として，約 10cm 展開しこれを風乾した後，噴霧用ドラーゲンドルフ試液を均等に噴霧するとき，試料溶液から得られるアコニチンに対応するスポットの濃さは標準溶液の 10μL を塗布した方から得られるスポットより濃いことはあっても，標準溶液の 15μL を塗布した方から得られるスポットより濃くない。

乾燥減量　15%以下。

灰　　分　5%以下。

【 241 】　K48

成分及び分量又は本質	日本薬局方	ケイヒ	3.0g
	〃	シャクヤク	3.0g
	〃	タイソウ	3.0g
	〃	ショウキョウ	1.0g
	〃	カンゾウ	2.0g
	〃	リュウコツ	2.0g
	〃	ボレイ	3.0g
		全　　量	17.0g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。		
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。		
効能又は効果	体力中等度以下で，疲れやすく，神経過敏で，興奮しやすいものの次の諸症：神経質，不眠症，小児夜泣き，夜尿症，眼精疲労，神経症		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	桂枝加竜骨牡蛎湯		

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品1包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　ケイヒ　外面は暗赤褐色を呈し，内面は赤褐色を呈し，平滑である。横断面は赤褐色を呈し淡褐色の薄層が見られる。特異なにおいがあり，味は甘く，辛く，後にやや粘液性で，わずかに収れん性である。

横切片を鏡検するとき，一次皮部と二次皮部はほとんど連続した石細胞環で区分され，環の外辺にはほぼ円形に結集した繊維束を伴い，環の各石細胞の膜はしばしばU字形に肥厚する。二次皮部中には石細胞を認めず，まばらに少数の厚膜繊維を認める。柔組織中には油細胞，粘液細胞及び微細なシュウ酸カルシウムの針晶を含む細胞があり，柔細胞中にはでんぷん粒を含む。

（２）　シャクヤク　外面は褐色～淡灰褐色を呈し，横断面はち密で淡灰褐色を呈し，木部には淡褐色の放射状の線がある。わずかに特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後に渋くてわずかに苦い。

必要に応じて，「シャクヤク」の確認試験を準用する。

（３）　タイソウ　外面は赤褐色であらいしわがあるか，又は暗灰赤色で細かいしわがあり，いずれもつやがある。外果皮は薄く革質で，中果皮は暗灰褐色を呈し，海綿ようで柔らかく粘着性があり，内果皮は極めて堅く，種子は偏平である。わずかに特異なにおいがあり，味は甘い。

（４）　ショウキョウ　淡灰黄色の周皮を付けたままか，又はその一部をはぎとってあり，表面は灰白色～淡灰褐色で，しばしば白粉を付けている。横断面は繊維性，粉性で，淡帯黄褐色を呈し，皮層と中心柱とに分かれる。横断面をルーペ視するとき，その全面に維管束及び分泌物が褐色の細点として散在している。特異なにおいがあり，味は極めて辛い。

（５）　カンゾウ　外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現わす。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に 1～3 細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には 3～10 細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞中にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

（６）　リュウコツ　不定形の塊又は破片で，ときには円柱状の塊である。表面は淡灰白色を呈し，ところどころに灰黒色又は黄褐色の斑点を付けるものがある。外側は質のち密な 2～10mm の層からなり，その内方は淡褐色を呈する海綿質からなる。質は重くてかたいが，ややもろく，破砕すると小片及び粉末となる。におい及び味はないが，なめると舌に強く吸着する。

必要に応じて，「リュウコツ」の確認試験を準用する。

（７）　ボレイ　薄い小片に砕いた貝がらで，外面は淡緑灰褐色，内面は乳白色を呈する。ほとんどにおい及び味はない。

必要に応じて，「ボレイ」の確認試験を準用する。

乾燥減量　10%以下。

【 242 】　K49

成分及び分量又は本質	日本薬局方	ケイヒ	4.0g
	〃	シャクヤク	4.0g
	〃	タイソウ	4.0g
	〃	ショウキョウ	1.0g
	〃	カンゾウ	2.0g
	〃	ビャクジュツ	4.0g
	〃	ブシ	0.5g
	〃	ブクリョウ	4.0g
		全　　量	23.5g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。		
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，熱いうちに煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。 本剤は必ず1日分ずつ煎じ，数日分をまとめて煎じないこと。		
効能又は効果	体力虚弱で，手足が冷えてこわばり，尿量が少なく，ときに，動悸，めまい，筋肉のぴくつきがあるものの次の諸症：関節痛，神経痛		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	桂枝加苓朮附湯		

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品1包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　ケイヒ　外面は暗赤褐色を呈し，内面は赤褐色を呈し，平滑である。折面はやや繊維性で赤褐色を呈し淡褐色の薄層がある。特異なにおいがあり，味は甘く，辛く，後にやや粘液性で，わずかに収れん性である。

横切片を鏡検するとき，一次皮部と二次皮部はほとんど連続した石細胞環で区分され，環の外辺にはほぼ円形に結集した繊維束を伴い，環の各石細胞の壁はしばしばU字形に肥厚する。二次皮部中には石細胞を認めず，まばらに少数の厚膜繊維を認める。柔組織中に

は油細胞，粘液細胞及びでんぷん粒を含む。放射組織中には微細なシュウ酸カルシウムの針晶を含む細胞がある。

（２）　シャクヤク　外面は褐色～淡灰褐色を呈し，横断面はち密で淡灰褐色を呈し，木部には淡褐色の放射状の線がある。わずかに特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後に渋くてわずかに苦い。

必要に応じて，「シャクヤク」の確認試験を準用する。

（３）　タイソウ　外面は赤褐色であらいしわがあるか，又は暗灰赤色で細かいしわがあり，いずれもつやがある。外果皮は薄く革質で，中果皮は暗灰褐色を呈し，海綿ようで柔らかく粘着性があり，内果皮は極めて堅く，種子は偏平である。わずかに特異なにおいがあり，味は甘い。

（４）　ショウキョウ　淡灰黄色の周皮を付けたままか，又はその一部をはぎとってあり，表面は灰白色～淡灰褐色で，しばしば白粉を付けている。横断面は繊維性，粉性で，淡黄褐色を呈し，皮層と中心柱とに分かれる。横断面をルーペ視するとき，その全面に維管束及び分泌物が暗褐色の細点として散在している。特異なにおいがあり，味は極めて辛い。

（５）　カンゾウ　外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現わす。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に 1～3 細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には 3～10 細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞中にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

（６）　ビャクジュツ　外面は淡灰黄色～淡黄白色で，ところどころ灰褐色を呈し，横切面には淡黄褐色～褐色の分泌物による細点がある。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，皮部の柔組織中にはしばしば師部の外側に接して繊維束があり，放射組織の末端部には淡褐色～褐色の内容物を含む油室がある。木部には大きい髄を囲んで放射状に配列した短径の道管とそれを囲む著しい繊維束がある。髄及び放射組織中には皮部と同様な油室があり，柔組織中にはイヌリンの結晶及びシュウ酸カルシウムの小針晶を含む。

必要に応じて，「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。

（７）　ブシ　本品はほぼ倒円錐形で，長さ 15～30mm，径 12～16mm，又は縦ときに横に切断され，長さ 20～60mm，幅 15～40mm，厚さ 200～700μm，又は径 12mm 以下の不整な多角形に破砕されている。外面は淡褐色～暗褐色又は黄褐色を呈する。質は堅く，通例，しわはなく，切面は平らで，淡褐色～暗褐色又は黄白色～淡黄褐色を呈し，通常角質，半透明で光沢がある。弱い特異なにおいがある。

横切片及び縦切片を鏡検するとき，外側から擬上皮，一次皮層，内皮，二次皮層，形成層，木部が認められる。一次皮層には楕円形～楕円状四角形，短径 30～75μm，長径 60～150μm の厚壁細胞がある。内皮は接線方向に長い 1 層の細胞からなっている。形成層輪は星形又は不整の多角形～円形であり，木部の道管群は V 字形を呈する。二次皮層及び髄中

に独立した形成層輪が認められるものもある。道管は孔紋，階紋，網紋又はらせん紋道管である。柔細胞中のでんぷん粒は糊化している。

必要に応じて，「ブシ」の確認試験を準用する。

（８）　ブクリョウ　白色又はわずかに淡赤色を帯びた白色である。外層が残存するものは暗褐色～暗赤褐色で，きめがあらく，裂け目がある。質は堅いが砕きやすい。味はないがやや粘液ようである。

必要に応じて，「ブクリョウ」の確認試験を準用する。

乾燥減量　15％以下。

灰　　分　4％以下。

【 243 】　K50

成分及び分量 又は本質	日本薬局方	ケイヒ	3.0g
	〃	シャクヤク	3.0g
	〃	タイソウ	4.0g
	〃	ショウキョウ	1.0g
	〃	カンゾウ	2.0g
		全　　量	13.0g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。		
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。		
効能又は効果	体力虚弱で，汗が出るものの次の症状：かぜの初期		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	桂枝湯		

規格及び試験方法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品1包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　ケイヒ　外面は暗赤褐色を呈し，内面は赤褐色を呈し，平滑である。横断面は赤褐色を呈し淡褐色の薄層が見られる。特異なにおいがあり，味は甘く，辛く，後にやや粘液性で，わずかに収れん性である。

横切片を鏡検するとき，一次皮部と二次皮部はほとんど連続した石細胞環で区分され，環の外辺にはほぼ円形に結集した繊維束を伴い，環の各石細胞の膜はしばしばU字形に肥厚する。二次皮部中には石細胞を認めず，まばらに少数の厚膜繊維を認める。柔組織中には油細胞，粘液細胞及び微細なシュウ酸カルシウムの針晶を含む細胞があり，柔細胞中にはでんぷん粒を含む。

（2）　シャクヤク　外面は褐色～淡灰褐色を呈し，横断面はち密で淡灰褐色を呈し，木部には淡褐色の放射状の線がある。わずかに特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後に渋くてわずかに苦い。

必要に応じて，「シャクヤク」の確認試験を準用する。

（３）　タイソウ　外面は赤褐色であらいしわがあるか，又は暗灰赤色で細かいしわがあり，いずれもつやがある。外果皮は薄く革質で，中果皮は暗灰褐色を呈し，海綿ようで柔らかく粘着性があり，内果皮は極めて堅く，種子は偏平である。わずかに特異なにおいがあり，味は甘い。

（４）　ショウキョウ　淡灰黄色の周皮を付けたままか，又はその一部をはぎとってあり，表面は灰白色～淡灰褐色で，しばしば白粉を付けている。横断面は繊維性，粉性で，淡帯黄褐色を呈し，皮層と中心柱とに分かれる。横断面をルーペ視するとき，その全面に維管束及び分泌物が褐色の細点として散在している。特異なにおいがあり，味は極めて辛い。

（５）　カンゾウ　外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現わす。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に 1～3 細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には 3～10 細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞中にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

乾燥減量　15％以下。

灰　　分　10％以下。

【 244 】　K51

成分及び分量又は本質	日本薬局方	ケイヒ	4.0g
	〃	ニンジン	3.0g
	〃	ビャクジュツ	3.0g
	〃	カンゾウ	3.0g
	〃	カンキョウ	2.0g
		全　　量	15.0g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。		
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。		
効能又は効果	体力虚弱で，胃腸が弱く，ときに発熱・悪寒を伴うものの次の諸症：頭痛，動悸，慢性胃腸炎，胃腸虚弱，下痢，消化器症状を伴う感冒		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	桂枝人参湯		

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品1包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　ケイヒ　外面は暗赤褐色を呈し，内面は赤褐色を呈し，平滑である。横断面は赤褐色を呈し淡褐色の薄層が見られる。特異なにおいがあり，味は甘く，辛く，後にやや粘液性で，わずかに収れん性である。

横切片を鏡検するとき，一次皮部と二次皮部はほとんど連続した石細胞環で区分され，環の外辺にはほぼ円形に結集した繊維束を伴い，環の各石細胞の膜はしばしばU字形に肥厚する。二次皮部中には石細胞を認めず，まばらに少数の厚膜繊維を認める。柔組織中には油細胞，粘液細胞及び微細なシュウ酸カルシウムの針晶を含む細胞があり，柔細胞中にはでんぷん粒を含む。

（2）　ニンジン　外面は淡黄褐色～淡灰褐色を呈し，縦じわがあり，横断面は淡黄褐色を呈し，形成層の付近は褐色を呈する。特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後にやや苦い。

必要に応じて，「ニンジン」の確認試験を準用する。

（３）　ビャクジュツ　外面は淡灰黄色～淡黄白色で，ところどころ灰褐色を呈し，横切面には淡黄褐色～褐色の分泌物による細点がある。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，皮部の柔組織中にはしばしば師管の外側に接して繊維束があり，放射組織の末端部には淡褐色～褐色の内容物を含む油室がある。木部には大きい髄を囲んで放射状に配列した短径の道管とそれを囲む著しい繊維束がある。髄及び放射組織中には皮部と同様な油室があり，柔組織中にはイヌリンの小球晶及びシュウ酸カルシウムの針晶を含む。

必要に応じて，「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。

（４）　カンゾウ　外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現わす。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に 1～3 細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には 3～10 細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞中にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

（５）　カンキョウ　偏圧した不規則な塊状でしばしば分枝する。分枝した各部はやや湾曲した卵形又は長卵形を呈し，長さ 2～4cm，径 1～2cm である。外面は灰黄色～灰黄褐色で，しわ及び輪節がある。折面は褐色～暗褐色で透明感があり角質である。横切面をルーペ視するとき皮層と中心柱は区分され，全面に維管束が散在する。特異なにおいがあり，味は極めて辛い。

横切片を鏡検するとき，外側よりコルク層，皮層，内皮，中心柱が認められる。皮層と中心柱は一層の内皮によって区分される。皮層及び中心柱は柔組織からなり，繊維束で囲まれた維管束が散在する。柔組織中には黄色の油様物質を含む油細胞が散在し，柔細胞中にはシュウ酸カルシウムの単晶が含まれ，でんぷんは糊化している。

必要に応じて，「カンキョウ」の確認試験を準用する。

乾燥減量　15%以下。

灰　　分　8%以下。

【 245 】　K52

成分及び分量又は本質	日本薬局方	ケイヒ	4.0g
	〃	ブクリョウ	4.0g
	〃	ボタンピ	4.0g
	〃	トウニン	4.0g
	〃	シャクヤク	4.0g
		全　　量	20.0g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。		
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。		
効能又は効果	比較的体力があり，ときに下腹部痛，肩こり，頭重，めまい，のぼせて足冷えなどを訴えるものの次の諸症：月経不順，月経異常，月経痛，更年期障害，血の道症，肩こり，めまい，頭重，打ち身（打撲症），しもやけ，しみ，湿疹・皮膚炎，にきび		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	桂枝茯苓丸料		

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品1包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　ケイヒ　外面は暗赤褐色を呈し，内面は赤褐色を呈し，平滑である。横断面はやや繊維性で赤褐色を呈し淡褐色の薄層が見られる。特異なにおいがあり，味は甘く，辛く，後にやや粘液性で，わずかに収れん性である。

横切片を鏡検するとき，一次皮部と二次皮部はほとんど連続した石細胞環で区分され，環の外辺にはほぼ円形に結集した繊維束を伴い，環の各石細胞の壁はしばしばU字形に肥厚する。二次皮部中には石細胞を認めず，まばらに少数の厚膜繊維を認める。柔組織中には油細胞，粘液細胞及びでんぷん粒を含む。放射組織中には微細なシュウ酸カルシウムの針晶を含む細胞がある。

（２）　ブクリョウ　白色又はわずかに淡赤色を帯びた白色である。外層が残存するものは暗褐色～暗赤褐色で，きめがあらく，裂け目がある。質は堅いが砕きやすい。ほとんどにおいがなく，味はないがやや粘液ようである。

必要に応じて，「ブクリョウ」の確認試験を準用する。

（３）　ボタンピ　外面は暗褐色～帯紫褐色，内面は淡灰褐色～暗紫色を呈する。内面及び切断面にはしばしば白色の結晶を付着する。特異なにおいがあり，味はわずかに辛くて苦い。

必要に応じて，「ボタンピ」の確認試験を準用する。

（４）　トウニン　種皮は薄く，外面は赤褐色を帯び，表面にはすれて落ちやすい石細胞となった表皮細胞があって，粉をふいたようである。切断面は類白色である。味はわずかに苦く，油ようである。

表皮の表面を鏡検するとき，数個ずつ集合する石細胞はおおむね円形で，その細胞膜は均等に厚く，側面視では方形又は長方形を呈する。

必要に応じて，「トウニン」の確認試験を準用する。

（５）　シャクヤク　外面は褐色～淡灰褐色を呈し，横断面はち密で淡灰褐色を呈し，木部には淡褐色の放射状の線がある。わずかに特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後に渋くてわずかに苦い。

必要に応じて，「シャクヤク」の確認試験を準用する。

乾燥減量　15％以下。

灰　　分　5％以下。

【 246 】 K52—①

成分及び分量 又は本質	日本薬局方	ケイヒ	4.0g
	〃	ブクリョウ	4.0g
	〃	ボタンピ	4.0g
	〃	トウニン	4.0g
	〃	シャクヤク	4.0g
		全　量	20.0g
製造方法	以上の生薬をそれぞれ末とし，「ハチミツ」を結合剤として丸剤の製法により丸剤 200 個とする。		
用法及び用量	大人 1 日 3 回，1 回 20～30 個宛，食前又は空腹時に服用する。 15 才未満 7 才以上　大人の 2/3，7 才未満 5 才以上　大人の 1/2 を服用する。		
効能又は効果	比較的体力があり，ときに下腹部痛，肩こり，頭重，めまい，のぼせて足冷えなどを訴えるものの次の諸症：月経不順，月経異常，月経痛，更年期障害，血の道症，肩こり，めまい，頭重，打ち身（打撲症），しもやけ，しみ，湿疹・皮膚炎，にきび		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	桂枝茯苓丸		

規 格 及 び 試 験 方 法

性　状　本品は褐色で，特異なにおいがある。

確認試験　本品 10 個をとり，崩壊し，薄めたグリセリン（1→2）又は抱水クロラール 50g を水 15mL 及びグリセリン 10mL の混液に溶かした液を滴加して鏡検するとき淡褐色を呈した石細胞群，繊維束及びじん皮繊維，細胞膜がわずかにコルク化した分泌細胞などの破片を認める（ケイヒ）；菌糸，顆粒体，粘液板又はそれらを含む偽組織の破片を認める（ブクリョウ）；でんぷん粒及び集晶を含む球形～卵形の柔組織を認め，この細胞膜の内面はところどころ小突起状となってでんぷん粒の間に入り込んでいるか，またこのような傾向が見られる（ボタンピ）；でんぷん粒又はシュウ酸カルシウムの集晶を含む円形，鈍多角形又は長形の柔細胞を認め，この細胞膜には孔紋がある。また重縁孔，孔紋，階紋導管の破片を認める（シャクヤク）；特異の形をした石細胞群を有する子殻組織の破片又はその石細胞を認める。なお，キョウニンとの区別はこの石細胞の形の差による（トウニン）。

【 247 】　K53

成分及び分量又は本質	日本薬局方	ケイヒ	4.0g
	〃	ブクリョウ	4.0g
	〃	ボタンピ	4.0g
	〃	トウニン	4.0g
	〃	シャクヤク	4.0g
	〃	ヨクイニン	10.0g
		全　　量	30.0g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。		
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。		
効能又は効果	比較的体力があり，ときに下腹部痛，肩こり，頭重，めまい，のぼせて足冷えなどを訴えるものの次の諸症：にきび，しみ，手足のあれ（手足の湿疹・皮膚炎），月経不順，血の道症		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	桂枝茯苓丸料加薏苡仁		

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品1包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　ケイヒ　外面は暗赤褐色を呈し，内面は赤褐色を呈し，平滑である。横断面は赤褐色を呈し淡褐色の薄層が見られる。特異なにおいがあり，味は甘く，辛く，後にやや粘液性で，わずかに収れん性である。

横切片を鏡検するとき，一次皮部と二次皮部はほとんど連続した石細胞環で区分され，環の外辺にはほぼ円形に結集した繊維束を伴い，環の各石細胞の膜はしばしばU字形に肥厚する。二次皮部中には石細胞を認めず，まばらに少数の厚膜繊維を認める。柔組織中には油細胞，粘液細胞及び微細なシュウ酸カルシウムの針晶を含む細胞があり，柔細胞中にはでんぷん粒を含む。

（２）　ブクリョウ　白色又はわずかに淡赤色を帯びた白色で，質は堅いが砕きやすい。味はないがやや粘液ようである。

必要に応じて，「ブクリョウ」の確認試験を準用する。

（３）　ボタンピ　外面は暗褐色～帯紫褐色，内面は淡灰褐色～暗紫色を呈する。内面及び切断面にはしばしば白色の結晶を付着する。特異なにおいがあり，味はわずかに辛くて苦い。

必要に応じて，「ボタンピ」の確認試験を準用する。

（４）　トウニン　種皮は薄く，外面は赤褐色を帯び，表面にはすれて落ちやすい石細胞となった表皮細胞があって，粉をふいたようである。切断面は類白色である。味はわずかに苦く，油ようである。

表皮の表面を鏡検するとき，数個ずつ集合する石細胞はおおむね円形で，その細胞膜は均等に厚く，側面視では方形又は長方形を呈する。

必要に応じて，「トウニン」の確認試験を準用する。

（５）　シャクヤク　外面は褐色～淡灰褐色を呈し，横断面はち密で淡灰褐色を呈し，木部には淡褐色の放射状の線がある。わずかに特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後に渋くてわずかに苦い。

必要に応じて，「シャクヤク」の確認試験を準用する。

（６）　ヨクイニン　卵形又は広卵形を呈し，頂端及び基部はややくぼみ，長さ約6mm，幅約 5mm，背面は丸くふくれ，腹面の中央には縦に深いみぞがある。背面はほぼ白色，粉質で，腹面のみぞ及びその他の表面のところどころに褐色膜質の果皮及び種皮が付いている。横断面をルーペ視するとき，背面は白色の内乳からなり，腹面のくぼみには淡黄色の胚盤がある。質は堅い。味はわずかに甘く，歯間に粘着する。

必要に応じて，「ヨクイニン」の確認試験を準用する。

乾燥減量　15%以下。

灰　　分　5%以下。

【 248 】　K54

成分及び分量又は本質	日本薬局方	ニンジン	3.0g
	〃	ビャクジュツ	4.0g
	〃	ブクリョウ	4.0g
	〃	レンニク	3.0g
	〃	サンヤク	3.0g
	〃	サンザシ	2.0g
	〃	チンピ	2.0g
	〃	タクシャ	2.0g
	〃	カンゾウ	1.0g
		全　量	24.0g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。		
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。		
効能又は効果	体力虚弱で，痩せて顔色が悪く，食欲がなく，下痢の傾向があるものの次の諸症：胃腸虚弱，慢性胃腸炎，消化不良，下痢		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	啓脾湯		

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品1包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　ニンジン　外面は淡黄褐色～淡灰褐色を呈し，縦じわがあり，横断面は淡黄褐色を呈し，形成層の付近は褐色を呈する。特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後にやや苦い。

必要に応じて，「ニンジン」の確認試験を準用する。

（２）　ビャクジュツ　外面は淡灰黄色～淡黄白色で，ところどころ灰褐色を呈し，横切面には淡黄褐色～褐色の分泌物による細点がある。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，皮部の柔組織中にはしばしば師管の外側に接して繊維束があり，放射組織の末端部には淡褐色～褐色の内容物を含む油室がある。木部には大きい髄を囲んで放射状に配列した短径の道管とそれを囲む著しい繊維束がある。髄及び放射組織中には皮部と同様な油室があり，柔組織中にはイヌリンの小球晶及びシュウ酸カルシウムの針晶を含む。

必要に応じて，「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。

（３）　ブクリョウ　白色又はわずかに淡赤色を帯びた白色で，質は堅いが砕きやすい。味はないがやや粘液ようである。

必要に応じて，「ブクリョウ」の確認試験を準用する。

（４）　レンニク　卵形体～楕円体で，一端には乳頭状の突起があり，その周辺はへこんでいる。長さ 1.0～1.7cm，幅 0.5～1.2cm，外面は淡赤褐色～淡黄褐色を呈し，突起部は暗赤褐色を呈する。内果皮はつやがなく，剥離しにくい。内部は黄白色の胚乳からなり，中央部にある胚は緑色である。ほとんどにおいがなく，味はわずかに甘く，やや油様で，胚は極めて苦い。

中央部の横切片を鏡検するとき，内果皮は柔組織からなり，ときに脱落して見られないことがある。種皮は表皮と圧縮された柔細胞からなる柔組織で形成され，柔組織中に維管束が散在する。内乳は表皮と柔組織で形成される。残存する内果皮中には，シュウ酸カルシウムの集晶及びタンニン様物質を含み，種皮の柔細胞中にはタンニン様物質を含み，内乳の柔組織中にはでんぷん粒を含む。

必要に応じて，「レンニク」の確認試験を準用する。

（５）　サンヤク　類白色～帯黄白色で，粉質である。味はない。

必要に応じて，「サンヤク」の確認試験を準用する。

（６）　サンザシ　ほぼ球形で，径 8～14mm である。外面は黄褐色～灰褐色を呈し，細かい網目状のしわがあり，一端には径 4～6mm のくぼみがあって，その周辺にはしばしばがくの基部が残存し，他端には短い果柄又はその残基がある。真果は通例 5 室でしばしば 5 個に分裂する。この分果の長さは 5～8mm，淡褐色を呈し，通例，各々1 個の種子を含む。ほとんどにおいがなく，わずかに酸味がある。

中央部の横切片を鏡検するとき，最外層は比較的厚いクチクラ層で覆われた表皮からなる。クチクラは表皮細胞の側壁まで入り込みくさび状を呈する。表皮細胞及びその直下の 2～3 層の柔細胞中には黄褐色～赤褐色の内容物が認められる。その内側は柔組織からなり，維管束が散在し，単独又は 2～数個集まった石細胞が多数出現する。シュウ酸カルシウムの集晶及び単晶が認められる。真果の果皮は主として厚壁細胞よりなる。種子は種皮で覆われ，その内側に周乳，内乳，子葉を認める。真果の果皮の厚壁細胞中及び種皮の細胞中にシュウ酸カルシウム単晶が認められる。

必要に応じて，「サンザシ」の確認試験を準用する。

（７）　チンピ　外面は黄赤色～暗黄褐色で，油室による多数の小さいくぼみがあり，内面は白色～淡灰黄褐色である。厚さ約 2mm で，質は軽くてもろい。芳香があり，味は苦くて，わずかに刺激性である。

必要に応じて，「チンピ」の確認試験を準用する。

（８）　タクシャ　淡黄褐色～淡褐色でコルク層を付ける部位はやや暗色を呈する。ルーペ視するとき，褐色～淡褐色のはん点が散在する。切面は粒状で，繊維性ではない。わずかににおい及び味がある。

（９）　カンゾウ　外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現わす。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に 1～3 細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には 3～10 細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞中にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

乾燥減量　15%以下。

灰　　分　5%以下。

【 249 】　K55

成分及び分量 又は本質	日本薬局方	ブクリョウ	1.5g
	〃	ニンジン	1.5g
	〃	ケイガイ	1.5g
	〃	ボウフウ	1.5g
	〃	サイコ	1.5g
	〃	レンギョウ	1.5g
	〃	キキョウ	1.5g
	〃	キジツ	1.5g
	〃	センキュウ	1.5g
	〃	カンゾウ	1.0～1.5g
	〃	ショウキョウ	1.0g
	〃	キョウカツ	1.5g
	〃	ドクカツ	1.5g
	〃	ゼンコ	1.5g
	局外生規	キンギンカ	1.5g
		全　　量	21.5～22.0g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。		
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。		
効能又は効果	比較的体力があるものの次の諸症：急性化膿性皮膚疾患の初期，湿疹・皮膚炎		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	荊防敗毒散料		

規格及び試験方法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品 1 包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　ブクリョウ　白色又はわずかに淡赤色を帯びた白色で，質は堅いが砕きやすい。味はないがやや粘液ようである。

必要に応じて，「ブクリョウ」の確認試験を準用する。

（2）　ニンジン　外面は淡黄褐色～淡灰褐色を呈し，縦じわがあり，横断面は淡黄褐色を呈し，形成層の付近は褐色を呈する。特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後にやや苦い。

必要に応じて，「ニンジン」の確認試験を準用する。

（3）　ケイガイ　茎，輪散花序に集合したがく筒，これら及びときには葉の砕片，種子ようの微粒の分果からなる。茎は方形で外面はおおむね紫褐色，径約 1mm である。がく筒は淡褐色～黄緑色で長さ 2～3mm，ルーペ視するとき，先端はきょ歯辺，筒部には数条の線があり，唇形花又は果実を含み，茎とともに類白色の短毛を認める。分果は黄褐色～黒色，両端の細いだ円体で長さ 1～1.5mm，径は長さのほぼ 1/2 である。特異な芳香があり，口に含むとわずかに清涼感がある。

必要に応じて，「ケイガイ」の確認試験を準用する。

（4）　ボウフウ　外面は淡褐色で，多数の縦じわがある。横断面の周辺は灰褐色で，空げきが多く，中央は円形に黄色を呈する。味はわずかに甘い。

（5）　サイコ　外面は灰褐色～褐色で，深いしわがあるものがあり，横断面では，皮部は褐色，木部は淡褐色を呈する。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，皮部にはしばしば接線方向に長い裂け目があり，皮部の厚さは半径の 1/3～1/2 で，径 15～35μm の胞間性離生油道がやや多数散在し，木部には道管が放射状若しくはほぼ階段状に配列し，ところどころに繊維群があり，根頭部の髄には皮部と同様の油道がある。柔細胞中にはでんぷん粒を満たし，また油滴を認める。

必要に応じて，「サイコ」の確認試験を準用する。

（6）　レンギョウ　外面は淡褐色～暗褐色を呈し，淡灰色の小隆起点が散在し，内面は黄褐色である。特異な芳香があり，味はわずかに収れん性である。

必要に応じて，「レンギョウ」の確認試験を準用する。

（7）　キキョウ　外面は皮付きは灰褐色，皮去りは白色～淡褐色を呈し，繊維性でない。横切面をルーペ視するとき，皮部は木部よりやや薄く，ほとんど白色で，ところどころにすき間があり，形成層の付近はしばしば褐色を帯びる。木部は白色～淡褐色を呈し，その組織は皮部よりもやや密である。味は初めなく，後にえぐくて苦い。

必要に応じて，「キキョウ」の確認試験を準用する。

（8）　キジツ　外面は濃緑褐色～褐色で，つやがなく，油室による多数のくぼんだ細点がある。切断面は淡灰褐色を呈し，内果皮を付ける部分は褐色を呈する。特異なにおいがあり，味は苦い。

必要に応じて，「キジツ」の確認試験を準用する。

（9）　センキュウ　外面は灰褐色～暗褐色で，切断面は灰白色～灰褐色，半透明で，ときにはうつろがある。質は密で堅い。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，皮部及び髄には油道が散在する。木部には厚膜で木化した木部繊維が大小不同の群をなして存在する。でんぷん粒は，通例，のり化していて，まれに径5～25μm のでんぷん粒を認めることがある。シュウ酸カルシウム結晶は認めない。

（10）　カンゾウ　外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現わす。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に 1～3 細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には 3～10 細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞中にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

（11）　ショウキョウ　淡灰黄色の周皮を付けたままか，又はその一部をはぎとってあり，表面は灰白色～淡灰褐色で，しばしば白粉を付けている。横断面は繊維性，粉性で，淡帯黄褐色を呈し，皮層と中心柱とに分かれる。横断面をルーペ視するとき，その全面に維管束及び分泌物が褐色の細点として散在している。特異なにおいがあり，味は極めて辛い。

（12）　キョウカツ　やや湾曲した円柱形～円錐形を呈し，長さ 3～10cm，径 5～20mm，ときに根茎は分枝する。外面は黄褐色～暗褐色である。根茎はその頂端にやや円形にくぼんだ茎の跡があり，ときには短い茎の残基を付け，外面には隆起した節があり，節間は，通例，短い。節にはいぼ状突起となった根の跡がある。根の外面には粗い縦じわ及びいぼ状突起となった側根の跡がある。質は軽くややもろくて折りやすい。横切面には多くの放射状の裂け目があり，皮部は黄褐色～褐色，木部は淡黄色～淡灰黄色，髄は灰白色～淡褐色を呈し，ルーペ視するとき，皮部及び髄には油道による褐色の細点を認める。特異なにおいがあり，味は初めわずかに酸味があり，後にやや辛く，わずかに麻痺性である。

横切片を鏡検するとき，最外層は数層～十数層のコルク層からなり，その内側に数層の厚角組織がある。皮層には多数の油道があり，大きいものでは径が 300μm に達する。また皮層には放射状に大きなすき間がある。髄にも油道があり，大きいものでは径が 500μm に達する。柔組織中には単粒及び 2～3 個の複粒のでんぷん粒を含む。

必要に応じて，「キョウカツ」の確認試験を準用する。

（13）　ドクカツ　湾曲した不整円柱状～塊状を呈する根茎で，ときに短い根を付けることがある。長さ 4～12cm，径 2.5～7cm，しばしば縦割又は横切されている。上部には茎の跡による大きなくぼみが 1～数個あるか，又は径 1.5～2.5cm の茎の短い残基を 1 個付けるものがある。外面は暗褐色～黄褐色を呈し，縦じわがあり，根の基部又はその跡がある。横切面は灰黄褐色～黄褐色を呈し，油道による褐色の細点が散在し，多くの裂け目がある。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，最外層はコルク層で，コルク石細胞からなる層がある。これに続き数層の厚角組織が認められる。維管束と放射組織は明瞭で，髄は広い。師部の外側に師部繊維群が認められることがある。皮部及び髄に離生細胞間隙からなる油道が認められる。木部は道管，木部繊維及び厚壁化することがある木部柔組織からなる。髄中には維管束が散在する。また，柔細胞にはシュウ酸カルシウムの集晶が認められる。でんぷん粒は，単粒又は 2～6 個の複粒である。

必要に応じて，「ドクカツ」の確認試験を準用する。

（14）　ゼンコ　1）Peucedanum praeruptorum Dunn 細長い倒円錐形～円柱形を呈し，下部はときに二股になる。長さ 3～15cm，根頭部の径は 0.8～1.8cm である。外面は淡褐色～暗褐色を呈し，根頭部には多数の輪節状のしわがあり，毛状を呈する葉柄の残基を付けるものもある。根にはやや深い縦じわ及び側根を切除した跡がある。横切面は淡褐色～類白色を呈する。質はもろい。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，最外層はコルク層からなり，一部のコルク細胞は内側の接線壁が肥厚する。その内側には厚角組織がある。皮部には多数の油道が散在し，空隙が認められる。師部の先端部には師部繊維が見られることがある。木部には道管が認められ，油道が散在する。柔組織中に認められるでんぷん粒は 2～10 数個の複粒である。

2）Angelica decursiva Franchet et Savatier　1）に似るが，根頭部に毛状を呈する葉柄の残茎を付けない。

横切片を鏡検するとき，1）に似るが，コルク細胞の細胞壁は肥厚せず，師部の先端部には師部繊維を認めない。また，木部中には油道が認められない。

必要に応じて，「ゼンコ」の確認試験を準用する。

（15）　キンギンカ　やや湾曲したこん棒状のつぼみで，長さ 1.5～3.0cm，外面は淡黄色～黄褐色を呈し，ルーペ視すると，淡褐色の毛を密生している。花は唇形で，5 本の雄しべがある。特異なにおいがあり，味は苦くてわずかに甘い。

必要に応じて，局外生規「キンギンカ」の確認試験を準用する。

乾燥減量　10%以下。

灰　　分　6%以下。

【 250 】　K56

成分及び分量又は本質	日本薬局方	ケイヒ	3.5g
	〃	シャクヤク	2.0g
	〃	ショウキョウ	1.0g
	〃	カンゾウ	2.0g
	〃	マオウ	2.0g
	〃	タイソウ	2.0g
	〃	キョウニン	2.5g
		全　　量	15.0g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。		
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。		
効能又は効果	体力中等度又はやや虚弱なものの次の諸症：感冒，せき，かゆみ		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	桂麻各半湯		

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品1包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　ケイヒ　外面は暗赤褐色を呈し，内面は赤褐色を呈し，平滑である。横断面は赤褐色を呈し淡褐色の薄層が見られる。特異なにおいがあり，味は甘く，辛く，後にやや粘液性で，わずかに収れん性である。

横切片を鏡検するとき，一次皮部と二次皮部はほとんど連続した石細胞環で区分され，環の外辺にはほぼ円形に結集した繊維束を伴い，環の各石細胞の膜はしばしばU字形に肥厚する。二次皮部中には石細胞を認めず，まばらに少数の厚膜繊維を認める。柔組織中には油細胞，粘液細胞及び微細なシュウ酸カルシウムの針晶を含む細胞があり，柔細胞中にはでんぷん粒を含む。

（２）　シャクヤク　外面は褐色～淡灰褐色を呈し，横断面はち密で淡灰褐色を呈し，木部には淡褐色の放射状の線がある。わずかに特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後に渋くてわずかに苦い。

必要に応じて，「シャクヤク」の確認試験を準用する。

（３）　ショウキョウ　淡灰黄色の周皮を付けたままか，又はその一部をはぎとってあり，表面は灰白色～淡灰褐色で，しばしば白粉を付けている。横断面は繊維性，粉性で，淡帯黄褐色を呈し，皮層と中心柱とに分かれる。横断面をルーペ視するとき，その全面に維管束及び分泌物が褐色の細点として散在している。特異なにおいがあり，味は極めて辛い。

（４）　カンゾウ　外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現わす。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に 1～3 細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には 3～10 細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞中にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

（５）　マオウ　細い円柱状又はだ円柱を呈し，長さ 3～10mm，径 1～2mm，淡緑色～黄緑色である。表面に多数の平行する縦みぞがあり，節部には，長さ 2～4mm の 2 枚のりん片状の葉が対生し，その基部は合着して筒状になっている。りん片状の葉の色は淡褐色～褐色である。茎の横断面をルーペ視するとき，円形～だ円形で，周囲部は灰緑色～黄緑色を呈し，中心部には赤緑色の物質が充満しているか，又は中空のところがある。味は渋くてわずかに苦く，やや麻ひ性である。

必要に応じて，「マオウ」の確認試験を準用する。

（６）　タイソウ　外面は赤褐色であらいしわがあるか，又は暗灰赤色で細かいしわがあり，いずれもつやがある。外果皮は薄く革質で，中果皮は暗灰褐色を呈し，海綿ようで柔らかく粘着性があり，内果皮は極めて堅く，種子は偏平である。わずかに特異なにおいがあり，味は甘い。

（７）　キョウニン　種皮は褐色で，表面にはすれて落ちやすい石細胞となった表皮細胞があって，粉をふいたようである。切断面は類白色である。味は苦く，油ようである。

表皮の表面を鏡検するとき，数個ずつ集合する石細胞はおおむね円形で，その細胞膜は均等に著しく厚くなり，径 60～90μm，側面視では鈍三角形で，細胞膜は先端部で著しく厚い。

必要に応じて，「キョウニン」の確認試験を準用する。

乾燥減量　10%以下。

灰　　分　5%以下。

【 251 】　K57

成分及び分量又は本質	日本薬局方	ビンロウジ	4.0g
	〃	ブクリョウ	4.0g
	局外生規	モッカ	3.0g
	〃	キッピ	2.0g
	日本薬局方	キキョウ	2.0g
	〃	ゴシュユ	1.0g
	〃	ソヨウ	1.0g
	〃	ショウキョウ	1.0g
		全　量	18.0g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。		
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。		
効能又は効果	体力中等度のものの次の諸症：下肢の倦怠感，ふくらはぎの緊張・圧痛		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	鶏鳴散料加茯苓		

規格及び試験方法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品1包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　ビンロウジ　灰褐色の種皮が白色の胚乳中に入り込んで大理石ようの模様を呈する。味は渋くてわずかに苦い。

必要に応じて，「ビンロウジ」の確認試験を準用する。

（2）　ブクリョウ　白色又はわずかに淡赤色を帯びた白色で，質は堅いが砕きやすい。味はないがやや粘液ようである。

必要に応じて，「ブクリョウ」の確認試験を準用する。

（３）　モッカ　外面は赤褐色～暗褐色を呈し，切断面は黄褐色で顆粒状を呈する。しばしば種子は偏平で暗褐色を呈する。酸味があって渋い。

横切片を鏡検するとき，果肉（花托）の皮層には多数の石細胞があり，外辺では単独あるいはほぼ円形の石細胞群をなし，内辺では更に大きな群となっている。皮層の内側は大きな円形の細胞間隙がある柔組織からなる。

必要に応じて，局外生規「モッカ」の確認試験を準用する。

（４）　キッピ　外面は黄褐色～赤褐色を呈し，油室による多数のくぼんだ細点があり，内面は類白色～淡赤褐色を呈する。厚さ約 1mm で，質は軽くてもろい。芳香があり，味は苦い。

切片を鏡検するとき，油室は円く，径 410～730μm である。

必要に応じて，局外生規「キッピ」の確認試験を準用する。

（５）　キキョウ　外面は皮付きは灰褐色，皮去りは白色～淡褐色を呈し，繊維性でない。横切面をルーペ視するとき，皮部は木部よりやや薄く，ほとんど白色で，ところどころにすき間があり，形成層の付近はしばしば褐色を帯びる。木部は白色～淡褐色を呈し，その組織は皮部よりもやや密である。味は初めなく，後にえぐくて苦い。

必要に応じて，「キキョウ」の確認試験を準用する。

（６）　ゴシュユ　偏球形又は球形を呈し，外面は暗褐色～灰褐色，多くの油室がくぼんだ小点として認められ，その中心には花柱の残基があるが，しばしばこれは脱落している。果柄は長さ 2～5mm で，灰緑色の毛を密生している。果皮は，通例，開裂し，子房は 5 室に分かれ，各室中には倒卵球形又は球形の褐色～黒褐色又は帯青黒色のつやのある種子が存在する。特異なにおいがあり，味は辛く，後に残留性の苦味がある。

必要に応じて，「ゴシュユ」の確認試験を準用する。

（７）　ソヨウ　縮んだ葉の細片で，両面とも帯褐紫色，あるいは上面は灰緑色～帯褐緑色で下面は帯褐紫色を呈する。茎を交じえるものは，その横断面は方形である。葉をルーペ視するとき，両面にまばらに毛を認め，特に葉脈上に多く，裏面には細かい腺毛を認める。もみ砕くとき，特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

必要に応じて，「ソヨウ」の確認試験を準用する。

（８）　ショウキョウ　淡灰黄色の周皮を付けたままか，又はその一部をはぎとってあり，表面は灰白色～淡灰褐色で，しばしば白粉を付けている。横断面は繊維性，粉性で，淡帯黄褐色を呈し，皮層と中心柱とに分かれる。横断面をルーペ視するとき，その全面に維管束及び分泌物が褐色の細点として散在している。特異なにおいがあり，味は極めて辛い。

乾燥減量　15％以下。

灰　　分　5％以下。

【 252 】　K58

成分及び分量又は本質	日本薬局方	ハンゲ	5.0g
	〃	ブクリョウ	5.0g
	〃	ケイヒ	4.0g
	〃	タイソウ	3.0g
	〃	シャクヤク	3.0g
	〃	カンゾウ	1.0～1.5g
	〃	カンキョウ	1.0g
		全　　量	22.0～22.5g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。		
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。		
効能又は効果	体力虚弱で，ときに胃部に水がたまる感じのするものの次の諸症：慢性胃炎，腹痛		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	堅中湯		

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品1包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　ハンゲ　外面は白色～灰白黄色，上部には茎の跡がくぼみとなり，その周辺には根の跡がくぼんだ細点となっている。横断面は白色，粉性である。味は初めなく，やや粘液性で，後に強いえぐ味を残す。

横切片を鏡検するとき，主としてでんぷん粒を充満した柔組織からなり，わずかにシュウ酸カルシウムの束晶を含んだ粘液細胞がその間に認められる。でんぷん粒は主として2～3個の複粒で，通例，径10～15μm，単粒は通例径3～7μmである。束晶は長さ25～150μmである。

（２）　ブクリョウ　白色又はわずかに淡赤色を帯びた白色で，質は堅いが砕きやすい。味はないがやや粘液ようである。

必要に応じて，「ブクリョウ」の確認試験を準用する。

（３）　ケイヒ　外面は暗赤褐色を呈し，内面は赤褐色を呈し，平滑である。横断面は赤褐色を呈し淡褐色の薄層が見られる。特異なにおいがあり，味は甘く，辛く，後にやや粘液性で，わずかに収れん性である。

横切片を鏡検するとき，一次皮部と二次皮部はほとんど連続した石細胞環で区分され，環の外辺にはほぼ円形に結集した繊維束を伴い，環の各石細胞の膜はしばしばU字形に肥厚する。二次皮部中には石細胞を認めず，まばらに少数の厚膜繊維を認める。柔組織中には油細胞，粘液細胞及び微細なシュウ酸カルシウムの針晶を含む細胞があり，柔細胞中にはでんぷん粒を含む。

（４）　タイソウ　外面は赤褐色であらいしわがあるか，又は暗灰赤色で細かいしわがあり，いずれもつやがある。外果皮は薄く革質で，中果皮は暗灰褐色を呈し，海綿ようで柔らかく粘着性があり，内果皮は極めて堅く，種子は偏平である。わずかに特異なにおいがあり，味は甘い。

（５）　シャクヤク　外面は褐色～淡灰褐色を呈し，横断面はち密で淡灰褐色を呈し，木部には淡褐色の放射状の線がある。わずかに特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後に渋くてわずかに苦い。

必要に応じて，「シャクヤク」の確認試験を準用する。

（６）　カンゾウ　外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現わす。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に 1～3 細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には 3～10 細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞中にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

（７）　カンキョウ　偏圧した不規則な塊状でしばしば分枝する。分枝した各部はやや湾曲した卵形又は長卵形を呈し，長さ 2～4cm，径 1～2cm である。外面は灰黄色～灰黄褐色で，しわ及び輪節がある。折面は褐色～暗褐色で透明感があり角質である。横切面をルーペ視するとき皮層と中心柱は区分され，全面に維管束が散在する。特異なにおいがあり，味は極めて辛い。

横切片を鏡検するとき，外側よりコルク層，皮層，内皮，中心柱が認められる。皮層と中心柱は一層の内皮によって区分される。皮層及び中心柱は柔組織からなり，繊維束で囲まれた維管束が散在する。柔組織中には黄色の油様物質を含む油細胞が散在し，柔細胞中にはシュウ酸カルシウムの単晶が含まれ，でんぷんは糊化している。

必要に応じて，「カンキョウ」の確認試験を準用する。

乾燥減量　15％以下。

灰　　分　5％以下。

【 253 】　K59

成分及び分量又は本質	日本薬局方	ケイヒ	4.0g
	〃	ブクリョウ	4.0g
	〃	ボタンピ	4.0g
	〃	トウニン	4.0g
	〃	シャクヤク	4.0g
	〃	カンゾウ	1.5g
	〃	ショウキョウ	1.0g
		全　　量	22.5g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。		
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。		
効能又は効果	比較的体力があり，ときに下腹部痛，肩こり，頭重，めまい，のぼせて足冷えなどを訴えるものの次の諸症：月経不順，月経異常，月経痛，更年期障害，血の道症，肩こり，めまい，頭重，打ち身（打撲症），しもやけ，しみ		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	甲字湯		

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品1包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　ケイヒ　外面は暗赤褐色を呈し，内面は赤褐色を呈し，平滑である。横断面は赤褐色を呈し淡褐色の薄層が見られる。特異なにおいがあり，味は甘く，辛く，後にやや粘液性で，わずかに収れん性である。

横切片を鏡検するとき，一次皮部と二次皮部はほとんど連続した石細胞環で区分され，環の外辺にはほぼ円形に結集した繊維束を伴い，環の各石細胞の膜はしばしばU字形に肥厚する。二次皮部中には石細胞を認めず，まばらに少数の厚膜繊維を認める。柔組織中に

は油細胞，粘液細胞及び微細なシュウ酸カルシウムの針晶を含む細胞があり，柔細胞中にはでんぷん粒を含む。

（２）　ブクリョウ　白色又はわずかに淡赤色を帯びた白色で，質は堅いが砕きやすい。味はないがやや粘液ようである。

必要に応じて，「ブクリョウ」の確認試験を準用する。

（３）　ボタンピ　外面は暗褐色～帯紫褐色，内面は淡灰褐色～暗紫色を呈する。内面及び切断面にはしばしば白色の結晶を付着する。特異なにおいがあり，味はわずかに辛くて苦い。

必要に応じて，「ボタンピ」の確認試験を準用する。

（４）　トウニン　種皮は薄く，外面は赤褐色を帯び，表面にはすれて落ちやすい石細胞となった表皮細胞があって，粉をふいたようである。切断面は類白色である。味はわずかに苦く，油ようである。

表皮の表面を鏡検するとき，数個ずつ集合する石細胞はおおむね円形で，その細胞膜は均等に厚く，側面視では方形又は長方形を呈する。

必要に応じて，「トウニン」の確認試験を準用する。

（５）　シャクヤク　外面は褐色～淡灰褐色を呈し，横断面はち密で淡灰褐色を呈し，木部には淡褐色の放射状の線がある。わずかに特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後に渋くてわずかに苦い。

必要に応じて，「シャクヤク」の確認試験を準用する。

（６）　カンゾウ　外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現わす。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に 1～3 細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には 3～10 細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞中にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

（７）　ショウキョウ　淡灰黄色の周皮を付けたままか，又はその一部をはぎとってあり，表面は灰白色～淡灰褐色で，しばしば白粉を付けている。横断面は繊維性，粉性で，淡帯黄褐色を呈し，皮層と中心柱とに分かれる。横断面をルーペ視するとき，その全面に維管束及び分泌物が褐色の細点として散在している。特異なにおいがあり，味は極めて辛い。

乾燥減量　15％以下。

灰　　分　5％以下。

【 254 】　K60

成分及び分量又は本質	日本薬局方	ソウジュツ	4.0g
	〃	コウボク	3.0g
	〃	チンピ	3.0g
	〃	コウブシ	4.0g
	〃	タイソウ	2.0g
	〃	ショウキョウ	0.5g
	〃	カンゾウ	1.0g
	〃	シュクシャ	1.5g
	〃	カッコウ	1.0g
		全　量	20.0g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。		
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。		
効能又は効果	体力中等度で，食べ過ぎて胃がもたれる傾向のあるものの次の諸症：食欲異常，食欲不振，急・慢性胃炎，消化不良		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	香砂平胃散料		

規格及び試験方法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品1包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　ソウジュツ　外面は暗灰褐色～暗黄褐色である。横断面は淡褐色～赤褐色の分泌物による細点を認める。しばしば白色綿状の結晶を析出する。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，皮部の柔組織中には，通例，繊維束を欠き，放射組織の末端部には淡褐色～黄褐色の内容物を含む油室がある。木部は形成層に接して道管を囲んだ繊維

束が放射状に配列し，髄及び放射組織中には皮部と同様な油室がある。柔細胞中にはイヌリンの球晶及びシュウ酸カルシウムの針晶を含む。

（２）　コウボク　外面は灰白色～灰褐色を呈し，内面は淡褐色～褐色，切断面は淡赤褐色を呈し，繊維性である。わずかに芳香があり，味は苦い。

横切片を鏡検するとき，コルク層は厚く，ほぼ等径性の石細胞が環状に内接する。一次皮部は狭く，内しょう部には繊維群が点在し，二次皮部の放射組織間には師部繊維群が階段状に並ぶ。油細胞の多数は一次皮部に，少数は二次皮部に散在し，狭い放射組織内にも認められることがある。

必要に応じて，「コウボク」の確認試験を準用する。

（３）　チンピ　外面は黄赤色～暗黄褐色で，油室による多数の小さいくぼみがあり，内面は白色～淡灰黄褐色である。厚さ約 2mm で，質は軽くてもろい。芳香があり，味は苦くて，わずかに刺激性である。

必要に応じて，「チンピ」の確認試験を準用する。

（４）　コウブシ　外面は灰褐色～灰黒褐色を呈し，不整な輪節があり，その部分に一方に向かって多数の毛がある。質は堅く，横断面は赤褐色～淡黄色を呈し，ろうようのつやを帯び，皮層部の厚さは中心柱の径とほぼ等しいか又はわずかに薄い。横断面をルーペ視するとき，外面は繊維束が褐色のはん点として輪状に並び，皮層部にはところどころに維管束が赤褐色のはん点として，また分泌細胞が黄褐色の微小なはん点として多数存在する。中心柱には多数の維管束が点又は線として散在する。わずかに特異なにおい及び味がある。

（５）　タイソウ　外面は赤褐色であらいしわがあるか，又は暗灰赤色で細かいしわがあり，いずれもつやがある。外果皮は薄く革質で，中果皮は暗灰褐色を呈し，海綿ようで柔らかく粘着性があり，内果皮は極めて堅く，種子は偏平である。わずかに特異なにおいがあり，味は甘い。

（６）　ショウキョウ　淡灰黄色の周皮を付けたままか，又はその一部をはぎとってあり，表面は灰白色～淡灰褐色で，しばしば白粉を付けている。横断面は繊維性，粉性で，淡帯黄褐色を呈し，皮層と中心柱とに分かれる。横断面をルーペ視するとき，その全面に維管束及び分泌物が褐色の細点として散在している。特異なにおいがあり，味は極めて辛い。

（７）　カンゾウ　外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現わす。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に 1～3 細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には 3～10 細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞中にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

（８）　シュクシャ　ほぼ球形又はだ円球形を呈し，長さ 1～1.5cm，径 0.8～1cm，外面は灰褐色～暗褐色を呈し，石灰を散布して乾燥したものは白粉を付けている。種子塊は薄い膜で 3 室に分かれ，各室に 10～20 個の種子を含む。種子は多角形の粒状で，長さ 3～5mm，径約 3mm，表面には多数の細かい突起があり，質は堅い。種子を縫線に沿って縦

断すると，断面は細長く，へそは深くくぼみ，合点はややくぼんでいる。種皮は暗褐色，外乳は白色で，淡黄色の内乳及び胚を包み，胚は細長い。かめば特異なにおいがあり，味は辛い。

（９）　カッコウ　茎及びこれに対生した葉からなる。葉はしわがよって縮み，水に浸してしわを伸ばすと，卵形～卵状長楕円形を呈し，長さ 2.5～10cm，幅 2.5～7cm，辺縁に鈍きょ歯があり，基部は広いくさび形で葉柄を付ける。葉の上面は暗褐色，下面は灰褐色を呈し，両面に密に毛がある。茎は方柱形，中実で，表面は灰緑色を呈し，灰白色～黄白色の毛があり，髄は大きく，類白色で海綿状を呈する。ルーペ視するとき，毛，腺毛及び腺りんを認める。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

葉柄の横切片を鏡検するとき，向軸面中央は大きく突出し，その表皮の内側に厚角細胞が認められる。中央部の維管束は 2 群に分かれる。葉身主脈部の横切片を鏡検するとき，主脈の向軸面は大きく突出し，その表皮の内側に厚角細胞が認められる。中央部には扇状に配列した維管束がある。茎の横切片を鏡検するとき，表皮の内側に数細胞層の厚角組織が認められる。ときに表皮下にコルク層が発達することがある。皮層の内側には並立維管束が環状に配列し，師部の外側に師部繊維群が認められる。皮層の柔細胞中に油滴が，髄の柔細胞中にシュウ酸カルシウムの針晶，単晶又は柱状晶が認められる。

必要に応じて，「カッコウ」の確認試験を準用する。

乾燥減量　15%以下。

灰　　分　6%以下。

【 255 】　K61

成分及び分量 又は本質	日本薬局方	ビャクジュツ	3.0g
	〃	ブクリョウ	3.0g
	〃	ソウジュツ	2.0g
	〃	コウボク	2.0g
	〃	チンピ	2.0g
	〃	コウブシ	2.0g
	〃	ショウズク	2.0g
	〃	ニンジン	2.0g
	〃	モッコウ	1.5g
	〃	シュクシャ	1.5g
	〃	カンゾウ	1.5g
	〃	タイソウ	1.5g
	〃	ショウキョウ	1.0g
		全　　量	25.0g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。		
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。		
効能又は効果	体力虚弱なものの次の諸症：胃弱，胃腸虚弱，慢性胃腸炎，食欲不振		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	香砂養胃湯		

規格及び試験方法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品1包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　ビャクジュツ　外面は淡灰黄色～淡黄白色で，ところどころ灰褐色を呈し，横切面には淡黄褐色～褐色の分泌物による細点がある。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，皮部の柔組織中にはしばしば師管の外側に接して繊維束があり，放射組織の末端部には淡褐色～褐色の内容物を含む油室がある。木部には大きい髄を囲んで放射状に配列した短径の道管とそれを囲む著しい繊維束がある。髄及び放射組織中には皮部と同様な油室があり，柔組織中にはイヌリンの小球晶及びシュウ酸カルシウムの針晶を含む。

必要に応じて，「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。

（2）　ブクリョウ　白色又はわずかに淡赤色を帯びた白色で，質は堅いが砕きやすい。味はないがやや粘液ようである。

必要に応じて，「ブクリョウ」の確認試験を準用する。

（3）　ソウジュツ　外面は暗灰褐色～暗黄褐色である。横断面は淡褐色～赤褐色の分泌物による細点を認める。しばしば白色綿状の結晶を析出する。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，皮部の柔組織中には，通例，繊維束を欠き，放射組織の末端部には淡褐色～黄褐色の内容物を含む油室がある。木部は形成層に接して道管を囲んだ繊維束が放射状に配列し，髄及び放射組織中には皮部と同様な油室がある。柔細胞中にはイヌリンの球晶及びシュウ酸カルシウムの針晶を含む。

（4）　コウボク　外面は灰白色～灰褐色を呈し，内面は淡褐色～褐色，切断面は淡赤褐色を呈し，繊維性である。わずかに芳香があり，味は苦い。

横切片を鏡検するとき，コルク層は厚く，ほぼ等径性の石細胞が環状に内接する。一次皮部は狭く，内しょう部には繊維群が点在し，二次皮部の放射組織間には師部繊維群が階段状に並ぶ。油細胞の多数は一次皮部に，少数は二次皮部に散在し，狭い放射組織内にも認められることがある。

必要に応じて，「コウボク」の確認試験を準用する。

（5）　チンピ　外面は黄赤色～暗黄褐色で，油室による多数の小さいくぼみがあり，内面は白色～淡灰黄褐色である。厚さ約 2mm で，質は軽くてもろい。芳香があり，味は苦くて，わずかに刺激性である。

必要に応じて，「チンピ」の確認試験を準用する。

（6）　コウブシ　外面は灰褐色～灰黒褐色を呈し，不整な輪節があり，その部分に一方に向かって多数の毛がある。質は堅く，横断面は赤褐色～淡黄色を呈し，ろうようのつやを帯び，皮層部の厚さは中心柱の径とほぼ等しいか又はわずかに薄い。横断面をルーペ視するとき，外面は繊維束が褐色のはん点として輪状に並び，皮層部にはところどころに維管束が赤褐色のはん点として，また分泌細胞が黄褐色の微小なはん点として多数存在する。中心柱には多数の維管束が点又は線として散在する。わずかに特異なにおい及び味がある。

（7）　ショウズク　淡黄色を呈し，ほぼ長だ円球形をなし，長さ 10～20mm，径 5～10mm，表面には 3 本の鈍いりょうと多数の縦線があり，頂端には 1～2mm の小突起がある。果皮は薄く軽く繊維性である。内部は薄い膜によって 3 室に分かれ，各室中には仮種皮によって縦に接合する 3～7 個の種子がある。種子は暗褐色～黒褐色を呈し，長卵形又は不整有角性で，長さ 3～4mm，背部はとつ形で，腹部には深い縦みぞがあり，また粗雑

な小隆起がある。種子は特異な芳香があり，味は辛くてわずかに苦く，果皮はにおい及び味がない。

（８）　ニンジン　外面は淡黄褐色～淡灰褐色を呈し，縦じわがあり，横断面は淡黄褐色を呈し，形成層の付近は褐色を呈する。特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後にやや苦い。

必要に応じて，「ニンジン」の確認試験を準用する。

（９）　モッコウ　外面は黄褐色～灰褐色で，あらい縦じわがある。横断面は黄褐色～暗褐色で，ルーペ視するとき，環状暗色の形成層が認められ，木部組織と放射組織が放射状の模様を呈し，ところどころに大きな裂け目と褐色の油室が散在している。特異なにおいがあり，味は苦い。

（10）　シュクシャ　ほぼ球形又はだ円球形を呈し，長さ 1～1.5cm，径 0.8～1cm，外面は灰褐色～暗褐色を呈し，石灰を散布して乾燥したものは白粉を付けている。種子塊は薄い膜で 3 室に分かれ，各室に 10～20 個の種子を含む。種子は多角形の粒状で，長さ 3～5mm，径約 3mm，表面には多数の細かい突起があり，質は堅い。種子を縫線に沿って縦断すると，断面は細長く，へそは深くくぼみ，合点はややくぼんでいる。種皮は暗褐色，外乳は白色で，淡黄色の内乳及び胚を包み，胚は細長い。かめば特異なにおいがあり，味は辛い。

（11）　カンゾウ　外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現わす。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に 1～3 細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には 3～10 細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞中にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

（12）　タイソウ　外面は赤褐色であらいしわがあるか，又は暗灰赤色で細かいしわがあり，いずれもつやがある。外果皮は薄く革質で，中果皮は暗灰褐色を呈し，海綿ようで柔らかく粘着性があり，内果皮は極めて堅く，種子は偏平である。わずかに特異なにおいがあり，味は甘い。

（13）　ショウキョウ　淡灰黄色の周皮を付けたままか，又はその一部をはぎとってあり，表面は灰白色～淡灰褐色で，しばしば白粉を付けている。横断面は繊維性，粉性で，淡帯黄褐色を呈し，皮層と中心柱とに分かれる。横断面をルーペ視するとき，その全面に維管束及び分泌物が褐色の細点として散在している。特異なにおいがあり，味は極めて辛い。

乾燥減量　15%以下。

灰　　分　5%以下。

【 256 】　K62

成分及び分量 又は本質	日本薬局方	ニンジン	3.0g
	〃	ビャクジュツ	3.0g
	〃	ブクリョウ	3.0g
	〃	ハンゲ	3.0g
	〃	チンピ	2.0g
	〃	コウブシ	2.0g
	〃	タイソウ	1.5g
	〃	ショウキョウ	0.5g
	〃	カンゾウ	1.0g
	〃	シュクシャ	1.0g
	〃	カッコウ	1.0g
		全　量	21.0g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。		
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。		
効能又は効果	体力中等度以下で，気分が沈みがちで頭が重く，胃腸が弱く，食欲がなく，みぞおちがつかえて疲れやすく，貧血性で手足が冷えやすいものの次の諸症：胃炎，胃腸虚弱，胃下垂，消化不良，食欲不振，胃痛，嘔吐		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	香砂六君子湯		

規格及び試験方法

性　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品1包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（１）　ニンジン　外面は淡黄褐色～淡灰褐色を呈し，縦じわがあり，横断面は淡黄褐色を呈し，形成層の付近は褐色を呈する。特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後にやや苦い。

必要に応じて，「ニンジン」の確認試験を準用する。

（２）　ビャクジュツ　外面は淡灰黄色～淡黄白色で，ところどころ灰褐色を呈し，横切面には淡黄褐色～褐色の分泌物による細点がある。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，皮部の柔組織中にはしばしば師管の外側に接して繊維束があり，放射組織の末端部には淡褐色～褐色の内容物を含む油室がある。木部には大きい髄を囲んで放射状に配列した短径の道管とそれを囲む著しい繊維束がある。髄及び放射組織中には皮部と同様な油室があり，柔組織中にはイヌリンの小球晶及びシュウ酸カルシウムの針晶を含む。

必要に応じて，「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。

（３）　ブクリョウ　白色又はわずかに淡赤色を帯びた白色で，質は堅いが砕きやすい。味はないがやや粘液ようである。

必要に応じて，「ブクリョウ」の確認試験を準用する。

（４）　ハンゲ　外面は白色～灰白黄色，上部には茎の跡がくぼみとなり，その周辺には根の跡がくぼんだ細点となっている。横断面は白色，粉性である。味は初めなく，やや粘液性で，後に強いえぐ味を残す。

横切片を鏡検するとき，主としてでんぷん粒を充満した柔組織からなり，わずかにシュウ酸カルシウムの束晶を含んだ粘液細胞がその間に認められる。でんぷん粒は主として 2～3 個の複粒で，通例，径 10～15μm，単粒は通例径 3～7μm である。束晶は長さ 25～150μm である。

（５）　チンピ　外面は黄赤色～暗黄褐色で，油室による多数の小さいくぼみがあり，内面は白色～淡灰黄褐色である。厚さ約 2mm で，質は軽くてもろい。芳香があり，味は苦くて，わずかに刺激性である。

必要に応じて，「チンピ」の確認試験を準用する。

（６）　コウブシ　外面は灰褐色～灰黒褐色を呈し，不整な輪節があり，その部分に一方に向かって多数の毛がある。質は堅く，横断面は赤褐色～淡黄色を呈し，ろうようのつやを帯び，皮層部の厚さは中心柱の径とほぼ等しいか又はわずかに薄い。横断面をルーペ視するとき，外面は繊維束が褐色のはん点として輪状に並び，皮層部はところどころに維管束が赤褐色のはん点として，また分泌細胞が黄褐色の微小なはん点として多数存在する。中心柱には多数の維管束が点又は線として散在する。わずかに特異なにおい及び味がある。

（７）　タイソウ　外面は赤褐色であらいしわがあるか，又は暗灰赤色で細かいしわがあり，いずれもつやがある。外果皮は薄く革質で，中果皮は暗灰褐色を呈し，海綿ようで柔らかく粘着性があり，内果皮は極めて堅く，種子は偏平である。わずかに特異なにおいがあり，味は甘い。

（８）　ショウキョウ　淡灰黄色の周皮をつけたままか，又はその一部をはぎとってあり，表面は灰白色～淡灰褐色で，しばしば白粉を付けている。横断面は繊維性，粉性で，淡帯黄褐色を呈し，皮層と中心柱とに分かれる。横断面をルーペ視するとき，その全面に

維管束及び分泌物が褐色の細点として散在している。特異なにおいがあり，味は極めて辛い。

（９）　カンゾウ　外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現わす。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に 1～3 細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には 3～10 細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞中にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

（10）　シュクシャ　ほぼ球形又はだ円形を呈し，長さ 1～1.5cm，径 0.8～1cm，外面は灰褐色～暗褐色を呈し，石灰を散布して乾燥したものは白粉を付けている。種子塊は薄い膜で三部に分かれ，各部には仮種皮によって接合する 10～20 粒の種子がある。種子は多角形の粒状で，長さ 0.3～0.5cm，径約 0.3cm，外面には暗褐色で多数の細かい突起があり，質は堅い。種子を縫線に沿って縦断し，ルーペ視するとき，切面は細長く，へそは深くくぼみ，合点はややくぼんでいる。外乳は白色で，淡黄色の内乳及び胚を包み，胚は細長い。かめば特異な芳香があり，味は辛い。

（11）　カッコウ　茎及びこれに対生した葉からなる。葉はしわがよって縮み，水に浸してしわを伸ばすと，卵形～卵状長楕円形を呈し，長さ 2.5～10cm，幅 2.5～7cm，辺縁に鈍きょ歯があり，基部は広いくさび形で葉柄を付ける。葉の上面は暗褐色，下面は灰褐色を呈し，両面に密に毛がある。茎は方柱形，中実で，表面は灰緑色を呈し，灰白色～黄白色の毛があり，髄は大きく，類白色で海綿状を呈する。ルーペ視するとき，毛，腺毛及び腺りんを認める。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

葉柄の横切片を鏡検するとき，向軸面中央は大きく突出し，その表皮の内側に厚角細胞が認められる。中央部の維管束は 2 群に分かれる。葉身主脈部の横切片を鏡検するとき，主脈の向軸面は大きく突出し，その表皮の内側に厚角細胞が認められる。中央部には扇状に配列した維管束がある。茎の横切片を鏡検するとき，表皮の内側に数細胞層の厚角組織が認められる。ときに表皮下にコルク層が発達することがある。皮層の内側には並立維管束が環状に配列し，師部の外側に師部繊維群が認められる。皮層の柔細胞中に油滴が，髄の柔細胞中にシュウ酸カルシウムの針晶，単晶又は柱状晶が認められる。

必要に応じて，「カッコウ」の確認試験を準用する。

乾燥減量　15%以下。

灰　　分　5%以下。

【 257 】　K63

成分及び分量又は本質	日本薬局方	コウブシ	3.5g
	〃	ソヨウ	1.5g
	〃	チンピ	3.0g
	〃	カンゾウ	1.0g
	〃	ショウキョウ	1.0g
		全　　量	10.0g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。		
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，熱いうちに煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。 本剤は必ず1日分ずつ煎じ，数日分をまとめて煎じないこと。		
効能又は効果	体力虚弱で，神経過敏で気分がすぐれず胃腸の弱いものの次の諸症：かぜの初期，血の道症		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	香蘇散料		

規格及び試験方法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品1包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　コウブシ　紡錘形を呈し，長さ1.5～2.5cm，径0.5～1cmである。外面は灰褐色～灰黒褐色で，5～8個の不整な輪節があり，その部分に毛状になった繊維束がある。質は堅く，横断面は赤褐色～淡黄色を呈し，ろうようのつやを帯び，皮層部の厚さは中心柱の径とほぼ等しいか又はわずかに薄い。これをルーペ視するとき，周辺には繊維束が褐色のはん点として輪状に並び，皮層部にはところどころに維管束が赤褐色のはん点として，また分泌細胞が黄褐色の微小なはん点として多数存在する。中心柱には多数の維管束が点又は線として散在する。わずかに特異なにおい及び味がある。

（2）　ソヨウ　縮んだ葉の細片で，両面とも帯褐紫色，又は上面は灰緑色～帯褐緑色で下面は帯褐紫色を呈する。茎を交えるものは，その横断面は方形である。葉をルーペ視す

るとき，両面にまばらに毛を認め，特に葉脈上に多く，裏面には細かい腺毛を認める。もみ砕くとき，特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

必要に応じて，「ソヨウ」の確認試験を準用する。

（３）　チンピ　外面は黄赤色～暗黄褐色で，油室による多数の小さいくぼみがあり，内面は白色～淡灰黄褐色である。質は軽くてもろい。特異な芳香があり，味は苦くて，わずかに刺激性である。

必要に応じて，「チンピ」の確認試験を準用する。

（４）　カンゾウ　外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現わす。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に 1～3 細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には 3～10 細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞中にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

（５）　ショウキョウ　淡灰黄色の周皮を付けたままか，又はその一部をはぎとってあり，表面は灰白色～淡灰褐色で，しばしば白粉を付けている。横断面は繊維性，粉性で，淡黄褐色を呈し，皮層と中心柱とに分かれる。横断面をルーペ視するとき，その全面に維管束及び分泌物が暗褐色の細点として散在している。特異なにおいがあり，味は極めて辛い。

乾燥減量　15％以下。

灰　　分　6％以下。

【 258 】　K63—①

成分及び分量 又は本質	日本薬局方	コウブシ	2.1g
	〃	ソヨウ	0.9g
	〃	チンピ	1.8g
	〃	カンゾウ	0.6g
	〃	ショウキョウ	0.6g
		全　　量	6.0g
製造方法	以上の生薬をそれぞれ末とし，散剤の製法により製する。ただし，分包散剤とする。		
用法及び用量	1回量を次のとおりとし，1日3回，食前又は空腹時に服用する。 大人（15才以上）1包2.0g，15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満大人の1/4を服用する。		
効能又は効果	体力虚弱で，神経過敏で気分がすぐれず胃腸の弱いものの次の諸症：かぜの初期，血の道症		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	香蘇散		

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は褐色の粉末で，特異なにおいがある。

確認試験

（1）　コウブシ　本品の粉末2gにジエチルエーテル10mLを加え，還流冷却器を付け，水浴上で10分間加熱し，冷後，ろ過し，ろ液を試料溶液とする。

別に「コウブシ」の粉末1gをとり，試料溶液と同様に操作して対照溶液とする。

これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び対照溶液10μLずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲルを用いて調製した薄層板にスポットする。次にクロロホルム・メタノール混液（3：1）を展開溶媒として約10cm展開した後，薄層板を風乾する。

これに*p*-ジメチルアミノベンズアルデヒド試液を均等に噴霧し，105℃で30分間加熱するとき，*Rf*値約0.84付近に暗紫色スポットを認める。

（2）　ソヨウ　本品の粉末2gにジエチルエーテル10mLを加え，還流冷却器をつけ，水浴上で10分間加熱し，冷後，ろ過し，ろ液を試料溶液とする。

別に「ソヨウ」の粉末 1g をとり，試料溶液と同様に操作して対照溶液とする。

これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び対照溶液 10μL ずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲルを用いて調製した薄層板にスポットする。次にヘキサン・ベンゼン・アセトン混液（70：15：15）を展開溶媒として約 10cm 展開した後，薄層板を風乾するとき，*Rf* 値約 0.32 付近に緑色のスポットを認める。

（３）　チンピ　本品の粉末 2g にメタノール 10mL を加え，還流冷却器をつけ，水浴上で 10 分間加熱し，冷後，ろ過し，ろ液を試料溶液とする。

別に「チンピ」の粉末 1g をとり，試料溶液と同様に操作して対照溶液とする。

これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び対照溶液 10μL ずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲルを用いて調製した薄層板にスポットする。次にクロロホルム・メタノール混液（3：1）を展開溶媒として約 10cm 展開した後，薄層板を風乾する。

これに硫酸試液を均等に噴霧し，105℃で 30 分間加熱するとき，*Rf* 値約 0.89 付近に黄色のスポットを認める。

（４）　カンゾウ　本品の粉末 2g にエタノール（95）・水混液（7：3）10mL を加え，還流冷却器を付け，水浴上で 10 分間加熱し，冷後，ろ過し，ろ液を試料溶液とする。別に「カンゾウ」の粉末 1g をとり，試料溶液と同様に操作して対照溶液とする。

これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び対照溶液 10μL ずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲルを用いて調製した薄層板にスポットする。次にベンゼン・酢酸エチル混液（3：7）を展開溶媒として約 10cm 展開した後，薄層板を風乾する。

これに 4 - メトキシベンズアルデヒド・硫酸試液を均等に噴霧し，105℃で 30 分間加熱するとき，*Rf* 値約 0.55 付近に橙色のスポットを認める。

（５）　ショウキョウ　本品の粉末 2g にアセトン 10mL を加え，還流冷却器をつけ，水浴上で 10 分間加熱し，冷後，ろ過し，ろ液を試料溶液とする。

別に「ショウキョウ」の粉末 1g をとり，試料溶液と同様に操作して対照溶液とする。

これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び対照溶液 10μL ずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲルを用いて調製した薄層板にスポットする。次に四塩化炭素・アセトン混液（5：1）を展開溶媒として約 10cm 展開した後，薄層板を風乾する。

これにバニリン・硫酸・エタノール試液を均等に噴霧し，105℃で 30 分間加熱するとき，*Rf* 値約 0.55 付近に紫色のスポットを認める。

乾燥減量　15％以下。

灰　　分　6％以下。

【 259 】　K64

成分及び分量 又は本質	日本薬局方	コウボク	3.0g
	〃	ショウキョウ	0.5g
	〃	ハンゲ	4.0g
	〃	ニンジン	2.0g
	〃	カンゾウ	2.0g
		全　量	11.5g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。		
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。		
効能又は効果	体力虚弱で，腹部膨満感のあるものの次の諸症：胃腸虚弱，嘔吐		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	厚朴生姜半夏人参甘草湯		

規格及び試験方法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品1包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　コウボク　外面は灰白色～灰褐色を呈し，内面は淡褐色～褐色，切断面は淡赤褐色を呈し，繊維性である。わずかに芳香があり，味は苦い。

横切片を鏡検するとき，コルク層は厚く，ほぼ等径性の石細胞が環状に内接する。一次皮部は狭く，内しょう部には繊維群が点在し，二次皮部の放射組織間には師部繊維群が階段状に並ぶ。油細胞の多数は一次皮部に，少数は二次皮部に散在し，狭い放射組織内にも認められることがある。

必要に応じて，「コウボク」の確認試験を準用する。

（2）　ショウキョウ　淡灰黄色の周皮を付けたままか，又はその一部をはぎとってあり，表面は灰白色～淡灰褐色で，しばしば白粉を付けている。横断面は繊維性，粉性で，淡帯黄褐色を呈し，皮層と中心柱とに分かれる。横断面をルーペ視するとき，その全面に維管束及び分泌物が褐色の細点として散在している。特異なにおいがあり，味は極めて辛い。

（３）　ハンゲ　外面は白色～灰白黄色，上部には茎の跡がくぼみとなり，その周辺には根の跡がくぼんだ細点となっている。横断面は白色，粉性である。味は初めなく，やや粘液性で，後に強いえぐ味を残す。

横切片を鏡検するとき，主としてでんぷん粒を充満した柔組織からなり，わずかにシュウ酸カルシウムの束晶を含んだ粘液細胞がその間に認められる。でんぷん粒は主として 2～3 個の複粒で，通例，径 10～15μm，単粒は通例径 3～7μm である。束晶は長さ 25～150μm である。

（４）　ニンジン　外面は淡黄褐色～淡灰褐色を呈し，縦じわがあり，横断面は淡黄褐色を呈し，形成層の付近は褐色を呈する。特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後にやや苦い。

必要に応じて，「ニンジン」の確認試験を準用する。

（５）　カンゾウ　外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現わす。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に 1～3 細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には 3～10 細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞中にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

乾燥減量　15％以下。

灰　　分　5％以下。

【 260 】　K65

成分及び分量 又は本質	日本薬局方	マオウ	4.0g
	〃	キョウニン	4.0g
	〃	セッコウ	10.0g
	〃	カンゾウ	2.0g
	〃	ソウハクヒ	3.0g
		全　量	23.0g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。		
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。		
効能又は効果	体力中等度以上で，せきが強くでるものの次の諸症：せき，気管支ぜんそく，気管支炎，小児ぜんそく，感冒，痔の痛み		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	五虎湯		

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品1包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　マオウ　細い円柱状又はだ円柱を呈し，長さ3～10mm，径1～2mm，淡緑色～黄緑色である。表面に多数の平行する縦みぞがあり，節部には，長さ2～4mmの2枚のりん片状の葉が対生し，その基部は合着して筒状になっている。りん片状の葉の色は淡褐色～褐色である。茎の横断面をルーペ視するとき，円形～だ円形で，周囲部は灰緑色～黄緑色を呈し，中心部には赤緑色の物質が充満しているか，又は中空のところがある。味は渋くてわずかに苦く，やや麻ひ性である。

必要に応じて，「マオウ」の確認試験を準用する。

（2）　キョウニン　種皮は褐色で，表面にはすれて落ちやすい石細胞となった表皮細胞があって，粉をふいたようである。切断面は類白色である。味は苦く，油ようである。

表皮の表面を鏡検するとき，数個ずつ集合する石細胞はおおむね円形で，その細胞膜は均等に著しく厚くなり，径 60～90μm，側面視では鈍三角形で，細胞膜は先端部で著しく厚い。

必要に応じて，「キョウニン」の確認試験を準用する。

（3）　セッコウ　光沢のある白色の重い繊維状結晶塊で，におい及び味はない。砕くとたやすく針状～微細結晶性の粉末となる。水に溶けにくい。

必要に応じて，「セッコウ」の確認試験を準用する。

（4）　カンゾウ　外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現わす。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に 1～3 細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には 3～10 細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞中にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

（5）　ソウハクヒ　外面は白色～黄褐色を呈し，周皮をつけたものは，その周皮が黄褐色ではがれやすい。横切面は白色～淡褐色を呈し，繊維性で，内面は暗黄褐色である。わずかに特異な味がある。

横切片を鏡検するとき，周皮を付けたものでは外側は 5～12 層のコルク細胞からなり，皮部にはところどころに師部繊維又はその束があり，しばしば師部柔組織と交互にややしま模様を呈する。また乳管及びシュウ酸カルシウムの単晶を認め，でんぷん粒は径 1～7μm，球形又はだ円球形の単粒又は複粒からなる。

必要に応じて，「ソウハクヒ」の確認試験を準用する。

乾燥減量　10%以下。

灰　　分　45%以下。

【 261 】　K66

成分及び分量又は本質	日本薬局方	ゴシツ	3.0g
	〃	ケイヒ	3.0g
	〃	シャクヤク	3.0g
	〃	トウニン	3.0g
	〃	トウキ	3.0g
	〃	ボタンピ	3.0g
	〃	エンゴサク	3.0g
	〃	モッコウ	1.0g
		全　　量	22.0g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。		
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。		
効能又は効果	比較的体力があるものの次の諸症：月経困難，月経不順，月経痛		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	牛膝散料		

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品1包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　ゴシツ　表面は灰黄色～黄褐色で，多数の縦じわがある。切断面は灰白色～淡褐色を呈し，黄白色の木部を認める。味はわずかに甘く，粘液性である。

横切片を鏡検するとき，皮部はやや明らかな形成層によって木部と区別できる。木部の中心には小さい原生木部があり，これを囲んで同心円状の環状維管束が外方に配列し，柔細胞中にはシュウ酸カルシウムの砂晶を含み，でんぷん粒は認めない。

必要に応じて，「ゴシツ」の確認試験を準用する。

（２）　ケイヒ　外面は暗赤褐色を呈し，内面は赤褐色を呈し，平滑である。横断面は赤褐色を呈し淡褐色の薄層が見られる。特異なにおいがあり，味は甘く，辛く，後にやや粘液性で，わずかに収れん性である。

横切片を鏡検するとき，一次皮部と二次皮部はほとんど連続した石細胞環で区分され，環の外辺にはほぼ円形に結集した繊維束を伴い，環の各石細胞の膜はしばしばU字形に肥厚する。二次皮部中には石細胞を認めず，まばらに少数の厚膜繊維を認める。柔組織中には油細胞，粘液細胞及び微細なシュウ酸カルシウムの針晶を含む細胞があり，柔細胞中にはでんぷん粒を含む。

（３）　シャクヤク　外面は褐色～淡灰褐色を呈し，横断面はち密で淡灰褐色を呈し，木部には淡褐色の放射状の線がある。わずかに特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後に渋くてわずかに苦い。

必要に応じて，「シャクヤク」の確認試験を準用する。

（４）　トウニン　種皮は薄く，外面は赤褐色を帯び，表面にはすれて落ちやすい石細胞となった表皮細胞があって，粉をふいたようである。切断面は類白色である。味はわずかに苦く，油ようである。

表皮の表面を鏡検するとき，数個ずつ集合する石細胞はおおむね円形で，その細胞膜は均等に厚く，側面視では方形又は長方形を呈する。

必要に応じて，「トウニン」の確認試験を準用する。

（５）　トウキ　外面は暗褐色～赤褐色で，縦じわがあり，切断面は淡黄色～黄褐色を呈する。特異なにおいがあり，味はわずかに甘く，後にやや辛い。

横切片を鏡検するとき，コルク層は 4～10 層からなり，その内側に数層の厚角組織が続いている。皮部には分泌細胞に囲まれた多数の樹脂道並びにしばしば大きなすき間がある。形成層は長方形に偏圧された数層の細胞からなり，明らかに皮部と木部とを区別する。木部では多数の道管と放射組織とが交互に放射状に配列し，その外方の道管は単独又は数個集まってやや密に配列してくさび状をなすが，中心部付近の道管は極めてまばらに存在する。でんぷん粒は径 19μm 以下，まれに 2～5 個の複粒があり，複粒の径は 25μm に達し，しばしばのり化している。

（６）　ボタンピ　外面は暗褐色～帯紫褐色，内面は淡灰褐色～暗紫色を呈する。内面及び切断面にはしばしば白色の結晶を付着する。特異なにおいがあり，味はわずかに辛くて苦い。

必要に応じて，「ボタンピ」の確認試験を準用する。

（７）　エンゴサク　外面は灰黄色～灰褐色で，切断面は黄色～灰黄緑色を呈する。味は苦い。

必要に応じて，「エンゴサク」の確認試験を準用する。

（８）　モッコウ　外面は黄褐色～灰褐色で，あらい縦じわがある。横断面は黄褐色～暗褐色で，ルーペ視するとき，環状暗色の形成層が認められ，木部組織と放射組織が放射状の模様を呈し，ところどころに大きな裂け目と褐色の油室が散在している。特異なにおいがあり，味は苦い。

乾燥減量　10%以下。

灰　　分　5%以下。

【 262 】　K67

成分及び分量又は本質	日本薬局方	ブクリョウ	2.0g
	〃	ビャクジュツ	3.0g
	〃	チンピ	2.0g
	〃	ハンゲ	2.0g
	〃	トウキ	2.0g
	〃	シャクヤク	1.0g
	〃	センキュウ	1.0g
	〃	コウボク	1.0g
	〃	ビャクシ	1.0g
	〃	キジツ	1.0g
	〃	キキョウ	1.0g
	〃	ショウキョウ	1.3g
	〃	ケイヒ	1.0g
	〃	マオウ	1.0g
	〃	タイソウ	1.0g
	〃	カンゾウ	1.0g
		全　量	22.3g

製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。
効能又は効果	体力中等度又はやや虚弱で，冷えがあるものの次の諸症：胃腸炎，腰痛，神経痛，関節痛，月経痛，頭痛，更年期障害，感冒
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器
規格及び試験方法	別記のとおり。
備考	五積散料

規格及び試験方法

性　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品 1 包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　ブクリョウ　白色又はわずかに淡赤色を帯びた白色で，質は堅いが砕きやすい。ほとんどにおいがなく，味はないがやや粘液ようである。

必要に応じて，「ブクリョウ」の確認試験を準用する。

（2）　ビャクジュツ　外面は淡灰黄色～淡黄白色で，ところどころ灰褐色を呈し，横切面には淡黄褐色～褐色の分泌物による細点がある。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，皮部の柔組織中にはしばしば師管の外側に接して繊維束があり，放射組織の末端部には淡褐色～褐色の内容物を含む油室がある。木部には大きい髄を囲んで放射状に配列した短径の道管とそれを囲む著しい繊維束がある。髄及び放射組織中には皮部と同様な油室があり，柔組織中にはイヌリンの小球晶及びシュウ酸カルシウムの針晶を含む。

必要に応じて，「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。

（3）　チンピ　外面は黄赤色～暗黄褐色で，油室による多数の小さいくぼみがあり，内面は白色～淡灰黄褐色である。厚さ約 2mm で，質は軽くてもろい。芳香があり，味は苦くて，わずかに刺激性である。

必要に応じて，「チンピ」の確認試験を準用する。

（4）　ハンゲ　外面は白色～灰白黄色，上部には茎の跡がくぼみとなり，その周辺には根の跡がくぼんだ細点となっている。横断面は白色，粉性である。味は初めなく，やや粘液性で，後に強いえぐ味を残す。

横切片を鏡検するとき，主としてでんぷん粒を充満した柔組織からなり，わずかにシュウ酸カルシウムの束晶を含んだ粘液細胞がその間に認められる。でんぷん粒は主として 2～3 個の複粒で，通例，径 10～15μm，単粒は通例径 3～7μm である。束晶は長さ 25～150μm である。

（5）　トウキ　外面は暗褐色～赤褐色で，縦じわがあり，切断面は淡黄色～黄褐色を呈する。特異なにおいがあり，味はわずかに甘く，後にやや辛い。

横切片を鏡検するとき，コルク層は 4～10 層からなり，その内側に数層の厚角組織が続いている。皮部には分泌細胞に囲まれた多数の樹脂道並びにしばしば大きなすき間がある。形成層は長方形に偏圧された数層の細胞からなり，明らかに皮部と木部とを区別する。木部では多数の道管と放射組織とが交互に放射状に配列し，その外方の道管は単独又は数個集まってやや密に配列してくさび状をなすが，中心部付近の道管は極めてまばらに存在する。でんぷん粒は径 19μm 以下，まれに 2～5 個の複粒があり，複粒の径は 25μm に達し，しばしばのり化している。

（6）　シャクヤク　外面は褐色～淡灰褐色を呈し，横断面はち密で淡灰褐色を呈し，木部には淡褐色の放射状の線がある。わずかに特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後に渋くてわずかに苦い。

必要に応じて，「シャクヤク」の確認試験を準用する。

（7）　センキュウ　外面は灰褐色～暗褐色で，切断面は灰白色～灰褐色，半透明で，ときにはうつろがある。質は密で堅い。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，皮部及び髄には油道が散在する。木部には厚膜で木化した木部繊維が大小不同の群をなして存在する。でんぷん粒は，通例，のり化していて，まれに径5～25μmのでんぷん粒を認めることがある。シュウ酸カルシウム結晶は認めない。

（８）　コウボク　外面は灰白色～灰褐色を呈し，内面は淡褐色～褐色，切断面は淡赤褐色を呈し，繊維性である。わずかに芳香があり，味は苦い。

横切片を鏡検するとき，コルク層は厚く，ほぼ等径性の石細胞が環状に内接する。一次皮部は狭く，内しょう部には繊維群が点在し，二次皮部の放射組織間には師部繊維群が階段状に並ぶ。油細胞の多数は一次皮部に，少数は二次皮部に散在し，狭い放射組織内にも認められることがある。

必要に応じて，「コウボク」の確認試験を準用する。

（９）　ビャクシ　外面は灰褐色～暗褐色を呈し，縦じわがあり，横断面の周辺は灰白色で空げきが多く，中央部は暗褐色である。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

必要に応じて，「ビャクシ」の確認試験を準用する。

（10）　キジツ　外面は濃緑褐色～褐色で，つやがなく，油室による多数のくぼんだ細点がある。切断面は淡灰褐色を呈し，内果皮を付ける部分は褐色を呈する。特異なにおいがあり，味は苦い。

必要に応じて，「キジツ」の確認試験を準用する。

（11）　キキョウ　外面は皮付きは灰褐色，皮去りは白色～淡褐色を呈し，繊維性でない。横切面をルーペ視するとき，皮部は木部よりやや薄く，ほとんど白色で，ところどころにすき間があり，形成層の付近はしばしば褐色を帯びる。木部は白色～淡褐色を呈し，その組織は皮部よりもやや密である。味は初めなく，後にえぐくて苦い。

必要に応じて，「キキョウ」の確認試験を準用する。

（12）　ショウキョウ　淡灰黄色の周皮を付けたままか，又はその一部をはぎとってあり，表面は灰白色～淡灰褐色で，しばしば白粉を付けている。横断面は繊維性，粉性で，淡帯黄褐色を呈し，皮層と中心柱とに分かれる。横断面をルーペ視するとき，その全面に維管束及び分泌物が褐色の細点として散在している。特異なにおいがあり，味は極めて辛い。

（13）　ケイヒ　外面は暗赤褐色を呈し，内面は赤褐色を呈し，平滑である。横断面は赤褐色を呈し淡褐色の薄層が見られる。特異なにおいがあり，味は甘く，辛く，後にやや粘液性で，わずかに収れん性である。

横切片を鏡検するとき，一次皮部と二次皮部はほとんど連続した石細胞環で区分され，環の外辺にはほぼ円形に結集した繊維束を伴い，環の各石細胞の膜はしばしばU字形に肥厚する。二次皮部中には石細胞を認めず，まばらに少数の厚膜繊維を認める。柔組織中には油細胞，粘液細胞及び微細なシュウ酸カルシウムの針晶を含む細胞があり，柔細胞中にはでんぷん粒を含む。

（14）　マオウ　細い円柱状又はだ円柱を呈し，長さ3～10mm，径1～2mm，淡緑色～黄緑色である。表面に多数の平行する縦みぞがあり，節部には，長さ2～4mmの2枚のりん片状の葉が対生し，その基部は合着して筒状になっている。りん片状の葉の色は淡褐色～褐色である。茎の横断面をルーペ視するとき，円形～だ円形で，周囲部は灰緑色～黄緑色を呈し，中心部には赤緑色の物質が充満しているか，又は中空のところがある。味は渋くてわずかに苦く，やや麻ひ性である。

必要に応じて，「マオウ」の確認試験を準用する。

（15）　タイソウ　外面は赤褐色であらいしわがあるか，又は暗灰赤色で細かいしわがあり，いずれもつやがある。外果皮は薄く革質で，中果皮は暗灰褐色を呈し，海綿ようで柔らかく粘着性があり，内果皮は極めて堅く，種子は偏平である。わずかに特異なにおいがあり，味は甘い。

（16）　カンゾウ　外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現わす。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に 1～3 細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には 3～10 細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞中にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

乾燥減量　15%以下。

灰　　分　5%以下。

【 263 】　K68

成分及び分量又は本質	日本薬局方　ジオウ　6.0g 〃　サンシュユ　3.0g 〃　サンヤク　3.0g 〃　タクシャ　3.0g 〃　ブクリョウ　3.0g 〃　ボタンピ　3.0g 〃　ケイヒ　1.0g 〃　ゴシツ　3.0g 〃　シャゼンシ　3.0g 〃　ブシ　0.5g 全　量　28.5g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。
効能又は効果	体力中等度以下で，疲れやすくて，四肢が冷えやすく尿量減少し，むくみがあり，ときに口渇があるものの次の諸症：下肢痛，腰痛，しびれ，高齢者のかすみ目，かゆみ，排尿困難，頻尿，むくみ，高血圧に伴う随伴症状の改善（肩こり，頭重，耳鳴り）
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器
規格及び試験方法	別記のとおり。
備考	牛車腎気丸料

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品1包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　ジオウ　外面は黄褐色～黒褐色を呈し，深い縦みぞ及びくびれがある。質は柔らかく粘性である。横断面は黄褐色～黒褐色で，皮部は木部より色が濃く，ほとんど髄を認めない。特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後にやや苦い。

横切片を鏡検するとき，コルク層は 7～15 層で，皮部はすべて柔細胞からなり，外皮部に褐色の分泌物を含む細胞が散在する。木部はほとんど柔細胞で満たされ，放射状に並ぶ道管は側孔のある網紋があり，弱い木化反応を呈する。

（２）　サンシュユ　偏圧された長だ円形を呈し，長さ 1.5～2cm，幅約 1cm である。表面は暗赤紫色～暗紫色を呈し，つやがあり，あらいしわがある。表面には種子を抜きとった跡の裂け目があり，頂端にがくの跡があり，基部に果柄の跡がある。質は柔軟である。酸味があって，わずかに甘い。

（３）　サンヤク　類白色～帯黄白色で，粉質である。味はない。

必要に応じて，「サンヤク」の確認試験を準用する。

（４）　タクシャ　淡黄褐色～淡褐色でコルク層をつける部位はやや暗色を呈する。ルーペ視するとき，褐色～淡褐色のはん点が散在する。切面は粒状で，繊維性ではない。わずかににおい及び味がある。

（５）　ブクリョウ　白色又はわずかに淡赤色を帯びた白色で，質は堅いが砕きやすい。味はないがやや粘液ようである。

必要に応じて，「ブクリョウ」の確認試験を準用する。

（６）　ボタンピ　外面は暗褐色～帯紫褐色，内面は淡灰褐色～暗紫色を呈する。内面及び切断面にはしばしば白色の結晶を付着する。特異なにおいがあり，味はわずかに辛くて苦い。

必要に応じて，「ボタンピ」の確認試験を準用する。

（７）　ケイヒ　外面は暗赤褐色を呈し，内面は赤褐色を呈し，平滑である。横断面は赤褐色を呈し淡褐色の薄層が見られる。特異なにおいがあり，味は甘く，辛く，後にやや粘液性で，わずかに収れん性である。

横切片を鏡検するとき，一次皮部と二次皮部はほとんど連続した石細胞環で区分され，環の外辺にはほぼ円形に結集した繊維束を伴い，環の各石細胞の膜はしばしばU字形に肥厚する。二次皮部中には石細胞を認めず，まばらに少数の厚膜繊維を認める。柔組織中には油細胞，粘液細胞及び微細なシュウ酸カルシウムの針晶を含む細胞があり，柔細胞中にはでんぷん粒を含む。

（８）　ゴシツ　表面は灰黄色～黄褐色で，多数の縦じわがある。切断面は灰白色～淡褐色を呈し，黄白色の木部を認める。味はわずかに甘く，粘液性である。

横切片を鏡検するとき，皮部はやや明らかな形成層によって木部と区別できる。木部の中心には小さい原生木部があり，これを囲んで同心円状の環状維管束が外方に配列し，柔細胞中にはシュウ酸カルシウムの砂晶を含み，でんぷん粒は認めない。

必要に応じて，「ゴシツ」の確認試験を準用する。

（９）　シャゼンシ　長さ 2～2.5mm，幅 0.7～1mm，厚さ 0.3～0.5mm の偏だ円体で，つやのある褐色～黄褐色を呈する。ルーペ視するとき，ほぼ平滑で背面は弓状に隆起するが，腹面はややくぼんでいる。珠孔及び縫線は認められない。味はわずかに苦く，粘液性である。

横切片を鏡検するとき，種皮は粘液を含む表皮，栄養層及びほぼ等径性の細胞からなる色素層の 3 層からなり，その内部には種皮より厚い内乳が 2 枚の子葉を包んでいる。

必要に応じて，「シャゼンシ」の確認試験を準用する。

（10）　ブシ　本品はほぼ倒円錐形で，長さ 15～30mm，径 12～16mm，又は縦ときに横に切断され，長さ 20～60mm，幅 15～40mm，厚さ 200～700μm，又は径 12mm 以下の不整な多角形に破砕されている。外面は淡褐色～暗褐色又は黄褐色を呈する。質は堅く，通例，しわはなく，切面は平らで，淡褐色～暗褐色又は黄白色～淡黄褐色を呈し，通常角質，半透明で光沢がある。弱い特異なにおいがある。

横切片及び縦切片を鏡検するとき，外側から擬上皮，一次皮層，内皮，二次皮層，形成層，木部が認められる。一次皮層には楕円形～楕円状四角形，短径 30～75μm，長径 60～150μm の厚壁細胞がある。内皮は接線方向に長い 1 層の細胞からなっている。形成層輪は星形又は不整の多角形～円形であり，木部の道管群は V 字形を呈する。二次皮層及び髄中に独立した形成層輪が認められるものもある。道管は孔紋，階紋，網紋又はらせん紋道管である。柔細胞中のでんぷん粒は糊化している。

必要に応じて，「ブシ」の確認試験を準用する。

純度試験　本品 1 包中のアコニチン（$C_{34}H_{47}O_{11}N$：645.75）の残存量は 0.01mg 以下である。

本品 1 包を粉末とし，その重量を精密に量り，これにメタノール 50mL を加え一夜放置した後，1 時間振とうし，ろ紙を用いてろ過する。残渣に再びメタノール 30mL を加え 1 時間振とうした後，前記ろ紙を用いてろ過する。またこの残渣をメタノール 30mL で 2 回洗い，全量を合わせ減圧下でメタノールをほとんど留去する。残留物に希塩酸 10mL を加え水浴上で加温溶解する。冷後，分液ろう斗に脱脂綿を用いてろ過し，水 10mL で 2 回洗う。ろ液を合わせ，これにアンモニア水（28）を加えてアルカリ性とする。これにクロロホルム 50mL を加えて良く振り混ぜた後に下層を分取する。この操作を 2 回繰り返した後，クロロホルムを合わせ，これに水 10mL を加え洗った後，クロロホルム層を分取し，無水硫酸ナトリウムを加えて脱水する。これをろ過し，減圧下で蒸発乾固する。残留物をクロロホルム 1mL に正確に溶かして試料溶液とする。

別にアコニチン 20mg を精密に量り，クロロホルム 10mL に溶かし正確にメスアップする。この溶液 1mL を正確に量り，10mL に正確に希釈し標準溶液とする。

試料溶液及び標準溶液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。あらかじめ薄層クロマトグラフ用シリカゲルを用いて 0.25mm の厚さに調製し活性化した薄層板に試料溶液 0.3mL，標準溶液 10μL 及び 15μL を正確に塗布する。次にブタノール・酢酸・水（4：1：5）の混合溶液の上層を展開溶媒として，約 10cm 展開しこれを風乾した後，噴霧用ドラーゲンドルフ試液を均等に噴霧するとき，試料溶液から得られるアコニチンに対応するスポットの濃さは標準溶液の 10μL を塗布した方から得られるスポットより濃いことはあっても，標準溶液の 15μL を塗布した方から得られるスポットより濃くない。

乾燥減量　15%以下。

灰　　分　5%以下。

【 264 】　K69

成分及び分量 又は本質	日本薬局方　ゴシュユ　4.0g 〃　ニンジン　3.0g 〃　タイソウ　3.0g 〃　ショウキョウ　2.0g 全　量　12.0g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。
効能又は効果	体力中等度以下で，手足が冷えて肩がこり，ときにみぞおちが膨満するものの次の諸症：頭痛，頭痛に伴うはきけ・嘔吐，しゃっくり
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器
規格及び試験方法	別記のとおり。
備考	呉茱萸湯

規格及び試験方法

性　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品1包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　ゴシュユ　偏球形又は球形を呈し，外面は暗褐色～灰褐色，多くの油室がくぼんだ小点として認められ，その中心には花柱の残基があるが，しばしばこれは脱落している。果柄は長さ2～5mmで，灰緑色の毛を密生している。果皮は，通例，開裂し，予房は5室に分かれ，各室中には倒卵球形又は球形の褐色～黒褐色又は帯青黒色のつやのある種子がある。特異なにおいがあり，味は辛く，後に残留性の苦味がある。

必要に応じて，「ゴシュユ」の確認試験を準用する。

（2）　ニンジン　外面は淡黄褐色～淡灰褐色を呈し，縦じわがあり，横断面は淡黄褐色を呈し，形成層の付近は褐色を呈する。特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後にやや苦い。

必要に応じて，「ニンジン」の確認試験を準用する。

（3）　タイソウ　外面は赤褐色であらいしわがあるか，又は暗灰赤色で細かいしわがあり，いずれもつやがある。外果皮は薄く革質で，中果皮は暗灰褐色を呈し，海綿ようで柔

らかく粘着性があり，内果皮は極めて堅く，種子は偏平である。わずかに特異なにおいがあり，味は甘い。

（４）　ショウキョウ　淡灰黄色の周皮を付けたままか，又はその一部をはぎとってあり，表面は灰白色～淡灰褐色で，しばしば白粉を付けている。横断面は繊維性，粉性で，淡帯黄褐色を呈し，皮層と中心柱とに分かれる。横断面をルーペ視するとき，その全面に維管束及び分泌物が褐色の細点として散在している。特異なにおいがあり，味は極めて辛い。

乾燥減量　15%以下。

灰　　分　10%以下。

【 265 】　K70

成分及び分量 又は本質	日本薬局方	センキュウ	5.0g
	〃	ジュウヤク	2.0g
	〃	ケイガイ	1.5g
	〃	ダイオウ	1.0g
	局外生規	キンギンカ	2.0g
		全　　量	11.5g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。		
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。		
効能又は効果	体力中等度以上のものの次の諸症：かゆみ，湿疹・皮膚炎		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	五物解毒散料		

規格及び試験方法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品1包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　センキュウ　外面は灰褐色～暗褐色で，切断面は灰白色～灰褐色，半透明で，ときにはうつろがある。質は密で堅い。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，皮部及び髄には油道が散在する。木部には厚膜で木化した木部繊維が大小不同の群をなして存在する。でんぷん粒は，通例，のり化していて，まれに径5～25μmのでんぷん粒を認めることがある。シュウ酸カルシウム結晶は認めない。

（2）　ジュウヤク　葉，花穂及び少量の茎で，茎及び葉はともに毛がない。葉は淡緑褐色を呈し，花穂は淡黄褐色で無花被の多数の小花を付け，その基部に長卵円形の淡黄色～淡黄褐色の総包がある。茎は淡褐色を呈し，縦みぞと結節がある。ほとんど味がない。

必要に応じて，「ジュウヤク」の確認試験を準用する。

（3）　ケイガイ　茎，輪散花序に集合したがく筒，これら及びときには葉の砕片，種子ようの微粒の分果からなる。茎は方形で外面はおおむね紫褐色，径約1mmである。がく

筒は淡褐色～黄緑色で長さ 2～3mm，ルーペ視するとき，先端はきょ歯辺，筒部には数条の線があり，唇形花又は果実を含み，茎とともに類白色の短毛を認める。分果は黄褐色～黒色，両端の細いだ円体で長さ 1～1.5mm，径は長さのほぼ 1/2 である。特異な芳香があり，口に含むとわずかに清涼感がある。

必要に応じて，「ケイガイ」の確認試験を準用する。

（４）　ダイオウ　暗褐色～黄褐色～淡褐色を呈し，ルーペ視すると入り組んだ不規則な模様がある。質はおおむね粗で繊維性ではない。特異なにおいがあり，味はわずかに渋くて苦い。かめば細かい砂をかむような感じがあり，だ液を黄色に染める。

必要に応じて，「ダイオウ」の確認試験を準用する。

（５）　キンギンカ　やや湾曲したこん棒状のつぼみで，長さ 1.5～3.0cm，外面は淡黄色～黄褐色を呈し，ルーペ視すると，淡褐色の毛を密生している。花は唇形で，5 本の雄しべがある。特異なにおいがあり，味は渋くてわずかに甘い。

必要に応じて，局外生規「キンギンカ」の確認試験を準用する。

乾燥減量　15%以下。

灰　　分　10%以下。

【 266 】　K71

成分及び分量又は本質	日本薬局方	ブクリョウ	5.0g
	〃	トウキ	3.0g
	〃	オウゴン	3.0g
	〃	カンゾウ	2.0g
	〃	シャクヤク	2.0g
	〃	サンシシ	1.0～2.0g
		全　　量	16.0～17.0g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。		
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。		
効能又は効果	体力中等度のものの次の諸症：頻尿，排尿痛，残尿感，尿のにごり		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	五淋散料		

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品1包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　ブクリョウ　白色又はわずかに淡赤色を帯びた白色で，質は堅いが砕きやすい。味はないがやや粘液ようである。

必要に応じて，「ブクリョウ」の確認試験を準用する。

（2）　トウキ　外面は暗褐色～赤褐色で，縦じわがあり，切断面は淡黄色～黄褐色を呈する。特異なにおいがあり，味はわずかに甘く，後にやや辛い。

横切片を鏡検するとき，コルク層は4～10層からなり，その内側に数層の厚角組織が続いている。皮部には分泌細胞に囲まれた多数の樹脂道並びにしばしば大きなすき間がある。形成層は長方形に偏圧された数層の細胞からなり，明らかに皮部と木部とを区別する。木部では多数の道管と放射組織とが交互に放射状に配列し，その外方の道管は単独又は数個集まってやや密に配列してくさび状をなすが，中心部付近の道管は極めてまばらに

存在する。でんぷん粒は径 19μm 以下，まれに 2～5 個の複粒があり，複粒の径は 25μm に達し，しばしばのり化している。

（３）　オウゴン　外面は黄褐色～暗褐色を呈し，切断面は黄色～帯褐黄色を呈し，縦に繊維性のすじが見られる。味はわずかに苦い。

必要に応じて，「オウゴン」の確認試験を準用する。

（４）　カンゾウ　外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現わす。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に 1～3 細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には 3～10 細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞中にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

（５）　シャクヤク　外面は褐色～淡灰褐色を呈し，横断面はち密で淡灰褐色を呈し，木部には淡褐色の放射状の線がある。わずかに特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後に渋くてわずかに苦い。

必要に応じて，「シャクヤク」の確認試験を準用する。

（６）　サンシシ　果皮は薄く砕きやすく，その外面は赤褐色，黄褐色又は黒褐色を呈し，内面は黄褐色を呈し，平らでつやがある。果実の内部は 2 室に分かれ，黄赤色～暗赤色の果肉中に黒褐色又は黄赤色で長径約 5mm の偏平な種子の団塊を含む。質は軽い。弱いにおいがあり，味は苦い。

必要に応じて，「サンシシ」の確認試験を準用する。

乾燥減量　15%以下。

灰　　分　5%以下。

【 267 】　K72

成分及び分量 又は本質	日本薬局方	チョレイ	3.0g
	〃	ブクリョウ	4.0g
	〃	タクシャ	4.0g
	〃	ケイヒ	2.5g
	〃	ビャクジュツ	3.0g
		全　　量	16.5g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。		
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。		
効能又は効果	体力に関わらず使用でき，のどが渇いて尿量が少ないもので，めまい，はきけ，嘔吐，腹痛，頭痛，むくみなどのいずれかを伴う次の諸症：水様性下痢，急性胃腸炎（しぶり腹のものには使用しないこと），暑気あたり，頭痛，むくみ，二日酔		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	五苓散料		

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験（Ｉ）　本品1包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　チョレイ　外面は黒褐色～灰褐色を呈し，切断面はやや柔らかくコルクようで，ほぼ白色～淡褐色を呈し，内部には白色のまだら模様がある。質は軽い。味がない。

必要に応じて，「チョレイ」の確認試験を準用する。

（2）　ブクリョウ　白色又はわずかに淡赤色を帯びた白色である。外層が残存するものは暗褐色～暗赤褐色で，きめがあらく，裂け目がある。質は堅いが砕きやすい。ほとんどにおいがなく，味はないがやや粘液ようである。

必要に応じて，「ブクリョウ」の確認試験を準用する。

（３）　タクシャ　淡黄褐色～淡褐色でコルク層をつける部位はやや暗色を呈する。ルーペ視するとき，褐色～淡褐色のはん点が散在する。切面は粒状で，繊維性ではない。わずかににおい及び味がある。

（４）　ケイヒ　外面は暗赤褐色を呈し，内面は赤褐色を呈し，平滑である。横断面は赤褐色を呈し淡褐色の薄層が見られる。特異なにおいがあり，味は甘く，辛く，後にやや粘液性で，わずかに収れん性である。

横切片を鏡検するとき，一次皮部と二次皮部はほとんど連続した石細胞環で区分され，環の外辺にはほぼ円形に結集した繊維束を伴い，環の各石細胞の膜はしばしばU字形に肥厚する。二次皮部中には石細胞を認めず，まばらに少数の厚膜繊維を認める。柔組織中には油細胞，粘液細胞及び微細なシュウ酸カルシウムの針晶を含む細胞があり，柔細胞中にはでんぷん粒を含む。

（５）　ビャクジュツ　外面は淡灰黄色～淡黄白色で，ところどころ灰褐色を呈し，横切面には淡黄褐色～褐色の分泌物による細点がある。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，皮部の柔組織中にはしばしば師部の外側に接して繊維束があり，放射組織の末端部には淡褐色～褐色の内容物を含む油室がある。木部には大きい髄を囲んで放射状に配列した短径の道管とそれを囲む著しい繊維束がある。髄及び放射組織中には皮部と同様な油室があり，柔組織中にはイヌリンの結晶及びシュウ酸カルシウムの小針晶を含む。

必要に応じて，「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。

確認試験（Ⅱ）

（１）　ケイヒ　本品の粉末 2g にジエチルエーテル 10mL を加え，還流冷却器を付け，水浴上で 10 分間加熱し，冷後，ろ過し，ろ液を試料溶液とする。別に，「ケイヒ」の粉末 1g をとり，試料溶液と同様に操作して対照溶液とする。

これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び対照溶液 10μL ずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲルを用いて調製した薄層板にスポットする。次にヘキサン・クロロホルム・酢酸エチル混液（4：1：1）を展開溶媒として約 10cm 展開した後，薄層板を風乾する。これに 2,4 - ジニトロフェニルヒドラジン試液を均等に噴霧するとき，*Rf* 値約 0.45 付近に橙色のスポットを認める。

（２）　ビャクジュツ　本品の粉末 2g にヘキサン 10mL を加え，還流冷却器を付け，水浴上で 10 分間加熱し，冷後，ろ過し，ろ液を試料溶液とする。別に「ビャクジュツ」の粉末 1g をとり，試料溶液と同様に操作して対照溶液とする。

これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び対照溶液 10μL ずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲルを用いて調製した薄層板にスポットする。次にヘキサン・ベンゼン・酢酸エチル混液（14：3：3）を展開溶媒として約 10cm 展開した後，薄層板を風乾する。

これに *p* - ジメチルアミノベンズアルデヒド試液を均等に噴霧し，105℃で 5 分間加熱するとき，*Rf* 値約 0.61 付近に紅色のスポットを認める。

乾燥減量　15%以下。

灰　　分　5%以下。

【 268 】　K72—①

成分及び分量 又は本質	日本薬局方　チョレイ末　1.1g 〃　ブクリョウ末　1.1g 〃　タクシャ末　1.9g 〃　ケイヒ末　0.8g 〃　ビャクジュツ末　1.1g 全　量　6.0g
製造方法	以上をとり，散剤の製法により製し，3包とする。
用法及び用量	大人1日3回1包宛，食前又は空腹時に服用する。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。
効能又は効果	体力に関わらず使用でき，のどが渇いて尿量が少ないもので，めまい，はきけ，嘔吐，腹痛，頭痛，むくみなどのいずれかを伴う次の諸症：水様性下痢，急性胃腸炎（しぶり腹のものには使用しないこと），暑気あたり，頭痛，むくみ，二日酔
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器
規格及び試験方法	別記のとおり。
備考	五苓散

規格及び試験方法

性　状　本品は褐色の粉末で，特異なにおいがある。

確認試験　本品に薄めたグリセリン（1→2）又は抱水クロラール50gを水15mL及びグリセリン10mLの混液に溶かした液を滴加して鏡検するとき，淡褐色を呈した石細胞群，繊維束及びじん皮繊維，細胞膜がわずかにコルク化した分泌細胞などの破片を認める（ケイヒ）；菌糸，顆粒体，粘液板又はそれらを含む偽組織の破片を認める（ブクリョウ）；イヌリンの小球晶を含んだ柔細胞及び褐色の内容物を含む油室があり少数の石細胞を認める（ビャクジュツ）。

乾燥減量　20%以下。

灰　分　5%以下。

【 269 】　K73

成分及び分量又は本質	日本薬局方	サイコ	7.0g
	〃	ハンゲ	5.0g
	〃	オウゴン	3.0g
	〃	タイソウ	3.0g
	〃	ニンジン	3.0g
	〃	カンゾウ	1.5～2.0g
	〃	ショウキョウ	1.0g
	〃	オウレン	1.5g
	局外生規	カロニン	3.0g
		全　量	28.0～28.5g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。		
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。		
効能又は効果	体力中等度以上で，ときに脇腹(腹)からみぞおちあたりにかけて苦しく，食欲不振で口が苦く，舌に白苔がつき，強いせきが出てたんが切れにくく，ときに胸痛があるものの次の諸症：せき，胸痛，気管支炎		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	柴陥湯		

規格及び試験方法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品1包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　サイコ　外面は灰褐色～褐色で，深いしわがあるものがあり，横断面では，皮部は褐色，木部は淡褐色を呈する。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，皮部にはしばしば接線方向に長い裂け目があり，皮部の厚さは半径の1/3～1/2で，径15～35μmの胞間性離生油道がやや多数散在し，木部には道管が

放射状若しくはほぼ階段状に配列し，ところどころに繊維群があり，根頭部の髄には皮部と同様の油道がある。柔細胞中にはでんぷん粒を満たし，また油滴を認める。

必要に応じて，「サイコ」の確認試験を準用する。

（２）　ハンゲ　外面は白色～灰白黄色，上部には茎の跡がくぼみとなり，その周辺には根の跡がくぼんだ細点となっている。横断面は白色，粉性である。味は初めなく，やや粘液性で，後に強いえぐ味を残す。

横切片を鏡検するとき，主としてでんぷん粒を充満した柔組織からなり，わずかにシュウ酸カルシウムの束晶を含んだ粘液細胞がその間に認められる。でんぷん粒は主として 2～3 個の複粒で，通例，径 10～15μm，単粒は通例径 3～7μm である。束晶は長さ 25～150μm である。

（３）　オウゴン　外面は黄褐色～暗褐色を呈し，切断面は黄色～帯褐黄色を呈し，縦に繊維性のすじが見られる。味はわずかに苦い。

必要に応じて，「オウゴン」の確認試験を準用する。

（４）　タイソウ　外面は赤褐色であらいしわがあるか，又は暗灰赤色で細かいしわがあり，いずれもつやがある。外果皮は薄く革質で，中果皮は暗灰褐色を呈し，海綿ようで柔らかく粘着性があり，内果皮は極めて堅く，種子は偏平である。わずかに特異なにおいがあり，味は甘い。

（５）　ニンジン　外面は淡黄褐色～淡灰褐色を呈し，縦じわがあり，横断面は淡黄褐色を呈し，形成層の付近は褐色を呈する。特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後にやや苦い。

必要に応じて，「ニンジン」の確認試験を準用する。

（６）　カンゾウ　外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現わす。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に 1～3 細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には 3～10 細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞中にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

（７）　ショウキョウ　淡灰黄色の周皮をつけたままか，又はその一部をはぎとってあり，表面は灰白色～淡灰褐色で，しばしば白粉を付けている。横断面は繊維性，粉性で，淡帯黄褐色を呈し，皮層と中心柱とに分かれる。横断面をルーペ視するとき，その全面に維管束及び分泌物が褐色の細点として散在している。特異なにおいがあり，味は極めて辛い。

（８）　オウレン　根茎の径は 2～7mm で，外面は灰黄褐色～褐色を呈し，輪節及び多数の根の基部を認め，横断面はやや繊維性で，コルク層は淡灰褐色，皮部は黄褐色，木部は黄色，髄は黄褐色である。味は極めて苦く，残留性で，だ液を黄色に染める。

横切片を鏡検するとき，コルク層は薄膜のコルク細胞からなり，皮部柔組織中にはコルク層に近い部位に石細胞群，形成層に近い部位に黄色の師部繊維の認められるものが多い。木部は主として道管，仮道管，木部繊維からなり，放射組織は明らかで，髄は大き

く，髄中には石細胞あるいは厚膜木化した細胞を伴った石細胞を認めることがある。柔細胞には細かいでんぷん粒を含むが，結晶を含まない。

必要に応じて，「オウレン」の確認試験を準用する。

（９）　カロニン　種子で，次の（1），（2）又は（3）である。（1）は偏平な卵形～広卵形，ときにだ円形を呈し，多くは左右非相称である。長さ 9～18mm，幅 5～10mm，厚さ約 3mm，灰褐色～暗赤褐色あるいは淡褐色を呈する。細まった一端にはへそと発芽口があり，この部分はやや隆起し，切形又は鈍頭を呈する。周辺に沿って幅 1～3mm の縁どりがあるものと，これが明らかでないものとがある。表面はなめらかであるが，ルーペ視すると，多数の小さなくぼみが見られる。（2）は偏平な長だ円形を呈し，長さ 12～15mm，幅 5～7mm，厚さ約 4mm，灰白色～灰褐色を呈する。へそ及び発芽口の部分は（1）に類似するが，周辺の縁どりはおおむね明らかでなく，表面はざらつき，小隆起が密集する。（3）は（1）に類似するが，大形で，長さ 18～27mm，幅 10～16mm，厚さ 3～6mm のもの，（1）にやや類似するがおおむね左右相称で，へそと発芽口は極めて接近し，その付近は淡黄褐色を呈するもの，及び（1）に極めて類似するものとがある。種皮をはぐと通例表面灰緑色を呈する子葉が見られる。においがなく，味は苦く油ようである。

必要に応じて，局外生規「カロニン」の確認試験を準用する。

乾燥減量　15％以下。

灰　　分　5％以下。

【 270 】　K74

成分及び分量 又は本質	日本薬局方　サイコ　5.0g 〃　ハンゲ　4.0g 〃　ブクリョウ　3.0g 〃　ケイヒ　3.0g 〃　タイソウ　2.5g 〃　ニンジン　2.5g 〃　リュウコツ　2.5g 〃　ボレイ　2.5g 〃　ショウキョウ　0.5g 〃　ダイオウ　1.0g 全　量　26.5g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。
効能又は効果	体力中等度以上で，精神不安があって，動悸，不眠，便秘などを伴う次の諸症：高血圧の随伴症状（動悸，不安，不眠），神経症，更年期神経症，小児夜泣き，便秘
貯蔵方法及び 有効期間	密閉容器
規格及び試験方法	別記のとおり。
備考	柴胡加竜骨牡蛎湯

規格及び試験方法

性　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品1包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　サイコ　外面は灰褐色～褐色で，深いしわがあるものがあり，横断面では，皮部は褐色，木部は淡褐色を呈する。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，皮部にはしばしば接線方向に長い裂け目があり，皮部の厚さは半径の1/3～1/2で，径15～35μmの胞間性離生油道がやや多数散在し，木部には道管が放

射状若しくはほぼ階段状に配列し，ところどころに繊維群があり，根頭部の髄には皮部と同様の油道がある。柔細胞中にはでんぷん粒を満たし，また油滴を認める。

必要に応じて，「サイコ」の確認試験を準用する。

（２）　ハンゲ　外面は白色～灰白黄色，上部には茎の跡がくぼみとなり，その周辺には根の跡がくぼんだ細点となっている。横断面は白色，粉性である。味は初めなく，やや粘液性で，後に強いえぐ味を残す。

横切片を鏡検するとき，主としてでんぷん粒を充満した柔組織からなり，わずかにシュウ酸カルシウムの束晶を含んだ粘液細胞がその間に認められる。でんぷん粒は主として 2～3 個の複粒で，通例，径 10～15μm，単粒は通例径 3～7μm である。束晶は長さ 25～150μm である。

（３）　ブクリョウ　白色又はわずかに淡赤色を帯びた白色で，質は堅いが砕きやすい。味はないがやや粘液ようである。

必要に応じて，「ブクリョウ」の確認試験を準用する。

（４）　ケイヒ　外面は暗赤褐色を呈し，内面は赤褐色を呈し，平滑である。横断面は赤褐色を呈し淡褐色の薄層が見られる。特異なにおいがあり，味は甘く，辛く，後にやや粘液性で，わずかに収れん性である。

横切片を鏡検するとき，一次皮部と二次皮部はほとんど連続した石細胞環で区分され，環の外辺にはほぼ円形に結集した繊維束を伴い，環の各石細胞の膜はしばしばU字形に肥厚する。二次皮部中には石細胞を認めず，まばらに少数の厚膜繊維を認める。柔組織中には油細胞，粘液細胞及び微細なシュウ酸カルシウムの針晶を含む細胞があり，柔細胞中にはでんぷん粒を含む。

（５）　タイソウ　外面は赤褐色であらいしわがあるか，又は暗灰赤色で細かいしわがあり，いずれもつやがある。外果皮は薄く革質で，中果皮は暗灰褐色を呈し，海綿ようで柔らかく粘着性があり，内果皮は極めて堅く，種子は偏平である。わずかに特異なにおいがあり，味は甘い。

（６）　ニンジン　外面は淡黄褐色～淡灰褐色を呈し，縦じわがあり，横断面は淡黄褐色を呈し，形成層の付近は褐色を呈する。特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後にやや苦い。

必要に応じて，「ニンジン」の確認試験を準用する。

（７）　リュウコツ　不定形の塊又は破片で，ときには円柱状の塊である。表面は淡灰白色を呈し，ところどころに灰黒色又は黄褐色のはん点を付けるものがある。外側は質のち密な 2～10mm の層からなり，その内方は淡褐色を呈する海綿質からなる。質は重くてかたいが，ややもろく，破砕すると小片及び粉末となる。におい及び味はないが，なめると舌に強く吸着する。

必要に応じて，「リュウコツ」の確認試験を準用する。

（８）　ボレイ　薄い小片に砕いた貝がらで，外面は淡緑灰褐色，内面は乳白色を呈する。ほとんどにおい及び味はない。

必要に応じて，「ボレイ」の確認試験を準用する。

（９）　ショウキョウ　淡灰黄色の周皮をつけたままか，又はその一部をはぎとってあり，表面は灰白色～淡灰褐色で，しばしば白粉を付けている。横断面は繊維性，粉性で，淡帯黄褐色を呈し，皮層と中心柱とに分かれる。横断面をルーペ視するとき，その全面に

維管束及び分泌物が褐色の細点として散在している。特異なにおいがあり，味は極めて辛い。

（10）　ダイオウ　暗褐色～黄褐色～淡褐色を呈し，ルーペ視すると入り組んだ不規則な模様がある。質はおおむね粗で繊維性ではない。特異なにおいがあり，味はわずかに渋くて苦い。かめば細かい砂をかむような感じがあり，だ液を黄色に染める。

必要に応じて，「ダイオウ」の確認試験を準用する。

乾燥減量　15％以下。

【 271 】　K74—①

成分及び分量 又は本質	日本薬局方	サイコ	5.0g
	〃	ハンゲ	4.0g
	〃	ブクリョウ	3.0g
	〃	ケイヒ	3.0g
	〃	オウゴン	2.5g
	〃	タイソウ	2.5g
	〃	ニンジン	2.5g
	〃	リュウコツ	2.5g
	〃	ボレイ	2.5g
	〃	ショウキョウ	0.5g
	〃	ダイオウ	1.0g
		全　量	29.0g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。		
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，熱いうちに煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。 本剤は必ず1日分ずつ煎じ，数日分をまとめて煎じないこと。		
効能又は効果	体力中等度以上で，精神不安があって，動悸，不眠，便秘などを伴う次の諸症：高血圧の随伴症状（動悸，不安，不眠），神経症，更年期神経症，小児夜泣き，便秘		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	柴胡加竜骨牡蛎湯（黄芩）		

規格及び試験方法

性　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品1包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（１）　サイコ　外面は淡褐色～褐色で，深いしわがあるものがあり，横断面では，皮部は褐色，木部は淡褐色を呈する。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，皮部にはしばしば接線方向に長い裂け目があり，皮部の厚さは半径の 1/3～1/2 で，径 15～35μm の胞間性離生油道がやや多数散在する。木部には道管が放射状若しくはほぼ階段状に配列し，ところどころに繊維群があり，根頭部の髄には皮部と同様の油道がある。柔細胞中にはでんぷん粒及び油滴を認める。

必要に応じて，「サイコ」の確認試験を準用する。

（２）　ハンゲ　外面は白色～灰白黄色，上部には茎の跡がくぼみとなり，その周辺には根の跡がくぼんだ細点となっている。横断面は白色，粉性である。味は初めなく，やや粘液性で，後に強いえぐ味を残す。

横切片を鏡検するとき，主としてでんぷん粒を充満した柔組織からなり，わずかにシュウ酸カルシウムの束晶を含んだ粘液細胞がその間に認められる。でんぷん粒は主として 2～3 個の複粒で，通例，径 10～15μm，単粒は通例径 3～7μm である。束晶は長さ 25～150μm である。

（３）　ブクリョウ　白色又はわずかに淡赤色を帯びた白色である。外層が残存するものは暗褐色～暗赤褐色で，きめがあらく，裂け目がある。質は堅いが砕きやすい。味はないがやや粘液ようである。

必要に応じて，「ブクリョウ」の確認試験を準用する。

（４）　ケイヒ　外面は暗赤褐色を呈し，内面は赤褐色を呈し，平滑である。折面はやや繊維性で赤褐色を呈し淡褐色の薄層がある。特異なにおいがあり，味は甘く，辛く，後にやや粘液性で，わずかに収れん性である。

横切片を鏡検するとき，一次皮部と二次皮部はほとんど連続した石細胞環で区分され，環の外辺にはほぼ円形に結集した繊維束を伴い，環の各石細胞の壁はしばしばU字形に肥厚する。二次皮部中には石細胞を認めず，まばらに少数の厚膜繊維を認める。柔組織中には油細胞，粘液細胞及びでんぷん粒を含む。放射組織中には微細なシュウ酸カルシウムの針晶を含む細胞がある。

（５）　オウゴン　外面は黄褐色を呈し，切断面は黄色～黄褐色を呈し，縦に繊維性のすじが見られる。味はわずかに苦い。

必要に応じて，「オウゴン」の確認試験を準用する。

（６）　タイソウ　外面は赤褐色であらいしわがあるか，または暗灰赤色で細かいしわがあり，いずれもつやがある。外果皮は薄く革質で，中果皮は暗灰褐色を呈し，海綿ようで柔らかく粘着性があり，内果皮は極めて堅く，種子は偏平である。わずかに特異なにおいがあり，味は甘い。

（７）　ニンジン　外面は淡黄褐色～淡灰褐色を呈し，縦じわがあり，横断面は淡黄褐色を呈し，形成層の付近は褐色を呈する。特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後にやや苦い。

必要に応じて，「ニンジン」の確認試験を準用する。

（８）　リュウコツ　不定形の塊又は破片で，ときには円柱状の塊である。表面は淡灰白色を呈し，ところどころに灰黒色又は黄褐色の斑点を付けるものがある。外側は質のち密な 2～10mm の層からなり，その内方は淡褐色を呈する多孔質部からなる。質は重くてかたいが，ややもろく，破砕すると小片及び粉末となる。におい及び味はないが，なめると舌に強く吸着する。

必要に応じて，「リュウコツ」の確認試験を準用する。

（９）　ボレイ　薄い小片に砕いた貝がらで，外面は淡緑灰褐色，内面は乳白色を呈する。味はない。

必要に応じて，「ボレイ」の確認試験を準用する。

（10）　ショウキョウ　淡灰黄色の周皮を付けたままか，又はその一部をはぎとってあり，表面は灰白色～淡灰褐色で，しばしば白粉を付けている。横断面は繊維性，粉性で，淡帯黄褐色を呈し，皮層と中心柱とに分かれる。横断面をルーペ視するとき，その全面に維管束及び分泌物が暗褐色の細点として散在している。特異なにおいがあり，味は極めて辛い。

（11）　ダイオウ　暗褐色～黄褐色～淡褐色を呈し，ルーペ視すると入り組んだ不規則な模様がある。質はおおむね粗で繊維性はない。特異なにおいがあり，味はわずかに渋くて苦い。かめば細かい砂をかむような感じがあり，だ液を黄色に染める。

必要に応じて，「ダイオウ」の確認試験を準用する。

乾燥減量　11%以下。

灰　　分　25%以下。

【 272 】　K75

成分及び分量又は本質	日本薬局方	サイコ	6.0g
	〃	ケイヒ	3.0g
	〃	カロコン	4.0g
	〃	オウゴン	3.0g
	〃	ボレイ	3.0g
	〃	カンキョウ	2.0g
	〃	カンゾウ	2.0g
		全　　量	23.0g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。		
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。		
効能又は効果	体力中等度以下で，冷え症，貧血気味，神経過敏で，動悸，息切れ，ときにねあせ，頭部の発汗，口の乾きがあるものの次の諸症：更年期障害，血の道症，不眠症，神経症，動悸，息切れ，かぜの後期の症状，気管支炎		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	柴胡桂枝乾姜湯		

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品1包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　サイコ　外面は灰褐色～褐色で，深いしわがあるものがあり，横断面では，皮部は褐色，木部は淡褐色を呈する。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，皮部にはしばしば接線方向に長い裂け目があり，皮部の厚さは半径の1/3～1/2で，径15～35μmの胞間性離生油道がやや多数散在し，木部には道管が放射状若しくはほぼ階段状に配列し，ところどころに繊維群があり，根頭部の髄には皮部と同様の油道がある。柔細胞中にはでんぷん粒を満たし，また油滴を認める。

必要に応じて，「サイコ」の確認試験を準用する。

（２）　ケイヒ　外面は暗赤褐色を呈し，内面は赤褐色を呈し，平滑である。横断面は赤褐色を呈し淡褐色の薄層が見られる。特異なにおいがあり，味は甘く，辛く，後にやや粘液性で，わずかに収れん性である。

横切片を鏡検するとき，一次皮部と二次皮部はほとんど連続した石細胞環で区分され，環の外辺にはほぼ円形に結集した繊維束を伴い，環の各石細胞の膜はしばしばU字形に肥厚する。二次皮部中には石細胞を認めず，まばらに少数の厚膜繊維を認める。柔組織中には油細胞，粘液細胞及び微細なシュウ酸カルシウムの針晶を含む細胞があり，柔細胞中にはでんぷん粒を含む。

（３）　カロコン　外面は淡黄色で，帯褐黄色の不規則な維管束の走行が見られる。切断面は淡黄色で，やや繊維性である。横断面をルーペ視するとき，幅の広い放射組織及び帯褐黄色の道管によるはん点又は小孔を認める。味はわずかに苦い。

（４）　オウゴン　外面は黄褐色～暗褐色を呈し，切断面は黄色～帯褐黄色を呈し，縦に繊維性のすじが見られる。味はわずかに苦い。

必要に応じて，「オウゴン」の確認試験を準用する。

（５）　ボレイ　薄い小片に砕いた貝がらで，外面は淡緑灰褐色，内面は乳白色を呈する。ほとんどにおい及び味はない。

必要に応じて，「ボレイ」の確認試験を準用する。

（６）　カンキョウ　偏圧した不規則な塊状でしばしば分枝する。分枝した各部はやや湾曲した卵形又は長卵形を呈し，長さ 2～4cm，径 1～2cm である。外面は灰黄色～灰黄褐色で，しわ及び輪節がある。折面は褐色～暗褐色で透明感があり角質である。横切面をルーペ視するとき皮層と中心柱は区分され，全面に維管束が散在する。特異なにおいがあり，味は極めて辛い。

横切片を鏡検するとき，外側よりコルク層，皮層，内皮，中心柱が認められる。皮層と中心柱は一層の内皮によって区分される。皮層及び中心柱は柔組織からなり，繊維束で囲まれた維管束が散在する。柔組織中には黄色の油様物質を含む油細胞が散在し，柔細胞中にはシュウ酸カルシウムの単晶が含まれ，でんぷんは糊化している。

必要に応じて，「カンキョウ」の確認試験を準用する。

（７）　カンゾウ　外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現わす。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に 1～3 細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には 3～10 細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞中にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

乾燥減量　15%以下。

灰　　分　25%以下。

【 273 】　K76

成分及び分量又は本質	日本薬局方	サイコ	5.0g
	〃	ハンゲ	4.0g
	〃	ケイヒ	2.0g
	〃	シャクヤク	2.0g
	〃	オウゴン	2.0g
	〃	ニンジン	2.0g
	〃	タイソウ	2.0g
	〃	カンゾウ	1.0～1.5g
	〃	ショウキョウ	1.0g
		全　　量	21.0～21.5g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。		
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。		
効能又は効果	体力中等度又はやや虚弱で，多くは腹痛を伴い，ときに微熱・寒気・頭痛・はきけなどのあるものの次の諸症：胃腸炎，かぜの中期から後期の症状		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	柴胡桂枝湯		

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品1包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　サイコ　外面は灰褐色～褐色で，深いしわがあるものがあり，横断面では，皮部は褐色，木部は淡褐色を呈する。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，皮部にはしばしば接線方向に長い裂け目があり，皮部の厚さは半径の1/3～1/2で，径15～35μmの胞間性離生油道がやや多数散在し，木部には道管が放

射状若しくはほぼ階段状に配列し，ところどころに繊維群があり，根頭部の髄には皮部と同様の油道がある。柔細胞中にはでんぷん粒を満たし，また油滴を認める。

必要に応じて，「サイコ」の確認試験を準用する。

（２）　ハンゲ　外面は白色～灰白黄色，上部には茎の跡がくぼみとなり，その周辺には根の跡がくぼんだ細点となっている。横断面は白色，粉性である。味は初めなく，やや粘液性で，後に強いえぐ味を残す。

横切片を鏡検するとき，主としてでんぷん粒を充満した柔組織からなり，わずかにシュウ酸カルシウムの束晶を含んだ粘液細胞がその間に認められる。でんぷん粒は主として 2～3 個の複粒で，通例，径 10～15μm，単粒は通例径 3～7μm である。束晶は長さ 25～150μm である。

（３）　ケイヒ　外面は暗赤褐色を呈し，内面は赤褐色を呈し，平滑である。横断面は赤褐色を呈し淡褐色の薄層が見られる。特異なにおいがあり，味は甘く，辛く，後にやや粘液性で，わずかに収れん性である。

横切片を鏡検するとき，一次皮部と二次皮部はほとんど連続した石細胞環で区分され，環の外辺にはほぼ円形に結集した繊維束を伴い，環の各石細胞の膜はしばしばU字形に肥厚する。二次皮部中には石細胞を認めず，まばらに少数の厚膜繊維を認める。柔組織中には油細胞，粘液細胞及び微細なシュウ酸カルシウムの針晶を含む細胞があり，柔細胞中にはでんぷん粒を含む。

（４）　シャクヤク　外面は褐色～淡灰褐色を呈し，横断面はち密で淡灰褐色を呈し，木部には淡褐色の放射状の線がある。わずかに特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後に渋くてわずかに苦い。

必要に応じて，「シャクヤク」の確認試験を準用する。

（５）　オウゴン　外面は黄褐色～暗褐色を呈し，切断面は黄色～帯褐黄色を呈し，縦に繊維性のすじが見られる。味はわずかに苦い。

必要に応じて，「オウゴン」の確認試験を準用する。

（６）　ニンジン　外面は淡黄褐色～淡灰褐色を呈し，縦じわがあり，横断面は淡黄褐色を呈し，形成層の付近は褐色を呈する。特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後にやや苦い。

必要に応じて，「ニンジン」の確認試験を準用する。

（７）　タイソウ　外面は赤褐色であらいしわがあるか，又は暗灰赤色で細かいしわがあり，いずれもつやがある。外果皮は薄く革質で，中果皮は暗灰褐色を呈し，海綿ようで柔らかく粘着性があり，内果皮は極めて堅く，種子は偏平である。わずかに特異なにおいがあり，味は甘い。

（８）　カンゾウ　外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現わす。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に 1～3 細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には 3～10 細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞中

にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

（９）　ショウキョウ　淡灰黄色の周皮を付けたままか，又はその一部をはぎとってあり，表面は灰白色～淡灰褐色で，しばしば白粉を付けている。横断面は繊維性，粉性で，淡帯黄褐色を呈し，皮層と中心柱とに分かれる。横断面をルーペ視するとき，その全面に維管束及び分泌物が褐色の細点として散在している。特異なにおいがあり，味は極めて辛い。

乾燥減量　15%以下。

灰　　分　10%以下。

【 274 】　K77

成分及び分量 又は本質	日本薬局方	サイコ	2.0g
	〃	トウキ	1.5g
	〃	シャクヤク	1.5g
	〃	センキュウ	1.5g
	〃	ジオウ	1.5g
	〃	オウレン	1.5g
	〃	オウゴン	1.5g
	〃	オウバク	1.5g
	〃	サンシシ	1.5g
	〃	カロコン	1.5g
	〃	ハッカ	1.5g
	〃	カンゾウ	1.5g
	〃	レンギョウ	1.5g
	〃	キキョウ	1.5g
	〃	ゴボウシ	1.5g
		全　量	23.0g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。		
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。		
効能又は効果	体力中等度で，疳の強い傾向（神経過敏）にあるものの次の諸症：神経症，慢性扁桃炎，湿疹・皮膚炎，虚弱児の体質改善		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	柴胡清肝湯		

規格及び試験方法

性　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品 1 包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　サイコ　外面は灰褐色～褐色で，深いしわがあるものがあり，横断面では，皮部は褐色，木部は淡褐色を呈する。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，皮部にはしばしば接線方向に長い裂け目があり，皮部の厚さは半径の 1/3～1/2 で，径 15～35μm の胞間性離生油道がやや多数散在し，木部には道管が放射状若しくはほぼ階段状に配列し，ところどころに繊維群があり，根頭部の髄には皮部と同様の油道がある。柔細胞中にはでんぷん粒を満たし，また油滴を認める。

必要に応じて，「サイコ」の確認試験を準用する。

（2）　トウキ　外面は暗褐色～赤褐色で，縦じわがあり，切断面は淡黄色～黄褐色を呈する。特異なにおいがあり，味はわずかに甘く，後にやや辛い。

横切片を鏡検するとき，コルク層は 4～10 層からなり，その内側に数層の厚角組織が続いている。皮部には分泌細胞に囲まれた多数の樹脂道並びにしばしば大きなすき間がある。形成層は長方形に偏圧された数層の細胞からなり，明らかに皮部と木部とを区別する。木部では多数の道管木部では多数の道管と放射組織とが交互に放射状に配列し，その外方の道管は単独又は数個集まってやや密に配列してくさび状をなすが，中心部付近の道管は極めてまばらに存在する。でんぷん粒は径 19μm 以下，まれに 2～5 個の複粒があり，複粒の径は 25μm に達し，しばしばのり化している。

（3）　シャクヤク　外面は褐色～淡灰褐色を呈し，横断面はち密で淡灰褐色を呈し，木部には淡褐色の放射状の線がある。わずかに特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後に渋くてわずかに苦い。

必要に応じて，「シャクヤク」の確認試験を準用する。

（4）　センキュウ　外面は灰褐色～暗褐色で，切断面は灰白色～灰褐色，半透明で，ときにはうつろがある。質は密で堅い。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，皮部及び髄には油道が散在する。木部には厚膜で木化した木部繊維が大小不同の群をなして存在する。でんぷん粒は，通例，のり化していて，まれに径 5～25μm のでんぷん粒を認めることがある。シュウ酸カルシウム結晶は認めない。

（5）　ジオウ　外面は黄褐色～黒褐色を呈し，深い縦みぞ及びくびれがある。質は柔らかく粘性である。横断面は黄褐色～黒褐色で，皮部は木部より色が濃く，ほとんど髄を認めない。特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後にやや苦い。

横切片を鏡検するとき，コルク層は 7～15 層で，皮部はすべて柔細胞からなり，外皮部に褐色の分泌物を含む細胞が散在する。木部はほとんど柔細胞で満たされ，放射状に並ぶ道管は側孔のある網紋があり，弱い木化反応を呈する。

（6）　オウレン　根茎の径は 2～7mm で，外面は灰黄褐色～褐色を呈し，輪節及び多数の根の基部を認め，横断面はやや繊維性で，コルク層は淡灰褐色，皮部は黄褐色，木部は黄色，髄は黄褐色である。味は極めて苦く，残留性で，だ液を黄色に染める。

横切片を鏡検するとき，コルク層は薄膜のコルク細胞からなり，皮部柔組織中にはコルク層に近い部位に石細胞群，形成層に近い部位に黄色の師部繊維の認められるものが多い。木部は主として道管，仮道管，木部繊維からなり，放射組織は明らかで，髄は大きく，髄中には石細胞あるいは厚膜木化した細胞を伴った石細胞を認めることがある。柔細胞には細かいでんぷん粒を含むが，結晶を含まない。

必要に応じて，「オウレン」の確認試験を準用する。

（７）　オウゴン　外面は黄褐色～暗褐色を呈し，切断面は黄色～帯褐黄色を呈し，縦に繊維性のすじが見られる。味はわずかに苦い。

必要に応じて，「オウゴン」の確認試験を準用する。

（８）　オウバク　外面は灰黄褐色～灰褐色で，内面は黄色～暗黄褐色で，細かい縦線がある。横断面は鮮黄色でやや繊維性である。横切面をルーペ視するとき，皮部外層は黄色で薄く，石細胞が黄褐色の点状に分布する。皮部内層は厚く，一次放射組織は外方に向かうにしたがい幅が広がり，それらの一次放射組織の間に，多くの二次放射組織が集まってほぼ三角形の師部を形成し，この組織に褐色を呈する師部繊維束が層積して接線方向に並び，放射組織と交錯して格子状を呈する。味は極めて苦く，粘液性で，だ液を黄色に染める。

必要に応じて，「オウバク」の確認試験を準用する。

（９）　サンシシ　果皮は薄く砕きやすく，その外面は赤褐色，黄褐色又は黒褐色を呈し，内面は黄褐色を呈し，平らでつやがある。果実の内部は 2 室に分かれ，黄赤色～暗赤色の果肉中に黒褐色又は黄赤色で長径約 5mm の偏平な種子の団塊を含む。質は軽い。特異なにおいがあり，味は苦い。

必要に応じて，「サンシシ」の確認試験を準用する。

（10）　カロコン　外面は淡黄色で，帯褐黄色の不規則な維管束の走行が見られる。切断面は淡黄色で，やや繊維性である。横断面をルーペ視するとき，幅の広い放射組織及び帯褐黄色の道管によるはん点又は小孔を認める。味はわずかに苦い。

（11）　ハッカ　上面は淡褐黄色～淡緑黄色，下面は淡緑色～淡緑黄色である。葉をルーペ視するとき，両面に毛，腺毛及び腺りんをまばらに認め，腺毛及び腺りんは下面に多い。特異な芳香があり，口に含むと清涼感がある。

必要に応じて，「ハッカ」の確認試験を準用する。

（12）　カンゾウ　外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現わす。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に 1～3 細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には 3～10 細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞中にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

（13）　レンギョウ　外面は淡褐色～暗褐色を呈し，淡灰色の小隆起点が散在し，内面は黄褐色である。特異な芳香があり，味はわずかに収れん性である。

必要に応じて，「レンギョウ」の確認試験を準用する。

（14）　キキョウ　外面は皮付きは灰褐色，皮去りは白色～淡褐色を呈し，繊維性でない。横切面をルーペ視するとき，皮部は木部よりやや薄く，ほとんど白色で，ところどころにすき間があり，形成層の付近はしばしば褐色を帯びる。木部は白色～淡褐色を呈し，その組織は皮部よりもやや密である。味は初めなく，後にえぐくて苦い。

必要に応じて，「キキョウ」の確認試験を準用する。

（15）　ゴボウシ　やや湾曲した倒長卵形のそう果で，長さ 5～7mm，幅 2.0～3.2mm，厚さ 0.8～1.5mm，外面は灰褐色～褐色で，黒色の点がある。幅広い一端は径約 1mm のくぼみがあり，他端は細まり平たんで不明瞭な縦の稜線がある。100 粒の質量は 1.0～1.5 g である。ほとんどにおいがなく，味は苦く油様である。

横切片を鏡検するとき，外果皮は 1 層の表皮からなり，中果皮はやや厚壁化した柔組織からなり，内果皮は 1 層の石細胞層からなる。種皮は放射方向に長く厚壁化した表皮と数層の柔組織からなる。種皮の内側には内乳，子葉が見られる。中果皮柔細胞中には褐色物質を，内果皮石細胞中にはシュウ酸カルシウムの単晶を，子葉にはでんぷん粒，油滴，アリューロン粒及びシュウ酸カルシウムの微小な集晶を含む。

必要に応じて，「ゴボウシ」の確認試験を準用する。

乾燥減量　15%以下。

灰　　分　5%以下。

【 275 】　K78

成分及び分量又は本質	日本薬局方	ニンジン	4.0g
	〃	ビャクジュツ	4.0g
	〃	ブクリョウ	4.0g
	〃	ハンゲ	4.0g
	〃	チンピ	2.0g
	〃	タイソウ	2.0g
	〃	カンゾウ	1.0g
	〃	ショウキョウ	0.5g
	〃	サイコ	3.0g
	〃	シャクヤク	3.0g
		全　　量	27.5g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。		
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。		
効能又は効果	体力中等度以下で，神経質であり，胃腸が弱くみぞおちがつかえ，食欲不振，腹痛，貧血，冷え症の傾向のあるものの次の諸症：胃炎，胃腸虚弱，胃下垂，消化不良，食欲不振，胃痛，嘔吐，神経性胃炎		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	柴苓六君子湯		

規格及び試験方法

性　　状　本品はわずかに芳香性のにおいがある。

確認試験　本品1包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　ニンジン　外面は淡黄褐色～淡灰褐色を呈し，縦じわがあり，横断面は淡黄褐色を呈し，形成層の付近は褐色を呈する。特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後にやや苦い。

必要に応じて，「ニンジン」の確認試験を準用する。

（２）　ビャクジュツ　外面は淡灰黄色～淡黄白色で，ところどころ灰褐色を呈し，横切面には淡黄褐色～褐色の分泌物による細点がある。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，皮部の柔組織中にはしばしば師管の外側に接して繊維束があり，放射組織の末端部には淡褐色～褐色の内容物を含む油室がある。木部には大きい髄を囲んで放射状に配列した短径の道管とそれを囲む著しい繊維束がある。髄及び放射組織中には皮部と同様な油室があり，柔組織中にはイヌリンの小球晶及びシュウ酸カルシウムの針晶を含む。

必要に応じて，「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。

（３）　ブクリョウ　白色又はわずかに淡赤色を帯びた白色で，質は堅いが砕きやすい。味はないがやや粘液ようである。

必要に応じて，「ブクリョウ」の確認試験を準用する。

（４）　ハンゲ　外面は白色～灰白黄色，上部には茎の跡がくぼみとなり，その周辺には根の跡がくぼんだ細点となっている。横断面は白色，粉性である。味は初めなく，やや粘液性で，後に強いえぐ味を残す。

横切片を鏡検するとき，主としてでんぷん粒を充満した柔組織からなり，わずかにシュウ酸カルシウムの束晶を含んだ粘液細胞がその間に認められる。でんぷん粒は主として 2～3 個の複粒で，通例，径 10～15μm，単粒は通例径 3～7μm である。束晶は長さ 25～150μm である。

（５）　チンピ　外面は黄赤色～暗黄褐色で，油室による多数の小さいくぼみがあり，内面は白色～淡灰黄褐色である。厚さ約 2mm で，質は軽くてもろい。芳香があり，味は苦くて，わずかに刺激性である。

必要に応じて，「チンピ」の確認試験を準用する。

（６）　タイソウ　外面は赤褐色であらいしわがあるか，又は暗灰赤色で細かいしわがあり，いずれもつやがある。外果皮は薄く革質で，中果皮は暗灰褐色を呈し，海綿ようで柔らかく粘着性があり，内果皮は極めて堅く，種子は偏平である。わずかに特異なにおいがあり，味は甘い。

（７）　カンゾウ　外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現わす。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に 1～3 細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には 3～10 細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞中にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

（８）　ショウキョウ　淡灰黄色の周皮を付けたままか，又はその一部をはぎとってあり，表面は灰白色～淡灰褐色で，しばしば白粉を付けている。横断面は繊維性，粉性で，淡帯黄褐色を呈し，皮層と中心柱とに分かれる。横断面をルーペ視するとき，その全面に維管束及び分泌物が褐色の細点として散在している。特異なにおいがあり，味は極めて辛い。

（９）　サイコ　外面は灰褐色～褐色で，深いしわがあるものがあり，横断面では，皮部は褐色，木部は淡褐色を呈する。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，皮部にはしばしば接線方向に長い裂け目があり，皮部の厚さは半径の 1/3～1/2 で，径 15～35μm の胞間性離生油道がやや多数散在し，木部には道管が放射状若しくはほぼ階段状に配列し，ところどころに繊維群があり，根頭部の髄には皮部と同様の油道がある。柔細胞中にはでんぷん粒を満たし，また油滴を認める。

必要に応じて，「サイコ」の確認試験を準用する。

（10）　シャクヤク　外面は褐色～淡灰褐色を呈し，横断面はち密で淡灰褐色を呈し，木部には淡褐色の放射状の線がある。わずかに特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後に渋くてわずかに苦い。

必要に応じて，「シャクヤク」の確認試験を準用する。

乾燥減量　15％以下。

灰　　分　5％以下。

【 276 】　K79

成分及び分量 又は本質	日本薬局方　サイコ　7.0g 〃　ハンゲ　5.0g 〃　ショウキョウ　1.0g 〃　オウゴン　3.0g 〃　タイソウ　3.0g 〃　ニンジン　3.0g 〃　カンゾウ　2.0g 〃　ブクリョウ　5.0g 〃　コウボク　3.0g 〃　ソヨウ　2.0g 全　量　34.0g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。
効能又は効果	体力中等度で，気分がふさいで，咽喉，食道部に異物感があり，かぜをひきやすく，ときに動悸，めまい，嘔気などを伴うものの次の諸症：小児ぜんそく，気管支ぜんそく，気管支炎，せき，不安神経症，虚弱体質
貯蔵方法及び 有効期間	密閉容器
規格及び試験方法	別記のとおり。
備考	柴朴湯

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品はソヨウのにおいがある。

確認試験　本品1包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　サイコ　外面は灰褐色～褐色で，深いしわがあるものがあり，横断面では，皮部は褐色，木部は淡褐色を呈する。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，皮部にはしばしば接線方向に長い裂け目があり，皮部の厚さは半径の 1/3～1/2 で，径 15～35μm の胞間性離生油道がやや多数散在し，木部には道管が放射状若しくはほぼ階段状に配列し，ところどころに繊維群があり，根頭部の髄には皮部と同様の油道がある。柔細胞中にはでんぷん粒を満たし，また油滴を認める。

必要に応じて，「サイコ」の確認試験を準用する。

（２）　ハンゲ　外面は白色～灰白黄色，上部には茎の跡がくぼみとなり，その周辺には根の跡がくぼんだ細点となっている。横断面は白色，粉性である。味は初めなく，やや粘液性で，後に強いえぐ味を残す。

横切片を鏡検するとき，主としてでんぷん粒を充満した柔組織からなり，わずかにシュウ酸カルシウムの束晶を含んだ粘液細胞がその間に認められる。でんぷん粒は主として 2～3 個の複粒で，通例，径 10～15μm，単粒は通例径 3～7μm である。束晶は長さ 25～150μm である。

（３）　ショウキョウ　淡灰黄色の周皮を付けたままか，又はその一部をはぎとってあり，表面は灰白色～淡灰褐色で，しばしば白粉を付けている。横断面は繊維性，粉性で，淡帯黄褐色を呈し，皮層と中心柱とに分かれる。横断面をルーペ視するとき，その全面に維管束及び分泌物が褐色の細点として散在している。特異なにおいがあり，味は極めて辛い。

（４）　オウゴン　外面は黄褐色～暗褐色を呈し，切断面は黄色～帯褐黄色を呈し，縦に繊維性のすじが見られる。味はわずかに苦い。

必要に応じて，「オウゴン」の確認試験を準用する。

（５）　タイソウ　外面は赤褐色であらいしわがあるか，又は暗灰赤色で細かいしわがあり，いずれもつやがある。外果皮は薄く革質で，中果皮は暗灰褐色を呈し，海綿ようで柔らかく粘着性があり，内果皮は極めて堅く，種子は偏平である。わずかに特異なにおいがあり，味は甘い。

（６）　ニンジン　外面は淡黄褐色～淡灰褐色を呈し，縦じわがあり，横断面は淡黄褐色を呈し，形成層の付近は褐色を呈する。特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後にやや苦い。

必要に応じて，「ニンジン」の確認試験を準用する。

（７）　カンゾウ　外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現わす。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に 1～3 細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には 3～10 細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞中にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

（８）　ブクリョウ　白色又はわずかに淡赤色を帯びた白色で，質は堅いが砕きやすい。味はないがやや粘液ようである。

必要に応じて，「ブクリョウ」の確認試験を準用する。

（９）　コウボク　外面は灰白色～灰褐色を呈し，内面は淡褐色～褐色，切断面は淡赤褐色を呈し，繊維性である。わずかに芳香があり，味は苦い。

横切片を鏡検するとき，コルク層は厚く，ほぼ等径性の石細胞が環状に内接する。一次皮部は狭く，内しょう部には繊維群が点在し，二次皮部の放射組織間には師部繊維群が階段状に並ぶ。油細胞の多数は一次皮部に，少数は二次皮部に散在し，狭い放射組織内にも認められることがある。

必要に応じて，「コウボク」の確認試験を準用する。

（10）　ソヨウ　縮んだ葉の細片で，両面とも帯褐紫色，あるいは上面は灰緑色～帯褐緑色で下面は帯褐紫色を呈する。茎を交じえるものは，その横断面は方形である。葉をルーペ視するとき，両面にまばらに毛を認め，特に葉脈上に多く，裏面には細かい腺毛を認める。もみ砕くとき，特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

必要に応じて，「ソヨウ」の確認試験を準用する。

乾燥減量　10%以下。

灰　　分　10%以下。

【 277 】　K80

成分及び分量 又は本質	日本薬局方	サイコ	5.0g
	〃	ハンゲ	4.0g
	〃	ショウキョウ	1.0g
	〃	オウゴン	3.0g
	〃	タイソウ	2.5g
	〃	ニンジン	2.5g
	〃	カンゾウ	2.0g
	〃	タクシャ	5.0g
	〃	チョレイ	3.0g
	〃	ブクリョウ	3.0g
	〃	ビャクジュツ	3.0g
	〃	ケイヒ	2.5g
		全　量	36.5g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。		
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。		
効能又は効果	体力中等度で，のどが渇いて尿量が少なく，ときにはきけ，食欲不振，むくみなどを伴うものの次の諸症：水様性下痢，急性胃腸炎，暑気あたり，むくみ		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	柴苓湯		

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品1包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（１）　サイコ　外面は灰褐色～褐色で，深いしわがあるものがあり，横断面では，皮部は褐色，木部は淡褐色を呈する。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，皮部にはしばしば接線方向に長い裂け目があり，皮部の厚さは半径の 1/3～1/2 で，径 15～35μm の胞間性離生油道がやや多数散在し，木部には道管が放射状若しくはほぼ階段状に配列し，ところどころに繊維群があり，根頭部の髄には皮部と同様の油道がある。柔細胞中にはでんぷん粒を満たし，また油滴を認める。

必要に応じて，「サイコ」の確認試験を準用する。

（２）　ハンゲ　外面は白色～灰白黄色，上部には茎の跡がくぼみとなり，その周辺には根の跡がくぼんだ細点となっている。横断面は白色，粉性である。味は初めなく，やや粘液性で，後に強いえぐ味を残す。

横切片を鏡検するとき，主としてでんぷん粒を充満した柔組織からなり，わずかにシュウ酸カルシウムの束晶を含んだ粘液細胞がその間に認められる。でんぷん粒は主として 2～3 個の複粒で，通例，径 10～15μm，単粒は通例径 3～7μm である。束晶は長さ 25～150μm である。

（３）　ショウキョウ　淡灰黄色の周皮を付けたままか，又はその一部をはぎとってあり，表面は灰白色～淡灰褐色で，しばしば白粉を付けている。横断面は繊維性，粉性で，淡帯黄褐色を呈し，皮層と中心柱とに分かれる。横断面をルーペ視するとき，その全面に維管束及び分泌物が褐色の細点として散在している。特異なにおいがあり，味は極めて辛い。

（４）　オウゴン　外面は黄褐色～暗褐色を呈し，切断面は黄色～帯褐黄色を呈し，縦に繊維性のすじが見られる。味はわずかに苦い。

必要に応じて，「オウゴン」の確認試験を準用する。

（５）　タイソウ　外面は赤褐色であらいしわがあるか，又は暗灰赤色で細かいしわがあり，いずれもつやがある。外果皮は薄く革質で，中果皮は暗灰褐色を呈し，海綿ようで柔らかく粘着性があり，内果皮は極めて堅く，種子は偏平である。わずかに特異なにおいがあり，味は甘い。

（６）　ニンジン　外面は淡黄褐色～淡灰褐色を呈し，縦じわがあり，横断面は淡黄褐色を呈し，形成層の付近は褐色を呈する。特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後にやや苦い。

必要に応じて，「ニンジン」の確認試験を準用する。

（７）　カンゾウ　外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現わす。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に 1～3 細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には 3～10 細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞中にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

（８）　タクシャ　淡黄褐色～淡褐色でコルク層をつける部位はやや暗色を呈する。ルーペ視するとき，褐色～淡褐色のはん点が散在する。切面は粒状で，繊維性ではない。わずかににおい及び味がある。

（９）　チョレイ　外面は黒褐色を呈し，切断面はやや柔らかくコルクようで，ほぼ白色～淡褐色を呈し，内部には白色のまだら模様がある。質は軽い。味がない。

必要に応じて，「チョレイ」の確認試験を準用する。

(10)　ブクリョウ　白色又はわずかに淡赤色を帯びた白色で，質は堅いが砕きやすい。味はないがやや粘液ようである。

必要に応じて，「ブクリョウ」の確認試験を準用する。

(11)　ビャクジュツ　外面は淡灰黄色～淡黄白色で，ところどころ灰褐色を呈し，横切面には淡黄褐色～褐色の分泌物による細点がある。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，皮部の柔組織中にはしばしば師管の外側に接して繊維束があり，放射組織の末端部には淡褐色～褐色の内容物を含む油室がある。木部には大きい髄を囲んで放射状に配列した短径の道管とそれを囲む著しい繊維束がある。髄及び放射組織中には皮部と同様な油室があり，柔組織中にはイヌリンの小球晶及びシュウ酸カルシウムの針晶を含む。

必要に応じて，「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。

(12)　ケイヒ　外面は暗赤褐色を呈し，内面は赤褐色を呈し，平滑である。横断面は赤褐色を呈し淡褐色の薄層が見られる。特異なにおいがあり，味は甘く，辛く，後にやや粘液性で，わずかに収れん性である。

横切片を鏡検するとき，一次皮部と二次皮部はほとんど連続した石細胞環で区分され，環の外辺にはほぼ円形に結集した繊維束を伴い，環の各石細胞の膜はしばしばU字形に肥厚する。二次皮部中には石細胞を認めず，まばらに少数の厚膜繊維を認める。柔組織中には油細胞，粘液細胞及び微細なシュウ酸カルシウムの針晶を含む細胞があり，柔細胞中にはでんぷん粒を含む。

乾燥減量　15%以下。

灰　　分　10%以下。

【 278 】　K81

成分及び分量 又は本質	日本薬局方	ダイオウ末	4.0g
	〃	オウゴン末	4.0g
	〃	オウレン末	2.0g
		全　量	10.0g
製造方法	以上をとり，散剤の製法により製する。		
用法及び用量	1回量を次のとおりとし，1日3回食間に服用する。 大人（15才以上）1包0.8g，15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。		
効能又は効果	体力中等度以上で，のぼせ気味で顔面紅潮し，精神不安，みぞおちのつかえ，便秘傾向などのあるものの次の諸症：高血圧の随伴症状（のぼせ，肩こり，耳なり，頭重，不眠，不安），鼻血，痔出血，便秘，更年期障害，血の道症		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	三黄散		

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は黄褐色で，味はきわめて苦く，特異なにおいがある。

確認試験

（1）　オウゴン　本品の粉末2gにメタノール10mLを加え，還流冷却器を付け，水浴上で10分間加熱し，冷後，ろ過し，ろ液を試料溶液とする。

別に「オウゴン」の粉末1gをとり，試料溶液と同様に操作して，対照溶液とする。

これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び対照溶液10μLずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲルを用いて調製した薄層板にスポットする。次にクロロホルム・メタノール混液（3：1）を展開溶媒として約10cm展開した後，薄層板を風乾する。これに塩化鉄（Ⅲ）試液を均等に噴霧するとき，*Rf*値約0.61付近に暗褐色のスポットを認める。

（2）　オウレン　本品の粉末2gにメタノール10mLを加え，還流冷却器を付け，水浴上で10分間加熱し，冷後，ろ過し，ろ液を試料溶液とする。

別に「オウレン」の粉末1gをとり，試料溶液と同様に操作して，対照溶液とする。

これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び対照溶液5μLずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲルを用いて調製した薄層板にスポットする。次

に 1 - ブタノール・酢酸・水混液（6：2：2）を展開溶媒として約 10cm 展開した後，薄層板を風乾する。これに 4 - メトキシベンズアルデヒド・硫酸試液を均等に噴霧するとき，*Rf* 値約 0.23 付近に黄色のスポットを認める。

（３）　ダイオウ　本品の粉末 2g にメタノール 10mL を加え，還流冷却器を付け，水浴上で 10 分間加熱し，冷後，ろ過し，ろ液を試料溶液とする。

別に「ダイオウ」の粉末 1g をとり，試料溶液と同様に操作して，対照溶液とする。

これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び対照溶液 5μL ずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲルを用いて調製した薄層板にスポットする。次にクロロホルム・メタノール混液（3：1）を展開溶媒として約 10cm 展開した後，薄層板を風乾する。*Rf* 値約 0.84 付近に黄色のスポットを認める。

乾燥減量　10%以下。

灰　　分　7%以下。

【 279 】　K82

成分及び分量 又は本質	日本薬局方	ダイオウ	1.0～2.0g
	〃	オウゴン	1.0g
	〃	オウレン	1.0g
		全　量	3.0～4.0g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。		
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。		
効能又は効果	体力中等度以上で，のぼせ気味で顔面紅潮し，精神不安，みぞおちのつかえ，便秘傾向などのあるものの次の諸症：高血圧の随伴症状（のぼせ，肩こり，耳なり，頭重，不眠，不安），鼻血，痔出血，便秘，更年期障害，血の道症		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	三黄瀉心湯		

規格及び試験方法

性　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品1包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　ダイオウ　暗褐色～黄褐色～淡褐色を呈し，ルーペ視すると入り組んだ不規則な模様がある。質はおおむね粗で繊維性ではない。特異なにおいがあり，味はわずかに渋くて苦い。かめば細かい砂をかむような感じがあり，だ液を黄色に染める。

必要に応じて，「ダイオウ」の確認試験を準用する。

（2）　オウゴン　外面は黄褐色～暗褐色を呈し，切断面は黄色～帯褐黄色を呈し，縦に繊維性のすじが見られる。味はわずかに苦い。

必要に応じて，「オウゴン」の確認試験を準用する。

（3）　オウレン　根茎の径は2～7mmで，外面は灰黄褐色～褐色を呈し，輪節及び多数の根の基部を認め，横断面はやや繊維性で，コルク層は淡灰褐色，皮部は黄褐色，木部は黄色，髄は黄褐色である。味は極めて苦く，残留性で，だ液を黄色に染める。

横切片を鏡検するとき，コルク層は薄膜のコルク細胞からなり，皮部柔組織中にはコルク層に近い部位に石細胞群，形成層に近い部位に黄色の師部繊維の認められるものが多い。木部は主として道管，仮道管，木部繊維からなり，放射組織は明らかで，髄は大きく，髄中には石細胞あるいは厚膜木化した細胞を伴った石細胞を認めることがある。柔細胞には細かいでんぷん粒を含むが，結晶を含まない。

必要に応じて，「オウレン」の確認試験を準用する。

乾燥減量　10%以下。

灰　　分　7%以下。

【 280 】　K83

成分及び分量又は本質	日本薬局方	サンソウニン	15.0g
	〃	チモ	3.0g
	〃	センキュウ	3.0g
	〃	ブクリョウ	5.0g
	〃	カンゾウ	1.0g
		全　　量	27.0g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。		
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。		
効能又は効果	体力中等度以下で，心身が疲れ，精神不安，不眠などがあるものの次の諸症：不眠症，神経症		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	酸棗仁湯		

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品1包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　サンソウニン　扁平な卵形～円形でレンズ状を呈し，長さ5～9mm，幅4～6mm，厚さ2～3mm，外面は褐色～暗赤褐色を呈し，つやがある。一端にはへそ，他端には合点がある。種皮はやや柔軟で，乳白色の内乳及び淡黄色の胚を包む。100粒の質量は3.0～4.5gである。わずかな油臭があり，緩和でやや油様である。

横切片を鏡検するとき，種皮は外側の表皮，柔組織，内側の表皮からなる。外側の表皮は放射方向に長く厚壁化した細胞からなり，内側の表皮にはクチクラが認められる。内乳は柔組織からなり，シュウ酸カルシウムの集晶，アリューロン粒，でんぷん粒を含む。子葉は柔組織からなり，アリューロン粒，でんぷん粒，油滴を含む。

必要に応じて，「サンソウニン」の確認試験を準用する。

（2）　チモ　外面は黄褐色～褐色を呈し，質は軽くて折りやすい。横断面は淡黄褐色を呈し，これをルーペ視するとき，皮層は極めて狭く，広い中心柱には多くの維管束が不規

則に点在し，粘液細胞又はその集合による多孔性を示す。味はわずかに甘く，粘液性で，後に苦い。

必要に応じて，「チモ」の確認試験を準用する。

（３）　センキュウ　外面は灰褐色～暗褐色で，切断面は灰白色～灰褐色，半透明で，ときにはうつろがある。質は密で堅い。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，皮部及び髄には油道が散在する。木部には厚膜で木化した木部繊維が大小不同の群をなして存在する。でんぷん粒は，通例，のり化していて，まれに径5～25μm のでんぷん粒を認めることがある。シュウ酸カルシウム結晶は認めない。

（４）　ブクリョウ　白色又はわずかに淡赤色を帯びた白色で，質は堅いが砕きやすい。味はないがやや粘液ようである。

必要に応じて，「ブクリョウ」の確認試験を準用する。

（５）　カンゾウ　外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現わす。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に 1～3 細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には 3～10 細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞中にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

乾燥減量　10%以下。

灰　　分　5%以下。

【 281 】　K84

成分及び分量 又は本質	日本薬局方	オウゴン	3.0g
	〃	クジン	3.0g
	〃	ジオウ	6.0g
		全　量	12.0g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。		
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。		
効能又は効果	体力中等度又はやや虚弱で，手足のほてりがあるものの次の諸症：湿疹・皮膚炎，手足のあれ（手足の湿疹・皮膚炎），不眠		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	三物黄芩湯		

規格及び試験方法

性　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品1包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　オウゴン　外面は黄褐色～暗褐色を呈し，切断面は黄色～帯褐黄色を呈し，縦に繊維性のすじが見られる。味はわずかに苦い。

必要に応じて，「オウゴン」の確認試験を準用する。

（2）　クジン　外面は暗褐色～黄褐色で，切断面は黄白色～淡灰褐色を呈し，繊維性である。味は極めて苦く，残留性である。

必要に応じて，「クジン」の確認試験を準用する。

（3）　ジオウ　外面は黄褐色～黒褐色を呈し，深い縦みぞ及びくびれがある。質は柔らかく粘性である。横断面は黄褐色～黒褐色で，皮部は木部より色が濃く，ほとんど髄を認めない。特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後にやや苦い。

横切片を鏡検するとき，コルク層は7～15層で，皮部はすべて柔細胞からなり，外皮部に褐色の分泌物を含む細胞が散在する。木部はほとんど柔細胞で満たされ，放射状に並ぶ道管は側孔のある網紋があり，弱い木化反応を呈する。

乾燥減量　15%以下。

灰　　分　6%以下。

【 282 】　K85

成分及び分量又は本質	日本薬局方	トウキ	2.5g
	〃	シャクヤク	2.5g
	〃	ジオウ	2.5g
	〃	テンモンドウ	2.5g
	〃	バクモンドウ	2.5g
	〃	チンピ	2.5g
	〃	ビャクジュツ	3.0g
	〃	チモ	1.5g
	〃	オウバク	1.5g
	〃	カンゾウ	1.0～1.5g
		全　量	22.0～22.5g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。		
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。		
効能又は効果	体力虚弱で，のどにうるおいがなく，たんが切れにくくてせきこみ，皮膚が浅黒く乾燥し，便秘傾向のあるものの次の諸症：気管支炎，せき		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	滋陰降火湯		

規格及び試験方法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品1包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　トウキ　外面は暗褐色～赤褐色で，縦じわがあり，切断面は淡黄色～黄褐色を呈する。特異なにおいがあり，味はわずかに甘く，後にやや辛い。

横切片を鏡検するとき，コルク層は4～10層からなり，その内側に数層の厚角組織が続いている。皮部には分泌細胞に囲まれた多数の樹脂道並びにしばしば大きなすき間があ

る。形成層は長方形に偏圧された数層の細胞からなり，明らかに皮部と木部とを区別する。木部では多数の道管と放射組織とが交互に放射状に配列し，その外方の道管は単独又は数個集まってやや密に配列してくさび状をなすが，中心部付近の道管は極めてまばらに存在する。でんぷん粒は径 19μm 以下，まれに 2～5 個の複粒があり，複粒の径は 25μm に達し，しばしばのり化している。

（２）　シャクヤク　外面は褐色～淡灰褐色を呈し，横断面はち密で淡灰褐色を呈し，木部には淡褐色の放射状の線がある。わずかに特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後に渋くてわずかに苦い。

必要に応じて，「シャクヤク」の確認試験を準用する。

（３）　ジオウ　外面は黄褐色～黒褐色を呈し，深い縦みぞ及びくびれがある。質は柔らかく粘性である。横断面は黄褐色～黒褐色で，皮部は木部より色が濃く，ほとんど髄を認めない。特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後にやや苦い。

横切片を鏡検するとき，コルク層は 7～15 層で，皮部はすべて柔細胞からなり，外皮部に褐色の分泌物を含む細胞が散在する。木部はほとんど柔細胞で満たされ，放射状に並ぶ道管は側孔のある網紋があり，弱い木化反応を呈する。

（４）　テンモンドウ　紡錘形～円柱形を呈し，長さ 5～15cm，径 5～20mm，外面は淡黄褐色～淡褐色を呈し，半透明で，しばしば縦じわがある。質は柔軟性であるか，又は堅い。折面は灰黄色でつやがあり，やや角質様である。特異なにおいがあり，味は初め甘く，後わずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，皮層の外辺には石細胞及びその群が散在し，皮層及び中心柱の柔細胞中にはシュウ酸カルシウムの束針晶を含む粘液細胞を認める。でんぷん粒を認めない。

必要に応じて，「テンモンドウ」の確認試験を準用する。

（５）　バクモンドウ　紡錘形を呈し，長さ 10～25mm，径 3～5mm，一端はややとがり，他端はやや丸みをもち，外面は淡黄色～淡黄褐色で，大小の縦じわがある。皮層は柔軟性でもろく，中心柱は強じんで折りにくい。皮層の折面は淡黄褐色を呈し，やや半透明で粘着性がある。味はわずかに甘く，粘着性である。

（６）　チンピ　外面は黄赤色～暗黄褐色で，油室による多数の小さいくぼみがあり，内面は白色～淡灰黄褐色である。厚さ約 2mm で，質は軽くてもろい。芳香があり，味は苦くて，わずかに刺激性である。

必要に応じて，「チンピ」の確認試験を準用する。

（７）　ビャクジュツ　外面は淡灰黄色～淡黄白色で，ところどころ灰褐色を呈し，横切面には淡黄褐色～褐色の分泌物による細点がある。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，皮部の柔組織中にはしばしば師管の外側に接して繊維束があり，放射組織の末端部には淡褐色～褐色の内容物を含む油室がある。木部には大きい髄を囲んで放射状に配列した短径の道管とそれを囲む著しい繊維束がある。髄及び放射組織中には皮部と同様な油室があり，柔組織中にはイヌリンの小球晶及びシュウ酸カルシウムの針晶を含む。

必要に応じて，「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。

（８）　チモ　外面は黄褐色～褐色を呈し，質は軽くて折りやすい。横断面は淡黄褐色を呈し，これをルーペ視するとき，皮層は極めて狭く，広い中心柱には，多くの維管束が不

規則に点在し，粘液細胞又はその集合による多孔性を示す。味はわずかに甘く，粘液性で，後に苦い。

必要に応じて，「チモ」の確認試験を準用する。

（９）　オウバク　外面は灰黄褐色～灰褐色で，内面は黄色～暗黄褐色で，細かい縦線がある。横断面は鮮黄色でやや繊維性である。横切面をルーペ視するとき，皮部外層は黄色で薄く，石細胞が黄褐色の点状に分布する。皮部内層は厚く，一次放射組織は外方に向かうにしたがい幅が広がり，それらの一次放射組織の間に，多くの二次放射組織が集まってほぼ三角形の師部を形成し，この組織に褐色を呈する師部繊維束が層積して接線方向に並び，放射組織と交錯して格子状を呈する。味は極めて苦く，粘液性で，だ液を黄色に染める。

必要に応じて，「オウバク」の確認試験を準用する。

（10）　カンゾウ　外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現わす。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に 1～3 細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には 3～10 細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞中にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

乾燥減量　15%以下。

灰　　分　5%以下。

【 283 】　K86

成分及び分量 又は本質	日本薬局方	トウキ	3.0g
	〃	シャクヤク	3.0g
	〃	ビャクジュツ	3.0g
	〃	ブクリョウ	3.0g
	〃	チンピ	3.0g
	〃	サイコ	3.0g
	〃	チモ	3.0g
	〃	コウブシ	3.0g
	〃	ジコッピ	3.0g
	〃	バクモンドウ	3.0g
	〃	バイモ	2.0g
	〃	ハッカ	1.0g
	〃	カンゾウ	1.0g
		全　　量	34.0g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。		
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，熱いうちに煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。 本剤は必ず1日分ずつ煎じ，数日分をまとめて煎じないこと。		
効能又は効果	体力虚弱なものの次の諸症：慢性のせき，たん，気管支炎		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	滋陰至宝湯		

規格及び試験方法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品1包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（１）　トウキ　外面は暗褐色～赤褐色で，縦じわがあり，切断面は淡黄色～黄褐色を呈する。特異なにおいがあり，味はわずかに甘く，後にやや辛い。

横切片を鏡検するとき，コルク層は 4～10 層からなり，その内側に数層の厚角組織が続いている。皮部には分泌細胞に囲まれた多数の樹脂道並びにしばしば大きなすき間がある。形成層は長方形に偏圧された数層の細胞からなり，明らかに皮部と木部とを区別する。木部では多数の道管と放射組織とが交互に放射状に配列し，その外方の道管は単独又は数個集まってやや密に配列してくさび状をなすが，中心部付近の道管は極めてまばらに存在する。でんぷん粒は径 19μm 以下，まれに 2～5 個の複粒があり，複粒の径は 25μm に達し，しばしばのり化している。

（２）　シャクヤク　外面は褐色～淡灰褐色を呈し，横断面はち密で淡灰褐色を呈し，木部には淡褐色の放射状の線がある。わずかに特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後に渋くてわずかに苦い。

必要に応じて，「シャクヤク」の確認試験を準用する。

（３）　ビャクジュツ　外面は淡灰黄色～淡黄白色で，ところどころ灰褐色を呈し，横切面には淡黄褐色～褐色の分泌物による細点がある。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，皮部の柔組織中にはしばしば師部の外側に接して繊維束があり，放射組織の末端部には淡褐色～褐色の内容物を含む油室がある。木部には大きい髄を囲んで放射状に配列した短径の道管とそれを囲む著しい繊維束がある。髄及び放射組織中には皮部と同様な油室があり，柔組織中にはイヌリンの結晶及びシュウ酸カルシウムの小針晶を含む。

必要に応じて，「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。

（４）　ブクリョウ　白色又はわずかに淡赤色を帯びた白色である。外層が残存するものは暗褐色～暗赤褐色で，きめがあらく，裂け目がある。質は堅いが砕きやすい。ほとんどにおいがなく，味はないがやや粘液ようである。

必要に応じて，「ブクリョウ」の確認試験を準用する。

（５）　チンピ　外面は黄赤色～暗黄褐色で，油室による多数の小さいくぼみがあり，内面は白色～淡灰黄褐色である。質は軽くてもろい。特異な芳香があり，味は苦くて，わずかに刺激性である。

必要に応じて，「チンピ」の確認試験を準用する。

（６）　サイコ　外面は淡褐色～褐色で，深いしわがあるものがあり，横断面では，皮部は褐色，木部は淡褐色を呈する。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，皮部にはしばしば接線方向に長い裂け目があり，皮部の厚さは半径の 1/3～1/2 で，径 15～35μm の胞間性離生油道がやや多数散在し，木部には道管が放射状若しくはほぼ階段状に配列し，ところどころに繊維群があり，根頭部の髄には皮部と同様の油道がある。柔細胞中にはでんぷん粒を満たし，また油滴を認める。

必要に応じて，「サイコ」の確認試験を準用する。

（７）　チモ　外面は黄褐色～褐色を呈し，質は軽くて折りやすい。横断面は淡黄褐色を呈し，これをルーペ視するとき，皮層は極めて狭く，広い中心柱には多くの維管束が不規則に点在し，粘液細胞またはその集合による多孔性を示す。味はわずかに甘く，粘液性で，後に苦い。

必要に応じて，「チモ」の確認試験を準用する。

（８）　コウブシ　紡錘形を呈し，長さ 1.5～2.5cm，径 0.5～1cm である。外面は灰褐色～灰黒褐色で，5～8 個の不整な輪節があり，その部分に毛状になった繊維束がある。質は堅く，横断面は赤褐色～淡黄色を呈し，ろうようのつやを帯び，皮層部の厚さは中心柱の径とほぼ等しいか又はわずかに薄い。これをルーペ視するとき，周辺には繊維束が褐色のはん点として輪状に並び，皮層部にはところどころに維管束が赤褐色のはん点として，また分泌細胞が黄褐色の微小なはん点として多数存在する。中心柱には多数の維管束が点又は線として散在する。わずかに特異なにおい及び味がある。

（９）　ジコッピ　厚さ 1～6mm の管状又は半管状の皮片である。外側は淡褐色～淡黄褐色で，周皮はりん片状にはがれやすい。内側は灰褐色を呈し，縦に条線がある。質はもろく，折面は灰白色を呈し，繊維性でない。特異な弱いにおいがあり，味は初めわずかに甘い。

横切片を鏡検するとき，周皮のコルク層は数層の薄膜のコルク細胞からなる。皮部にはシュウ酸カルシウムの砂晶を含む柔細胞が散在し，少数の繊維を認めることがある。柔細胞に含まれるでんぷん粒は径 1～10μmである。石細胞は認めることがあっても，極めてまれである。

必要に応じて，「ジコッピ」の確認試験を準用する。

（10）　バクモンドウ　外面は淡黄色～淡黄褐色で，大小の縦じわがある。折るとき皮層は柔軟であるがもろく，中心柱は強じんである。皮層の折面は淡黄褐色を呈し，やや半透明で粘着性がある。味はわずかに甘く，粘着性である。

（11）　バイモ　偏球形を呈し，肥厚した 2 個のりん片葉からなり，径 2～3cm，高さ 1～2cm，しばしば分離したものがある。外面及び内面は白色～淡黄褐色，内面の基部はやや暗色を呈する。石灰を散布して乾燥したものは白粉を付けている。折面は白色を呈し，粉性である。特異な弱いにおいがあり，味は苦い。

横切片を鏡検するとき，最外層は 1 層の表皮からなりその内側は柔組織で満たされ，多数の維管束が散在する。柔組織中にはでんぷん粒を含む。でんぷん粒は主に単粒で，径 5～50μm，層紋が明瞭で，長卵形～卵形又は三角状卵形，まれに 2～3 個からなる複粒もある。また，表皮細胞及び道管付近の柔細胞にはシュウ酸カルシウムの単晶を含む。

必要に応じて，「バイモ」の確認試験を準用する。

（12）　ハッカ　上面は淡褐黄色～淡緑黄色，下面は淡緑色～淡緑黄色である。葉をルーペ視するとき，両面に毛，腺毛及び腺りんをまばらに認め，腺毛及び腺りんは下面に多い。特異な芳香があり，口に含むと清涼感がある。

必要に応じて，「ハッカ」の確認試験を準用する。

（13）　カンゾウ　外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現わす。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に 1～3 細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には 3～10 細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞中にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

乾燥減量　13%以下。

灰　　分　6%以下。

【 284 】　K87

成分及び分量又は本質	日本薬局方	シコン	120g
	〃	トウキ	60g
	〃	ゴマ油	1000g
	〃	ミツロウ	340g
	〃	豚脂	20g（ない場合も可）
		全　　量	1540g（1520g※） ※豚脂がない場合
製造方法	ゴマ油を煮て，ミツロウ及び豚脂を入れて溶かし，次いでトウキを入れる。トウキの色が焦げるのを度として火力を増し，シコンを入れて 2～3 沸させ，鮮明な紫赤色になったら速やかに火よりおろし，布でこして冷却して軟膏とする。		
用法及び用量	適量を皮膚に塗布する。		
効能又は効果	ひび，あかぎれ，しもやけ，魚の目，あせも，ただれ，外傷，火傷，痔核による疼痛，肛門裂傷，湿疹・皮膚炎		
貯蔵方法及び有効期間	気密容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	紫雲膏		

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は紫赤色で，特異なにおいがある。

確認試験　本品 0.1g にジエチルエーテル 10mL を加えて溶かし，これに水酸化ナトリウム試液 1mL を加え，よく振り混ぜる。しばらく静置するとき，水層は，青色を呈する（シコン）。

【 285 】　K88

成分及び分量 又 は 本 質	日本薬局方　サイコ　2.0g 〃　シャクヤク　2.0g 〃　キジツ　2.0g 〃　カンゾウ　1.0g 全　量　7.0g
製 造 方 法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，熱いうちに煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。 本剤は必ず1日分ずつ煎じ，数日分をまとめて煎じないこと。
効能又は効果	体力中等度以上で，胸腹部に重苦しさがあり，ときに不安，不眠などがあるものの次の諸症：胃炎，胃痛，腹痛，神経症
貯蔵方法及び 有 効 期 間	密閉容器
規格及び試験方法	別記のとおり。
備　　考	四逆散料

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品1包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　サイコ　外面は淡褐色～褐色で，深いしわがあるものがあり，横断面では，皮部は褐色，木部は淡褐色を呈する。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，皮部にはしばしば接線方向に長い裂け目があり，皮部の厚さは半径の1/3～1/2で，径15～35μmの胞間性離生油道がやや多数散在し，木部には道管が放射状若しくはほぼ階段状に配列し，ところどころに繊維群があり，根頭部の髄には皮部と同様の油道がある。柔細胞中にはでんぷん粒を満たし，また油滴を認める。

必要に応じて，「サイコ」の確認試験を準用する。

（２）　シャクヤク　外面は褐色～淡灰褐色を呈し，横断面はち密で淡灰褐色を呈し，木部には淡褐色の放射状の線がある。わずかに特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後に渋くてわずかに苦い。

必要に応じて，「シャクヤク」の確認試験を準用する。

（３）　キジツ　外面は濃緑褐色～褐色で，つやがなく，油室による多数のくぼんだ小点がある。切断面は淡灰褐色を呈し，内果皮を付ける部分は褐色を呈する。特異なにおいがあり，味は苦い。

必要に応じて，「キジツ」の確認試験を準用する。

（４）　カンゾウ　外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現わす。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に 1～3 細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には 3～10 細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞中にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

乾燥減量　10%以下。

灰　　分　5%以下。

【 286 】　K88—①

成分及び分量 又は本質	日本薬局方　サイコ　1.8g 〃　シャクヤク　1.8g 〃　キジツ　1.8g 〃　カンゾウ　0.9g 全　量　6.3g
製造方法	以上の生薬をそれぞれ末とし，散剤の製法により製する。ただし，分包散剤とする。
用法及び用量	1回量を次のとおりとし，1日3回，食前又は空腹時に服用する。 大人（15才以上）1包2.0g，15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4を服用する。
効能又は効果	体力中等度以上で，胸腹部に重苦しさがあり，ときに不安，不眠などがあるものの次の諸症：胃炎，胃痛，腹痛，神経症
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器
規格及び試験方法	別記のとおり。
備考	四逆散

規格及び試験方法

性　状　本品は淡褐色の粉末で，特異なにおいがある。

確認試験

（1）　サイコ　本品の粉末2gにメタノール10mLを加え，還流冷却器を付け，水浴上で10分間加熱し，冷後，ろ過し，ろ液を試料溶液とする。

別に「サイコ」の粉末1gをとり，試料溶液と同様に操作して対照溶液とする。

これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び対照溶液10μLずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲルを用いて調製した薄層板にスポットする。次にクロロホルム・メタノール・水混液（30：10：1）を展開溶媒として約10cm展開した後，薄層板を風乾する。

これにエタノール（95）・硫酸（1：1）試液を均等に噴霧し，50℃で5分間加熱するとき，*Rf*値約0.42付近に紫色のスポットを認める。

（2）　シャクヤク　本品の粉末2gにメタノール10mLを加え，還流冷却器を付け，水浴上で10分間加熱し，冷後，ろ過し，ろ液を試料溶液とする。

別に「シャクヤク」の粉末 1g をとり，試料溶液と同様に操作して対照溶液とする。

これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び対照溶液 10μL ずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲルを用いて調製した薄層板にスポットする。次にトルエン・ギ酸・ギ酸エチル混液（3：1：6）を展開溶媒として約 10cm 展開した後，薄層板を風乾する。

これに塩化鉄（Ⅲ）試液を均等に噴霧するとき，*Rf* 値約 0.48 付近に暗紫色のスポットを認める。

（3） キジツ 本品の粉末 2g にメタノール 10mL を加え，還流冷却器を付け，水浴上で 10 分間加熱し，冷後，ろ過し，ろ液を試料溶液とする。

別に「キジツ」の粉末 1g をとり，試料溶液と同様に操作して対照溶液とする。

これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び対照溶液 10μL ずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲルを用いて調製した薄層板にスポットする。次にクロロホルム・アセトン混液（6：1）を展開溶媒として約 10cm 展開した後，薄層板を風乾する。

これに硫酸試液を均等に噴霧し，105℃で 30 分間加熱するとき，*Rf* 値約 0.48 付近に黄色のスポットを認める。

（4） カンゾウ 本品の粉末 2g にメタノール・水混液（7：3）10mL を加え，還流冷却器を付け，水浴上で 10 分間加熱し，冷後，ろ過し，ろ液を試料溶液とする。別に「カンゾウ」の粉末 1g をとり，試料溶液と同様に操作して対照溶液とする。

これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び対照溶液 10μL ずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲルを用いて調製した薄層板にスポットする。次にベンゼン・酢酸エチル混液（3：7）を展開溶媒として約 10cm 展開した後，薄層板を風乾する。

これに 4 - メトキシベンズアルデヒド・硫酸試液を均等に噴霧し，105℃で 30 分間加熱するとき，*Rf* 値約 0.51 付近に橙色のスポットを認める。

乾燥減量 10%以下。

灰　　分 5%以下。

【 287 】　K89

成分及び分量 又 は 本 質	日本薬局方　ニンジン　4.0g 〃　ビャクジュツ　4.0g 〃　ブクリョウ　4.0g 〃　カンゾウ　1.0g 〃　ショウキョウ　0.3g 〃　タイソウ　1.0g 全　量　14.3g
製 造 方 法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。
効能又は効果	体力虚弱で，痩せて顔色が悪くて，食欲がなく，疲れやすいものの次の諸症：胃腸虚弱，慢性胃炎，胃のもたれ，嘔吐，下痢，夜尿症
貯蔵方法及び 有 効 期 間	密閉容器
規格及び試験方法	別記のとおり。
備　　考	四君子湯

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品1包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　ニンジン　外面は淡黄褐色～淡灰褐色を呈し，縦じわがあり，横断面は淡黄褐色を呈し，形成層の付近は褐色を呈する。特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後にやや苦い。

必要に応じて，「ニンジン」の確認試験を準用する。

（2）　ビャクジュツ　外面は淡灰黄色～淡黄白色で，ところどころ灰褐色を呈し，横切面には淡黄褐色～褐色の分泌物による細点がある。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，皮部の柔組織中にはしばしば師管の外側に接して繊維束があり，放射組織の末端部には淡褐色～褐色の内容物を含む油室がある。木部には大きい髄を

囲んで放射状に配列した短径の道管とそれを囲む著しい繊維束がある。髄及び放射組織中には皮部と同様な油室があり，柔組織中にはイヌリンの小球晶及びシュウ酸カルシウムの針晶を含む。

必要に応じて，「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。

（3）　ブクリョウ　白色又はわずかに淡赤色を帯びた白色で，質は堅いが砕きやすい。味はないがやや粘液ようである。

必要に応じて，「ブクリョウ」の確認試験を準用する。

（4）　カンゾウ　外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現わす。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に 1～3 細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には 3～10 細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞中にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

（5）　ショウキョウ　淡灰黄色の周皮を付けたままか，又はその一部をはぎとってあり，表面は灰白色～淡灰褐色で，しばしば白粉を付けている。横断面は繊維性，粉性で，淡帯黄褐色を呈し，皮層と中心柱とに分かれる。横断面をルーペ視するとき，その全面に維管束及び分泌物が褐色の細点として散在している。特異なにおいがあり，味は極めて辛い。

（6）　タイソウ　外面は赤褐色であらいしわがあるか，又は暗灰赤色で細かいしわがあり，いずれもつやがある。外果皮は薄く革質で，中果皮は暗灰褐色を呈し，海綿ようで柔らかく粘着性があり，内果皮は極めて堅く，種子は偏平である。わずかに特異なにおいがあり，味は甘い。

乾燥減量　15%以下。

灰　　分　5%以下。

【 288 】　K90

成分及び分量 又 は 本 質	日本薬局方　トウキ　3.0g 〃　シャクヤク　3.0g 〃　センキュウ　3.0g 〃　ジオウ　3.0g 〃　オウギ　3.0g 〃　オウバク　2.0g 〃　チョウトウコウ　4.0g 全　量　21.0g
製 造 方 法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1 包として製する。
用法及び用量	本品 1 包に水約 500mL を加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を 3 回に分けて食間に服用する。上記は大人の 1 日量である。 15 才未満 7 才以上　大人の 2/3，7 才未満 4 才以上　大人の 1/2，4 才未満 2 才以上　大人の 1/3，2 才未満　大人の 1/4 以下を服用する。
効能又は効果	体力中等度以下で，顔色が悪くて疲れやすく，胃腸障害のないものの次の諸症：高血圧に伴う随伴症状（のぼせ，肩こり，耳なり，頭重）
貯蔵方法及び 有 効 期 間	密閉容器
規格及び試験方法	別記のとおり。
備　　考	七物降下湯

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品 1 包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　トウキ　外面は暗褐色～赤褐色で，縦じわがあり，切断面は淡黄色～黄褐色を呈する。特異なにおいがあり，味はわずかに甘く，後にやや辛い。

横切片を鏡検するとき，コルク層は 4～10 層からなり，その内側に数層の厚角組織が続いている。皮部には分泌細胞に囲まれた多数の樹脂道並びにしばしば大きなすき間がある。形成層は長方形に偏圧された数層の細胞からなり，明らかに皮部と木部とを区別する。木部では多数の道管と放射組織とが交互に放射状に配列し，その外方の道管は単独又は数個集まってやや密に配列してくさび状をなすが，中心部付近の道管は極めてまばらに存在する。でんぷん粒は径 19μm 以下，まれに 2～5 個の複粒があり，複粒の径は 25μm に達し，しばしばのり化している。

（２）　シャクヤク　外面は褐色～淡灰褐色を呈し，横断面はち密で淡灰褐色を呈し，木部には淡褐色の放射状の線がある。わずかに特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後に渋くてわずかに苦い。

必要に応じて，「シャクヤク」の確認試験を準用する。

（３）　センキュウ　外面は灰褐色～暗褐色で，切断面は灰白色～灰褐色，半透明で，ときにはうつろがある。質は密で堅い。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，皮部及び髄には油道が散在する。木部には厚膜で木化した木部繊維が大小不同の群をなして存在する。でんぷん粒は，通例，のり化していて，まれに径5～25μm のでんぷん粒を認めることがある。シュウ酸カルシウム結晶は認めない。

（４）　ジオウ　外面は黄褐色～黒褐色を呈し，深い縦みぞ及びくびれがある。質は柔らかく粘性である。横断面は黄褐色～黒褐色で，皮部は木部より色が濃く，ほとんど髄を認めない。特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後にやや苦い。

横切片を鏡検するとき，コルク層は 7～15 層で，皮部はすべて柔細胞からなり，外皮部に褐色の分泌物を含む細胞が散在する。木部はほとんど柔細胞で満たされ，放射状に並ぶ道管は側孔のある網紋があり，弱い木化反応を呈する。

（５）　オウギ　外面は淡灰黄色～淡褐黄色で，不規則なあらい縦じわがあり，折面は繊維性である。横断面をルーペ視するとき，最外層には周皮があり，皮部は淡黄白色，木部は淡黄色，形成層付近はやや褐色を帯びる。木部から皮部にわたって白色の放射組織が認められる。太いものではしばしば多数の放射状の裂け目となっている。わずかに特異なにおいがあり，味は甘い。

（６）　オウバク　外面は灰黄褐色～灰褐色で，内面は黄色～暗黄褐色で，細かい縦線がある。横断面は鮮黄色でやや繊維性である。横切面をルーペ視するとき，皮部外層は黄色で薄く，石細胞が黄褐色の点状に分布する。皮部内層は厚く，一次放射組織は外方に向かうにしたがい幅が広がり，それらの一次放射組織の間に，多くの二次放射組織が集まってほぼ三角形の師部を形成し，この組織に褐色を呈する師部繊維束が層積して接線方向に並び，放射組織と交錯して格子状を呈する。味は極めて苦く，粘液性で，だ液を黄色に染める。

必要に応じて，「オウバク」の確認試験を準用する。

（７）　チョウトウコウ　かぎ状のとげ又はとげが対生又は単生する短い茎からなる。とげは長さ 1～4cm で，湾曲して先端はとがり，外面は赤褐色～暗褐色，又は黄褐色を呈し，毛を付けるものもある。横切面は長楕円形～楕円形で，淡褐色を呈する。茎は細長い方柱形～円柱形で，径 2～5mm，外面は赤褐色～暗褐色，又は黄褐色を呈し，横切面は方形で，髄は淡褐色で方形～楕円形を呈するか又は空洞化している。質は堅い。ほとんどにおいがなく，味はほとんどない。

とげの横切面を鏡検するとき，表皮のクチクラは平滑又は歯牙上の細かい凹凸があり，師部に外接する繊維はほぼ環状に配列し，皮部の柔細胞中にはシュウ酸カルシウムの砂晶を認める。

必要に応じて，「チョウトウコウ」の確認試験を準用する。

乾燥減量　10%以下。

灰　　分　5%以下。

【 289 】　K91

成分及び分量 又 は 本 質	日本薬局方	チョウジ	1.5g
	〃	ショウキョウ	1.0g
	局外生規	シテイ	5.0g
		全　　量	7.5g
製 造 方 法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。		
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。		
効能又は効果	しゃっくり		
貯蔵方法及び 有 効 期 間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備　　考	柿蒂湯		

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品1包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　チョウジ　暗褐色～暗赤色のつぼみで，長さ1～1.8cm，やや偏平な四りょう柱状の花床と，その上端には厚いがく片4枚及び4枚の膜質花べんとがあり，花べんは重なり合いほぼ球形を呈する。花べんに包まれた内部には多数の雄しべと1本の花柱とがある。強い特異なにおいがあり，味はやくようで，後わずかに舌を麻ひする。

必要に応じて，「チョウジ」の確認試験を準用する。

（2）　ショウキョウ　淡灰黄色の周皮を付けたままか，又はその一部をはぎとってあり，表面は灰白色～淡灰褐色で，しばしば白粉を付けている。横断面は繊維性，粉性で，淡帯黄褐色を呈し，皮層と中心柱とに分かれる。横断面をルーペ視するとき，その全面に維管束及び分泌物が褐色の細点として散在している。特異なにおいがあり，味は極めて辛い。

（3）　シテイ　4裂した合片がくで，皿状を呈し，径1.5～2.5cmである。裂片は広卵形～三角状広卵形，合片部はほぼ四角形を呈し，やや厚い。外面は灰褐色～褐色を呈し，通例，4本の隆起線があり，しばしば果柄の残基を付けている。内面の合片部には褐色の短毛を密生し，中央部には果実の分離した跡がある。味はわずかに渋い。

必要に応じて，局外生規「シテイ」の確認試験を準用する。

乾燥減量　15%以下。

灰　　分　6%以下。

【 290 】　K92

成分及び分量 又は本質	日本薬局方　トウキ　3.0g 〃　シャクヤク　3.0g 〃　センキュウ　3.0g 〃　ジオウ　3.0g 全　量　12.0g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。
効能又は効果	体力虚弱で，冷え症で皮膚が乾燥，色つやの悪い体質で胃腸障害のないものの次の諸症：月経不順，月経異常，更年期障害，血の道症，冷え症，しもやけ，しみ，貧血，産後あるいは流産後の疲労回復
貯蔵方法及び 有効期間	密閉容器
規格及び試験方法	別記のとおり。
備考	四物湯

規格及び試験方法

性　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品1包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　トウキ　外面は暗褐色～赤褐色で，縦じわがあり，切断面は淡黄色～黄褐色を呈する。特異なにおいがあり，味はわずかに甘く，後にやや辛い。

横切片を鏡検するとき，コルク層は4～10層からなり，その内側に数層の厚角組織が続いている。皮部には分泌細胞に囲まれた多数の樹脂道並びにしばしば大きなすき間がある。形成層は長方形に偏圧された数層の細胞からなり，明らかに皮部と木部とを区別する。木部では多数の道管と放射組織とが交互に放射状に配列し，その外方の道管は単独又は数個集まってやや密に配列してくさび状をなすが，中心部付近の道管は極めてまばらに存在する。でんぷん粒は径19μm以下，まれに2～5個の複粒があり，複粒の径は25μmに達し，しばしばのり化している。

（2）　シャクヤク　外面は褐色～淡灰褐色を呈し，横断面はち密で淡灰褐色を呈し，木部には淡褐色の放射状の線がある。わずかに特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後に渋くてわずかに苦い。

必要に応じて，「シャクヤク」の確認試験を準用する。

（３）　センキュウ　外面は灰褐色～暗褐色で，切断面は灰白色～灰褐色，半透明で，ときにはうつろがある。質は密で堅い。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，皮部及び髄には油道が散在する。木部には厚膜で木化した木部繊維が大小不同の群をなして存在する。でんぷん粒は，通例，のり化していて，まれに径5～25μmのでんぷん粒を認めることがある。シュウ酸カルシウム結晶は認めない。

（４）　ジオウ　外面は黄褐色～黒褐色を呈し，深い縦みぞ及びくびれがある。質は柔らかく粘性である。横断面は黄褐色～黒褐色で，皮部は木部より色が濃く，ほとんど髄を認めない。特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後にやや苦い。

横切片を鏡検するとき，コルク層は7～15層で，皮部はすべて柔細胞からなり，外皮部に褐色の分泌物を含む細胞が散在する。木部はほとんど柔細胞で満たされ，放射状に並ぶ道管は側孔のある網紋があり，弱い木化反応を呈する。

乾燥減量　10%以下。

灰　　分　10%以下。

【 291 】　K93

成分及び分量又は本質	日本薬局方	カンゾウ	3.0～4.0g
	〃	ショウキョウ	1.0g
	〃	ケイヒ	3.0g
	〃	タイソウ	5.0g
	〃	ニンジン	2.0g
	〃	ジオウ	4.0g
	〃	バクモンドウ	6.0g
	〃	マシニン	3.0g
		全　　量	27.0～28.0g
	局外生規	アキョウ	2.0g
製造方法	アキョウを除く以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製し，これにアキョウ 2.0g を添付する。		
用法及び用量	本品 1 包に，水約 500mL を加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，添付のアキョウを煎液に入れ，再び 5 分ほど熱して溶かし，煎液を 3 回に分けて食間に服用する。上記は大人の 1 日量である。 15 才未満 7 才以上　大人の 2/3，7 才未満 4 才以上　大人の 1/2，4 才未満 2 才以上　大人の 1/3，2 才未満　大人の 1/4 以下を服用する。		
効能又は効果	体力中等度以下で，疲れやすく，ときに手足のほてりなどがあるものの次の諸症：動悸，息切れ，脈のみだれ		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器，ただし，アキョウは気密容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	炙甘草湯		

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品 1 包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　カンゾウ　外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現わす。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に 1～3 細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には 3～10 細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞中にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

（２）　ショウキョウ　淡灰黄色の周皮を付けたままか，又はその一部をはぎとってあり，表面は灰白色～淡灰褐色で，しばしば白粉を付けている。横断面は繊維性，粉性で，淡帯黄褐色を呈し，皮層と中心柱とに分かれる。横断面をルーペ視するとき，その全面に維管束及び分泌物が褐色の細点として散在している。特異なにおいがあり，味は極めて辛い。

（３）　ケイヒ　外面は暗赤褐色を呈し，内面は赤褐色を呈し，平滑である。横断面はやや繊維性で赤褐色を呈し淡褐色の薄層が見られる。特異な芳香があり，味は甘く，辛く，後にやや粘液性で，わずかに収れん性である。

横切片を鏡検するとき，一次皮部と二次皮部はほとんど連続した石細胞環で区分され，環の外辺にはほぼ円形に結集した繊維束を伴い，環の各石細胞の膜はしばしば U 字形に肥厚する。二次皮部中には石細胞を認めず，まばらに少数の厚膜繊維を認める。柔組織中には油細胞，粘液細胞及びでんぷん粒を含む。放射組織中には微細なシュウ酸カルシウムの針晶を含む細胞がある。

（４）　タイソウ　外面は赤褐色であらいしわがあるか，又は暗灰赤色で細かいしわがあり，いずれもつやがある。外果皮は薄く革質で，中果皮は暗灰褐色を呈し，海綿ようで柔らかく粘着性があり，内果皮は極めて堅く，種子は偏平である。わずかに特異なにおいがあり，味は甘い。

（５）　ニンジン　外面は淡黄褐色～淡灰褐色を呈し，縦じわがあり，横断面は淡黄褐色を呈し，形成層の付近は褐色を呈する。特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後にやや苦い。

必要に応じて，「ニンジン」の確認試験を準用する。

（６）　ジオウ　外面は黄褐色～黒褐色を呈し，深い縦みぞ及びくびれがある。質は柔らかく粘性である。横断面は黄褐色～黒褐色で，皮部は木部より色が濃く，ほとんど髄を認めない。特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後にやや苦い。

横切片を鏡検するとき，コルク層は 7～15 層で，皮部はすべて柔細胞からなり，外皮部に褐色の分泌物を含む細胞が散在する。木部はほとんど柔細胞で満たされ，放射状に並ぶ道管は側孔のある網紋があり，弱い木化反応を呈する。

（７）　バクモンドウ　紡錘形を呈し，長さ 10～25mm，径 3～5mm，一端はややとがり，他端はやや丸みをもち，外面は淡黄色～淡黄褐色で，大小の縦じわがある。皮層は柔軟性でもろく，中心柱は強じんで折りにくい。皮層の折面は淡黄褐色を呈し，やや半透明で粘着性がある。味はわずかに甘く，粘着性である。

（８）　マシニン　わずかに偏平な卵球形を呈し，長さ 4～5mm，径 3～4mm，外面は灰緑色～灰褐色を呈する。一端はややとがり，他の一端には果柄の跡があり，両側には稜線がある。外面はつやがあり，白色の網脈模様がある。果皮はやや堅い。種子はやや緑色を帯び，内部には灰白色の胚乳がある。100 粒の質量は 1.6～2.7 g である。ほとんどにおいはないが，かめば香ばしく，味は緩和で油様である。

横切片を鏡検するとき，外果皮は１層の表皮からなり，中果皮は柔組織，色素細胞層，及び短小細胞列からなり，内果皮は１層の放射方向に長い石細胞層からなる。種皮は管状細胞層と海綿状組織からなる。種子の内側には１層の柔細胞からなる周乳と１層～数層の柔細胞からなる内乳がある。胚の大部分は柔組織からなり胚軸の中央及び子葉の各部に維管束が認められる。胚の柔組織にはアリューロン粒及び油滴を含む。

必要に応じて，「マシニン」の確認試験を準用する。

乾燥減量　10%以下。

灰　　分　5%以下。

【 292 】　K94

成分及び分量 又は本質	日本薬局方　シャクヤク　4.0g 〃　カンゾウ　3.0～4.0g 全　量　7.0～8.0g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。
効能又は効果	体力に関わらず使用でき，筋肉の急激なけいれんを伴う痛みのあるものの次の諸症：こむらがえり，筋肉のけいれん，腹痛，腰痛
貯蔵方法及び 有効期間	密閉容器
規格及び試験方法	別記のとおり。
備考	芍薬甘草湯

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品はカンゾウのにおいがある。

確認試験　本品1包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　シャクヤク　外面は褐色～淡灰褐色を呈し，横断面はち密で淡灰褐色を呈し，木部には淡褐色の放射状の線がある。わずかに特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後に渋くてわずかに苦い。

必要に応じて，「シャクヤク」の確認試験を準用する。

（2）　カンゾウ　外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現わす。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に1～3細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には3～10細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞中にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

乾燥減量　10%以下。

灰　　分　5%以下。

【 293 】　K95

成分及び分量 又は本質	日本薬局方	マクリ	5.0g
	〃	ダイオウ	1.0～1.5g
	〃	カンゾウ	1.0～1.5g
		全　量	7.0～8.0g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。		
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。		
効能又は効果	回虫の駆除		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	鷓鴣菜湯		

規格及び試験方法

性　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品1包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　マクリ　外面は暗赤紫色，暗灰赤色～灰褐色，径2～3mmの丸いひも状を呈し，短い毛のような小枝でおおわれ，不規則な二また状に数回分枝する。しばしば石灰そう類や小形の海そう類を付けている。海そう臭があり，味はわずかに塩辛く不快である。

必要に応じて，「マクリ」の確認試験を準用する。

（2）　ダイオウ　暗褐色～黄褐色～淡褐色を呈し，ルーペ視すると入り組んだ不規則な模様がある。質はおおむね粗で繊維性ではない。特異なにおいがあり，味はわずかに渋くて苦い。かめば細かい砂をかむような感じがあり，だ液を黄色に染める。

必要に応じて，「ダイオウ」の確認試験を準用する。

（3）　カンゾウ　外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現わす。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に1～3細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には3～10細胞列

の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞中にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

乾燥減量　10%以下。

灰　　分　44%以下。

【 294 】　K96

成分及び分量又は本質	日本薬局方　ニンジン　3.0g 〃　オウギ　3.0g 〃　ビャクジュツ　3.0g 〃　ブクリョウ　3.0g 〃　トウキ　3.0g 〃　シャクヤク　3.0g 〃　ジオウ　3.0g 〃　センキュウ　3.0g 〃　ケイヒ　3.0g 〃　カンゾウ　1.0～1.5g 全　量　28.0～28.5g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。
効能又は効果	体力虚弱なものの次の諸症：病後・術後の体力低下，疲労倦怠，食欲不振，ねあせ，手足の冷え，貧血
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器
規格及び試験方法	別記のとおり。
備考	十全大補湯

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品1包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　ニンジン　外面は淡黄褐色～淡灰褐色を呈し，縦じわがあり，横断面は淡黄褐色を呈し，形成層の付近は褐色を呈する。特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後にやや苦い。

必要に応じて，「ニンジン」の確認試験を準用する。

（２）　オウギ　外面は淡灰黄色～淡褐黄色で，不規則なあらい縦じわがあり，折面は繊維性である。横断面はルーペ視するとき，最外層には周皮があり，皮部は淡黄白色，木部は淡黄色，形成層付近はやや褐色を帯びる。木部から皮部にわたって白色の放射組織が認められる。太いものではしばしば多数の放射状の裂け目となっている。わずかに特異なにおいがあり，味は甘い。

（３）　ビャクジュツ　外面は淡灰黄色～淡黄白色で，ところどころ灰褐色を呈し，横切面には淡黄褐色～褐色の分泌物による細点がある。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，皮部の柔組織中にはしばしば師管の外側に接して繊維束があり，放射組織の末端部には淡褐色～褐色の内容物を含む油室がある。木部には大きい髄を囲んで放射状に配列した短径の道管とそれを囲む著しい繊維束がある。髄及び放射組織中には皮部と同様な油室があり，柔組織中にはイヌリンの小球晶及びシュウ酸カルシウムの針晶を含む。

必要に応じて，「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。

（４）　ブクリョウ　白色又はわずかに淡赤色を帯びた白色で，質は堅いが砕きやすい。味はないがやや粘液ようである。

必要に応じて，「ブクリョウ」の確認試験を準用する。

（５）　トウキ　外面は暗褐色～赤褐色で，縦じわがあり，切断面は淡黄色～黄褐色を呈する。特異なにおいがあり，味はわずかに甘く，後にやや辛い。

横切片を鏡検するとき，コルク層は 4～10 層からなり，その内側に数層の厚角組織が続いている。皮部には分泌細胞に囲まれた多数の樹脂道並びにしばしば大きなすき間がある。形成層は長方形に偏圧された数層の細胞からなり，明らかに皮部と木部とを区別する。木部では多数の道管と放射組織とが交互に放射状に配列し，その外方の道管は単独又は数個集まってやや密に配列してくさび状をなすが，中心部付近の道管は極めてまばらに存在する。でんぷん粒は径 19μm 以下，まれに 2～5 個の複粒があり，複粒の径は 25μm に達し，しばしばのり化している。

（６）　シャクヤク　外面は褐色～淡灰褐色を呈し，横断面はち密で淡灰褐色を呈し，木部には淡褐色の放射状の線がある。わずかに特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後に渋くてわずかに苦い。

必要に応じて，「シャクヤク」の確認試験を準用する。

（７）　ジオウ　外面は黄褐色～黒褐色を呈し，深い縦みぞ及びくびれがある。質は柔らかく粘性である。横断面は黄褐色～黒褐色で，皮部は木部より色が濃く，ほとんど髄を認めない。特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後にやや苦い。

横切片を鏡検するとき，コルク層は 7～15 層で，皮部はすべて柔細胞からなり，外皮部に褐色の分泌物を含む細胞が散在する。木部はほとんど柔細胞で満たされ，放射状に並ぶ道管は側孔のある網紋があり，弱い木化反応を呈する。

（８）　センキュウ　外面は灰褐色～暗褐色で，切断面は灰白色～灰褐色，半透明で，ときにはうつろがある。質は密で堅い。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，皮部及び髄には油道が散在する。木部には厚膜で木化した木部繊維が大小不同の群をなして存在する。でんぷん粒は，通例，のり化していて，まれに径 5～25μm のでんぷん粒を認めることがある。シュウ酸カルシウム結晶は認めない。

（９）　ケイヒ　外面は暗赤褐色を呈し，内面は赤褐色を呈し，平滑である。横断面は赤褐色を呈し淡褐色の薄層が見られる。特異なにおいがあり，味は甘く，辛く，後にやや粘液性で，わずかに収れん性である。

横切片を鏡検するとき，一次皮部と二次皮部はほとんど連続した石細胞環で区分され，環の外辺にはほぼ円形に結集した繊維束を伴い，環の各石細胞の膜はしばしばU字形に肥厚する。二次皮部中には石細胞を認めず，まばらに少数の厚膜繊維を認める。柔組織中には油細胞，粘液細胞及び微細なシュウ酸カルシウムの針晶を含む細胞があり，柔細胞中にはでんぷん粒を含む。

（10）　カンゾウ　外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現わす。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に1～3細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には3～10細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞中にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

乾燥減量　15%以下。

灰　　分　5%以下。

【 295 】　K97

成分及び分量又は本質	日本薬局方	サイコ	3.0g
	〃	オウヒ	3.0g
	〃	キキョウ	3.0g
	〃	センキュウ	3.0g
	〃	ブクリョウ	3.0g
	〃	ドクカツ	2.0g
	〃	ボウフウ	3.0g
	〃	カンゾウ	1.0～2.0g
	〃	ショウキョウ	1.0g
	〃	ケイガイ	2.0g
		全　量	24.0～25.0g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。		
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。		
効能又は効果	体力中等度なものの皮膚疾患で，発赤があり，ときに化膿するものの次の諸症：化膿性皮膚疾患・急性皮膚疾患の初期，じんましん，湿疹・皮膚炎，水虫		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	十味敗毒湯		

規格及び試験方法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品1包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　サイコ　外面は灰褐色～褐色で，深いしわがあるものがあり，横断面では，皮部は褐色，木部は淡褐色を呈する。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，皮部にはしばしば接線方向に長い裂け目があり，皮部の厚さは半径の1/3～1/2で，径15～35μmの胞間性離生油道がやや多数散在し，木部には道管が放

射状若しくはほぼ階段状に配列し，ところどころに繊維群があり，根頭部の髄には皮部と同様の油道がある。柔細胞中にはでんぷん粒を満たし，また油滴を認める。

必要に応じて，「サイコ」の確認試験を準用する。

（２）　オウヒ　板状又は半管状の皮片で，厚さ 3～6mm，外面は淡褐色～褐色を呈し，内面は平滑で，灰褐色～褐色を呈する。周皮は脱落していることがある。周皮を付けているものは，外面は粗雑で皮目を認める。内面には多数の細かい縦線がある。横切面は灰褐色～褐色を呈し，繊維性である。わずかに特異なにおいがあり，味はわずかに苦く，収れん性である。

横切片を鏡検するとき周皮を付けているものは，コルク層にシュウ酸カルシウムの単晶及び集晶を認める。皮部には多数の石細胞及び異形細胞が不規則に並び，シュウ酸カルシウムの単晶及び集晶を含む柔細胞が点在する。放射組織間では師部繊維群がそれ以外の師部組織と交互に並ぶ。

必要に応じて，「オウヒ」の確認試験を準用する。

（３）　キキョウ　外面は皮付きは灰褐色，皮去りは白色～淡褐色を呈し，繊維性でない。横切面をルーペ視するとき，皮部は木部よりやや薄く，ほとんど白色で，ところどころにすき間があり，形成層の付近はしばしば褐色を帯びる。木部は白色～淡褐色を呈し，その組織は皮部よりもやや密である。味は初めなく，後にえぐくて苦い。

必要に応じて，「キキョウ」の確認試験を準用する。

（４）　センキュウ　外面は灰褐色～暗褐色で，切断面は灰白色～灰褐色，半透明で，ときにはうつろがある。質は密で堅い。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，皮部及び髄には油道が散在する。木部には厚膜で木化した木部繊維が大小不同の群をなして存在する。でんぷん粒は，通例，のり化していて，まれに径 5～25μm のでんぷん粒を認めることがある。シュウ酸カルシウム結晶は認めない。

（５）　ブクリョウ　白色又はわずかに淡赤色を帯びた白色で，質は堅いが砕きやすい。味はないがやや粘液ようである。

必要に応じて，「ブクリョウ」の確認試験を準用する。

（６）　ドクカツ　湾曲した不整円柱状～塊状を呈する根茎で，ときに短い根を付けることがある。長さ 4～12cm，径 2.5～7cm，しばしば縦割又は横切されている。上部には茎の跡による大きなくぼみが 1～数個あるか，又は径 1.5～2.5cm の茎の短い残基を 1 個付けるものがある。外面は暗褐色～黄褐色を呈し，縦じわがあり，根の基部又はその跡がある。横切面は灰黄褐色～黄褐色を呈し，油道による褐色の細点が散在し，多くの裂け目がある。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，最外層はコルク層で，コルク石細胞からなる層がある。これに続き数層の厚角組織が認められる。維管束と放射組織は明瞭で，髄は広い。師部の外側に師部繊維群が認められることがある。皮部及び髄に離生細胞間隙からなる油道が認められる。木部は道管，木部繊維及び厚壁化することがある木部柔組織からなる。髄中には維管束が散在する。また，柔細胞にはシュウ酸カルシウムの集晶が認められる。でんぷん粒は，単粒又は 2～6 個の複粒である。

必要に応じて，「ドクカツ」の確認試験を準用する。

（７）　ボウフウ　外面は淡褐色で，多数の縦じわがある。横断面の周辺は灰褐色で，空げきが多く，中央は円形に黄色を呈する。味はわずかに甘い。

（８）　カンゾウ　外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現わす。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に 1～3 細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には 3～10 細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞中にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

（９）　ショウキョウ　淡灰黄色の周皮を付けたままか，又はその一部をはぎとってあり，表面は灰白色～淡灰褐色で，しばしば白粉を付けている。横断面は繊維性，粉性で，淡帯黄褐色を呈し，皮層と中心柱とに分かれる。横断面をルーペ視するとき，その全面に維管束及び分泌物が褐色の細点として散在している。特異なにおいがあり，味は極めて辛い。

（10）　ケイガイ　茎，輪散花序に集合したがく筒，これら及びときには葉の砕片，種子ようの微粒の分果からなる。茎は方形で外面はおおむね紫褐色，径約 1mm である。がく筒は淡褐色～黄緑色で長さ 2～3mm，ルーペ視するとき，先端はきょ歯辺，筒部には数条の線があり，唇形花又は果実を含み，茎とともに類白色の短毛を認める。分果は黄褐色～黒色，両端の細いだ円体で長さ 1～1.5mm，径は長さのほぼ 1/2 である。特異な芳香があり，口に含むとわずかに清涼感がある。

必要に応じて，「ケイガイ」の確認試験を準用する。

乾燥減量　15％以下。

灰　　分　5％以下。

【 296 】　K98

成分及び分量又は本質	日本薬局方　トウキ　3.0g 〃　ジオウ　6.0g 〃　トウニン　2.0g 〃　キョウニン　2.0g 〃　キジツ　2.0g 〃　オウゴン　2.0g 〃　コウボク　2.0g 〃　ダイオウ　1.0～2.0g 〃　カンゾウ　1.0～1.5g 〃　マシニン　2.0g 全　量　23.0～24.5g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。
効能又は効果	体力中等度又はやや虚弱で，ときに皮膚乾燥などがあるものの次の症状：便秘
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器
規格及び試験方法	別記のとおり。
備考	潤腸湯

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品1包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　トウキ　外面は暗褐色～赤褐色で，縦じわがあり，切断面は淡黄色～黄褐色を呈する。特異なにおいがあり，味はわずかに甘く，後にやや辛い。

横切片を鏡検するとき，コルク層は4～10層からなり，その内側に数層の厚角組織が続いている。皮部には分泌細胞に囲まれた多数の樹脂道並びにしばしば大きなすき間がある。形成層は長方形に偏圧された数層の細胞からなり，明らかに皮部と木部とを区別す

る。木部では多数の道管と放射組織とが交互に放射状に配列し，外方の道管は単独又は数個集まってやや密に配列してくさび状をなすが，中心部付近の道管は極めてまばらに存在する。でんぷん粒は径 19μm 以下，まれに 2～5 個の複粒があり，複粒の径は 25μm に達し，しばしばのり化している。

（２）　ジオウ　外面は黄褐色～黒褐色を呈し，深い縦みぞ及びくびれがある。質は柔らかく粘性である。横断面は黄褐色～黒褐色で，皮部は木部より色が濃く，ほとんど髄を認めない。特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後にやや苦い。

横切片を鏡検するとき，コルク層は 7～15 層で，皮部はすべて柔細胞からなり，外皮部に褐色の分泌物を含む細胞が散在する。木部はほとんど柔細胞で満たされ，放射状に並ぶ道管は側孔のある網紋があり，弱い木化反応を呈する。

（３）　トウニン　種皮は薄く，外面は赤褐色を帯び，表面にはすれて落ちやすい石細胞となった表皮細胞があって，粉をふいたようである。切断面は類白色である。味はわずかに苦く，油ようである。

表皮の表面を鏡検するとき，数個ずつ集合する石細胞はおおむね円形で，その細胞膜は均等に厚く，側面視では方形又は長方形を呈する。

必要に応じて，「トウニン」の確認試験を準用する。

（４）　キョウニン　種皮は褐色で，表面にはすれて落ちやすい石細胞となった表皮細胞があって，粉をふいたようである。切断面は類白色である。味は苦く，油ようである。

表皮の表面を鏡検するとき，数個ずつ集合する石細胞はおおむね円形で，その細胞膜は均等に著しく厚くなり，径 60～90μm，側面視では鈍三角形で，細胞膜は先端部で著しく厚い。

必要に応じて，「キョウニン」の確認試験を準用する。

（５）　キジツ　外面は濃緑褐色～褐色で，つやがなく，油室による多数のくぼんだ細点がある。切断面は淡灰褐色を呈し，内果皮を付ける部分は褐色を呈する。特異なにおいがあり，味は苦い。

必要に応じて，「キジツ」の確認試験を準用する。

（６）　オウゴン　外面は黄褐色～暗褐色を呈し，切断面は黄色～帯褐黄色を呈し，縦に繊維性のすじが見られる。味はわずかに苦い。

必要に応じて，「オウゴン」の確認試験を準用する。

（７）　コウボク　外面は灰白色～灰褐色を呈し，内面は淡褐色～褐色，切断面は淡赤褐色を呈し，繊維性である。わずかに芳香があり，味は苦い。

横切片を鏡検するとき，コルク層は厚く，ほぼ等径性の石細胞が環状に内接する。一次皮部は狭く，内しょう部には繊維群が点在し，二次皮部の放射組織間には師部繊維群が階段状に並ぶ。油細胞の多数は一次皮部に，少数は二次皮部に散在し，狭い放射組織内にも認められることがある。

必要に応じて，「コウボク」の確認試験を準用する。

（８）　ダイオウ　暗褐色～黄褐色～淡褐色を呈し，ルーペ視すると入り組んだ不規則な模様がある。質はおおむね粗で繊維性ではない。特異なにおいがあり，味はわずかに渋くて苦い。かめば細かい砂をかむような感じがあり，だ液を黄色に染める。

必要に応じて，「ダイオウ」の確認試験を準用する。

（９）　カンゾウ　外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現わす。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に 1～3 細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には 3～10 細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞中にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

（10）　マシニン　わずかに偏平な卵球形を呈し，長さ 4～5mm，径 3～4mm，外面は灰緑色～灰褐色を呈する。一端はややとがり，他の一端には果柄の跡があり，両側には稜線がある。外面はつやがあり，白色の網脈模様がある。果皮はやや堅い。種子はやや緑色を帯び，内部には灰白色の胚乳がある。100 粒の質量は 1.6～2.7 g である。ほとんどにおいはないが，かめば香ばしく，味は緩和で油様である。

横切片を鏡検するとき，外果皮は 1 層の表皮からなり，中果皮は柔組織，色素細胞層，及び短小細胞列からなり，内果皮は 1 層の放射方向に長い石細胞層からなる。種皮は管状細胞層と海綿状組織からなる。種子の内側には 1 層の柔細胞からなる周乳と 1 層～数層の柔細胞からなる内乳がある。胚の大部分は柔組織からなり胚軸の中央及び子葉の各部に維管束が認められる。胚の柔組織にはアリューロン粒及び油滴を含む。

必要に応じて，「マシニン」の確認試験を準用する。

乾燥減量　10%以下。

灰　　分　6%以下。

【 297 】　K99

成分及び分量 又 は 本 質	日本薬局方　ハンゲ　5.0g 〃　ニンジン　2.5g 〃　オウゴン　2.5g 〃　カンゾウ　2.5g 〃　タイソウ　2.5g 〃　オウレン　1.0g 〃　カンキョウ　1.5g 〃　ショウキョウ　2.0g 全　量　19.5g
製 造 方 法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。
効能又は効果	体力中等度で，みぞおちがつかえた感じがあり，はきけやげっぷを伴うものの次の諸症：食欲不振，胸やけ，はきけ，嘔吐，下痢，胃腸炎，口臭
貯蔵方法及び 有 効 期 間	密閉容器
規格及び試験方法	別記のとおり。
備　　考	生姜瀉心湯

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品1包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　ハンゲ　外面は白色～灰白黄色，上部には茎の跡がくぼみとなり，その周辺には根の跡がくぼんだ細点となっている。横断面は白色，粉性である。味は初めなく，やや粘液性で，後に強いえぐ味を残す。

横切片を鏡検するとき，主としてでんぷん粒を充満した柔組織からなり，わずかにシュウ酸カルシウムの束晶を含んだ粘液細胞がその間に認められる。でんぷん粒は主として2

～3 個の複粒で，通例，径 10～15μm，単粒は通例径 3～7μm である。束晶は長さ 25～150μm である。

（２）　ニンジン　外面は淡黄褐色～淡灰褐色を呈し，縦じわがあり，横断面は淡黄褐色を呈し，形成層の付近は褐色を呈する。特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後にやや苦い。

必要に応じて，「ニンジン」の確認試験を準用する。

（３）　オウゴン　外面は黄褐色～暗褐色を呈し，切断面は黄色～帯褐黄色を呈し，縦に繊維性のすじが見られる。味はわずかに苦い。

必要に応じて，「オウゴン」の確認試験を準用する。

（４）　カンゾウ　外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現わす。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に 1～3 細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には 3～10 細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞中にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

（５）　タイソウ　外面は赤褐色であらいしわがあるか，又は暗灰赤色で細かいしわがあり，いずれもつやがある。外果皮は薄く革質で，中果皮は暗灰褐色を呈し，海綿ようで柔らかく粘着性があり，内果皮は極めて堅く，種子は偏平である。わずかに特異なにおいがあり，味は甘い。

（６）　オウレン　根茎の径は 2～7mm で，外面は灰黄褐色～褐色を呈し，輪節及び多数の根の基部を認め，横断面はやや繊維性で，コルク層は淡灰褐色，皮部は黄褐色，木部は黄色，髄は黄褐色である。味は極めて苦く，残留性で，だ液を黄色に染める。

横切片を鏡検するとき，コルク層は薄膜のコルク細胞からなり，皮部柔組織中にはコルク層に近い部位に石細胞群，形成層に近い部位に黄色の師部繊維の認められるものが多い。木部は主として道管，仮道管，木部繊維からなり，放射組織は明らかで，髄は大きく，髄中には石細胞あるいは厚膜木化した細胞を伴った石細胞を認めることがある。柔細胞には細かいでんぷん粒を含むが，結晶を含まない。

必要に応じて，「オウレン」の確認試験を準用する。

（７）　カンキョウ　偏圧した不規則な塊状でしばしば分枝する。分枝した各部はやや湾曲した卵形又は長卵形を呈し，長さ 2～4cm，径 1～2cm である。外面は灰黄色～灰黄褐色で，しわ及び輪節がある。折面は褐色～暗褐色で透明感があり角質である。横切面をルーペ視するとき皮層と中心柱は区分され，全面に維管束が散在する。特異なにおいがあり，味は極めて辛い。

横切片を鏡検するとき，外側よりコルク層，皮層，内皮，中心柱が認められる。皮層と中心柱は一層の内皮によって区分される。皮層及び中心柱は柔組織からなり，繊維束で囲まれた維管束が散在する。柔組織中には黄色の油様物質を含む油細胞が散在し，柔細胞中にはシュウ酸カルシウムの単晶が含まれ，でんぷんは糊化している。

必要に応じて，「カンキョウ」の確認試験を準用する。

（８）　ショウキョウ　淡灰黄色の周皮を付けたままか，又はその一部をはぎとってあり，表面は灰白色～淡灰褐色で，しばしば白粉を付けている。横断面は繊維性，粉性で，淡帯黄褐色を呈し，皮層と中心柱とに分かれる。横断面をルーペ視するとき，その全面に維管束及び分泌物が褐色の細点として散在している。特異なにおいがあり，味は極めて辛い。

乾燥減量　15％以下。

灰　　分　5％以下。

【 298 】　K100

成分及び分量又は本質	日本薬局方	ケイヒ	4.0g
	〃	ショウキョウ	1.0g
	〃	タイソウ	4.0g
	〃	シャクヤク	6.0g
	〃	カンゾウ	2.0g
		全　　量	17.0g
	日本薬局方	コウイ	20.0g
製造方法	コウイを除く以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製し，これにコウイ 20g を添付する。		
用法及び用量	本品 1 包に水約 500mL を加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，熱いうちに煎じかすを除き，添付の膠飴を煎液に入れ，かきまぜながら 5 分ほど熱して膠飴を溶かし，3 回に分けて食間に服用する。上記は大人の 1 日量である。 15 才未満 7 才以上　大人の 2/3，7 才未満 4 才以上　大人の 1/2，4 才未満 2 才以上　大人の 1/3，2 才未満　大人の 1/4 以下を服用する。 本剤は必ず 1 日分ずつ煎じ，数日分をまとめて煎じないこと。		
効能又は効果	体力虚弱で，疲労しやすく腹痛があり，血色がすぐれず，ときに動悸，手足のほてり，冷え，ねあせ，鼻血，頻尿および多尿などを伴うものの次の諸症：小児虚弱体質，疲労倦怠，慢性胃腸炎，腹痛，神経質，小児夜尿症，夜泣き		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	小建中湯		

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品 1 包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　ケイヒ　外面は暗赤褐色を呈し，内面は赤褐色を呈し，平滑である。折面はやや繊維性で赤褐色を呈し淡褐色の薄層がある。特異なにおいがあり，味は甘く，辛く，後にやや粘液性で，わずかに収れん性である。

横切片を鏡検するとき，一次皮部と二次皮部はほとんど連続した石細胞環で区分され，環の外辺にはほぼ円形に結集した繊維束を伴い，環の各石細胞の壁はしばしばU字形に肥厚する。二次皮部中には石細胞を認めず，まばらに少数の厚膜繊維を認める。柔組織中には油細胞，粘液細胞及びでんぷん粒を含む。放射組織中には微細なシュウ酸カルシウムの針晶を含む細胞がある。

（２）　ショウキョウ　淡灰黄色の周皮を付けたままか，又はその一部をはぎとってあり，表面は灰白色～淡灰褐色で，しばしば白粉を付けている。横断面は繊維性，粉性で，淡黄褐色を呈し，皮層と中心柱とに分かれる。横断面をルーペ視するとき，その全面に維管束及び分泌物が暗褐色の細点として散在している。特異なにおいがあり，味は極めて辛い。

（３）　タイソウ　外面は赤褐色であらいしわがあるか，又は暗灰赤色で細かいしわがあり，いずれもつやがある。外果皮は薄く革質で，中果皮は暗灰褐色を呈し，海綿ようで柔らかく粘着性があり，内果皮は極めて堅く，種子は偏平である。わずかに特異なにおいがあり，味は甘い。

（４）　シャクヤク　外面は褐色～淡灰褐色を呈し，横断面はち密で淡灰褐色を呈し，木部には淡褐色の放射状の線がある。わずかに特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後に渋くてわずかに苦い。

必要に応じて，「シャクヤク」の確認試験を準用する。

（５）　カンゾウ　外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現わす。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に1～3細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には3～10細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞中にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

乾燥減量　18%以下。

灰　　分　5%以下。

【 299 】　K101

成分及び分量又は本質	日本薬局方	サイコ	6.0g
	〃	ハンゲ	5.0g
	〃	オウゴン	3.0g
	〃	ニンジン	3.0g
	〃	タイソウ	3.0g
	〃	ショウキョウ	1.0g
	〃	カンゾウ	1.0～2.0g
		全　　量	22.0～23.0g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。		
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4を服用する。		
効能又は効果	体力中等度で，ときに脇腹(腹)からみぞおちあたりにかけて苦しく，食欲不振や口の苦味があり，舌に白苔がつくものの次の諸症：食欲不振，はきけ，胃炎，胃痛，胃腸虚弱，疲労感，かぜの後期の諸症状		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	小柴胡湯		

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は弱い刺激性の特異なにおいがある。

確認試験　本品1包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　サイコ　外面は淡褐色～褐色で，深いしわがあるものがあり，横断面では，皮部は褐色，木部は淡褐色を呈する。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，皮部にはしばしば接線方向に長い裂け目があり，皮部の厚さは半径の1/3～1/2で，径15～35μmの胞間性離生油道がやや多数散在し，木部には道管が放射状もしくはほぼ階段状に配列し，ところどころに繊維群があり，根頭部の髄には皮部と同様の油道がある。柔細胞中にはでんぷん粒を満たし，また油滴を認める。

必要に応じて，「サイコ」の確認試験を準用する。

（２）　ハンゲ　外面は白色～灰白黄色，上部には茎の跡がくぼみとなり，その周辺には根の跡がくぼんだ細点となっている。横断面は白色，粉性である。味は初めなく，やや粘液性で，後に強いえぐ味を残す。

横切片を鏡検するとき，主としてでんぷん粒を充満した柔組織からなり，わずかにシュウ酸カルシウムの束晶を含んだ粘液細胞がその間に認められる。でんぷん粒は主として 2～3 個の複粒で，通例，径 10～15μm，単粒は通例径 3～7μm である。束晶は長さ 25～150μm である。

（３）　オウゴン　外面は黄褐色～暗褐色を呈し，切断面は黄色～帯褐黄色を呈し，縦に繊維性のすじが見られる。味はわずかに苦い。

必要に応じて，「オウゴン」の確認試験を準用する。

（４）　ニンジン　外面は淡黄褐色～淡灰褐色を呈し，縦じわがあり，横断面は淡黄褐色を呈し，形成層の付近は褐色を呈する。特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後にやや苦い。

必要に応じて，「ニンジン」の確認試験を準用する。

（５）　タイソウ　外面は赤褐色であらいしわがあるか，又は暗灰赤色で細かいしわがあり，いずれもつやがある。外果皮は薄く革質で，中果皮は暗灰褐色を呈し，海綿ようで柔らかく粘着性があり，内果皮は極めて堅く，種子は偏平である。わずかに特異なにおいがあり，味は甘い。

（６）　ショウキョウ　淡灰黄色の周皮を付けたままか，又はその一部をはぎとってあり，表面は灰白色～淡灰褐色で，しばしば白粉を付けている。横断面は繊維性，粉性で，淡黄褐色を呈し，皮層と中心柱とに分かれる。横断面をルーペ視するとき，その全面に維管束及び分泌物が褐色の細点として散在している。特異なにおいがあり，味は極めて辛い。

（７）　カンゾウ　外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現わす。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に 1～3 細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には 3～10 細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞中にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

乾燥減量　20％以下。

灰　　分　5％以下。

【 300 】　K101—①

成分及び分量又は本質	日本薬局方	サイコ	6.0g
	〃	ハンゲ	6.0g
	〃	オウゴン	3.0g
	〃	チクセツニンジン	3.0g
	〃	タイソウ	3.0g
	〃	ショウキョウ	1.0g
	〃	カンゾウ	1.0～2.0g
		全　　量	23.0～24.0g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。		
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，熱いうちに煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。 本剤は必ず1日分ずつ煎じ，数日分をまとめて煎じないこと。		
効能又は効果	体力中等度で，ときに脇腹(腹)からみぞおちあたりにかけて苦しく，食欲不振や口の苦味があり，舌に白苔がつくものの次の諸症：食欲不振，はきけ，胃炎，胃痛，胃腸虚弱，疲労感，かぜの後期の諸症状		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	小柴胡湯（竹参）		

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は弱い刺激性の特異なにおいがある。

確認試験　本品1包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　サイコ　外面は淡褐色～褐色で，深いしわがあるものがあり，横断面では，皮部は褐色，木部は淡褐色を呈する。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，皮部にはしばしば接線方向に長い裂け目があり，皮部の厚さは半径の1/3～1/2で，径15～35μmの胞間性離生油道がやや多数散在する。木部には道管が放射状若しくはほぼ階段状に配列し，ところどころに繊維群があり，根頭部の髄には皮部と同様の油道がある。柔細胞中にはでんぷん粒及び油滴を認める。

必要に応じて，「サイコ」の確認試験を準用する。

（２）　ハンゲ　外面は白色～灰白黄色，上部には茎の跡がくぼみとなり，その周辺には根の跡がくぼんだ細点となっている。横断面は白色，粉性である。味は初めなく，やや粘液性で，後に強いえぐ味を残す。

横切片を鏡検するとき，主としてでんぷん粒を充満した柔組織からなり，わずかにシュウ酸カルシウムの束晶を含んだ粘液細胞がその間に認められる。でんぷん粒は主として 2～3 個の複粒で，通例，径 10～15μm，単粒は通例径 3～7μm である。束晶は長さ 25～150μm である。

（３）　オウゴン　外面は黄褐色を呈し，切断面は黄色～黄褐色を呈し，縦に繊維性のすじが見られる。味はわずかに苦い。

必要に応じて，「オウゴン」の確認試験を準用する。

（４）　チクセツニンジン　外面は淡黄褐色で，質は堅く，横断面はほぼ平らで淡黄褐色を呈し，角質ようである。弱いにおいがあり，味はわずかに苦い。

必要に応じて，「チクセツニンジン」の確認試験を準用する。

（５）　タイソウ　外面は赤褐色であらいしわがあるか，又は暗灰赤色で細かいしわがあり，いずれもつやがある。外果皮は薄く革質で，中果皮は暗灰褐色を呈し，海綿ようで柔らかく粘着性があり，内果皮は極めて堅く，種子は偏平である。わずかに特異なにおいがあり，味は甘い。

（６）　ショウキョウ　淡灰黄色の周皮を付けたままか，又はその一部をはぎとってあり，表面は灰白色～淡灰褐色で，しばしば白粉を付けている。横断面は繊維性，粉性で，淡黄褐色を呈し，皮層と中心柱とに分かれる。横断面をルーペ視するとき，その全面に維管束及び分泌物が暗褐色の細点として散在している。特異なにおいがあり，味は極めて辛い。

（７）　カンゾウ　外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現わす。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に 1～3 細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には 3～10 細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞中にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

乾燥減量　20%以下。

灰　　分　5%以下。

【 301 】　K102

成分及び分量又は本質	日本薬局方	サイコ	7.0g
	〃	ハンゲ	5.0g
	〃	オウゴン	3.0g
	〃	タイソウ	3.0g
	〃	ニンジン	3.0g
	〃	ショウキョウ	1.0g
	〃	カンゾウ	2.0g
	〃	キキョウ	3.0g
	〃	セッコウ	10.0g
		全　量	37.0g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。		
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。		
効能又は効果	比較的体力があり，ときに脇腹(腹)からみぞおちあたりにかけて苦しく，食欲不振や口の苦味があり，舌に白苔がつき，のどがはれて痛むものの次の諸症：のどの痛み，扁桃炎，扁桃周囲炎		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	小柴胡湯加桔梗石膏		

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品1包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　サイコ　外面は灰褐色～褐色で，深いしわがあるものがあり，横断面では，皮部は褐色，木部は淡褐色を呈する。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，皮部にはしばしば接線方向に長い裂け目があり，皮部の厚さは半径の1/3～1/2で，径15～35μmの胞間性離生油道がやや多数散在し，木部には道管が放

射状若しくはほぼ階段状に配列し，ところどころに繊維群があり，根頭部の髄には皮部と同様の油道がある。柔細胞中にはでんぷん粒を満たし，また油滴を認める。

必要に応じて，「サイコ」の確認試験を準用する。

（２）　ハンゲ　外面は白色～灰白黄色，上部には茎の跡がくぼみとなり，その周辺には根の跡がくぼんだ細点となっている。横断面は白色，粉性である。味は初めなく，やや粘液性で，後に強いえぐ味を残す。

横切片を鏡検するとき，主としてでんぷん粒を充満した柔組織からなり，わずかにシュウ酸カルシウムの束晶を含んだ粘液細胞がその間に認められる。でんぷん粒は主として 2～3 個の複粒で，通例，径 10～15μm，単粒は通例径 3～7μm である。束晶は長さ 25～150μm である。

（３）　オウゴン　外面は黄褐色～暗褐色を呈し，切断面は黄色～帯褐黄色を呈し，縦に繊維性のすじが見られる。味はわずかに苦い。

必要に応じて，「オウゴン」の確認試験を準用する。

（４）　タイソウ　外面は赤褐色であらいしわがあるか，又は暗灰赤色で細かいしわがあり，いずれもつやがある。外果皮は薄く革質で，中果皮は暗灰褐色を呈し，海綿ようで柔らかく粘着性があり，内果皮は極めて堅く，種子は偏平である。わずかに特異なにおいがあり，味は甘い。

（５）　ニンジン　外面は淡黄褐色～淡灰褐色を呈し，縦じわがあり，横断面は淡黄褐色を呈し，形成層の付近は褐色を呈する。特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後にやや苦い。

必要に応じて，「ニンジン」の確認試験を準用する。

（６）　ショウキョウ　淡灰黄色の周皮を付けたままか，又はその一部をはぎとってあり，表面は灰白色～淡灰褐色で，しばしば白粉を付けている。横断面は繊維性，粉性で，淡帯黄褐色を呈し，皮層と中心柱とに分かれる。横断面をルーペ視するとき，その全面に維管束及び分泌物が褐色の細点として散在している。特異なにおいがあり，味は極めて辛い。

（７）　カンゾウ　外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現わす。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に 1～3 細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には 3～10 細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞中にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

（８）　キキョウ　外面は皮付きは灰褐色，皮去りは白色～淡褐色を呈し，繊維性でない。横切面をルーペ視するとき，皮部は木部よりやや薄く，ほとんど白色で，ところどころにすき間があり，形成層の付近はしばしば褐色を帯びる。木部は白色～淡褐色を呈し，その組織は皮部よりもやや密である。味は初めなく，後にえぐくて苦い。

必要に応じて，「キキョウ」の確認試験を準用する。

（９）　セッコウ　光沢のある白色の重い繊維状結晶塊で，におい及び味はない。砕くとたやすく針状～微細結晶性の粉末となる。水に溶けにくい。

必要に応じて，「セッコウ」の確認試験を準用する。

乾燥減量　15％以下。

灰　　分　32％以下。

【 302 】　K103

成分及び分量 又は本質	日本薬局方　ダイオウ　2.0g 〃　キジツ　2.0g 〃　コウボク　3.0g 全　量　7.0g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。
効能又は効果	比較的体力があり，腹部が張って膨満し，ときに発熱するものの次の症状：便秘
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器
規格及び試験方法	別記のとおり。
備考	小承気湯

規格及び試験方法

性　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品1包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　ダイオウ　暗褐色～黄褐色～淡褐色を呈し，ルーペ視すると入り組んだ不規則な模様がある。質はおおむね粗で繊維性ではない。特異なにおいがあり，味はわずかに渋くて苦い。かめば細かい砂をかむような感じがあり，だ液を黄色に染める。

必要に応じて，「ダイオウ」の確認試験を準用する。

（2）　キジツ　外面は濃緑褐色～褐色で，つやがなく，油室による多数のくぼんだ細点がある。切断面は淡灰褐色を呈し，内果皮を付ける部分は褐色を呈する。特異なにおいがあり，味は苦い。

必要に応じて，「キジツ」の確認試験を準用する。

（3）　コウボク　外面は灰白色～灰褐色を呈し，内面は淡褐色～褐色，切断面は淡赤褐色を呈し，繊維性である。わずかに芳香があり，味は苦い。

横切片を鏡検するとき，コルク層は厚く，ほぼ等径性の石細胞が環状に内接する。一次皮部は狭く，内しょう部には繊維群が点在し，二次皮部の放射組織間には師部繊維群が階

段状に並ぶ。油細胞の多数は一次皮部に，少数は二次皮部に散在し，狭い放射組織内にも認められることがある。

必要に応じて，「コウボク」の確認試験を準用する。

乾燥減量　15%以下。

灰　　分　6%以下。

【 303 】　K104

成分及び分量又は本質	日本薬局方	マオウ	2.0～3.0g
	〃	シャクヤク	3.0g
	〃	カンキョウ	3.0g
	〃	カンゾウ	2.0～3.0g
	〃	ケイヒ	3.0g
	〃	サイシン	3.0g
	〃	ゴミシ	3.0g
	〃	ハンゲ	6.0g
		全　量	25.0～27.0g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。		
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。		
効能又は効果	体力中等度又はやや虚弱で，うすい水様のたんを伴うせきや鼻水が出るものの次の諸症：気管支炎，気管支ぜんそく，鼻炎，アレルギー性鼻炎，むくみ，感冒，花粉症		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	小青竜湯		

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品1包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　マオウ　細い円柱状又はだ円柱を呈し，長さ3～10mm，径1～2mm，淡緑色～黄緑色である。表面に多数の平行する縦みぞがあり，節部には，長さ2～4mmの2枚のりん片状の葉が対生し，その基部は合着して筒状になっている。りん片状の葉の色は淡褐色～褐色である。茎の横断面をルーペ視するとき，円形～だ円形で，周囲部は灰緑色～黄緑色を呈し，中心部には赤緑色の物質が充満しているか，又は中空のところがある。味は渋くてわずかに苦く，やや麻ひ性である。

必要に応じて，「マオウ」の確認試験を準用する。

（２）　シャクヤク　外面は褐色～淡灰褐色を呈し，横断面はち密で淡灰褐色を呈し，木部には淡褐色の放射状の線がある。わずかに特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後に渋くてわずかに苦い。

必要に応じて，「シャクヤク」の確認試験を準用する。

（３）　カンキョウ　偏圧した不規則な塊状でしばしば分枝する。分枝した各部はやや湾曲した卵形又は長卵形を呈し，長さ 2～4ｃｍ，径 1～2ｃｍである。外面は灰黄色～灰黄褐色で，しわ及び輪節がある。折面は褐色～暗褐色で透明感があり角質である。横切面をルーペ視するとき皮層と中心柱は区分され，全面に維管束が散在する。特異なにおいがあり，味は極めて辛い。

横切片を鏡検するとき，外側よりコルク層，皮層，内皮，中心柱が認められる。皮層と中心柱は一層の内皮によって区分される。皮層及び中心柱は柔組織からなり，繊維束で囲まれた維管束が散在する。柔組織中には黄色の油様物質を含む油細胞が散在し，柔細胞中にはシュウ酸カルシウムの単晶が含まれ，でんぷんは糊化している。

必要に応じて，「カンキョウ」の確認試験を準用する。

（４）　カンゾウ　外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現わす。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に 1～3 細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には 3～10 細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞中にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

（５）　ケイヒ　外面は暗赤褐色を呈し，内面は赤褐色を呈し，平滑である。横断面は赤褐色を呈し淡褐色の薄層が見られる。特異なにおいがあり，味は甘く，辛く，後にやや粘液性で，わずかに収れん性である。

横切片を鏡検するとき，一次皮部と二次皮部はほとんど連続した石細胞環で区分され，環の外辺にはほぼ円形に結集した繊維束を伴い，環の各石細胞の膜はしばしば U 字形に肥厚する。二次皮部中には石細胞を認めず，まばらに少数の厚膜繊維を認める。柔組織中には油細胞，粘液細胞及び微細なシュウ酸カルシウムの針晶を含む細胞があり，柔細胞中にはでんぷん粒を含む。

（６）　サイシン　根の外面は淡褐色で，径約 1mm，切断面は黄白色である。根茎は不整に湾曲し外面は暗褐色を呈する。特異なにおいがあり，味は辛く舌をやや麻ひする。

（７）　ゴミシ　暗赤色～黒褐色を呈し，表面にはしわがあり，またしばしば白い粉を付ける。果肉を除くとじん臓形の種子 1～2 個を認め，その外種皮は黄褐色～暗赤褐色を呈し，つやがあり，堅くてもろい。外種皮はたやすくはがれるが，内種皮は胚乳に密着し，背面に明らかな縫線を認める。酸味があり，後に渋くて苦い。

（８）　ハンゲ　外面は白色～灰白黄色，上部には茎の跡がくぼみとなり，その周辺には根の跡がくぼんだ細点となっている。横断面は白色，粉性である。味は初めなく，やや粘液性で，後に強いえぐ味を残す。

横切片を鏡検するとき，主としてでんぷん粒を充満した柔組織からなり，わずかにシュウ酸カルシウムの束晶を含んだ粘液細胞がその間に認められる。でんぷん粒は主として 2～3 個の複粒で，通例，径 10～15μm，単粒は通例径 3～7μm である。束晶は長さ 25～150μm である。

乾燥減量　15%以下。

灰　　分　6%以下。

【 304 】　K105

成分及び分量 又は本質	日本薬局方	マオウ	3.0g
	〃	シャクヤク	3.0g
	〃	カンキョウ	3.0g
	〃	カンゾウ	2.0～3.0g
	〃	ケイヒ	3.0g
	〃	サイシン	3.0g
	〃	ゴミシ	3.0g
	〃	ハンゲ	6.0g
	〃	セッコウ	5.0g
		全　量	31.0～32.0g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。		
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。		
効能又は効果	体力中等度で，うすい水様のたんを伴うせきや鼻水が出て，のどの渇きがあるものの次の諸症：気管支炎，気管支ぜんそく，鼻炎，アレルギー性鼻炎，むくみ，感冒		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	小青竜湯加石膏		

規格及び試験方法

性　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品1包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　マオウ　細い円柱状又はだ円柱を呈し，長さ3～10mm，径1～2mm，淡緑色～黄緑色である。表面に多数の平行する縦みぞがあり，節部には，長さ2～4mmの2枚のりん片状の葉が対生し，その基部は合着して筒状になっている。りん片状の葉の色は淡褐色～褐色である。茎の横断面をルーペ視するとき，円形～だ円形で，周囲部は灰緑色～黄緑

色を呈し，中心部には赤緑色の物質が充満しているか，又は中空のところがある。味は渋くてわずかに苦く，やや麻ひ性である。

必要に応じて，「マオウ」の確認試験を準用する。

（２）　シャクヤク　外面は褐色～淡灰褐色を呈し，横断面はち密で淡灰褐色を呈し，木部には淡褐色の放射状の線がある。わずかに特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後に渋くてわずかに苦い。

必要に応じて，「シャクヤク」の確認試験を準用する。

（３）　カンキョウ　偏圧した不規則な塊状でしばしば分枝する。分枝した各部はやや湾曲した卵形又は長卵形を呈し，長さ 2～4cm，径 1～2cm である。外面は灰黄色～灰黄褐色で，しわ及び輪節がある。折面は褐色～暗褐色で透明感があり角質である。横切面をルーペ視するとき皮層と中心柱は区分され，全面に維管束が散在する。特異なにおいがあり，味は極めて辛い。

横切片を鏡検するとき，外側よりコルク層，皮層，内皮，中心柱が認められる。皮層と中心柱は一層の内皮によって区分される。皮層及び中心柱は柔組織からなり，繊維束で囲まれた維管束が散在する。柔組織中には黄色の油様物質を含む油細胞が散在し，柔細胞中にはシュウ酸カルシウムの単晶が含まれ，でんぷんは糊化している。

必要に応じて，「カンキョウ」の確認試験を準用する。

（４）　カンゾウ　外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現わす。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に 1～3 細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には 3～10 細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞中にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

（５）　ケイヒ　外面は暗赤褐色を呈し，内面は赤褐色を呈し，平滑である。横断面は赤褐色を呈し淡褐色の薄層が見られる。特異なにおいがあり，味は甘く，辛く，後にやや粘液性で，わずかに収れん性である。

横切片を鏡検するとき，一次皮部と二次皮部はほとんど連続した石細胞環で区分され，環の外辺にはほぼ円形に結集した繊維束を伴い，環の各石細胞の膜はしばしば U 字形に肥厚する。二次皮部中には石細胞を認めず，まばらに少数の厚膜繊維を認める。柔組織中には油細胞，粘液細胞及び微細なシュウ酸カルシウムの針晶を含む細胞があり，柔細胞中にはでんぷん粒を含む。

（６）　サイシン　根の外面は淡褐色で，径約 1mm，切断面は黄白色である。根茎は不整に湾曲し外面は暗褐色を呈する。特異なにおいがあり，味は辛く舌をやや麻ひする。

（７）　ゴミシ　暗赤色～黒褐色を呈し，表面にはしわがあり，またしばしば白い粉を付ける。果肉を除くとじん臓形の種子 1～2 個を認め，その外種皮は黄褐色～暗赤褐色を呈し，つやがあり，堅くてもろい。外種皮はたやすくはがれるが，内種皮は胚乳に密着し，背面に明らかな縫線を認める。酸味があり，後に渋くて苦い。

（８）　ハンゲ　外面は白色～灰白黄色，上部には茎の跡がくぼみとなり，その周辺には根の跡がくぼんだ細点となっている。横断面は白色，粉性である。味は初めなく，やや粘液性で，後に強いえぐ味を残す。

横切片を鏡検するとき，主としてでんぷん粒を充満した柔組織からなり，わずかにシュウ酸カルシウムの束晶を含んだ粘液細胞がその間に認められる。でんぷん粒は主として 2～3 個の複粒で，通例，径 10～15μm，単粒は通例径 3～7μm である。束晶は長さ 25～150μm である。

（９）　セッコウ　光沢のある白色の重い繊維状結晶塊で，におい及び味はない。砕くとたやすく針状～微細結晶性の粉末となる。水に溶けにくい。

必要に応じて，「セッコウ」の確認試験を準用する。

乾燥減量　15％以下。

灰　　分　21％以下。

【 305 】　K106

成分及び分量又は本質	日本薬局方	マオウ	2.0～4.0g
	〃	シャクヤク	3.0g
	〃	カンキョウ	3.0g
	〃	カンゾウ	2.0～3.0g
	〃	ケイヒ	3.0g
	〃	サイシン	3.0g
	〃	ゴミシ	3.0g
	〃	ハンゲ	6.0g
	〃	キョウニン	4.0g
	〃	セッコウ	10.0g
		全　量	39.0～42.0g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。		
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。		
効能又は効果	体力中等度で，せきが出て，のどの渇きがあるものの次の諸症：気管支ぜんそく，小児ぜんそく，せき		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	小青竜湯加杏仁石膏（小青竜湯合麻杏甘石湯）		

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品1包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　マオウ　細い円柱状又はだ円柱を呈し，長さ3～10mm，径1～2mm，淡緑色～黄緑色である。表面に多数の平行する縦みぞがあり，節部には，長さ2～4mmの2枚のりん片状の葉が対生し，その基部は合着して筒状になっている。りん片状の葉の色は淡褐色～褐色である。茎の横断面をルーペ視するとき，円形～だ円形で，周囲部は灰緑色～黄緑

色を呈し，中心部には赤緑色の物質が充満しているか，又は中空のところがある。味は渋くてわずかに苦く，やや麻ひ性である。

必要に応じて，「マオウ」の確認試験を準用する。

（２）　シャクヤク　外面は褐色～淡灰褐色を呈し，横断面はち密で淡灰褐色を呈し，木部には淡褐色の放射状の線がある。わずかに特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後に渋くてわずかに苦い。

必要に応じて，「シャクヤク」の確認試験を準用する。

（３）　カンキョウ　偏圧した不規則な塊状でしばしば分枝する。分枝した各部はやや湾曲した卵形又は長卵形を呈し，長さ 2～4cm，径 1～2cm である。外面は灰黄色～灰黄褐色で，しわ及び輪節がある。折面は褐色～暗褐色で透明感があり角質である。横切面をルーペ視するとき皮層と中心柱は区分され，全面に維管束が散在する。特異なにおいがあり，味は極めて辛い。

横切片を鏡検するとき，外側よりコルク層，皮層，内皮，中心柱が認められる。皮層と中心柱は一層の内皮によって区分される。皮層及び中心柱は柔組織からなり，繊維束で囲まれた維管束が散在する。柔組織中には黄色の油様物質を含む油細胞が散在し，柔細胞中にはシュウ酸カルシウムの単晶が含まれ，でんぷんは糊化している。

必要に応じて，「カンキョウ」の確認試験を準用する。

（４）　カンゾウ　外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現わす。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に 1～3 細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には 3～10 細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞中にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

（５）　ケイヒ　外面は暗赤褐色を呈し，内面は赤褐色を呈し，平滑である。横断面は赤褐色を呈し淡褐色の薄層が見られる。特異なにおいがあり，味は甘く，辛く，後にやや粘液性で，わずかに収れん性である。

横切片を鏡検するとき，一次皮部と二次皮部はほとんど連続した石細胞環で区分され，環の外辺にはほぼ円形に結集した繊維束を伴い，環の各石細胞の膜はしばしば U 字形に肥厚する。二次皮部中には石細胞を認めず，まばらに少数の厚膜繊維を認める。柔組織中には油細胞，粘液細胞及び微細なシュウ酸カルシウムの針晶を含む細胞があり，柔細胞中にはでんぷん粒を含む。

（６）　サイシン　根の外面は淡褐色で，径約 1mm，切断面は黄白色である。根茎は不整に湾曲し外面は暗褐色を呈する。特異なにおいがあり，味は辛く舌をやや麻ひする。

（７）　ゴミシ　暗赤色～黒褐色を呈し，表面にはしわがあり，またしばしば白い粉を付ける。果肉を除くとじん臓形の種子 1～2 個を認め，その外種皮は黄褐色～暗赤褐色を呈し，つやがあり，堅くてもろい。外種皮はたやすくはがれるが，内種皮は胚乳に密着し，背面に明らかな縫線を認める。酸味があり，後に渋くて苦い。

（８）　ハンゲ　外面は白色～灰白黄色，上部には茎の跡がくぼみとなり，その周辺には根の跡がくぼんだ細点となっている。横断面は白色，粉性である。味は初めなく，やや粘液性で，後に強いえぐ味を残す。

横切片を鏡検するとき，主としてでんぷん粒を充満した柔組織からなり，わずかにシュウ酸カルシウムの束晶を含んだ粘液細胞がその間に認められる。でんぷん粒は主として 2～3 個の複粒で，通例，径 10～15μm，単粒は通例径 3～7μm である。束晶は長さ 25～150μm である。

（９）　キョウニン　種皮は褐色で，表面にはすれて落ちやすい石細胞となった表皮細胞があって，粉をふいたようである。切断面は類白色である。味は苦く，油ようである。

表皮の表面を鏡検するとき，数個ずつ集合する石細胞はおおむね円形で，その細胞膜は均等に著しく厚くなり，径 60～90μm，側面視では鈍三角形で，細胞膜は先端部で著しく厚い。

必要に応じて，「キョウニン」の確認試験を準用する。

（10）　セッコウ　光沢のある白色の重い繊維状結晶塊で，におい及び味はない。砕くとたやすく針状～微細結晶性の粉末となる。水に溶けにくい。

必要に応じて，「セッコウ」の確認試験を準用する。

乾燥減量　10%以下。

灰　　分　43%以下。

【 306 】　K107

成分及び分量 又は本質	日本薬局方　ハンゲ　8.0g 〃　ブクリョウ　3.0g 〃　ショウキョウ　2.0g 全　量　13.0g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。
効能又は効果	体力に関わらず使用でき，悪心があり，ときに嘔吐するものの次の諸症：つわり，嘔吐，悪心，胃炎
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器
規格及び試験方法	別記のとおり。
備考	小半夏加茯苓湯

規格及び試験方法

性　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品1包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　ハンゲ　外面は白色～灰白黄色，上部には茎の跡がくぼみとなり，その周辺には根の跡がくぼんだ細点となっている。横断面は白色，粉性である。味は初めなく，やや粘液性で，後に強いえぐ味を残す。

横切片を鏡検するとき，主としてでんぷん粒を充満した柔組織からなり，わずかにシュウ酸カルシウムの束晶を含んだ粘液細胞がその間に認められる。でんぷん粒は主として2～3個の複粒で，通例，径10～15μm，単粒は通例径3～7μmである。束晶は長さ25～150μmである。

（2）　ブクリョウ　白色又はわずかに淡赤色を帯びた白色で，質は堅いが砕きやすい。味はないがやや粘液ようである。

必要に応じて，「ブクリョウ」の確認試験を準用する。

（3）　ショウキョウ　淡灰黄色の周皮を付けたままか，又はその一部をはぎとってあり，表面は灰白色～淡灰褐色で，しばしば白粉を付けている。横断面は繊維性，粉性で，淡帯黄褐色を呈し，皮層と中心柱とに分かれる。横断面をルーペ視するとき，その全面に

維管束及び分泌物が褐色の細点として散在している。特異なにおいがあり，味は極めて辛い。

乾燥減量　15%以下。

灰　　分　5%以下。

【 307 】　K108

成分及び分量 又は本質	日本薬局方	トウキ	3.0g
	〃	ジオウ	3.0g
	〃	セッコウ	3.0g
	〃	ボウフウ	2.0g
	〃	ソウジュツ	2.0g
	〃	モクツウ	2.0g
	〃	ゴボウシ	2.0g
	〃	チモ	1.5g
	〃	ゴマ	1.5g
	局外生規	センタイ	1.0g
	日本薬局方	クジン	1.0g
	〃	ケイガイ	1.0g
	〃	カンゾウ	1.0g
		全　量	24.0g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。		
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4を服用する。		
効能又は効果	体力中等度以上の人の皮膚疾患で，かゆみが強くて分泌物が多く，ときに局所の熱感があるものの次の諸症：湿疹・皮膚炎，じんましん，水虫，あせも		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	消風散料		

規格及び試験方法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品1包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（１）　トウキ　外面は暗褐色～赤褐色で，縦じわがあり，切断面は淡黄色～黄褐色を呈する。特異なにおいがあり，味はわずかに甘く，後にやや辛い。

横切片を鏡検するとき，コルク層は 4～10 層からなり，その内側に数層の厚角組織が続いている。皮部には分泌細胞に囲まれた多数の樹脂道並びにしばしば大きなすき間がある。形成層は長方形に偏圧された数層の細胞からなり，明らかに皮部と木部とを区別する。木部では多数の道管と放射組織とが交互に放射状に配列し，その外方の道管は単独又は数個集まってやや密に配列してくさび状をなすが，中心部付近の道管は極めてまばらに存在する。でんぷん粒は径 19μm 以下，まれに 2～5 個の複粒があり，複粒の径は 25μm に達し，しばしばのり化している。

（２）　ジオウ　外面は黄褐色～黒褐色を呈し，深い縦みぞ及びくびれがある。質は柔らかく粘性である。横断面は黄褐色～黒褐色で，皮部は木部より色が濃く，ほとんど髄を認めない。特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後にやや苦い。

横切片を鏡検するとき，コルク層は 7～15 層で，皮部はすべて柔細胞からなり，外皮部に褐色の分泌物を含む細胞が散在する。木部はほとんど柔細胞で満たされ，放射状に並ぶ道管は側孔のある網紋があり，弱い木化反応を呈する。

（３）　セッコウ　光沢のある白色の重い繊維状結晶塊で，におい及び味はない。砕くとたやすく針状～微細結晶性の粉末となる。水に溶けにくい。

必要に応じて，「セッコウ」の確認試験を準用する。

（４）　ボウフウ　外面は淡褐色で，多数の縦じわがある。横断面の周辺は灰褐色で，空げきが多く，中央は円形に黄色を呈する。味はわずかに甘い。

（５）　ソウジュツ　外面は暗灰褐色～暗黄褐色である。横断面は淡褐色～赤褐色の分泌物による細点を認める。しばしば白色綿状の結晶を析出する。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，皮部の柔組織中には，通例，繊維束を欠き，放射組織の末端部には淡褐色～黄褐色の内容物を含む油室がある。木部は形成層に接して道管を囲んだ繊維束が放射状に配列し，髄及び放射組織中には皮部と同様な油室がある。柔細胞中にはイヌリンの球晶及びシュウ酸カルシウムの針晶を含む。

（６）　モクツウ　外側のコルク層は灰褐色で，円形又は横に長いだ円形の皮目がある。皮部は暗灰褐色を呈し，木部は淡褐色で，灰白色の放射組織と交互に配列する。髄は淡灰黄色で，明らかである。味はわずかにえぐい。

横切片を鏡検するとき，師部の外辺を囲む弧状の輪層は主として結晶細胞列をなす繊維束と石細胞群からなり，皮部の放射組織は単晶を含む厚膜細胞からなる。形成層は明らかで，束外では著しく内方に湾入している。髄周辺の細胞は，はなはだ厚膜で，しばしば単晶を含んでいる。でんぷん粒の大きさは 8mm 以下である。

必要に応じて，「モクツウ」の確認試験を準用する。

（７）　ゴボウシ　やや湾曲した倒長卵形のそう果で，長さ 5～7mm，幅 2.0～3.2mm，厚さ 0.8～1.5mm，外面は灰褐色～褐色で，黒色の点がある。幅広い一端は径約 1mm のくぼみがあり，他端は細まり平たんで不明瞭な縦の稜線がある。100 粒の質量は 1.0～1.5g である。ほとんどにおいがなく，味は苦く油様である。

横切片を鏡検するとき，外果皮は 1 層の表皮からなり，中果皮はやや厚壁化した柔組織からなり，内果皮は 1 層の石細胞層からなる。種皮は放射方向に長く厚壁化した表皮と数層の柔組織からなる。種皮の内側には内乳，子葉が見られる。中果皮柔細胞中には褐色物

質を，内果皮石細胞中にはシュウ酸カルシウムの単晶を，子葉にはでんぷん粒，油滴，アリューロン粒及びシュウ酸カルシウムの微小な集晶を含む。

必要に応じて，「ゴボウシ」の確認試験を準用する。

（８）　チモ　外面は黄褐色～褐色を呈し，質は軽くて折りやすい。横断面は淡黄褐色を呈し，これをルーペ視するとき，皮層は極めて狭く，広い中心柱には多くの維管束が不規則に点在し，粘液細胞又はその集合による多孔性を示す。味はわずかに甘く，粘液性で，後に苦い。

必要に応じて，「チモ」の確認試験を準用する。

（９）　ゴマ　本品は卵形～へら形を呈し，長さ 3～4mm，幅約 2mm，厚さ約 1mm である。外面は暗褐色～黒色を呈し，まれに淡褐色～褐色のものも認められる。本品をルーペ視するとき，縁に細い稜が認められる。本品 100 粒の質量は 0.2～0.3g である。本品はにおいがなく，味はわずかに甘く，やや油様である。

本品の横切片を鏡検するとき，種皮はさく状の表皮細胞と扁圧された柔細胞からなり，種皮の内側に，内乳及び子葉が認められる。表皮細胞中には球状のシュウ酸カルシウム集晶及び黒色の色素があり，内乳及び子葉の柔細胞中にはアリューロン粒及び脂肪油が認められる。

必要に応じて，「ゴマ」の確認試験を準用する。

（10）　センタイ　長だ円体，中空で，頭部，胸部，腹部からなり，長さ 3～4cm，幅 1.3～2cm，表面は淡黄褐色，半透明で光沢がある。頭部には前方に半球形の頭，だ円形の頭楯，それにつづく針形の口吻，両側に偏球形の透明な複眼がある。糸状の 1 対の触角があり，しばしば脱落している。胸部は背面が縦裂し，内部には白色の繊維状のものがあり，側面の両側の 2 対の羽は長さ約 1.5cm 及び約 0.5cm である。腹面には 3 対の足があり，前脚は肥大した鎌状であり，中脚と後脚は細長い。腹部の背面は 9 環節からなり，腹面の中央部は長三角形で階段状の凹凸がある。質は軽く，膜質が破砕しやすい。また，これらの部分がばらばらになっている場合もある。におい及び味はほとんどない。

必要に応じて，局外生規「センタイ」の確認試験を準用する。

（11）　クジン　外面は暗褐色～黄褐色で，切断面は淡黄褐色を呈し，繊維性である。味は極めて苦く，残留性である。

必要に応じて，「クジン」の確認試験を準用する。

（12）　ケイガイ　茎，輪散花序に集合したがく筒，これら及びときには葉の砕片，種子ようの微粒の分果からなる。茎は方形で外面はおおむね紫褐色，径約 1mm である。がく筒は淡褐色～黄緑色で長さ 2～3mm，ルーペ視するとき，先端はきょ歯辺，筒部には数条の線があり，唇形花又は果実を含み，茎とともに類白色の短毛を認める。分果は黄褐色～黒色，両端の細いだ円体で長さ 1～1.5mm，径は長さのほぼ 1/2 である。特異な芳香があり，口に含むとわずかに清涼感がある。

必要に応じて，「ケイガイ」の確認試験を準用する。

（13）　カンゾウ　外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現わす。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に 1～3 細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には 3～10 細胞列

の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞中にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

【 308 】　K109

成分及び分量 又は本質	日本薬局方	カッコン	5.0g
	〃	シャクヤク	3.0g
	〃	ショウマ	1.0g
	〃	ショウキョウ	1.0g
	〃	カンゾウ	1.5g
		全　量	11.5g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。		
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。		
効能又は効果	体力中等度で，頭痛，発熱，悪寒などがあるものの次の諸症：感冒の初期，湿疹・皮膚炎		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	升麻葛根湯		

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品1包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　カッコン　淡灰黄色～灰白色を呈し，繊維性でやや粉性である。味はわずかに甘い。横切片を鏡検するとき，師部には結晶細胞列を伴った繊維束，木部には道管及び木部繊維が著しく，柔組織を満たすでんぷん粒は長径2～18μm，多くは8～12μmの数面からなる多面体の単粒，まれに2～3個からなる複粒で，中央にへそ又は欠裂を認め，層紋がある。

（2）　シャクヤク　外面は褐色～淡灰褐色を呈し，横断面はち密で淡灰褐色を呈し，木部には淡褐色の放射状の線がある。わずかに特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後に渋くてわずかに苦い。

必要に応じて，「シャクヤク」の確認試験を準用する。

（3）　ショウマ　外面は暗褐色を呈し，切断面では木部は淡褐色～灰褐色繊維性で，網目状を呈する。質は軽い。味は苦くてわずかに渋い。

（４）　ショウキョウ　淡灰黄色の周皮を付けたままか，又はその一部をはぎとってあり，表面は灰白色～淡灰褐色で，しばしば白粉を付けている。横断面は繊維性，粉性で，淡帯黄褐色を呈し，皮層と中心柱とに分かれる。横断面をルーペ視するとき，その全面に維管束及び分泌物が褐色の細点として散在している。特異なにおいがあり，味は極めて辛い。

（５）　カンゾウ　外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現わす。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に 1～3 細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には 3～10 細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞中にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

乾燥減量　15%以下。

灰　　分　5%以下。

【 309 】　K110

成分及び分量 又は本質	日本薬局方　トウキ　3.0g 〃　シャクヤク　3.0g 〃　サイコ　3.0g 〃　ビャクジュツ　3.0g 〃　ブクリョウ　3.0g 〃　カンゾウ　1.5g 〃　ショウキョウ　1.0g 〃　ハッカ　1.0g 全　量　18.5g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。
効能又は効果	体力中等度以下で，肩がこり，疲れやすく精神不安などの精神神経症状，ときに便秘の傾向のあるものの次の諸症：冷え症，虚弱体質，月経不順，月経困難，更年期障害，血の道症，不眠症，神経症
貯蔵方法及び 有効期間	密閉容器
規格及び試験方法	別記のとおり。
備考	逍遙散料

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品1包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　トウキ　外面は暗褐色～赤褐色で，縦じわがあり，切断面は淡黄色～黄褐色を呈する。特異なにおいがあり，味はわずかに甘く，後にやや辛い。

横切片を鏡検するとき，コルク層は4～10層からなり，その内側に数層の厚角組織が続いている。皮部には分泌細胞に囲まれた多数の樹脂道並びにしばしば大きなすき間がある。形成層は長方形に偏圧された数層の細胞からなり，明らかに皮部と木部とを区別する。木部では多数の道管と放射組織とが交互に放射状に配列し，その外方の道管は単独又

は数個集まってやや密に配列してくさび状をなすが，中心部付近の道管は極めてまばらに存在する。でんぷん粒は径 19μm 以下，まれに 2～5 個の複粒があり，複粒の径は 25μm に達し，しばしばのり化している。

（2） シャクヤク 外面は褐色～淡灰褐色を呈し，横断面はち密で淡灰褐色を呈し，木部には淡褐色の放射状の線がある。わずかに特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後に渋くてわずかに苦い。

必要に応じて，「シャクヤク」の確認試験を準用する。

（3） サイコ 外面は灰褐色～褐色で，深いしわがあるものがあり，横断面では，皮部は褐色，木部は淡褐色を呈する。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，皮部にはしばしば接線方向に長い裂け目があり，皮部の厚さは半径の 1/3～1/2 で，径 15～35μm の胞間性離生油道がやや多数散在し，木部には道管が放射状若しくはほぼ階段状に配列し，ところどころに繊維群があり，根頭部の髄には皮部と同様の油道がある。柔細胞中にはでんぷん粒を満たし，また油滴を認める。

必要に応じて，「サイコ」の確認試験を準用する。

（4） ビャクジュツ 外面は淡灰黄色～淡黄白色で，ところどころ灰褐色を呈し，横切面には淡黄褐色～褐色の分泌物による細点がある。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，皮部の柔組織中にはしばしば師管の外側に接して繊維束があり，放射組織の末端部には淡褐色～褐色の内容物を含む油室がある。木部には大きい髄を囲んで放射状に配列した短径の道管とそれを囲む著しい繊維束がある。髄及び放射組織中には皮部と同様な油室があり，柔組織中にはイヌリンの小球晶及びシュウ酸カルシウムの針晶を含む。

必要に応じて，「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。

（5） ブクリョウ 白色又はわずかに淡赤色を帯びた白色で，質は堅いが砕きやすい。味はないがやや粘液ようである。

必要に応じて，「ブクリョウ」の確認試験を準用する。

（6） カンゾウ 外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現わす。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に 1～3 細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には 3～10 細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞中にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

（7） ショウキョウ 淡灰黄色の周皮を付けたままか，又はその一部をはぎとってあり，表面は灰白色～淡灰褐色で，しばしば白粉を付けている。横断面は繊維性，粉性で，淡帯黄褐色を呈し，皮層と中心柱とに分かれる。横断面をルーペ視するとき，その全面に維管束及び分泌物が褐色の細点として散在している。特異なにおいがあり，味は極めて辛い。

（８）　ハッカ　上面は淡褐黄色～淡緑黄色，下面は淡緑色～淡緑黄色である。葉をルーペ視するとき，両面に毛，腺毛及び腺りんをまばらに認め，腺毛及び腺りんは下面に多い。特異な芳香があり，口に含むと清涼感がある。

必要に応じて，「ハッカ」の確認試験を準用する。

乾燥減量　15%以下。

灰　　分　6%以下。

【 310 】　K111

成分及び分量 又は本質	日本薬局方　タクシャ　4.0g 〃　ブクリョウ　4.0g 〃　ビャクジュツ　4.0g 〃　チョレイ　4.0g 全　量　16.0g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。
効能又は効果	体力に関わらず使用でき，のどが渇いて水を飲んでも尿量が少なく，はきけ，嘔吐，腹痛，むくみなどのいずれかを伴うものの次の諸症：暑気あたり，急性胃腸炎，むくみ
貯蔵方法及び 有効期間	密閉容器
規格及び試験方法	別記のとおり。
備考	四苓湯

規格及び試験方法

性　状　本品は弱い特異なにおいがある。

確認試験　本品1包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　タクシャ　淡黄褐色～淡褐色でコルク層をつける部位はやや暗色を呈する。ルーペ視するとき，褐色～淡褐色のはん点が散在する。切面は粒状で，繊維性ではない。わずかににおい及び味がある。

（2）　ブクリョウ　白色又はわずかに淡赤色を帯びた白色で，質は堅いが砕きやすい。味はないがやや粘液ようである。

必要に応じて，「ブクリョウ」の確認試験を準用する。

（3）　ビャクジュツ　外面は淡灰黄色～淡黄白色で，ところどころ灰褐色を呈し，横切面には淡黄褐色～褐色の分泌物による細点がある。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，皮部の柔組織中にはしばしば師管の外側に接して繊維束があり，放射組織の末端部には淡褐色～褐色の内容物を含む油室がある。木部には大きい髄を

囲んで放射状に配列した短径の道管とそれを囲む著しい繊維束がある。髄及び放射組織中には皮部と同様な油室があり，柔組織中にはイヌリンの小球晶及びシュウ酸カルシウムの針晶を含む。

必要に応じて，「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。

（４）　チョレイ　外面は黒褐色を呈し，切断面はやや柔らかくコルクようで，ほぼ白色～淡褐色を呈し，内部には白色のまだら模様がある。質は軽い。味がない。

必要に応じて，「チョレイ」の確認試験を準用する。

乾燥減量　15%以下。

灰　　分　10%以下。

【 311 】　K112

成分及び分量又は本質	日本薬局方	チモ	3.0g
	〃	オウゴン	3.0g
	〃	サンシシ	1.5g
	〃	バクモンドウ	6.0g
	〃	セッコウ	6.0g
	〃	ショウマ	1.5g
	〃	シンイ	3.0g
	〃	ビャクゴウ	3.0g
	〃	ビワヨウ	1.0g
		全　量	28.0g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。		
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。		
効能又は効果	体力中等度以上で，濃い鼻汁が出て，ときに熱感を伴うものの次の諸症：鼻づまり，慢性鼻炎，蓄膿症（副鼻腔炎）		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	辛夷清肺湯		

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品1包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　チモ　外面は黄褐色～褐色を呈し，質は軽くて折りやすい。横断面は淡黄褐色を呈し，これをルーペ視するとき，皮層は極めて狭く，広い中心柱には多くの維管束が不規則に点在し，粘液細胞又はその集合による多孔性を示す。味はわずかに甘く，粘液性で，後に苦い。

必要に応じて，「チモ」の確認試験を準用する。

（２）　オウゴン　外面は黄褐色～暗褐色を呈し，切断面は黄色～帯褐黄色を呈し，縦に繊維性のすじが見られる。味はわずかに苦い。

必要に応じて，「オウゴン」の確認試験を準用する。

（３）　サンシシ　果皮は薄く砕きやすく，その外面は赤褐色，黄褐色又は黒褐色を呈し，内面は黄褐色を呈し，平らでつやがある。果実の内部は 2 室に分かれ，黄赤色～暗赤色の果肉中に黒褐色又は黄赤色で長径約 5mm の偏平な種子の団塊を含む。質は軽い。特異なにおいがあり，味は苦い。

必要に応じて，「サンシシ」の確認試験を準用する。

（４）　バクモンドウ　紡錘形を呈し，長さ 10～25mm，径 3～5mm，一端はややとがり，他端はやや丸みをもち，外面は淡黄色～淡黄褐色で，大小の縦じわがある。皮層は柔軟性でもろく，中心柱は強じんで折りにくい。皮層の折面は淡黄褐色を呈し，やや半透明で粘着性がある。味はわずかに甘く，粘着性である。

（５）　セッコウ　光沢のある白色の重い繊維状結晶塊で，におい及び味はない。砕くとたやすく針状～微細結晶性の粉末となる。水に溶けにくい。

必要に応じて，「セッコウ」の確認試験を準用する。

（６）　ショウマ　外面は暗褐色を呈し，切断面では木部は淡褐色～灰褐色繊維性で，網目状を呈する。質は軽い。味は苦くてわずかに渋い。

（７）　シンイ　紡錘形を呈し，長さ 15～45mm，中央の径 6～20mm，基部にしばしば木質の花柄を付ける。ほう葉は，通例，3 枚で，外面には毛がまばらにあって褐色～暗褐色を呈するか，又は密毛があって灰白色～淡黄褐色を呈し，内面は平滑で暗褐色を呈する。内部に 9 枚又は 12 枚の花被片があり，花被片は同形又は外側の 3 枚が小さい。雄ずいは 50～100 本あり，雌ずいも多数ある。質はもろい。特有のにおいがあり，味は辛くて，やや苦い。

必要に応じて，「シンイ」の確認試験を準用する。

（８）　ビャクゴウ　頂端の細まった長楕円形，ひ針形又は長三角形の舟形を呈し，半透明で長さ 1.3～6cm，幅 0.5～2.0cm である。外面は乳白色～淡黄褐色，ときに紫色を帯び，ほぼ平滑である。中央部はやや厚く，周辺部は薄くてわずかに波状，ときに内巻に曲がる。数条の縦に平行な維管束が，通例，透けて見える。質は堅いが折りやすく，折面は角質様で滑らかである。においがなく，わずかに酸味及び苦味がある。

表面を鏡検するとき，表皮細胞は長方形からほぼ正方形，気孔は類円形，気孔に接する細胞は多くは 4 個である。横切片を鏡検するとき，最外層は滑らかなクチクラで覆われた表皮細胞からなり，その下には円形から四角形の柔細胞が等しく分布し，さく状組織は認められない。葉肉の柔組織中には，りん片葉の向軸側から背軸側へ縦長に伸びる並列維管束が，ほぼ横一列に並ぶ。柔細胞に含まれるでんぷん粒は，通例，糊化している。

必要に応じて，「ビャクゴウ」の確認試験を準用する。

（９）　ビワヨウ　長楕円形～広ひ針形で，長さ 12～30cm，幅 4～9cm，先端はとがり，基部はくさび形で，短い葉柄を付け，辺縁には粗いきょ歯がある。ときに，短径 5～10mm，長径数 cm の短冊状に切裁されている。上面は緑色～緑褐色を呈し，下面は淡緑褐色で，淡褐色の綿毛を残存する。葉脈部は淡黄褐色を呈し，下面に突出している。わずかににおいがあり，味はほとんどない。

横切片を鏡検するとき，上面及び下面のクチクラは厚く，さく状組織はおおむね 4～5 層で，ところどころに葉緑粒を欠く大型の細胞を認める。主脈部では並立維管束は木部側

の基本組織の湾入によって一部切断されたほぼ環状を呈し，師部に接する繊維群を認める。葉肉中にはシュウ酸カルシウムの単晶及び集晶を認める。綿毛は単細胞性で湾曲し，太さ約 25μm，長さ 1.5mm に達する。

必要に応じて，「ビワヨウ」の確認試験を準用する。

乾燥減量　15%以下。

灰　　分　25%以下。

【 312 】　K113

成分及び分量 又は本質	日本薬局方	ソヨウ	1.5g
	〃	キジツ	1.5g
	〃	チンピ	2.0g
	〃	カッコン	2.0g
	〃	ハンゲ	3.0g
	〃	ブクリョウ	3.0g
	〃	ニンジン	1.5g
	〃	タイソウ	1.5g
	〃	カンキョウ	1.0g
	〃	モッコウ	1.5g
	〃	カンゾウ	1.0g
	〃	キキョウ	2.0g
	〃	ゼンコ	2.0g
		全　量	23.5g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。		
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。		
効能又は効果	体力虚弱で，胃腸が弱いものの次の諸症：感冒，せき		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	参蘇飲		

規格及び試験方法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品1包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　ソヨウ　縮んだ葉の細片で，両面とも帯褐紫色，あるいは上面は灰緑色～帯褐緑色で下面は帯褐紫色を呈する。茎を交じえるものは，その横断面は方形である。葉をルー

ペ視するとき，両面にまばらに毛を認め，特に葉脈上に多く，裏面には細かい腺毛を認める。もみ砕くとき，特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

必要に応じて，「ソヨウ」の確認試験を準用する。

（２）　キジツ　外面は濃緑褐色～褐色で，つやがなく，油室による多数のくぼんだ細点がある。切断面は淡灰褐色を呈し，内果皮を付ける部分は褐色を呈する。特異なにおいがあり，味は苦い。

必要に応じて，「キジツ」の確認試験を準用する。

（３）　チンピ　外面は黄赤色～暗黄褐色で，油室による多数の小さいくぼみがあり，内面は白色～淡灰黄褐色である。厚さ約 2mm で，質は軽くてもろい。芳香があり，味は苦くて，わずかに刺激性である。

必要に応じて，「チンピ」の確認試験を準用する。

（４）　カッコン　淡灰黄色～灰白色を呈し，繊維性でやや粉性である。味はわずかに甘い。横切片を鏡検するとき，師部には結晶細胞列を伴った繊維束，木部には道管及び木部繊維が著しく，柔組織を満たすでんぷん粒は長径 2～18μm，多くは 8～12μm の数面からなる多面体の単粒，まれに 2～3 個からなる複粒で，中央にへそ又は欠裂を認め，層紋がある。

（５）　ハンゲ　外面は白色～灰白黄色，上部には茎の跡がくぼみとなり，その周辺には根の跡がくぼんだ細点となっている。横断面は白色，粉性である。味は初めなく，やや粘液性で，後に強いえぐ味を残す。

横切片を鏡検するとき，主としてでんぷん粒を充満した柔組織からなり，わずかにシュウ酸カルシウムの束晶を含んだ粘液細胞がその間に認められる。でんぷん粒は主として 2～3 個の複粒で，通例，径 10～15μm，単粒は通例径 3～7μm である。束晶は長さ 25～150μm である。

（６）　ブクリョウ　白色又はわずかに淡赤色を帯びた白色で，質は堅いが砕きやすい。味はないがやや粘液ようである。

必要に応じて，「ブクリョウ」の確認試験を準用する。

（７）　ニンジン　外面は淡黄褐色～淡灰褐色を呈し，縦じわがあり，横断面は淡黄褐色を呈し，形成層の付近は褐色を呈する。特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後にやや苦い。

必要に応じて，「ニンジン」の確認試験を準用する。

（８）　タイソウ　外面は赤褐色であらいしわがあるか，又は暗灰赤色で細かいしわがあり，いずれもつやがある。外果皮は薄く革質で，中果皮は暗灰褐色を呈し，海綿ようで柔らかく粘着性があり，内果皮は極めて堅く，種子は偏平である。わずかに特異なにおいがあり，味は甘い。

（９）　カンキョウ　偏圧した不規則な塊状でしばしば分枝する。分枝した各部はやや湾曲した卵形又は長卵形を呈し，長さ 2～4cm，径 1～2cm である。外面は灰黄色～灰黄褐色で，しわ及び輪節がある。折面は褐色～暗褐色で透明感があり角質である。横切面をルーペ視するとき皮層と中心柱は区分され，全面に維管束が散在する。特異なにおいがあり，味は極めて辛い。

横切片を鏡検するとき，外側よりコルク層，皮層，内皮，中心柱が認められる。皮層と中心柱は一層の内皮によって区分される。皮層及び中心柱は柔組織からなり，繊維束で囲

まれた維管束が散在する。柔組織中には黄色の油様物質を含む油細胞が散在し，柔細胞中にはシュウ酸カルシウムの単晶が含まれ，でんぷんは糊化している。

必要に応じて，「カンキョウ」の確認試験を準用する。

（10）　モッコウ　外面は黄褐色～灰褐色で，あらい縦じわがある。横断面は黄褐色～暗褐色で，ルーペ視するとき，環状暗色の形成層が認められ，木部組織と放射組織が放射状の模様を呈し，ところどころに大きな裂け目と褐色の油室が散在している。特異なにおいがあり，味は苦い。

（11）　カンゾウ　外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現わす。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に 1～3 細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には 3～10 細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞中にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

（12）　キキョウ　外面は皮付きは灰褐色，皮去りは白色～淡褐色を呈し，繊維性でない。横切面をルーペ視するとき，皮部は木部よりやや薄く，ほとんど白色で，ところどころにすき間があり，形成層の付近はしばしば褐色を帯びる。木部は白色～淡褐色を呈し，その組織は皮部よりもやや密である。味は初めなく，後にえぐくて苦い。

必要に応じて，「キキョウ」の確認試験を準用する。

（13）　ゼンコ　1）Peucedanum praeruptorum Dunn 細長い倒円錐形～円柱形を呈し，下部はときに二股になる。長さ 3～15cm，根頭部の径は 0.8～1.8cm である。外面は淡褐色～暗褐色を呈し，根頭部には多数の輪節状のしわがあり，毛状を呈する葉柄の残基を付けるものもある。根にはやや深い縦じわ及び側根を切除した跡がある。横切面は淡褐色～類白色を呈する。質はもろい。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，最外層はコルク層からなり，一部のコルク細胞は内側の接線壁が肥厚する。その内側には厚角組織がある。皮部には多数の油道が散在し，空隙が認められる。師部の先端部には師部繊維が見られることがある。木部には道管が認められ，油道が散在する。柔組織中に認められるでんぷん粒は 2～10 数個の複粒である。

2）Angelica decursiva Franchet et Savatier　1）に似るが，根頭部に毛状を呈する葉柄の残茎を付けない。

横切片を鏡検するとき，1）に似るが，コルク細胞の細胞壁は肥厚せず，師部の先端部には師部繊維を認めない。また，木部中には油道が認められない。

必要に応じて，「ゼンコ」の確認試験を準用する。

乾燥減量　15%以下。

灰　　分　5%以下。

【 313 】　K114

成分及び分量又は本質	日本薬局方	マオウ	3.0～5.0g
	〃	キョウニン	4.0g
	〃	コウボク	3.0g
	〃	チンピ	2.5g
	〃	カンゾウ	2.0g
	〃	サイコ	2.0g
	〃	ソヨウ	1.5g
		全　　量	18.0～20.0g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。		
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。		
効能又は効果	体力中等度で，せき，喘鳴，息苦しさがあり，たんが少ないものの次の諸症：小児ぜんそく，気管支ぜんそく，気管支炎		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	神秘湯		

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は芳香性のにおいがある。

確認試験　本品1包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　マオウ　細い円柱状又はだ円柱を呈し，長さ3～10mm，径1～2mm，淡緑色～黄緑色である。表面に多数の平行する縦みぞがあり，節部には，長さ2～4mmの2枚のりん片状の葉が対生し，その基部は合着して筒状になっている。りん片状の葉の色は淡褐色～褐色である。茎の横断面をルーペ視するとき，円形～だ円形で，周囲部は灰緑色～黄緑色を呈し，中心部には赤緑色の物質が充満しているか，又は中空のところがある。味は渋くてわずかに苦く，やや麻ひ性である。

必要に応じて，「マオウ」の確認試験を準用する。

（２）　キョウニン　種皮は褐色で，表面にはすれて落ちやすい石細胞となった表皮細胞があって，粉をふいたようである。切断面は類白色である。味は苦く，油ようである。

表皮の表面を鏡検するとき，数個ずつ集合する石細胞はおおむね円形で，その細胞膜は均等に著しく厚くなり，径 60～90μm，側面視では鈍三角形で，細胞膜は先端部で著しく厚い。

必要に応じて，「キョウニン」の確認試験を準用する。

（３）　コウボク　外面は灰白色～灰褐色を呈し，内面は淡褐色～褐色，切断面は淡赤褐色を呈し，繊維性である。わずかに芳香があり，味は苦い。

横切片を鏡検するとき，コルク層は厚く，ほぼ等径性の石細胞が環状に内接する。一次皮部は狭く，内しょう部には繊維群が点在し，二次皮部の放射組織間には師部繊維群が階段状に並ぶ。油細胞の多数は一次皮部に，少数は二次皮部に散在し，狭い放射組織内にも認められることがある。

必要に応じて，「コウボク」の確認試験を準用する。

（４）　チンピ　外面は黄赤色～暗黄褐色で，油室による多数の小さいくぼみがあり，内面は白色～淡灰黄褐色である。厚さ約 2mm で，質は軽くてもろい。芳香があり，味は苦くて，わずかに刺激性である。

必要に応じて，「チンピ」の確認試験を準用する。

（５）　カンゾウ　外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現わす。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に 1～3 細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には 3～10 細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞中にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

（６）　サイコ　外面は灰褐色～褐色で，深いしわがあるものがあり，横断面では，皮部は褐色，木部は淡褐色を呈する。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，皮部にはしばしば接線方向に長い裂け目があり，皮部の厚さは半径の 1/3～1/2 で，径 15～35μm の胞間性離生油道がやや多数散在し，木部には道管が放射状若しくはほぼ階段状に配列し，ところどころに繊維群があり，根頭部の髄には皮部と同様の油道がある。柔細胞中にはでんぷん粒を満たし，また油滴を認める。

必要に応じて，「サイコ」の確認試験を準用する。

（７）　ソヨウ　縮んだ葉の細片で，両面とも帯褐紫色，あるいは上面は灰緑色～帯褐緑色で下面は帯褐紫色を呈する。茎を交じえるものは，その横断面は方形である。葉をルーペ視するとき，両面にまばらに毛を認め，特に葉脈上に多く，裏面には細かい腺毛を認める。もみ砕くとき，特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

必要に応じて，「ソヨウ」の確認試験を準用する。

乾燥減量　10%以下。

灰　　分　10%以下。

【 314 】　K115

成分及び分量又は本質	日本薬局方	ニンジン	3.0g
	〃	サンヤク	3.0g
	〃	ビャクジュツ	4.0g
	〃	ブクリョウ	4.0g
	〃	ヨクイニン	8.0g
	〃	ヘンズ	3.0g
	〃	レンニク	3.0g
	〃	キキョウ	2.5g
	〃	シュクシャ	2.0g
	〃	カンゾウ	0.8～1.5g
		全　量	33.3～34.0g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。		
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，熱いうちに煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。 本剤は必ず1日分ずつ煎じ，数日分をまとめて煎じないこと。		
効能又は効果	体力虚弱で，胃腸が弱く，痩せて顔色が悪く，食欲がなく下痢が続く傾向があるものの次の諸症：食欲不振，慢性下痢，病後の体力低下，疲労倦怠，消化不良，慢性胃腸炎		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	参苓白朮散料		

規格及び試験方法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品1包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　ニンジン　外面は淡黄褐色～淡灰褐色を呈し，縦じわがあり，横断面は淡黄褐色を呈し，形成層の付近は褐色を呈する。特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後にやや苦い。

必要に応じて，「ニンジン」の確認試験を準用する。

（２）　サンヤク　類白色～帯黄白色で，折面は類白色を呈し平らで，粉質である。ほとんどにおい及び味はない。

必要に応じて，「サンヤク」の確認試験を準用する。

（３）　ビャクジュツ　外面は淡灰黄色～淡黄白色で，ところどころ灰褐色を呈する。横切面には淡黄褐色～褐色の分泌物による細点がある。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，皮部の柔組織中にはしばしば師部の外側に接して繊維束があり，放射組織の末端部には淡褐色～褐色の内容物を含む油室がある。木部には大きい髄を囲んで放射状に配列した短径の道管とそれを囲む著しい繊維束がある。髄及び放射組織中には皮部と同様な油室があり，柔組織中にはイヌリンの結晶及びシュウ酸カルシウムの小針晶を含む。

必要に応じて，「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。

（４）　ブクリョウ　白色又はわずかに淡赤色を帯びた白色である。外層が残存するものは暗褐色～暗赤褐色で，きめがあらく，裂け目がある。質は堅いが砕きやすい。味はないがやや粘液ようである。

必要に応じて，「ブクリョウ」の確認試験を準用する。

（５）　ヨクイニン　卵形又は広卵形を呈し，頂端及び基部はややくぼみ，長さ約 6mm，幅約 5mm，背面は丸くふくれ，腹面に中央には縦に深いみぞがある。背面はほぼ白色，粉質で，腹面のみぞ及びその他の表面のところどころに褐色膜質の果皮及び種皮が付いている。横断面をルーペ視するとき，背面は白色の内乳からなり，腹面のくぼみには淡黄色の胚盤がある。質は堅い。味はわずかに甘く，歯間に粘着する。

必要に応じて，「ヨクイニン」の確認試験を準用する。

（６）　ヘンズ　偏楕円形～偏卵円形を呈し，長さ 9～14mm，幅 6～10mm，厚さ 4～7mm である。外面は淡黄白色～淡黄色を呈し，平滑でややつやがある。一辺に隆起する白色の半月形の種枕がある。質は堅い。においがほとんどなく，わずかに甘味と酸味がある。

横切片を鏡検するとき，種皮の最外層はクチクラで覆われた 1 細胞層のさく状の表皮細胞からなる。表皮下は 1 細胞層の砂時計状の厚壁化した細胞からなり，その内側に柔組織があり，その最内部は退廃化する。種皮の内側には子葉がある。子葉の最外層は 1 細胞層の表皮細胞がとりまき，その内部は主として柔組織からなり，アリューロン粒，油滴を含み，でんぷん粒を認めることがある。

必要に応じて，「ヘンズ」の確認試験を準用する。

（７）　レンニク　卵形体～楕円体で，一端には乳頭状の突起があり，その周辺はへこんでいる。長さ 1.0～1.7cm，幅 0.5～1.2cm，外面は淡赤褐色～淡黄褐色を呈し，突起部は暗赤褐色を呈する。内果皮はつやがなく，剥離しにくい。内部は黄白色の胚乳からなり，中央部にある胚は緑色である。ほとんどにおいがなく，味はわずかに甘く，やや油様で，胚は極めて苦い。

中央部の横切片を鏡検するとき，内果皮は柔組織からなり，ときに脱落して見られないことがある。種皮は表皮と圧縮された柔細胞からなる柔組織で形成され，柔組織中に維管束が散在する。内乳は表皮と柔組織で形成される。残存する内果皮中には，シュウ酸カル

シウムの集晶及びタンニン様物質を含み，種皮の柔細胞中にはタンニン様物質を含み，内乳の柔組織中にはでんぷん粒を含む。

必要に応じて，「レンニク」の確認試験を準用する。

（８）　キキョウ　外面は皮付きは灰褐色，皮去りは白色～淡褐色を呈し，繊維性でない。横切面をルーペ視するとき，皮部は木部よりやや薄く，ほとんど白色で，ところどころにすき間があり，形成層の付近はしばしば褐色を帯びる。皮部の厚さは木部の径よりやや薄く，ほとんど白色で，ところどころすき間があり，木部は白色～淡褐色を呈し，その組織は皮部よりもやや密である。味は初めなく，後にえぐくて苦い。

必要に応じて，「キキョウ」の確認試験を準用する。

（９）　シュクシャ　ほぼ球形又はだ円形を呈し，長さ 1～1.5cm，径 0.8～1cm，外面は灰褐色～暗褐色を呈し，石灰を散布して乾燥したものは白粉を付けている。種子塊は薄い膜で三部に分かれ，各部には仮種皮によって接合する 10～20 粒の種子がある。種子は多角形の粒状で，長さ 0.3～0.5cm，径約 0.3cm，外面には暗褐色で多数の細かい突起があり，質は堅い。種子を縫線に沿って縦断し，ルーペ視するとき，切面は細長く，へそは深くくぼみ，合点はややくぼんでいる。外乳は白色で，淡黄色の内乳及び胚を包み，胚は細長い。かめば特異な芳香があり，味は辛い。

（10）　カンゾウ　外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現わす。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に 1～3 細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には 3～10 細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞中にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

乾燥減量　15％以下。

灰　　分　4％以下。

【 315 】　K115—①

成分及び分量 又は本質	日本薬局方　ニンジン　0.53g 〃　サンヤク　0.53g 〃　ビャクジュツ　0.71g 〃　ブクリョウ　0.71g 〃　ヨクイニン　1.41g 〃　ヘンズ　0.53g 〃　レンニク　0.53g 〃　キキョウ　0.44g 〃　シュクシャ　0.35g 〃　カンゾウ　0.26g 全　量　6.0g
製造方法	以上の生薬をそれぞれ末とし，散剤の製法により製する。ただし，分包散剤とする。
用法及び用量	1回量を次のとおりとし，1日3回，食前又は空腹時に服用する。 大人（15才以上）1包2.0g，15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4を服用する。
効能又は効果	体力虚弱で，胃腸が弱く，痩せて顔色が悪く，食欲がなく下痢が続く傾向があるものの次の諸症：食欲不振，慢性下痢，病後の体力低下，疲労倦怠，消化不良，慢性胃腸炎
貯蔵方法及び 有効期間	密閉容器
規格及び試験方法	別記のとおり。
備考	参苓白朮散

規格及び試験方法

性　状　本品は淡黄白色～淡黄褐色で，特異なにおいがある。

確認試験

（1）　ニンジン　本品の粉末5gにメタノール20mLを加え，還流冷却器を付けて水浴上で15分間穏やかに煮沸し，冷後，ろ過し，ろ液を試料溶液とする。別に薄層クロマトグラフ用ジンセノサイドRg_1 1mgをメタノール1mLに溶かし，標準溶液とする。これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液20μL及び標準溶液10μLを薄層クロマトグラフ用シリカゲルを用いて調製した薄層板にスポットする。次に

クロロホルム・メタノール・水混液（13：7：2）の下層を展開溶媒として約 10cm 展開した後，薄層板を風乾する。これに希硫酸を均等に噴霧し，110℃で 10 分間加熱するとき，試料溶液から得た数個のスポットのうち 1 個のスポットは，標準溶液から得た赤紫色のスポットと色調及び *Rf* 値が等しい。

（２）　ビャクジュツ　本品の粉末 5g にヘキサン 10mL を加え，還流冷却器を付け，水浴上で 5 分間加熱し，冷後，ろ過し，ろ液を試料溶液とする。別に「ビャクジュツ」の粉末 1g をとり，試料溶液と同様に操作して対照溶液とする。

これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び対照溶液 10μL ずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲルを用いて調製した薄層板にスポットする。次にヘキサン・ベンゼン・酢酸エチル混液（14：3：3）を展開溶媒として約 10cm 展開した後，薄層板を風乾する。

これに *p*－ジメチルアミノベンズアルデヒド試液を均等に噴霧し，110℃で 10 分間加熱するとき，*Rf* 値約 0.80 付近に紫色のスポットを認める。

（３）　シュクシャ　本品の粉末に，薄めたグリセリン（1→2）又は抱水クロラール 50g を水 15mL とグリセリン 10mL の混液に溶かした液を滴加して鏡検するとき，多角形で膜の厚い石細胞群の破片を認める。

（４）　カンゾウ　本品の粉末 5g にエタノール（95）・水混液（7：3）10mL を加え，水浴上で 5 分間振り混ぜながら加熱し，冷後，ろ過し，ろ液を試料溶液とする。別に薄層クロマトグラフ用グリチルリチン酸 5mg をエタノール（95）・水混液（7：3）1mL に溶かし，標準溶液とする。これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液 10μL 及び標準溶液 4μL を薄層クロマトグラフ用シリカゲル（蛍光剤入り）を用いて調製した薄層板にスポットする。次に 1－ブタノール・水・酢酸（100）混液（7：2：1）を展開溶媒として約 10cm 展開した後，薄層板を風乾する。これに紫外線（主波長 254nm）を照射するとき，試料溶液から得た数個のスポットのうち 1 個のスポットは，標準溶液から得た暗紫色のスポットと色調及び *Rf* 値が等しい。

【 316 】　K116

成分及び分量又は本質	日本薬局方	サイコ	6.0g
	〃	ハンゲ	6.0g
	〃	オウゴン	3.0g
	〃	マクリ	3.0g
	〃	バクモンドウ	3.0g
	〃	ニンジン	3.0g
	〃	カンゾウ	2.0g
	〃	ショウキョウ	1.0g
		全　　量	27.0g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。		
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。		
効能又は効果	体力中等度で，ときに脇腹(腹)からみぞおちあたりにかけて苦しく，食欲不振や口の苦味があり，舌に白苔がつくものの次の症状：回虫の駆除		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	清肌安蛔湯		

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品1包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　サイコ　外面は灰褐色～褐色で，深いしわがあるものがあり，横断面では，皮部は褐色，木部は淡褐色を呈する。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，皮部にはしばしば接線方向に長い裂け目があり，皮部の厚さは半径の1/3～1/2で，径15～35μmの胞間性離生油道がやや多数散在し，木部には道管が放射状若しくはほぼ階段状に配列し，ところどころに繊維群があり，根頭部の髄には皮部と同様の油道がある。柔細胞中にはでんぷん粒を満たし，また油滴を認める。

必要に応じて，「サイコ」の確認試験を準用する。

（２）　ハンゲ　外面は白色～灰白黄色，上部には茎の跡がくぼみとなり，その周辺には根の跡がくぼんだ細点となっている。横断面は白色，粉性である。味は初めなく，やや粘液性で，後に強いえぐ味を残す。

横切片を鏡検するとき，主としてでんぷん粒を充満した柔組織からなり，わずかにシュウ酸カルシウムの束晶を含んだ粘液細胞がその間に認められる。でんぷん粒は主として 2～3 個の複粒で，通例，径 10～15μm，単粒は通例径 3～7μm である。束晶は長さ 25～150μm である。

（３）　オウゴン　外面は黄褐色～暗褐色を呈し，切断面は黄色～帯褐黄色を呈し，縦に繊維性のすじが見られる。味はわずかに苦い。

必要に応じて，「オウゴン」の確認試験を準用する。

（４）　マクリ　外面は暗赤紫色，暗灰赤色～灰褐色，径 2～3mm のまるいひも状を呈し，短い毛のような小枝でおおわれ，不規則な二また状に数回分枝する。しばしば石灰そう類や小形の海そう類を付けている。海そう臭があり，味はわずかに塩辛く不快である。

必要に応じて，「マクリ」の確認試験を準用する。

（５）　バクモンドウ　紡錘形を呈し，長さ 10～25mm，径 3～5mm，一端はややとがり，他端はやや丸みをもち，外面は淡黄色～淡黄褐色で，大小の縦じわがある。皮層は柔軟性でもろく，中心柱は強じんで折りにくい。皮層の折面は淡黄褐色を呈し，やや半透明で粘着性がある。味はわずかに甘く，粘着性である。

（６）　ニンジン　外面は淡黄褐色～淡灰褐色を呈し，縦じわがあり，横断面は淡黄褐色を呈し，形成層の付近は褐色を呈する。特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後にやや苦い。

必要に応じて，「ニンジン」の確認試験を準用する。

（７）　カンゾウ　外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現わす。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に 1～3 細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には 3～10 細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞中にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

（８）　ショウキョウ　淡灰黄色の周皮を付けたままか，又はその一部をはぎとってあり，表面は灰白色～淡灰褐色で，しばしば白粉を付けている。横断面は繊維性，粉性で，淡帯黄褐色を呈し，皮層と中心柱とに分かれる。横断面をルーペ視するとき，その全面に維管束及び分泌物が褐色の細点として散在している。特異なにおいがあり，味は極めて辛い。

乾燥減量　15％以下。

灰　　分　15％以下。

【 317 】　K117

成分及び分量又は本質	日本薬局方	ニンジン	3.0g
	〃	ビャクジュツ	3.0g
	〃	バクモンドウ	3.0g
	〃	トウキ	3.0g
	〃	オウギ	3.0g
	〃	チンピ	2.0g
	〃	ゴミシ	2.0g
	〃	オウバク	2.0g
	〃	カンゾウ	1.0～2.0g
		全　　量	22.0～23.0g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。		
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。		
効能又は効果	体力虚弱で，疲れやすく，食欲不振，ときに口渇などがあるものの次の諸症：暑気あたり，暑さによる食欲不振・下痢，夏痩せ，全身倦怠，慢性疾患による体力低下・食欲不振		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	清暑益気湯		

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品1包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　ニンジン　外面は淡黄褐色～淡灰褐色を呈し，縦じわがあり，横断面は淡黄褐色を呈し，形成層の付近は褐色を呈する。特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後にやや苦い。

必要に応じて，「ニンジン」の確認試験を準用する。

（２）　ビャクジュツ　外面は淡灰黄色～淡黄白色で，ところどころ灰褐色を呈し，横切面には淡黄褐色～褐色の分泌物による細点がある。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，皮部の柔組織中にはしばしば師管の外側に接して繊維束があり，放射組織の末端部には淡褐色～褐色の内容物を含む油室がある。木部には大きい髄を囲んで放射状に配列した短径の道管とそれを囲む著しい繊維束がある。髄及び放射組織中には皮部と同様な油室があり，柔組織中にはイヌリンの小球晶及びシュウ酸カルシウムの針晶を含む。

必要に応じて，「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。

（３）　バクモンドウ　紡錘形を呈し，長さ 10～25mm，径 3～5mm，一端はややとがり，他端はやや丸みをもち，外面は淡黄色～淡黄褐色で，大小の縦じわがある。皮層は柔軟性でもろく，中心柱は強じんで折りにくい。皮層の折面は淡黄褐色を呈し，やや半透明で粘着性がある。味はわずかに甘く，粘着性である。

（４）　トウキ　外面は暗褐色～赤褐色で，縦じわがあり，切断面は淡黄色～黄褐色を呈する。特異なにおいがあり，味はわずかに甘く，後にやや辛い。

横切片を鏡検するとき，コルク層は 4～10 層からなり，その内側に数層の厚角組織が続いている。皮部には分泌細胞に囲まれた多数の樹脂道並びにしばしば大きなすき間がある。形成層は長方形に偏圧された数層の細胞からなり，明らかに皮部と木部とを区別する。木部では多数の道管と放射組織とが交互に放射状に配列し，その外方の道管は単独又は数個集まってやや密に配列してくさび状をなすが，中心部付近の道管は極めてまばらに存在する。でんぷん粒は径 19μm 以下，まれに 2～5 個の複粒があり，複粒の径は 25μm に達し，しばしばのり化している。

（５）　オウギ　外面は淡灰黄色～淡褐黄色で，不規則なあらい縦じわがあり，折面は繊維性である。横断面をルーペ視するとき，最外層には周皮があり，皮部は淡黄白色，木部は淡黄色，形成層付近はやや褐色を帯びる。木部から皮部にわたって白色の放射組織が認められる。太いものではしばしば多数の放射状の裂け目となっている。わずかに特異なにおいがあり，味は甘い。

（６）　チンピ　外面は黄赤色～暗黄褐色で，油室による多数の小さいくぼみがあり，内面は白色～淡灰黄褐色である。厚さ約 2mm で，質は軽くてもろい。芳香があり，味は苦くて，わずかに刺激性である。

必要に応じて，「チンピ」の確認試験を準用する。

（７）　ゴミシ　暗赤色～黒褐色を呈し，表面にはしわがあり，またしばしば白い粉を付ける。果肉を除くとじん臓形の種子 1～2 個を認め，その外種皮は黄褐色～暗赤褐色を呈し，つやがあり，堅くてもろい。外種皮はたやすくはがれるが，内種皮は胚乳に密着し，背面に明らかな縫線を認める。酸味があり，後に渋くて苦い。

（８）　オウバク　外面は灰黄褐色～灰褐色で，内面は黄色～暗黄褐色で，細かい縦線がある。横断面は鮮黄色でやや繊維性である。横切面をルーペ視するとき，皮部外層は黄色で薄く，石細胞が黄褐色の点状に分布する。皮部内層は厚く，一次放射組織は外方に向かうにしたがい幅が広がり，それらの一次放射組織の間に，多くの二次放射組織が集まってほぼ三角形の師部を形成し，この組織に褐色を呈する師部繊維束が層積して接線方向に並び，放射組織と交錯して格子状を呈する。味は極めて苦く，粘液性で，だ液を黄色に染める。

必要に応じて，「オウバク」の確認試験を準用する。

（９）　カンゾウ　外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現わす。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に 1～3 細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には 3～10 細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞中にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

乾燥減量　15%以下。

灰　　分　5%以下。

【 318 】　K118

成分及び分量 又は本質	日本薬局方	オウゴン	3.0g
	〃	バクモンドウ	2.5g
	〃	ビャクシ	2.5g
	〃	ボウフウ	2.5g
	〃	ソウジュツ	2.5g
	〃	トウキ	2.5g
	〃	センキュウ	2.5g
	〃	キョウカツ	2.5g
	〃	ドクカツ	2.5g
	局外生規	マンケイシ	1.5g
	日本薬局方	キクカ	1.5g
	〃	サイシン	1.0g
	〃	ショウキョウ	1.0g
	〃	カンゾウ	1.0g
		全　量	29.0g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。		
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。		
効能又は効果	体力に関わらず使用でき，慢性化した痛みのあるものの次の諸症：顔面痛，頭痛		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	清上蠲痛湯		

規格及び試験方法

性　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品1包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　オウゴン　外面は黄褐色～暗褐色を呈し，切断面は黄色～帯褐黄色を呈し，縦に繊維性のすじが見られる。味はわずかに苦い。

必要に応じて，「オウゴン」の確認試験を準用する。

（2）　バクモンドウ　紡錘形を呈し，長さ 10～25mm，径 3～5mm，一端はややとがり，他端はやや丸みをもち，外面は淡黄色～淡黄褐色で，大小の縦じわがある。皮層は柔軟性でもろく，中心柱は強じんで折りにくい。皮層の折面は淡黄褐色を呈し，やや半透明で粘着性がある。味はわずかに甘く，粘着性である。

（3）　ビャクシ　外面は灰褐色～暗褐色を呈し，縦じわがあり，横断面の周辺は灰白色で空げきが多く，中央部は暗褐色である。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

必要に応じて，「ビャクシ」の確認試験を準用する。

（4）　ボウフウ　外面は淡褐色で，多数の縦じわがある。横断面の周辺は灰褐色で，空げきが多く，中央は円形に黄色を呈する。味はわずかに甘い。

（5）　ソウジュツ　外面は暗灰褐色～暗黄褐色である。横断面は淡褐色～赤褐色の分泌物による細点を認める。しばしば白色綿状の結晶を析出する。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，皮部の柔組織中には，通例，繊維束を欠き，放射組織の末端部には淡褐色～黄褐色の内容物を含む油室がある。木部は形成層に接して道管を囲んだ繊維束が放射状に配列し，髄及び放射組織中には皮部と同様な油室がある。柔細胞中にはイヌリンの球晶及びシュウ酸カルシウムの針晶を含む。

（6）　トウキ　外面は暗褐色～赤褐色で，縦じわがあり，切断面は淡黄色～黄褐色を呈する。特異なにおいがあり，味はわずかに甘く，後にやや辛い。

横切片を鏡検するとき，コルク層は 4～10 層からなり，その内側に数層の厚角組織が続いている。皮部には分泌細胞に囲まれた多数の樹脂道並びにしばしば大きなすき間がある。形成層は長方形に偏圧された数層の細胞からなり，明らかに皮部と木部とを区別する。木部では多数の道管と放射組織とが交互に放射状に配列し，その外方の道管は単独又は数個集まってやや密に配列してくさび状をなすが，中心部付近の道管は極めてまばらに存在する。でんぷん粒は径 19μm 以下，まれに 2～5 個の複粒があり，複粒の径は 25μm に達し，しばしばのり化している。

（7）　センキュウ　外面は灰褐色～暗褐色で，切断面は灰白色～灰褐色，半透明で，ときにはうつろがある。質は密で堅い。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，皮部及び髄には油道が散在する。木部には厚膜で木化した木部繊維が大小不同の群をなして存在する。でんぷん粒は，通例，のり化していて，まれに径 5～25μm のでんぷん粒を認めることがある。シュウ酸カルシウム結晶は認めない。

（8）　キョウカツ　やや湾曲した円柱形～円錐形を呈し，長さ 3～10cm，径 5～20mm，ときに根茎は分枝する。外面は黄褐色～暗褐色である。根茎はその頂端にやや円形にくぼんだ茎の跡があり，ときには短い茎の残基を付け，外面には隆起した節があり，節間は，通例，短い。節にはいぼ状突起となった根の跡がある。根の外面には粗い縦じわ及びいぼ状突起となった側根の跡がある。質は軽くややもろくて折りやすい。横切面には多くの放射状の裂け目があり，皮部は黄褐色～褐色，木部は淡黄色～淡灰黄色，髄は灰白色～淡褐色を呈し，ルーペ視するとき，皮部及び髄には油道による褐色の細点を認める。特異なにおいがあり，味は初めわずかに酸味があり，後にやや辛く，わずかに麻痺性である。

横切片を鏡検するとき，最外層は数層～十数層のコルク層からなり，その内側に数層の厚角組織がある。皮層には多数の油道があり，大きいものでは径が 300μm に達する。また皮層には放射状に大きなすき間がある。髄にも油道があり，大きいものでは径が 500μm に達する。柔組織中には単粒及び 2～3 個の複粒のでんぷん粒を含む。

必要に応じて，「キョウカツ」の確認試験を準用する。

（９）　ドクカツ　湾曲した不整円柱状～塊状を呈する根茎で，ときに短い根を付けることがある。長さ 4～12cm，径 2.5～7cm，しばしば縦割又は横切されている。上部には茎の跡による大きなくぼみが 1～数個あるか，又は径 1.5～2.5cm の茎の短い残基を 1 個付けるものがある。外面は暗褐色～黄褐色を呈し，縦じわがあり，根の基部又はその跡がある。横切面は灰黄褐色～黄褐色を呈し，油道による褐色の細点が散在し，多くの裂け目がある。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，最外層はコルク層で，コルク石細胞からなる層がある。これに続き数層の厚角組織が認められる。維管束と放射組織は明瞭で，髄は広い。師部の外側に師部繊維群が認められることがある。皮部及び髄に離生細胞間隙からなる油道が認められる。木部は道管，木部繊維及び厚壁化することがある木部柔組織からなる。髄中には維管束が散在する。また，柔細胞にはシュウ酸カルシウムの集晶が認められる。でんぷん粒は，単粒又は 2～6 個の複粒である。

必要に応じて，「ドクカツ」の確認試験を準用する。

（10）　マンケイシ　球形～倒卵形体で，径 3～7mm，外面は灰黒色～灰褐色でつやがない。下半は通例灰白色の薄いがくで覆われる。果実の内部は 4 室に分かれ，各室に 1 個の種子がある。味はわずかに辛い。

必要に応じて，局外生規「マンケイシ」の確認試験を準用する。

（11）　キクカ　径 15～40mm の頭花で，総ほうは 3～4 列の総ほう片からなり，総ほう外片は線形～ひ針形，内片は狭卵形～卵形を呈する。舌状花は多数で，類白色～黄色，管状花は少数で淡黄褐色を呈し，ときに退化して欠くことがある。総ほうの外面は緑褐色～褐色を呈する。質は軽く，砕きやすい。特有のにおいがあり，味はわずかに苦い。

必要に応じて，「キクカ」の確認試験を準用する。

（12）　サイシン　根の外面は淡褐色で，径約 1mm，切断面は黄白色である。根茎は不整に湾曲し外面は暗褐色を呈する。特異なにおいがあり，味は辛く舌をやや麻ひする。

（13）　ショウキョウ　淡灰黄色の周皮を付けたままか，又はその一部をはぎとってあり，表面は灰白色～淡灰褐色で，しばしば白粉を付けている。横断面は繊維性，粉性で，淡帯黄褐色を呈し，皮層と中心柱とに分かれる。横断面をルーペ視するとき，その全面に維管束及び分泌物が褐色の細点として散在している。特異なにおいがあり，味は極めて辛い。

（14）　カンゾウ　外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現わす。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に 1～3 細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には 3～10 細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞中

にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

乾燥減量　15%以下。

灰　　分　6%以下。

【 319 】　K119

成分及び分量又は本質	日本薬局方	ケイガイ	1.0g
	〃	オウレン	1.0g
	〃	ハッカ	1.0g
	〃	キジツ	1.0g
	〃	カンゾウ	1.0g
	〃	サンシシ	1.5～2.5g
	〃	センキュウ	2.5g
	〃	オウゴン	2.5g
	〃	レンギョウ	2.5g
	〃	ビャクシ	2.5g
	〃	キキョウ	2.5g
	〃	ボウフウ	2.5g
		全　　量	21.5～22.5g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。		
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。		
効能又は効果	体力中等度以上で，赤ら顔でときにのぼせがあるものの次の諸症：にきび，顔面・頭部の湿疹・皮膚炎，あかはな（酒さ）		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	清上防風湯		

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品1包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　ケイガイ　茎，輪散花序に集合したがく筒，これら及びときには葉の砕片，種子ようの微粒の分果からなる。茎は方形で外面はおおむね紫褐色，径約1mmである。がく

筒は淡褐色～黄緑色で長さ 2～3mm，ルーペ視するとき，先端はきょ歯辺，筒部には数条の線があり，唇形花又は果実を含み，茎とともに類白色の短毛を認める。分果は黄褐色～黒色，両端の細いだ円体で長さ 1～1.5mm，径は長さのほぼ 1/2 である。特異な芳香があり，口に含むとわずかに清涼感がある。

必要に応じて，「ケイガイ」の確認試験を準用する。

（２） オウレン 根茎の径は 2～7mm で，外面は灰黄褐色～褐色を呈し，輪節及び多数の根の基部を認め，横断面はやや繊維性で，コルク層は淡灰褐色，皮部は黄褐色，木部は黄色，髄は黄褐色である。味は極めて苦く，残留性で，だ液を黄色に染める。

横切片を鏡検するとき，コルク層は薄膜のコルク細胞からなり，皮部柔組織中にはコルク層に近い部位に石細胞群，形成層に近い部位に黄色の師部繊維の認められるものが多い。木部は主として道管，仮道管，木部繊維からなり，放射組織は明らかで，髄は大きく，髄中には石細胞あるいは厚膜木化した細胞を伴った石細胞を認めることがある。柔細胞には細かいでんぷん粒を含むが，結晶を含まない。

必要に応じて，「オウレン」の確認試験を準用する。

（３） ハッカ 上面は淡褐黄色～淡緑黄色，下面は淡緑色～淡緑黄色である。葉をルーペ視するとき，両面に毛，腺毛及び腺りんをまばらに認め，腺毛及び腺りんは下面に多い。特異な芳香があり，口に含むと清涼感がある。

必要に応じて，「ハッカ」の確認試験を準用する。

（４） キジツ 外面は濃緑褐色～褐色で，つやがなく，油室による多数のくぼんだ細点がある。切断面は淡灰褐色を呈し，内果皮を付ける部分は褐色を呈する。特異なにおいがあり，味は苦い。

必要に応じて，「キジツ」の確認試験を準用する。

（５） カンゾウ 外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現わす。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に 1～3 細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には 3～10 細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞中にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

（６） サンシシ 果皮は薄く砕きやすく，その外面は赤褐色，黄褐色又は黒褐色を呈し，内面は黄褐色を呈し，平らでつやがある。果実の内部は 2 室に分かれ，黄赤色～暗赤色の果肉中に黒褐色又は黄赤色で長径約 5mm の偏平な種子の団塊を含む。質は軽い。特異なにおいがあり，味は苦い。

必要に応じて，「サンシシ」の確認試験を準用する。

（７） センキュウ 外面は灰褐色～暗褐色で，切断面は灰白色～灰褐色，半透明で，ときにはうつろがある。質は密で堅い。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，皮部及び髄には油道が散在する。木部には厚膜で木化した木部繊維が大小不同の群をなして存在する。でんぷん粒は，通例，のり化していて，まれに径 5～25μm のでんぷん粒を認めることがある。シュウ酸カルシウム結晶は認めない。

（８）　オウゴン　外面は黄褐色～暗褐色を呈し，切断面は黄色～帯褐黄色を呈し，縦に繊維性のすじが見られる。味はわずかに苦い。

必要に応じて，「オウゴン」の確認試験を準用する。

（９）　レンギョウ　外面は淡褐色～暗褐色を呈し，淡灰色の小隆起点が散在し，内面は黄褐色である。特異な芳香があり，味はわずかに収れん性である。

必要に応じて，「レンギョウ」の確認試験を準用する。

（10）　ビャクシ　外面は灰褐色～暗褐色を呈し，縦じわがあり，横断面の周辺は灰白色で空げきが多く，中央部は暗褐色である。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

必要に応じて，「ビャクシ」の確認試験を準用する。

（11）　キキョウ　外面は皮付きは灰褐色，皮去りは白色～淡褐色を呈し，繊維性でない。横切面をルーペ視するとき，皮部は木部よりやや薄く，ほとんど白色で，ところどころにすき間があり，形成層の付近はしばしば褐色を帯びる。木部は白色～淡褐色を呈し，その組織は皮部よりもやや密である。味は初めなく，後にえぐくて苦い。

必要に応じて，「キキョウ」の確認試験を準用する。

（12）　ボウフウ　外面は淡褐色で，多数の縦じわがある。横断面の周辺は灰褐色で，空げきが多く，中央は円形に黄色を呈する。味はわずかに甘い。

乾燥減量　15％以下。

灰　　分　5％以下。

【 320 】　K120

成分及び分量 又は本質	日本薬局方	バクモンドウ	4.0g
	〃	ブクリョウ	4.0g
	〃	ニンジン	3.0g
	〃	シャゼンシ	3.0g
	〃	オウゴン	3.0g
	〃	オウギ	2.0g
	〃	カンゾウ	1.5g
	〃	レンニク	4.0g
	〃	ジコッピ	2.0g
		全　量	26.5g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。		
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。		
効能又は効果	体力中等度以下で，胃腸が弱く，全身倦怠感があり，口や舌が乾き，尿が出しぶるものの次の諸症：残尿感，頻尿，排尿痛，尿のにごり，排尿困難，こしけ（おりもの）		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	清心蓮子飲		

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品1包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　バクモンドウ　紡錘形を呈し，長さ10～25mm，径3～5mm，一端はややとがり，他端はやや丸みをもち，外面は淡黄色～淡黄褐色で，大小の縦じわがある。皮層は柔軟性でもろく，中心柱は強じんで折りにくい。皮層の折面は淡黄褐色を呈し，やや半透明で粘着性がある。味はわずかに甘く，粘着性である。

（２）　ブクリョウ　白色又はわずかに淡赤色を帯びた白色で，質は堅いが砕きやすい。味はないがやや粘液ようである。

必要に応じて，「ブクリョウ」の確認試験を準用する。

（３）　ニンジン　外面は淡黄褐色～淡灰褐色を呈し，縦じわがあり，横断面は淡黄褐色を呈し，形成層の付近は褐色を呈する。特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後にやや苦い。

必要に応じて，「ニンジン」の確認試験を準用する。

（４）　シャゼンシ　長さ 2～5mm，幅 0.7～1mm，厚さ 0.3～0.5mm の偏だ円体で，つやのある褐色～黄褐色を呈する。ルーペ視するとき，ほぼ平滑で背面は弓状に隆起するが，腹面はややくぼんでいる。珠孔及び縫線は認められない。味はわずかに苦く，粘液性である。

横切片を鏡検するとき，種皮は粘液を含む表皮，栄養層及びほぼ等径性の細胞からなる色素層の 3 層からなり，その内部には種皮より厚い内乳が 2 枚の子葉を包んでいる。

必要に応じて，「シャゼンシ」の確認試験を準用する。

（５）　オウゴン　外面は黄褐色～暗褐色を呈し，切断面は黄色～帯褐黄色を呈し，縦に繊維性のすじが見られる。味はわずかに苦い。

必要に応じて，「オウゴン」の確認試験を準用する。

（６）　オウギ　外面は淡灰黄色～淡褐黄色で，不規則なあらい縦じわがあり，折面は繊維性である。横断面をルーペ視するとき，最外層には周皮があり，皮部は淡黄白色，木部は淡黄色，形成層付近はやや褐色を帯びる。木部から皮部にわたって白色の放射組織が認められる。太いものではしばしば多数の放射状の裂け目となっている。わずかに特異なにおいがあり，味は甘い。

（７）　カンゾウ　外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現わす。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に 1～3 細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には 3～10 細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞中にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

（８）　レンニク　卵形体～楕円体で，一端には乳頭状の突起があり，その周辺はへこんでいる。長さ 1.0～1.7cm，幅 0.5～1.2cm，外面は淡赤褐色～淡黄褐色を呈し，突起部は暗赤褐色を呈する。内果皮はつやがなく，剥離しにくい。内部は黄白色の胚乳からなり，中央部にある胚は緑色である。ほとんどにおいがなく，味はわずかに甘く，やや油様で，胚は極めて苦い。

中央部の横切片を鏡検するとき，内果皮は柔組織からなり，ときに脱落して見られないことがある。種皮は表皮と圧縮された柔細胞からなる柔組織で形成され，柔組織中に維管束が散在する。内乳は表皮と柔組織で形成される。残存する内果皮中には，シュウ酸カルシウムの集晶及びタンニン様物質を含み，種皮の柔細胞中にはタンニン様物質を含み，内乳の柔組織中にはでんぷん粒を含む。

必要に応じて，「レンニク」の確認試験を準用する。

（９）　ジコッピ　厚さ 1～6mm の管状又は半管状の皮片である。外側は淡褐色～淡黄褐色で，周皮はりん片状にはがれやすい。内側は灰褐色を呈し，縦に条線がある。質はもろく，折面は灰白色を呈し，繊維性でない。特異な弱いにおいがあり，味は初めわずかに甘い。

横切片を鏡検するとき，周皮のコルク層は数層の薄膜のコルク細胞からなる。皮部にはシュウ酸カルシウムの砂晶を含む柔細胞が散在し，少数の繊維を認めることがある。柔細胞に含まれるでんぷん粒は径 1～10μm である。石細胞は認めることがあっても，極めてまれである。

必要に応じて，「ジコッピ」の確認試験を準用する。

乾燥減量　15%以下。

灰　　分　5%以下。

【 321 】　K121

成分及び分量又は本質	日本薬局方	オウゴン	2.0g
	〃	キキョウ	2.0g
	〃	ソウハクヒ	2.0g
	〃	キョウニン	2.0g
	〃	サンシシ	2.0g
	〃	テンモンドウ	2.0g
	〃	バイモ	2.0g
	〃	チンピ	2.0g
	〃	タイソウ	2.0g
	局外生規	チクジョ	2.0g
	日本薬局方	ブクリョウ	3.0g
	〃	トウキ	3.0g
	〃	バクモンドウ	3.0g
	〃	ゴミシ	1.0g
	〃	ショウキョウ	1.0g
	〃	カンゾウ	1.0g
		全　量	32.0g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。		
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。		
効能又は効果	体力中等度で，せきが続き，たんが多くて切れにくいものの次の諸症：たんの多く出るせき，気管支炎		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	清肺湯		

規格及び試験方法

性　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品 1 包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　オウゴン　外面は黄褐色～暗褐色を呈し，切断面は黄色～帯褐黄色を呈し，縦に繊維性のすじが見られる。味はわずかに苦い。

必要に応じて，「オウゴン」の確認試験を準用する。

（2）　キキョウ　外面は皮付きは灰褐色，皮去りは白色～淡褐色を呈し，繊維性でない。横切面をルーペ視するとき，皮部は木部よりやや薄く，ほとんど白色で，ところどころにすき間があり，形成層の付近はしばしば褐色を帯びる。木部は白色～淡褐色を呈し，その組織は皮部よりもやや密である。味は初めなく，後にえぐくて苦い。

必要に応じて，「キキョウ」の確認試験を準用する。

（3）　ソウハクヒ　外面は白色～黄褐色を呈し，周皮をつけたものは，その周皮が黄褐色ではがれやすい。横切面は白色～淡褐色を呈し，繊維性で，内面は暗黄褐色である。わずかに特異な味がある。

横切片を鏡検するとき，周皮を付けたものでは外側は 5～12 層のコルク細胞からなり，皮部にはところどころに師部繊維又はその束があり，しばしば師部柔組織と交互にややしま模様を呈する。また乳管及びシュウ酸カルシウムの単晶を認め，でんぷん粒は径 1～7μm，球形又はだ円球形の単粒又は複粒からなる。

必要に応じて，「ソウハクヒ」の確認試験を準用する。

（4）　キョウニン　種皮は褐色で，表面にはすれて落ちやすい石細胞となった表皮細胞があって，粉をふいたようである。切断面は類白色である。味は苦く，油ようである。

表皮の表面を鏡検するとき，数個ずつ集合する石細胞はおおむね円形で，その細胞膜は均等に著しく厚くなり，径 60～90μm，側面視では鈍三角形で，細胞膜は先端部で著しく厚い。

必要に応じて，「キョウニン」の確認試験を準用する。

（5）　サンシシ　果皮は薄く砕きやすく，その外面は赤褐色，黄赤色又は黒褐色を呈し，内面は黄褐色を呈し，平らでつやがある。果実の内部は 2 室に分かれ，黄赤色～暗赤色の果肉中に黒褐色又は黄赤色で長径約 5mm の偏平な種子の団塊を含む。質は軽い。特異なにおいがあり，味は苦い。

必要に応じて，「サンシシ」の確認試験を準用する。

（6）　テンモンドウ　紡錘形～円柱形を呈し，長さ 5～15cm，径 5～20mm，外面は淡黄褐色～淡褐色を呈し，半透明で，しばしば縦じわがある。質は柔軟性であるか，又は堅い。折面は灰黄色でつやがあり，やや角質様である。特異なにおいがあり，味は初め甘く，後わずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，皮層の外辺には石細胞及びその群が散在し，皮層及び中心柱の柔細胞中にはシュウ酸カルシウムの束針晶を含む粘液細胞を認める。でんぷん粒を認めない。

必要に応じて，「テンモンドウ」の確認試験を準用する。

（7）　バイモ　偏球形を呈し，肥厚した 2 個のりん片葉からなり，径 2～3cm，高さ 1～2cm，しばしば分離したものがある。外面及び内面は白色～淡黄褐色，内面の基部はやや暗色を呈する。石灰を散布して乾燥したものは白粉を付けている。折面は白色を呈し，粉性である。特異な弱いにおいがあり，味は苦い。

横切片を鏡検するとき，最外層は 1 層の表皮からなりその内側は柔組織で満たされ，多数の維管束が散在する。柔組織中にはでんぷん粒を含む。でんぷん粒は主に単粒で，径 5～50μm，層紋が明瞭で，長卵形～卵形又は三角状卵形，まれに 2～3 個からなる複粒もある。また，表皮細胞及び道管付近の柔細胞にはシュウ酸カルシウムの単晶を含む。

必要に応じて，「バイモ」の確認試験を準用する。

（８） チンピ 外面は黄赤色～暗黄褐色で，油室による多数の小さいくぼみがあり，内面は白色～淡灰黄褐色である。厚さ約 2mm で，質は軽くてもろい。芳香があり，味は苦くて，わずかに刺激性である。

必要に応じて，「チンピ」の確認試験を準用する。

（９） タイソウ 外面は赤褐色であらいしわがあるか，又は暗灰赤色で細かいしわがあり，いずれもつやがある。外果皮は薄く革質で，中果皮は暗灰褐色を呈し，海綿ようで柔らかく粘着性があり，内果皮は極めて堅く，種子は偏平である。わずかに特異なにおいがあり，味は甘い。

（10） チクジョ 淡緑黄色～淡黄白色～灰白色を呈し，通例つやがある。質は軽く繊維性である。味はやや苦い。

必要に応じて，局外生規「チクジョ」の確認試験を準用する。

（11） ブクリョウ 白色又はわずかに淡赤色を帯びた白色で，質は堅いが砕きやすい。味はないがやや粘液ようである。

必要に応じて，「ブクリョウ」の確認試験を準用する。

（12） トウキ 外面は暗褐色～赤褐色で，縦じわがあり，切断面は淡黄色～黄褐色を呈する。特異なにおいがあり，味はわずかに甘く，後にやや辛い。

横切片を鏡検するとき，コルク層は 4～10 層からなり，その内側に数層の厚角組織が続いている。皮部には分泌細胞に囲まれた多数の樹脂道並びにしばしば大きなすき間がある。形成層は長方形に偏圧された数層の細胞からなり，明らかに皮部と木部とを区別する。木部では多数の道管と放射組織とが交互に放射状に配列し，その外方の道管は単独又は数個集まってやや密に配列してくさび状をなすが，中心部付近の道管は極めてまばらに存在する。でんぷん粒は径 19μm 以下，まれに 2～5 個の複粒があり，複粒の径は 25μm に達し，しばしばのり化している。

（13） バクモンドウ 紡錘形を呈し，長さ 10～25mm，径 3～5mm，一端はややとがり，他端はやや丸みをもち，外面は淡黄色～淡黄褐色で，大小の縦じわがある。皮層は柔軟性でもろく，中心柱は強じんで折りにくい。皮層の折面は淡黄褐色を呈し，やや半透明で粘着性がある。味はわずかに甘く，粘着性である。

（14） ゴミシ 暗赤色～黒褐色を呈し，表面にはしわがあり，またしばしば白い粉を付ける。果肉を除くとじん臓形の種子 1～2 個を認め，その外種皮は黄褐色～暗赤褐色を呈し，つやがあり，堅くてもろい。外種皮はたやすくはがれるが，内種皮は胚乳に密着し，背面に明らかな縫線を認める。酸味があり，後に渋くて苦い。

（15） ショウキョウ 淡灰黄色の周皮を付けたままか，又はその一部をはぎとってあり，表面は灰白色～淡灰褐色で，しばしば白粉を付けている。横断面は繊維性，粉性で，淡帯黄褐色を呈し，皮層と中心柱とに分かれる。横断面をルーペ視するとき，その全面に維管束及び分泌物が褐色の細点として散在している。特異なにおいがあり，味は極めて辛い。

（16）　カンゾウ　外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現わす。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に 1～3 細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には 3～10 細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞中にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

乾燥減量　15%以下。

灰　　分　5%以下。

【 322 】　K122

成分及び分量又は本質	日本薬局方	ボタンピ	3.0g
	〃	センキュウ	3.0g
	〃	シャクヤク	3.0g
	〃	ケイヒ	3.0g
	〃	トウニン	4.0g
	〃	トウキ	4.0g
	〃	エンゴサク	2.0g
	〃	ゴシツ	2.0g
	〃	コウカ	1.0g
		全　　量	25.0g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。		
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。		
効能又は効果	体力中等度以上で，下腹部痛があるものの次の諸症：月経不順，月経痛，月経困難，神経痛，腰痛，肩こり		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	折衝飲		

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品1包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　ボタンピ　外面は暗褐色～帯紫褐色，内面は淡灰褐色～暗紫色を呈する。内面及び切断面にはしばしば白色の結晶を付着する。特異なにおいがあり，味はわずかに辛くて苦い。

必要に応じて，「ボタンピ」の確認試験を準用する。

（2）　センキュウ　外面は灰褐色～暗褐色で，切断面は灰白色～灰褐色，半透明で，ときにはうつろがある。質は密で堅い。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，皮部及び髄には油道が散在する。木部には厚膜で木化した木部繊維が大小不同の群をなして存在する。でんぷん粒は，通例，のり化していて，まれに径5～25μm のでんぷん粒を認めることがある。シュウ酸カルシウム結晶は認めない。

（３）　シャクヤク　外面は褐色～淡灰褐色を呈し，横断面はち密で淡灰褐色を呈し，木部には淡褐色の放射状の線がある。わずかに特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後に渋くてわずかに苦い。

必要に応じて，「シャクヤク」の確認試験を準用する。

（４）　ケイヒ　外面は暗赤褐色を呈し，内面は赤褐色を呈し，平滑である。横断面は赤褐色を呈し淡褐色の薄層が見られる。特異なにおいがあり，味は甘く，辛く，後にやや粘液性で，わずかに収れん性である。

横切片を鏡検するとき，一次皮部と二次皮部はほとんど連続した石細胞環で区分され，環の外辺にはほぼ円形に結集した繊維束を伴い，環の各石細胞の膜はしばしばU 字形に肥厚する。二次皮部中には石細胞を認めず，まばらに少数の厚膜繊維を認める。柔組織中には油細胞，粘液細胞及び微細なシュウ酸カルシウムの針晶を含む細胞があり，柔細胞中にはでんぷん粒を含む。

（５）　トウニン　種皮は薄く，外面は赤褐色を帯び，表面にはすれて落ちやすい石細胞となった表皮細胞があって，粉をふいたようである。切断面は類白色である。味はわずかに苦く，油ようである。

表皮の表面を鏡検するとき，数個ずつ集合する石細胞はおおむね円形で，その細胞膜は均等に厚く，側面視では方形又は長方形を呈する。

必要に応じて，「トウニン」の確認試験を準用する。

（６）　トウキ　外面は暗褐色～赤褐色で，縦じわがあり，切断面は淡黄色～黄褐色を呈する。特異なにおいがあり，味はわずかに甘く，後にやや辛い。

横切片を鏡検するとき，コルク層は 4～10 層からなり，その内側に数層の厚角組織が続いている。皮部には分泌細胞に囲まれた多数の樹脂道並びにしばしば大きなすき間がある。形成層は長方形に偏圧された数層の細胞からなり，明らかに皮部と木部とを区別する。木部では多数の道管と放射組織とが交互に放射状に配列し，その外方の道管は単独又は数個集まってやや密に配列してくさび状をなすが，中心部付近の道管は極めてまばらに存在する。でんぷん粒は径 19μm 以下，まれに 2～5 個の複粒があり，複粒の径は 25μm に達し，しばしばのり化している。

（７）　エンゴサク　外面は灰黄色～灰褐色で，切断面は黄色～灰黄緑色を呈する。味は苦い。

必要に応じて，「エンゴサク」の確認試験を準用する。

（８）　ゴシツ　表面は灰黄色～黄褐色で，多数の縦じわがある。切断面は灰白色～淡褐色を呈し，黄白色の木部を認める。味はわずかに甘く，粘液性である。

横切片を鏡検するとき，皮部はやや明らかな形成層によって木部と区別できる。木部の中心には小さい原生木部があり，これを囲んで同心円状の環状維管束が外方に配列し，柔細胞中にはシュウ酸カルシウムの砂晶を含み，でんぷん粒は認めない。

必要に応じて，「ゴシツ」の確認試験を準用する。

（９）　コウカ　赤色～赤褐色の花冠，花柄，黄色の花柱及び雄しべからなり，全長は約1cm，花冠は筒状で 5 裂し，雄しべは 5 本で，長い柱頭をもつ雌しべを囲んでいる。花粉

はほぼ球形で，径約 50μm，黄色で表面に細かい突起がある。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

必要に応じて，「コウカ」の確認試験を準用する。

乾燥減量　15%以下。

灰　　分　5%以下。

【 323 】　K123

成分及び分量 又は本質	日本薬局方	ダイオウ	1.0～2.0g
	〃	トウニン	5.0g
	〃	トウキ	5.0g
		全　量	11.0～12.0g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。		
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。		
効能又は効果	打撲のはれと痛み		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	千金鶏鳴散料		

規格及び試験方法

性　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品1包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　ダイオウ　暗褐色～黄褐色～淡褐色を呈し，ルーペ視すると入り組んだ不規則な模様がある。質はおおむね粗で繊維性ではない。特異なにおいがあり，味はわずかに渋くて苦い。かめば細かい砂をかむような感じがあり，だ液を黄色に染める。

必要に応じて，「ダイオウ」の確認試験を準用する。

（2）　トウニン　種皮は薄く，外面は赤褐色を帯び，表面にはすれて落ちやすい石細胞となった表皮細胞があって，粉をふいたようである。切断面は類白色である。味はわずかに苦く，油ようである。

表皮の表面を鏡検するとき，数個ずつ集合する石細胞はおおむね円形で，その細胞膜は均等に厚く，側面視では方形又は長方形を呈する。

必要に応じて，「トウニン」の確認試験を準用する。

（3）　トウキ　外面は暗褐色～赤褐色で，縦じわがあり，切断面は淡黄色～黄褐色を呈する。特異なにおいがあり，味はわずかに甘く，後にやや辛い。

横切片を鏡検するとき，コルク層は 4～10 層からなり，その内側に数層の厚角組織が続いている。皮部には分泌細胞に囲まれた多数の樹脂道並びにしばしば大きなすき間がある。形成層は長方形に偏圧された数層の細胞からなり，明らかに皮部と木部とを区別する。木部では多数の道管と放射組織とが交互に放射状に配列し，その外方の道管は単独又は数個集まってやや密に配列してくさび状をなすが，中心部付近の道管は極めてまばらに存在する。でんぷん粒は径 19μm 以下，まれに 2～5 個の複粒があり，複粒の径は 25μm に達し，しばしばのり化している。

乾燥減量　15%以下。

灰　　分　6%以下。

【 324 】　K124

成分及び分量又は本質	日本薬局方	ビャクジュツ	4.0g
	〃	ブクリョウ	4.0g
	〃	カッコン	4.0g
	〃	ニンジン	3.0g
	〃	モッコウ	1.0g
	〃	カンゾウ	1.0g
	〃	カッコウ	1.0g
		全　　量	18.0g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。		
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。		
効能又は効果	体力虚弱で，嘔吐や下痢があり，ときに口渇や発熱があるものの次の諸症：感冒時の嘔吐・下痢，小児の消化不良		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	銭氏白朮散料		

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品1包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　ビャクジュツ　外面は淡灰黄色～淡黄白色で，ところどころ灰褐色を呈し，横切面には淡黄褐色～褐色の分泌物による細点がある。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，皮部の柔組織中にはしばしば師管の外側に接して繊維束があり，放射組織の末端部には淡褐色～褐色の内容物を含む油室がある。木部には大きい髄を囲んで放射状に配列した短径の道管とそれを囲む著しい繊維束がある。髄及び放射組織中には皮部と同様な油室があり，柔組織中にはイヌリンの小球晶及びシュウ酸カルシウムの針晶を含む。

必要に応じて，「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。

（２）　ブクリョウ　白色又はわずかに淡赤色を帯びた白色で，質は堅いが砕きやすい。味はないがやや粘液ようである。

必要に応じて，「ブクリョウ」の確認試験を準用する。

（３）　カッコン　淡灰黄色～灰白色を呈し，繊維性でやや粉性である。味はわずかに甘い。横切片を鏡検するとき，師部には結晶細胞列を伴った繊維束，木部には道管及び木部繊維が著しく，柔組織を満たすでんぷん粒は長径 2～18μm，多くは 8～12μm の数面からなる多面体の単粒，まれに 2～3 個からなる複粒で，中央にへそ又は欠裂を認め，層紋がある。

（４）　ニンジン　外面は淡黄褐色～淡灰褐色を呈し，縦じわがあり，横断面は淡黄褐色を呈し，形成層の付近は褐色を呈する。特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後にやや苦い。

必要に応じて，「ニンジン」の確認試験を準用する。

（５）　モッコウ　外面は黄褐色～灰褐色で，あらい縦じわがある。横断面は黄褐色～暗褐色で，ルーペ視するとき，環状暗色の形成層が認められ，木部組織と放射組織が放射状の模様を呈し，ところどころに大きな裂け目と褐色の油室が散在している。特異なにおいがあり，味は苦い。

（６）　カンゾウ　外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現わす。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に 1～3 細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には 3～10 細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞中にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

（７）　カッコウ　茎及びこれに対生した葉からなる。葉はしわがよって縮み，水に浸してしわを伸ばすと，卵形～卵状長楕円形を呈し，長さ 2.5～10cm，幅 2.5～7cm，辺縁に鈍きょ歯があり，基部は広いくさび形で葉柄を付ける。葉の上面は暗褐色，下面は灰褐色を呈し，両面に密に毛がある。茎は方柱形，中実で，表面は灰緑色を呈し，灰白色～黄白色の毛があり，髄は大きく，類白色で海綿状を呈する。ルーペ視するとき，毛，腺毛及び腺りんを認める。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

葉柄の横切片を鏡検するとき，向軸面中央は大きく突出し，その表皮の内側に厚角細胞が認められる。中央部の維管束は 2 群に分かれる。葉身主脈部の横切片を鏡検するとき，主脈の向軸面は大きく突出し，その表皮の内側に厚角細胞が認められる。中央部には扇状に配列した維管束がある。茎の横切片を鏡検するとき，表皮の内側に数細胞層の厚角組織が認められる。ときに表皮下にコルク層が発達することがある。皮層の内側には並立維管束が環状に配列し，師部の外側に師部繊維群が認められる。皮層の柔細胞中に油滴が，髄の柔細胞中にシュウ酸カルシウムの針晶，単晶又は柱状晶が認められる。

必要に応じて，「カッコウ」の確認試験を準用する。

乾燥減量　15%以下。

灰　　分　5%以下。

【 325 】　K125

成分及び分量又は本質	日本薬局方	トウキ	2.0g
	〃	ジオウ	2.0g
	〃	センキュウ	2.0g
	〃	ビャクジュツ	2.0g
	〃	ブクリョウ	2.0g
	〃	トウニン	2.0g
	〃	シャクヤク	2.5g
	〃	ゴシツ	1.5g
	〃	ボウイ	1.5g
	〃	ボウフウ	1.5g
	〃	リュウタン	1.5g
	〃	ショウキョウ	0.5g
	〃	チンピ	1.5g
	〃	ビャクシ	1.0g
	〃	カンゾウ	1.0g
	〃	イレイセン	1.5g
	〃	キョウカツ	1.5g
		全　　量	27.5g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。		
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。		
効能又は効果	体力中等度で，痛みがあり，ときにしびれがあるものの次の諸症：関節痛，神経痛，腰痛，筋肉痛		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	疎経活血湯		

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品 1 包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　トウキ　外面は暗褐色～赤褐色で，縦じわがあり，切断面は淡黄色～黄褐色を呈する。特異なにおいがあり，味はわずかに甘く，後にやや辛い。

横切片を鏡検するとき，コルク層は 4～10 層からなり，その内側に数層の厚角組織が続いている。皮部には分泌細胞に囲まれた多数の樹脂道並びにしばしば大きなすき間がある。形成層は長方形に偏圧された数層の細胞からなり，明らかに皮部と木部とを区別する。木部では多数の道管と放射組織とが交互に放射状に配列し，その外方の道管は単独又は数個集まってやや密に配列してくさび状をなすが，中心部付近の道管は極めてまばらに存在する。でんぷん粒は径 19μm 以下，まれに 2～5 個の複粒があり，複粒の径は 25μm に達し，しばしばのり化している。

（2）　ジオウ　外面は黄褐色～黒褐色を呈し，深い縦みぞ及びくびれがある。質は柔らかく粘性である。横断面は黄褐色～黒褐色で，皮部は木部より色が濃く，ほとんど髄を認めない。特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後にやや苦い。

横切片を鏡検するとき，コルク層は 7～15 層で，皮部はすべて柔細胞からなり，外皮部に褐色の分泌物を含む細胞が散在する。木部はほとんど柔細胞で満たされ，放射状に並ぶ道管は側孔のある網紋があり，弱い木化反応を呈する。

（3）　センキュウ　外面は灰褐色～暗褐色で，切断面は灰白色～灰褐色，半透明で，ときにはうつろがある。質は密で堅い。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，皮部及び髄には油道が散在する。木部には厚膜で木化した木部繊維が大小不同の群をなして存在する。でんぷん粒は，通例，のり化していて，まれに径 5～25μm のでんぷん粒を認めることがある。シュウ酸カルシウム結晶は認めない。

（4）　ビャクジュツ　外面は淡灰黄色～淡黄白色で，ところどころ灰褐色を呈し，横切面には淡黄褐色～褐色の分泌物による細点がある。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，皮部の柔組織中にはしばしば師管の外側に接して繊維束があり，放射組織の末端部には淡褐色～褐色の内容物を含む油室がある。木部には大きい髄を囲んで放射状に配列した短径の道管とそれを囲む著しい繊維束がある。髄及び放射組織中には皮部と同様な油室があり，柔組織中にはイヌリンの小球晶及びシュウ酸カルシウムの針晶を含む。

必要に応じて，「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。

（5）　ブクリョウ　白色又はわずかに淡赤色を帯びた白色で，質は堅いが砕きやすい。味はないがやや粘液ようである。

必要に応じて，「ブクリョウ」の確認試験を準用する。

（6）　トウニン　種皮は薄く，外面は赤褐色を帯び，表面にはすれて落ちやすい石細胞となった表皮細胞があって，粉をふいたようである。切断面は類白色である。味はわずかに苦く，油ようである。

表皮の表面を鏡検するとき，数個ずつ集合する石細胞はおおむね円形で，その細胞膜は均等に厚く，側面視では方形又は長方形を呈する。

必要に応じて，「トウニン」の確認試験を準用する。

（７）　シャクヤク　外面は褐色～淡灰褐色を呈し，横断面はち密で淡灰褐色を呈し，木部には淡褐色の放射状の線がある。わずかに特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後に渋くてわずかに苦い。

必要に応じて，「シャクヤク」の確認試験を準用する。

（８）　ゴシツ　表面は灰黄色～黄褐色で，多数の縦じわがある。切断面は灰白色～淡褐色を呈し，黄白色の木部を認める。味はわずかに甘く，粘液性である。

横切片を鏡検するとき，皮部はやや明らかな形成層によって木部と区別できる。木部の中心には小さい原生木部があり，これを囲んで同心円状の環状維管束が外方に配列し，柔細胞中にはシュウ酸カルシウムの砂晶を含み，でんぷん粒は認めない。

必要に応じて，「ゴシツ」の確認試験を準用する。

（９）　ボウイ　外面は暗灰褐色を呈し，縦みぞがあり，横断面の外部は暗灰褐色のコルク層でおおわれ，内部には灰褐色の道管部と暗褐色の放射組織とが交互に放射状に配列する。味は苦い。

横切片を鏡検するとき，一次皮部にはシュウ酸カルシウムの針晶を含み，一次皮部及び内しょうには著しく膜の厚い石細胞が認められ，道管部では大小の道管がほぼ階段状に配列する。放射組織の細胞の大部分は木化せず，径 3～10μm のでんぷん粒及びシュウ酸カルシウムの小針晶を含み，ところどころに極めて厚膜の大きな石細胞が散在する。

必要に応じて，「ボウイ」の確認試験を準用する。

（10）　ボウフウ　外面は淡褐色で，多数の縦じわがある。横断面の周辺は灰褐色で，空げきが多く，中央は円形に黄色を呈する。味はわずかに甘い。

（11）　リュウタン　根の径は約 3mm，外面は灰黄褐色で，あらい縦じわがあり，切断面は黄褐色を呈する。味は極めて苦く，残留性である。

根の横切片を鏡検するとき，幼若な根では表皮，外皮及び数層の一次皮部を残すが，通例，その最外層は数個の娘細胞に分割した特異な細胞からなる内皮で，しばしばこれに内接して 1～2 層の厚角組織がある。二次皮部はところどころに裂け目があり，不規則に師管を分布し，木部には道管がやや放射状に配列し，木部内師管があり，根茎部には大きい髄があり，髄には師管を認めることがある。柔細胞中にはシュウ酸カルシウムの針晶，板晶又は砂晶あるいは油滴を含み，でんぷん粒は，通例，認めない。

必要に応じて，「リュウタン」の確認試験を準用する。

（12）　ショウキョウ　淡灰黄色の周皮を付けたままか，又はその一部をはぎとってあり，表面は灰白色～淡灰褐色で，しばしば白粉を付けている。横断面は繊維性，粉性で，淡帯黄褐色を呈し，皮層と中心柱とに分かれる。横断面をルーペ視するとき，その全面に維管束及び分泌物が褐色の細点として散在している。特異なにおいがあり，味は極めて辛い。

（13）　チンピ　外面は黄赤色～暗黄褐色で，油室による多数の小さいくぼみがあり，内面は白色～淡灰黄褐色である。厚さ約 2mm で，質は軽くてもろい。芳香があり，味は苦くて，わずかに刺激性である。

必要に応じて，「チンピ」の確認試験を準用する。

（14）　ビャクシ　外面は灰褐色～暗褐色を呈し，縦じわがあり，横断面の周辺は灰白色で空げきが多く，中央部は暗褐色である。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

必要に応じて，「ビャクシ」の確認試験を準用する。

（15）　カンゾウ　外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現わす。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に 1～3 細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には 3～10 細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞中にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

（16）　イレイセン　短い根茎と多数の細長い根からなる。根は長さ 10～20cm，径 1～2mm，外面は褐色～黒褐色を呈し，細かい縦じわがあり，折りやすく，皮層と中心柱は離れやすい。根の横断面は灰白色～淡黄褐色を呈し，中心柱は淡灰黄色～黄色，ルーペ視するとき，中心柱はほぼ円形で，木部の 2～4 箇所がわずかに湾入している。根茎は長さ 2～4cm，径 5～20mm，表面は淡灰褐色～灰褐色で，皮部は脱落し繊維状を呈し，しばしば隆起した節があり，頂端に木質の茎の残基を付ける。弱いにおいがあり，味はほとんどない。

根の横切片を鏡検するとき，最外層は一層の表皮からなり，表皮下に一層の外皮がある。内皮により皮層と中心柱に区分される。皮層は柔組織からなる。木部の 2～4 箇所がわずかに湾入し，その部分に師部があり，しばしば繊維を含む。柔組織中には単粒及び 2～8 個の複粒のでんぷん粒を含む。

必要に応じて，「イレイセン」の確認試験を準用する。

（17）　キョウカツ　やや湾曲した円柱形～円錐形を呈し，長さ 3～10cm，径 5～20mm，ときに根茎は分枝する。外面は黄褐色～暗褐色である。根茎はその頂端にやや円形にくぼんだ茎の跡があり，ときには短い茎の残基を付け，外面には隆起した節があり，節間は，通例，短い。節にはいぼ状突起となった根の跡がある。根の外面には粗い縦じわ及びいぼ状突起となった側根の跡がある。質は軽くややもろくて折りやすい。横切面には多くの放射状の裂け目があり，皮部は黄褐色～褐色，木部は淡黄色～淡灰黄色，髄は灰白色～淡褐色を呈し，ルーペ視するとき，皮部及び髄には油道による褐色の細点を認める。特異なにおいがあり，味は初めわずかに酸味があり，後にやや辛く，わずかに麻痺性である。

横切片を鏡検するとき，最外層は数層～十数層のコルク層からなり，その内側に数層の厚角組織がある。皮層には多数の油道があり，大きいものでは径が 300μm に達する。また皮層には放射状に大きなすき間がある。髄にも油道があり，大きいものでは径が 500μm に達する。柔組織中には単粒及び 2～3 個の複粒のでんぷん粒を含む。

必要に応じて，「キョウカツ」の確認試験を準用する。

乾燥減量　10%以下。

灰　　分　6%以下。

【 326 】　K126

成分及び分量又は本質	局外生規	シソシ	3.0g
	日本薬局方	コウボク	2.5g
	〃	タイソウ	1.5g
	〃	ショウキョウ	0.5g
	〃	カンゾウ	1.0g
	〃	トウキ	2.5g
	〃	ハンゲ	4.0g
	〃	チンピ	2.5g
	〃	ゼンコ	2.5g
	〃	ケイヒ	2.5g
		全　量	22.5g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。		
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。		
効能又は効果	体力虚弱で，足冷えや顔ののぼせがあり，息苦しさのあるものの次の諸症：慢性気管支炎，気管支ぜんそく		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	蘇子降気湯		

規格及び試験方法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品1包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　シソシ　球形～やや偏平な球形の小堅果で，径1.0～1.5mm，表面は淡灰褐色～暗褐色，あるいは淡黄褐色を呈し，ルーペ視すると，表面にやや隆起した網紋が見られる。かむと特異な香気がわずかに感じられ，味は油ようである。

必要に応じて，局外生規「シソシ」の確認試験を準用する。

（２）　コウボク　外面は灰白色～灰褐色を呈し，内面は淡褐色～褐色，切断面は淡赤褐色を呈し，繊維性である。わずかに芳香があり，味は苦い。

横切片を鏡検するとき，コルク層は厚く，ほぼ等径性の石細胞が環状に内接する。一次皮部は狭く，内しょう部には繊維群が点在し，二次皮部の放射組織間には師部繊維群が階段状に並ぶ。油細胞の多数は一次皮部に，少数は二次皮部に散在し，狭い放射組織内にも認められることがある。

必要に応じて，「コウボク」の確認試験を準用する。

（３）　タイソウ　外面は赤褐色であらいしわがあるか，又は暗灰赤色で細かいしわがあり，いずれもつやがある。外果皮は薄く革質で，中果皮は暗灰褐色を呈し，海綿ようで柔らかく粘着性があり，内果皮は極めて堅く，種子は偏平である。わずかに特異なにおいがあり，味は甘い。

（４）　ショウキョウ　淡灰黄色の周皮を付けたままか，又はその一部をはぎとってあり，表面は灰白色～淡灰褐色で，しばしば白粉を付けている。横断面は繊維性，粉性で，淡帯黄褐色を呈し，皮層と中心柱とに分かれる。横断面をルーペ視するとき，その全面に維管束及び分泌物が褐色の細点として散在している。特異なにおいがあり，味は極めて辛い。

（５）　カンゾウ　外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現わす。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に 1～3 細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には 3～10 細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞中にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

（６）　トウキ　外面は暗褐色～赤褐色で，縦じわがあり，切断面は淡黄色～黄褐色を呈する。特異なにおいがあり，味はわずかに甘く，後にやや辛い。

横切片を鏡検するとき，コルク層は 4～10 層からなり，その内側に数層の厚角組織が続いている。皮部には分泌細胞に囲まれた多数の樹脂道並びにしばしば大きなすき間がある。形成層は長方形に偏圧された数層の細胞からなり，明らかに皮部と木部とを区別する。木部では多数の道管と放射組織とが交互に放射状に配列し，その外方の道管は単独又は数個集まってやや密に配列してくさび状をなすが，中心部付近の道管は極めてまばらに存在する。でんぷん粒は径 19μm 以下，まれに 2～5 個の複粒があり，複粒の径は 25μm に達し，しばしばのり化している。

（７）　ハンゲ　外面は白色～灰白黄色，上部には茎の跡がくぼみとなり，その周辺には根の跡がくぼんだ細点となっている。横断面は白色，粉性である。味は初めなく，やや粘液性で，後に強いえぐ味を残す。

横切片を鏡検するとき，主としてでんぷん粒を充満した柔組織からなり，わずかにシュウ酸カルシウムの束晶を含んだ粘液細胞がその間に認められる。でんぷん粒は主として 2～3 個の複粒で，通例，径 10～15μm，単粒は通例径 3～7μm である。束晶は長さ 25～150μm である。

（８）　チンピ　外面は黄赤色～暗黄褐色で，油室による多数の小さいくぼみがあり，内面は白色～淡灰黄褐色である。厚さ約 2mm で，質は軽くてもろい。芳香があり，味は苦くて，わずかに刺激性である。

必要に応じて，「チンピ」の確認試験を準用する。

（９）　ゼンコ　1）Peucedanum praeruptorum Dunn 細長い倒円錐形～円柱形を呈し，下部はときに二股になる。長さ 3～15cm，根頭部の径は 0.8～1.8cm である。外面は淡褐色～暗褐色を呈し，根頭部には多数の輪節状のしわがあり，毛状を呈する葉柄の残基を付けるものもある。根にはやや深い縦じわ及び側根を切除した跡がある。横切面は淡褐色～類白色を呈する。質はもろい。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，最外層はコルク層からなり，一部のコルク細胞は内側の接線壁が肥厚する。その内側には厚角組織がある。皮部には多数の油道が散在し，空隙が認められる。師部の先端部には師部繊維が見られることがある。木部には道管が認められ，油道が散在する。柔組織中に認められるでんぷん粒は 2～10 数個の複粒である。

2）Angelica decursiva Franchet et Savatier　1）に似るが，根頭部に毛状を呈する葉柄の残茎を付けない。

横切片を鏡検するとき，1）に似るが，コルク細胞の細胞壁は肥厚せず，師部の先端部には師部繊維を認めない。また，木部中には油道が認められない。

必要に応じて，「ゼンコ」の確認試験を準用する。

（10）　ケイヒ　外面は暗赤褐色を呈し，内面は赤褐色を呈し，平滑である。横断面は赤褐色を呈し淡褐色の薄層が見られる。特異なにおいがあり，味は甘く，辛く，後にやや粘液性で，わずかに収れん性である。

横切片を鏡検するとき，一次皮部と二次皮部はほとんど連続した石細胞環で区分され，環の外辺にはほぼ円形に結集した繊維束を伴い，環の各石細胞の膜はしばしば U 字形に肥厚する。二次皮部中には石細胞を認めず，まばらに少数の厚膜繊維を認める。柔組織中には油細胞，粘液細胞及び微細なシュウ酸カルシウムの針晶を含む細胞があり，柔細胞中にはでんぷん粒を含む。

乾燥減量　15％以下。

灰　　分　5％以下。

【 327 】　K127

成分及び分量 又は本質	日本薬局方　ダイオウ　4.0g 〃　カンゾウ　1.0g 全　量　5.0g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。
効能又は効果	便秘，便秘に伴う頭重・のぼせ・湿疹・皮膚炎・ふきでもの(にきび)・食欲不振(食欲減退)・腹部膨満・腸内異常醗酵・痔などの症状の緩和
貯蔵方法及び 有効期間	密閉容器
規格及び試験方法	別記のとおり。
備考	大黄甘草湯

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品1包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　ダイオウ　暗褐色～黄褐色～淡褐色を呈し，ルーペ視すると入り組んだ不規則な模様がある。質はおおむね粗で繊維性ではない。特異なにおいがあり，味はわずかに渋くて苦い。かめば細かい砂をかむような感じがあり，だ液を黄色に染める。

必要に応じて，「ダイオウ」の確認試験を準用する。

（2）　カンゾウ　外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現わす。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に1～3細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には3～10細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞中にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

乾燥減量　10%以下。

灰　　分　6%以下。

【 328 】　K128

成分及び分量又は本質	日本薬局方	ダイオウ	1.0～2.0g
	〃	ボタンピ	4.0g
	〃	トウニン	4.0g
	別紙規格	乾燥硫酸ナトリウム	1.7g
	日本薬局方	トウガシ	4.0g
		全　量	14.7～15.7g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。		
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。		
効能又は効果	体力中等度以上で，下腹部痛があって，便秘しがちなものの次の諸症：月経不順，月経困難，月経痛，便秘，痔疾		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	大黄牡丹皮湯		

規格及び試験方法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品1包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　ダイオウ　暗褐色～黄褐色～淡褐色を呈し，ルーペ視すると入り組んだ不規則な模様がある。質はおおむね粗で繊維性ではない。特異なにおいがあり，味はわずかに渋くて苦い。かめば細かい砂をかむような感じがあり，だ液を黄色に染める。

必要に応じて，「ダイオウ」の確認試験を準用する。

（2）　ボタンピ　外面は暗褐色～帯紫褐色，内面は淡灰褐色～暗紫色を呈する。内面及び切断面にはしばしば白色の結晶を付着する。特異なにおいがあり，味はわずかに辛くて苦い。

必要に応じて，「ボタンピ」の確認試験を準用する。

（３）　トウニン　種皮は薄く，外面は赤褐色を帯び，表面にはすれて落ちやすい石細胞となった表皮細胞があって，粉をふいたようである。切断面は類白色である。味はわずかに苦く，油ようである。

表皮の表面を鏡検するとき，数個ずつ集合する石細胞はおおむね円形で，その細胞膜は均等に厚く，側面視では方形又は長方形を呈する。

必要に応じて，「トウニン」の確認試験を準用する。

（４）　乾燥硫酸ナトリウム　白色の粉末で，味はやや苦く，塩辛い。

また，別紙規格「乾燥硫酸ナトリウム」の確認試験を準用する。

（５）　トウガシ　1）Benincasa cerifera Savi は偏平な卵形～卵円形を呈し，長さ 10～13mm，幅 6～7mm，厚さ約 2mm，一端はややとがり，へそ及び発芽口の部分が 2 個の小突起となっている。表面は淡灰黄色～淡黄褐色を呈し，周辺にそって隆起帯がある。表面をルーペ視するとき，細かいしわ及びへこみを認める。

2）Benincasa cerifera Savi forma emarginata K.Kimura et Sugiyama は偏平な卵形～楕円形を呈し，長さ 9～12mm，幅 5～6mm，厚さ約 2mm，へその付近は（1）と同様であるが，表面は淡灰黄色を呈し，平滑で，周辺には隆起帯がない。

1）及び 2）はにおいがなく，味は緩和でわずかに油様である。

中央部横切片を鏡検するとき，1）の種皮の最外層は 1 細胞層のさく状の表皮からなり，隆起帯に相当する部位で明瞭である。2）の種皮の最外層は薄いクチクラで覆われた 1 細胞層の表皮で，しばしば脱落している。1）及び 2）の表皮に内接する下皮はやや厚壁化した柔組織からなり，その内側は数細胞層の石細胞からなる。種皮の最内層は数細胞層の柔組織である。周乳はクチクラで覆われ，数細胞層の柔組織からなる。内乳は横に長い細胞が一列に配列する。子葉は油滴，アリューロン粒を含み，でんぷん粒を認めることがある。

必要に応じて，「トウガシ」の確認試験を準用する。

乾燥減量　15%以下。

灰　　分　15%以下。

別紙規格　　乾燥硫酸ナトリウムの規格及び試験方法

本品を乾燥したものは定量するとき，硫酸ナトリウム（Na_2SO_4）99.0%以上を含む。

性　　状　本品は白色の粉末で，味はやや苦く，塩辛い。

本品は水に溶けやすく，エタノール（95）にほとんど溶けない。

確認試験　本品の水溶液（1→20）はナトリウム塩及び硫酸塩の定性反応を呈する。

純度試験　（１）　溶状及び液性　本品 0.5g に新たに煮沸し冷却した水 5mL を加えて溶かすとき，液は無色澄明で，中性である。

（２）　塩化物　本品 0.5g をとり，試験を行う。比較液には 0.01mol/L 塩酸 0.50mL を加える（0.036%以下）。

（３）　重金属　本品 2.0g をとり，第 1 法により操作し，試験を行う。比較液には鉛標準液 2.0mL を加える（10ppm 以下）。

（４）　ヒ素　本品 1.0g をとり，第 1 法により操作し，試験を行う（2ppm 以下）。

乾燥減量　11.4%以下（2g，105℃，4 時間）。

定 量 法　本品は乾燥し，その約 0.4g を精密に量り，水 200mL を加えて溶かし，塩酸 1mL を加えて煮沸し，熱時塩化バリウム試液 8mL を徐々に加える。この液を水浴上で 1 時間加熱したのち，冷後，沈殿をろ取し，洗液に硝酸銀試液を加えても混濁を生じなくなるまで水で洗い，乾燥し，恒量になるまで強熱し，重量を量り，硫酸バリウム（$BaSO_4$：233.40）の量とする。

硫酸ナトリウム（Na_2SO_4）の量（mg）

＝硫酸バリウム（$BaSO_4$）の量（mg）×0.6086

【 329 】　K129

成分及び分量又は本質	日本薬局方	サンショウ	1.0g
	〃	ニンジン	2.0g
	〃	カンキョウ	4.0g
		全　　量	7.0g
	日本薬局方	コウイ	20.0g
製造方法	コウイを除く以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製し，これにコウイ 20g を添付する。		
用法及び用量	本品 1 包に水約 500mL を加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，熱いうちに煎じかすを除き，添付の膠飴を煎液に入れ，かきまぜながら 5 分ほど熱して膠飴を溶かし，3 回に分けて食間に服用する。上記は大人の 1 日量である。 15 才未満 7 才以上　大人の 2/3，7 才未満 4 才以上　大人の 1/2，4 才未満 2 才以上　大人の 1/3，2 才未満　大人の 1/4 以下を服用する。 本剤は必ず 1 日分ずつ煎じ，数日分をまとめて煎じないこと。		
効能又は効果	体力虚弱で，腹が冷えて痛むものの次の諸症：下腹部痛，腹部膨満感		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	大建中湯		

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品 1 包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　サンショウ　偏球形のさく果の果皮で，開裂した径約 5mm の 2 心皮からなり，1 果柄に，通例，2～3 個合着するが，しばしば，そのうちの 1 個は，い縮退化していることがある。外面は暗黄赤色～暗赤褐色で，多数のくぼんだ小点があり，内面は淡黄白色である。特異な芳香があり，味は辛く舌を麻ひする。

横切片を鏡検するとき，外面表皮とこれに接する 1 細胞層中には赤褐色のタンニン質を含み，果皮内部には径約 500μm に達する油室があり，ところどころにらせん紋道管を主とする維管束が点在し，内層は石細胞層からなり，内面表皮細胞は極めて小さい。

（２）　ニンジン　外面は淡黄褐色～淡灰褐色を呈し，縦じわがあり，横断面は淡黄褐色を呈し，形成層の付近は褐色を呈する。特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後にやや苦い。

必要に応じて，「ニンジン」の確認試験を準用する。

（３）　カンキョウ　偏圧した不規則な塊状でしばしば分枝する。分枝した各部はやや湾曲した卵形又は長卵形を呈し，長さ 2～4cm，径 1～2cm である。外面は灰黄色～灰黄褐色で，しわ及び輪節がある。折面は褐色～暗褐色で透明感があり角質である。横切面をルーペ視するとき皮層と中心柱は区分され，全面に維管束が散在する。特異なにおいがあり，味は極めて辛い。

横切片を鏡検するとき，外側よりコルク層，皮層，内皮，中心柱が認められる。皮層と中心柱は一層の内皮によって区分される。皮層及び中心柱は柔組織からなり，繊維束で囲まれた維管束が散在する。柔組織中には黄色の油様物質を含む油細胞が散在し，柔細胞中にはシュウ酸カルシウムの単晶が含まれ，でんぷんは糊化している。

必要に応じて，「カンキョウ」の確認試験を準用する。

乾燥減量　20％以下。

灰　　分　5％以下。

【 330 】　K130

成分及び分量又は本質	日本薬局方	サイコ	6.0g
	〃	ハンゲ	6.0g
	〃	オウゴン	3.0g
	〃	シャクヤク	3.0g
	〃	タイソウ	3.0g
	〃	キジツ	3.0g
	〃	ショウキョウ	1.5g
	〃	ダイオウ	0.5g
		全　　量	26.0g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。		
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。		
効能又は効果	体力が充実して，脇腹からみぞおちあたりにかけて苦しく，便秘の傾向があるものの次の諸症：胃炎，常習便秘，高血圧や肥満に伴う肩こり・頭痛・便秘，神経症，肥満症		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	大柴胡湯		

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品はわずかに芳香性のにおいがある。

確認試験　本品1包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　サイコ　外面は灰褐色～褐色で，深いしわがあるものがあり，横断面では，皮部は褐色，木部は淡褐色を呈する。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，皮部にはしばしば接線方向に長い裂け目があり，皮部の厚さは半径の1/3～1/2で，径15～35μmの胞間性離生油道がやや多数散在し，木部には道管が放射状若しくはほぼ階段状に配列し，ところどころに繊維群があり，根頭部の髄には皮部と同様の油道がある。柔細胞中にはでんぷん粒を満たし，また油滴を認める。

必要に応じて，「サイコ」の確認試験を準用する。

（２）　ハンゲ　外面は白色～灰白黄色，上部には茎の跡がくぼみとなり，その周辺には根の跡がくぼんだ細点となっている。横断面は白色，粉性である。味は初めなく，やや粘液性で，後に強いえぐ味を残す。

横切片を鏡検するとき，主としてでんぷん粒を充満した柔組織からなり，わずかにシュウ酸カルシウムの束晶を含んだ粘液細胞がその間に認められる。でんぷん粒は主として 2～3 個の複粒で，通例，径 10～15μm，単粒は通例径 3～7μm である。束晶は長さ 25～150μm である。

（３）　オウゴン　外面は黄褐色～暗褐色を呈し，切断面は黄色～帯褐黄色を呈し，縦に繊維性のすじが見られる。味はわずかに苦い。

必要に応じて，「オウゴン」の確認試験を準用する。

（４）　シャクヤク　外面は褐色～淡灰褐色を呈し，横断面はち密で淡灰褐色を呈し，木部には淡褐色の放射状の線がある。わずかに特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後に渋くてわずかに苦い。

必要に応じて，「シャクヤク」の確認試験を準用する。

（５）　タイソウ　外面は赤褐色であらいしわがあるか，又は暗灰赤色で細かいしわがあり，いずれもつやがある。外果皮は薄く革質で，中果皮は暗灰褐色を呈し，海綿ようで柔らかく粘着性があり，内果皮は極めて堅く，種子は偏平である。わずかに特異なにおいがあり，味は甘い。

（６）　キジツ　外面は濃緑褐色～褐色で，つやがなく，油室による多数のくぼんだ細点がある。切断面は淡灰褐色を呈し，内果皮を付ける部分は褐色を呈する。特異なにおいがあり，味は苦い。

必要に応じて，「キジツ」の確認試験を準用する。

（７）　ショウキョウ　淡灰黄色の周皮を付けたままか，又はその一部をはぎとってあり，表面は灰白色～淡灰褐色で，しばしば白粉を付けている。横断面は繊維性，粉性で，淡帯黄褐色を呈し，皮層と中心柱とに分かれる。横断面をルーペ視するとき，その全面に維管束及び分泌物が褐色の細点として散在している。特異なにおいがあり，味は極めて辛い。

（８）　ダイオウ　暗褐色～黄褐色～淡褐色を呈し，ルーペ視すると入り組んだ不規則な模様がある。質はおおむね粗で繊維性ではない。特異なにおいがあり，味はわずかに渋くて苦い。かめば細かい砂をかむような感じがあり，だ液を黄色に染める。

必要に応じて，「ダイオウ」の確認試験を準用する。

乾燥減量　20％以下。

灰　　分　5％以下。

【 331 】　K131

成分及び分量 又は本質	日本薬局方　ハンゲ　7.0g 〃　ニンジン　3.0g 全　量　10.0g 日本薬局方　ハチミツ　20.0g
製造方法	ハチミツを除く以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製し，これにハチミツ 20.0g を添付する。
用法及び用量	本品 1 包に水約 500mL を加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，添付のハチミツを煎液に加えて，よくかきまぜ，煎液を 3 回に分けて食間に服用する。上記は大人の 1 日量である。 15 才未満 7 才以上　大人の 2/3，7 才未満 4 才以上　大人の 1/2，4 才未満 2 才以上　大人の 1/3，2 才未満　大人の 1/4 以下を服用する。
効能又は効果	体力中等度以下で，みぞおちがつかえた感じがあるものの次の諸症：嘔吐，むかつき，はきけ，悪心
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器，ただし，ハチミツは気密容器
規格及び試験方法	別記のとおり。
備考	大半夏湯

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品 1 包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　ハンゲ　外面は白色～灰白黄色，上部には茎の跡がくぼみとなり，その周辺には根の跡がくぼんだ細点となっている。横断面は白色，粉性である。味は初めなく，やや粘液性で，後に強いえぐ味を残す。

横切片を鏡検するとき，主としてでんぷん粒を充満した柔組織からなり，わずかにシュウ酸カルシウムの束晶を含んだ粘液細胞がその間に認められる。でんぷん粒は主として 2～3 個の複粒で，通例，径 10～15μm，単粒は通例径 3～7μm である。束晶は長さ 25～150μm である。

（2）　ニンジン　外面は淡黄褐色～淡灰褐色を呈し，縦じわがあり，横断面は淡黄褐色を呈し，形成層の付近は褐色を呈する。特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後にやや苦い。

必要に応じて，「ニンジン」の確認試験を準用する。

乾燥減量　15%以下。

灰　　分　5%以下。

【 332 】　K132

成分及び分量 又は本質	日本薬局方	サイコ	3.0g
	局外生規	チクジョ	3.0g
	日本薬局方	ブクリョウ	3.0g
	〃	バクモンドウ	3.0g
	〃	ショウキョウ	1.0g
	〃	ハンゲ	5.0g
	〃	コウブシ	2.0g
	〃	キキョウ	2.0g
	〃	チンピ	2.0g
	〃	キジツ	2.0g
	〃	オウレン	1.0g
	〃	カンゾウ	1.0g
	〃	ニンジン	1.0g
		全　量	29.0g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。		
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。		
効能又は効果	体力中等度のものの次の諸症：かぜ，インフルエンザ，肺炎などの回復期に熱が長びいたり，また平熱になっても，気分がさっぱりせず，せきやたんが多くて安眠が出来ないもの		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	竹茹温胆湯		

規格及び試験方法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品1包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（１）　サイコ　外面は灰褐色～褐色で，深いしわがあるものがあり，横断面では，皮部は褐色，木部は淡褐色を呈する。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，皮部にはしばしば接線方向に長い裂け目があり，皮部の厚さは半径の 1/3～1/2 で，径 15～35μm の胞間性離生油道がやや多数散在し，木部には道管が放射状若しくはほぼ階段状に配列し，ところどころに繊維群があり，根頭部の髄には皮部と同様の油道がある。柔細胞中にはでんぷん粒を満たし，また油滴を認める。

必要に応じて，「サイコ」の確認試験を準用する。

（２）　チクジョ　淡緑黄色～淡黄白色～灰白色を呈し，通例つやがある。質は軽く繊維性である。味はやや苦い。

必要に応じて，局外生規「チクジョ」の確認試験を準用する。

（３）　ブクリョウ　白色又はわずかに淡赤色を帯びた白色で，質は堅いが砕きやすい。味はないがやや粘液ようである。

必要に応じて，「ブクリョウ」の確認試験を準用する。

（４）　バクモンドウ　紡錘形を呈し，長さ 10～25mm，径 3～5mm，一端はややとがり，他端はやや丸みをもち，外面は淡黄色～淡黄褐色で，大小の縦じわがある。皮層は柔軟性でもろく，中心柱は強じんで折りにくい。皮層の折面は淡黄褐色を呈し，やや半透明で粘着性がある。味はわずかに甘く，粘着性である。

（５）　ショウキョウ　淡灰黄色の周皮を付けたままか，又はその一部をはぎとってあり，表面は灰白色～淡灰褐色で，しばしば白粉を付けている。横断面は繊維性，粉性で，淡帯黄褐色を呈し，皮層と中心柱とに分かれる。横断面をルーペ視するとき，その全面に維管束及び分泌物が褐色の細点として散在している。特異なにおいがあり，味は極めて辛い。

（６）　ハンゲ　外面は白色～灰白黄色，上部には茎の跡がくぼみとなり，その周辺には根の跡がくぼんだ細点となっている。横断面は白色，粉性である。味は初めなく，やや粘液性で，後に強いえぐ味を残す。

横切片を鏡検するとき，主としてでんぷん粒を充満した柔組織からなり，わずかにシュウ酸カルシウムの束晶を含んだ粘液細胞がその間に認められる。でんぷん粒は主として 2～3 個の複粒で，通例，径 10～15μm，単粒は通例径 3～7μm である。束晶は長さ 25～150μm である。

（７）　コウブシ　外面は灰褐色～灰黒褐色を呈し，不整な輪節があり，その部分に一方に向かって多数の毛がある。質は堅く，横断面は赤褐色～淡黄色を呈し，ろうようのつやを帯び，皮層部の厚さは中心柱の径とほぼ等しいか又はわずかに薄い。横断面をルーペ視するとき，外面は繊維束が褐色のはん点として輪状に並び，皮層部にはところどころに維管束が赤褐色のはん点として，また分泌細胞が黄褐色の微小なはん点として多数存在する。中心柱には多数の維管束が点又は線として散在する。わずかに特異なにおい及び味がある。

（８）　キキョウ　外面は皮付きは灰褐色，皮去りは白色～淡褐色を呈し，繊維性でない。横切面をルーペ視するとき，皮部は木部よりやや薄く，ほとんど白色で，ところどころにすき間があり，形成層の付近はしばしば褐色を帯びる。木部は白色～淡褐色を呈し，その組織は皮部よりもやや密である。味は初めなく，後にえぐくて苦い。

必要に応じて，「キキョウ」の確認試験を準用する。

（９）　チンピ　外面は黄赤色～暗黄褐色で，油室による多数の小さいくぼみがあり，内面は白色～淡灰黄褐色である。厚さ約 2mm で，質は軽くてもろい。芳香があり，味は苦くて，わずかに刺激性である。

必要に応じて，「チンピ」の確認試験を準用する。

（10）　キジツ　外面は濃緑褐色～褐色で，つやがなく，油室による多数のくぼんだ細点がある。切断面は淡灰褐色を呈し，内果皮を付ける部分は褐色を呈する。特異なにおいがあり，味は苦い。

必要に応じて，「キジツ」の確認試験を準用する。

（11）　オウレン　根茎の径は 2～7mm で，外面は灰黄褐色～褐色を呈し，輪節及び多数の根の基部を認め，横断面はやや繊維性で，コルク層は淡灰褐色，皮部は黄褐色，木部は黄色，髄は黄褐色である。味は極めて苦く，残留性で，だ液を黄色に染める。

横切片を鏡検するとき，コルク層は薄膜のコルク細胞からなり，皮部柔組織中にはコルク層に近い部位に石細胞群，形成層に近い部位に黄色の師部繊維の認められるものが多い。木部は主として道管，仮道管，木部繊維からなり，放射組織は明らかで，髄は大きく，髄中には石細胞あるいは厚膜木化した細胞を伴った石細胞を認めることがある。柔細胞には細かいでんぷん粒を含むが，結晶を含まない。

必要に応じて，「オウレン」の確認試験を準用する。

（12）　カンゾウ　外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現わす。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に 1～3 細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には 3～10 細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞中にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

（13）　ニンジン　外面は淡黄褐色～淡灰褐色を呈し，縦じわがあり，横断面は淡黄褐色を呈し，形成層の付近は褐色を呈する。特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後にやや苦い。

必要に応じて，「ニンジン」の確認試験を準用する。

乾燥減量　15％以下。

灰　　分　5％以下。

【 333 】　K133

成分及び分量又は本質	日本薬局方　センキュウ　3.0g 〃　ボクソク　3.0g 〃　センコツ　3.0g 〃　ケイヒ　3.0g 〃　カンゾウ　1.5g 〃　チョウジ　1.0g 〃　ダイオウ　1.0g 全　量　15.5g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。
効能又は効果	体力に関わらず使用でき，はれ，痛みがあるものの次の諸症：打撲，捻挫
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器
規格及び試験方法	別記のとおり。
備考	治打撲一方

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品1包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　センキュウ　外面は灰褐色～暗褐色で，切断面は灰白色～灰褐色，半透明で，ときにはうつろがある。質は密で堅い。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，皮部及び髄には油道が散在する。木部には厚膜で木化した木部繊維が大小不同の群をなして存在する。でんぷん粒は，通例，のり化していて，まれに径5～25μmのでんぷん粒を認めることがある。シュウ酸カルシウム結晶は認めない。

（2）　ボクソク　板状又は半管状の皮片で，厚さ5～15mm，外面は灰褐色～暗褐色を呈し，内面は褐色～淡褐色を呈する。外面は厚い周皮を付け，縦に粗い裂け目があり，内

面には縦の隆起線がある。横切面は褐色～淡褐色を呈し，ところどころに石細胞群による白色の細点を認める。におい及び味はほとんどない。

横切片を鏡検するとき，コルク層にはコルク石細胞が散在し，二次皮層には繊維群がほぼ階段状に並び，大きな石細胞群が不規則に配列する。柔組織中にシュウ酸カルシウムの集晶が散在する。石細胞や繊維細胞に隣接してシュウ酸カルシウムの単晶を含む細胞が認められ，縦切片では結晶細胞列となる。

必要に応じて，「ボクソク」の確認試験を準用する。

（３）　センコツ　外面は暗褐色，切断面は白色～灰白色を呈し，質は軽く海綿ようである。横断面をルーペ視するとき，外辺は黒色で，内部は多孔性の基本組織からなり，維管束が散在する。味はわずかに苦く不快である。

必要に応じて，「センコツ」の確認試験を準用する。

（４）　ケイヒ　外面は暗赤褐色を呈し，内面は赤褐色を呈し，平滑である。横断面は赤褐色を呈し淡褐色の薄層が見られる。特異なにおいがあり，味は甘く，辛く，後にやや粘液性で，わずかに収れん性である。

横切片を鏡検するとき，一次皮部と二次皮部はほとんど連続した石細胞環で区分され，環の外辺にはほぼ円形に結集した繊維束を伴い，環の各石細胞の膜はしばしばU字形に肥厚する。二次皮部中には石細胞を認めず，まばらに少数の厚膜繊維を認める。柔組織中には油細胞，粘液細胞及び微細なシュウ酸カルシウムの針晶を含む細胞があり，柔細胞中にはでんぷん粒を含む。

（５）　カンゾウ　外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現わす。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に1～3細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には3～10細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞中にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

（６）　チョウジ　暗褐色～暗赤色のつぼみで，長さ1～1.8cm，やや偏平な四稜柱状の花床と，その上端には厚いがく片4枚及び4枚の膜質花弁とがあり，花弁は重なり合いほぼ球形を呈する。花弁に包まれた内部には多数の雄しべと1本の花柱とがある。強い特異なにおいがあり，味はやくようで，後わずかに舌を麻ひする。

必要に応じて，「チョウジ」の確認試験を準用する。

（７）　ダイオウ　暗褐色～黄褐色～淡褐色を呈し，ルーペ視すると入り組んだ不規則な模様がある。質はおおむね粗で繊維性ではない。特異なにおいがあり，味はわずかに渋くて苦い。かめば細かい砂をかむような感じがあり，だ液を黄色に染める。

必要に応じて，「ダイオウ」の確認試験を準用する。

乾燥減量　15%以下。

灰　　分　6%以下。

【 334 】　K134

成分及び分量又は本質	日本薬局方	レンギョウ	3.0g
	〃	ソウジュツ	3.0g
	〃	センキュウ	3.0g
	〃	ボウフウ	2.0g
	〃	ニンドウ	2.0g
	〃	ケイガイ	1.0g
	〃	カンゾウ	0.5～1.0g
	〃	コウカ	1.0g
	〃	ダイオウ	0.5g
		全　量	16.0～16.5g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。		
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。		
効能又は効果	体力中等度以上のものの顔面，頭部などの皮膚疾患で，ときにかゆみ，分泌物などがあるものの次の諸症：湿疹・皮膚炎，乳幼児の湿疹・皮膚炎		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	治頭瘡一方		

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品1包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　レンギョウ　外面は淡褐色～暗褐色を呈し，淡灰色の小隆起点が散在し，内面は黄褐色である。特異な芳香があり，味はわずかに収れん性である。

必要に応じて，「レンギョウ」の確認試験を準用する。

（２）　ソウジュツ　外面は暗灰褐色～暗黄褐色である。横断面は淡褐色～赤褐色の分泌物による細点を認める。しばしば白色綿状の結晶を析出する。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，皮部の柔組織中には，通例，繊維束を欠き，放射組織の末端部には淡褐色～黄褐色の内容物を含む油室がある。木部は形成層に接して道管を囲んだ繊維束が放射状に配列し，髄及び放射組織中には皮部と同様な油室がある。柔細胞中にはイヌリンの球晶及びシュウ酸カルシウムの針晶を含む。

（３）　センキュウ　外面は灰褐色～暗褐色で，切断面は灰白色～灰褐色，半透明で，ときにはうつろがある。質は密で堅い。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，皮部及び髄には油道が散在する。木部には厚膜で木化した木部繊維が大小不同の群をなして存在する。でんぷん粒は，通例，のり化していて，まれに径5～25μm のでんぷん粒を認めることがある。シュウ酸カルシウム結晶は認めない。

（４）　ボウフウ　外面は淡褐色で，多数の縦じわがある。横断面の周辺は灰褐色で，空げきが多く，中央は円形に黄色を呈する。味はわずかに甘い。

（５）　ニンドウ　葉及び短い茎に対生する葉からなる。葉は短い葉柄を付け，楕円形で全縁，長さ 3～7cm，幅 1～3cm，上面は緑褐色，下面は淡灰緑色を呈し，ルーペ視するとき，両面に軟毛をまばらに認める。茎は径 1～4mm，外面は灰黄褐色～帯紫褐色で，横切面は円形，中空である。ほとんどにおいがなく，味は収れん性で，後わずかに苦い。

葉の横切片を鏡検するとき，最外層は上下面とも 1 層の表皮からなり，表皮には単細胞性の非腺毛と多細胞性の腺毛が認められる。主脈部では，表皮の内側数層は厚角組織からなり，中央部には維管束がある。葉肉部では上面表皮に接してさく状組織があり，下面表皮に接して海綿状組織がある。腺毛には褐色の分泌物が含まれ，柔細胞中にはシュウ酸カルシウムの集晶を含み，でんぷん粒が認められることがある。

必要に応じて，「ニンドウ」の確認試験を準用する。

（６）　ケイガイ　茎，輪散花序に集合したがく筒，これら及びときには葉の砕片，種子ようの微粒の分果からなる。茎は方形で外面はおおむね紫褐色，径約 1mm である。がく筒は淡褐色～黄緑色で長さ 2～3mm，ルーペ視するとき，先端はきょ歯辺，筒部には数条の線があり，唇形花又は果実を含み，茎とともに類白色の短毛を認める。分果は黄褐色～黒色，両端の細いだ円体で長さ 1～1.5mm，径は長さのほぼ 1/2 である。特異な芳香があり，口に含むとわずかに清涼感がある。

必要に応じて，「ケイガイ」の確認試験を準用する。

（７）　カンゾウ　外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現わす。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に 1～3 細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には 3～10 細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞中にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

（８）　コウカ　赤色～赤褐色の花冠，花柄，黄色の花柱及び雄しべからなり，全長は約 1cm，花冠は筒状で 5 裂し，雄しべは 5 本で，長い柱頭をもつ雌しべを囲んでいる。花粉

はほぼ球形で，径約 50μm，黄色で表面に細かい突起がある。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

必要に応じて，「コウカ」の確認試験を準用する。

（９）　ダイオウ　暗褐色～黄褐色～淡褐色を呈し，ルーペ視すると入り組んだ不規則な模様がある。質はおおむね粗で繊維性ではない。特異なにおいがあり，味はわずかに渋くて苦い。かめば細かい砂をかむような感じがあり，だ液を黄色に染める。

必要に応じて，「ダイオウ」の確認試験を準用する。

乾燥減量　10%以下。

灰　　分　6%以下。

【 335 】　K135

成分及び分量 又は本質	日本薬局方	ゴマ油	1000g
	〃	ミツロウ	380g
	〃	ウコン	40g
	〃	オウバク	20g
		全　量	1440g
製造方法	ゴマ油をよく煮て水分を蒸発させ，これにミツロウを加え，溶かし，布でろ過し，やや冷えた頃ウコン末及びオウバク末を徐々に混合し，かく拌しながら凝固させる。		
用法及び用量	適量を皮膚に塗布する。		
効能又は効果	急性化膿性皮膚疾患（はれもの）の初期，うち身，捻挫		
貯蔵方法及び有効期間	気密容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	中黄膏		

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は黄褐色で，特異なにおいがある。

確認試験　（１）　本品 3.5g に希エタノール 10mL を加え，水浴上で 2 分間加温した後，氷冷し，ろ過する。ろ液に水酸化ナトリウム溶液（1→100）1 滴を加えるとき，液は濃赤色を呈する（ウコン）。

（２）　本品 1g をろ紙上にとり，ジエチルエーテル 10～20 滴を滴加するとき，ろ紙は淡黄色に染まる。ろ紙を風乾して本品を除いた後，その裏面にホウ酸溶液（1→50）を滴加するとき，黄色の部分は淡褐色に変わる。更にこのろ紙を乾燥した後，これにアンモニア試液を滴加するとき，褐色の部分は青色を呈し，徐々に淡褐色にもどる（ウコン）。

（３）　本品 5g にジエチルエーテル 50mL を加え，よくかき混ぜた後，ろ過し，残留物をとり，ジエチルエーテル 30mL を加えてよくかき混ぜ，ろ過する。残留物を集め，エタノール（95）10mL を加えてよくかき混ぜた後，ろ過し，ろ液 1mL に塩酸 1mL 及び過酸化水素試液 0.5mL を加えて振り混ぜ，しばらく放置するとき液は淡赤色を呈する（オウバク）。

【 336 】　K136

成分及び分量 又 は 本 質	日本薬局方　ダイオウ　2.0g 別紙規格　乾燥硫酸ナトリウム　0.4g 日本薬局方　カンゾウ　1.0g 全　量　3.4g
製 造 方 法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。
効能又は効果	体力中等度なものの次の諸症：便秘，便秘に伴う頭重・のぼせ・湿疹・皮膚炎・ふきでもの（にきび）・食欲不振（食欲減退）・腹部膨満，腸内異常醗酵・痔などの症状の緩和
貯蔵方法及び 有 効 期 間	密閉容器
規格及び試験方法	別記のとおり。
備　　考	調胃承気湯

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品1包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　ダイオウ　暗褐色～黄褐色～淡褐色を呈し，ルーペ視すると入り組んだ不規則な模様がある。質はおおむね粗で繊維性ではない。特異なにおいがあり，味はわずかに渋くて苦い。かめば細かい砂をかむような感じがあり，だ液を黄色に染める。

必要に応じて，「ダイオウ」の確認試験を準用する。

（2）　乾燥硫酸ナトリウム　白色の粉末で，味はやや苦く，塩辛い。

また，別紙規格「乾燥硫酸ナトリウム」の確認試験を準用する。

（3）　カンゾウ　外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現わす。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に1～3細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には3～10細胞列

の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞中にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

乾燥減量　15%以下。

灰　　分　15%以下。

別紙規格　　**乾燥硫酸ナトリウムの規格及び試験方法**

本品を乾燥したものは定量するとき，硫酸ナトリウム（Na_2SO_4）99.0%以上を含む。

性　　状　本品は白色の粉末で，味はやや苦く，塩辛い。

本品は水に溶けやすく，エタノール（95）にほとんど溶けない。

確認試験　本品の水溶液（1→20）はナトリウム塩及び硫酸塩の定性反応を呈する。

純度試験　**（１）**　溶状及び液性　本品 0.5g に新たに煮沸し冷却した水 5mL を加えて溶かすとき，液は無色澄明で，中性である。

（２）　塩化物　本品 0.5g をとり，試験を行う。比較液には 0.01mol/L 塩酸 0.50mL を加える（0.036%以下）。

（３）　重金属　本品 2.0g をとり，第 1 法により操作し，試験を行う。比較液には鉛標準液 2.0mL を加える（10ppm 以下）。

（４）　ヒ素　本品 1.0g をとり，第 1 法により操作し，試験を行う（2ppm 以下）。

乾燥減量　11.4%以下（2g，105℃，4 時間）。

定 量 法　本品を乾燥し，その約 0.4g を精密に量り，水 200mL を加えて溶かし，塩酸 1mL を加えて煮沸し，熱時塩化バリウム試液 8mL を徐々に加える。この液を水浴上で 1 時間加熱したのち，冷後，沈殿をろ取し，洗液に硝酸銀試液を加えても混濁を生じなくなるまで水で洗い，乾燥し，恒量になるまで強熱し，重量を量り，硫酸バリウム（$BaSO_4$：233.40）の量とする。

硫酸ナトリウム（Na_2SO_4）の量（mg）

＝硫酸バリウム（$BaSO_4$）の量（mg）×0.6086

【 337 】　K137

成分及び分量又は本質	日本薬局方	チョウトウコウ	3.0g
	局外生規	キッピ	3.0g
	日本薬局方	キクカ	2.0g
	〃	ボウフウ	2.0g
	〃	ハンゲ	3.0g
	〃	バクモンドウ	3.0g
	〃	ブクリョウ	3.0g
	〃	ニンジン	2.0g
	〃	ショウキョウ	1.0g
	〃	カンゾウ	1.0g
	〃	セッコウ	5.0g
		全　量	28.0g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。		
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。		
効能又は効果	体力中等度で，慢性に経過する頭痛，めまい，肩こりなどがあるものの次の諸症：慢性頭痛，神経症，高血圧の傾向のあるもの		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	釣藤散料		

規格及び試験方法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品1包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　チョウトウコウ　かぎ状のとげ又はとげが対生又は単生する短い茎からなる。とげは長さ1～4cmで，湾曲して先端はとがり，外面は赤褐色～暗褐色，又は黄褐色を呈し，毛を付けるものもある。横切面は長楕円形～楕円形で，淡褐色を呈する。茎は細長い方柱形～円柱形で，径2～5mm，外面は赤褐色～暗褐色，又は黄褐色を呈し，横切面は方

形で，髄は淡褐色で方形～楕円形を呈するか又は空洞化している。質は堅い。ほとんどにおいがなく，味はほとんどない。

とげの横切面を鏡検するとき，表皮のクチクラは平滑又は歯牙上の細かい凹凸があり，師部に外接する繊維はほぼ環状に配列し，皮部の柔細胞中にはシュウ酸カルシウムの砂晶を認める。

必要に応じて，「チョウトウコウ」の確認試験を準用する。

（２）　キッピ　外面は黄褐色～赤褐色を呈し，油室による多数のくぼんだ細点があり，内面は類白色～淡赤褐色を呈する。厚さ約 1mm で，質は軽くてもろい。芳香があり，味は苦い。

切片を鏡検するとき，油室は円く，径 410～730μm である。

必要に応じて，局外生規「キッピ」の確認試験を準用する。

（３）　キクカ　径 15～40mm の頭花で，総ほうは 3～4 列の総ほう片からなり，総ほう外片は線形～ひ針形，内片は狭卵形～卵形を呈する。舌状花は多数で，類白色～黄色，管状花は少数で淡黄褐色を呈し，ときに退化して欠くことがある。総ほうの外面は緑褐色～褐色を呈する。質は軽く，砕きやすい。特有のにおいがあり，味はわずかに苦い。

必要に応じて，「キクカ」の確認試験を準用する。

（４）　ボウフウ　外面は淡褐色で，多数の縦じわがある。横断面の周辺は灰褐色で，空げきが多く，中央は円形に黄色を呈する。味はわずかに甘い。

（５）　ハンゲ　外面は白色～灰白黄色，上部には茎の跡がくぼみとなり，その周辺には根の跡がくぼんだ細点となっている。横断面は白色，粉性である。味は初めなく，やや粘液性で，後に強いえぐ味を残す。

横切片を鏡検するとき，主としてでんぷん粒を充満した柔組織からなり，わずかにシュウ酸カルシウムの束晶を含んだ粘液細胞がその間に認められる。でんぷん粒は主として 2～3 個の複粒で，通例，径 10～15μm，単粒は通例径 3～7μm である。束晶は長さ 25～150μm である。

（６）　バクモンドウ　紡錘形を呈し，長さ 10～25mm，径 3～5mm，一端はややとがり，他端はやや丸みをもち，外面は淡黄色～淡黄褐色で，大小の縦じわがある。皮層は柔軟性でもろく，中心柱は強じんで折りにくい。皮層の折面は淡黄褐色を呈し，やや半透明で粘着性がある。味はわずかに甘く，粘着性である。

（７）　ブクリョウ　白色又はわずかに淡赤色を帯びた白色で，質は堅いが砕きやすい。味はないがやや粘液ようである。

必要に応じて，「ブクリョウ」の確認試験を準用する。

（８）　ニンジン　外面は淡黄褐色～淡灰褐色を呈し，縦じわがあり，横断面は淡黄褐色を呈し，形成層の付近は褐色を呈する。特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後にやや苦い。

必要に応じて，「ニンジン」の確認試験を準用する。

（９）　ショウキョウ　淡灰黄色の周皮を付けたままか，又はその一部をはぎとってあり，表面は灰白色～淡灰褐色で，しばしば白粉を付けている。横断面は繊維性，粉性で，淡帯黄褐色を呈し，皮層と中心柱とに分かれる。横断面をルーペ視するとき，その全面に維管束及び分泌物が褐色の細点として散在している。特異なにおいがあり，味は極めて辛い。

（10）　カンゾウ　外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現わす。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に 1～3 細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には 3～10 細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞中にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

（11）　セッコウ　光沢のある白色の重い繊維状結晶塊で，におい及び味はない。砕くとたやすく針状～微細結晶性の粉末となる。水に溶けにくい。

必要に応じて，「セッコウ」の確認試験を準用する。

乾燥減量　10%以下。

灰　　分　21%以下。

【 338 】　K138

成分及び分量又は本質	日本薬局方	チョレイ	3.0g
	〃	ブクリョウ	3.0g
	〃	タクシャ	3.0g
	〃	カッセキ	3.0g
		全　　量	12.0g
	局外生規	アキョウ	3.0g
製造方法	アキョウを除く以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製し，これにアキョウ 3.0g を添付する。		
用法及び用量	本品 1 包に，水約 500mL を加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，添付のアキョウを煎液に入れ，再び 5 分ほど熱して溶かし，煎液を 3 回に分けて食間に服用する。上記は大人の 1 日量である。 15 才未満 7 才以上　大人の 2/3，7 才未満 4 才以上　大人の 1/2，4 才未満 2 才以上　大人の 1/3，2 才未満　大人の 1/4 以下を服用する。		
効能又は効果	体力に関わらず使用でき，排尿異常があり，ときに口が渇くものの次の諸症：排尿困難，排尿痛，残尿感，頻尿，むくみ		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器，ただし，アキョウは気密容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	猪苓湯		

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品 1 包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　チョレイ　外面は黒褐色を呈し，切断面はやや柔らかくコルクようで，ほぼ白色～淡褐色を呈し，内部には白色のまだら模様がある。質は軽い。味がない。

必要に応じて，「チョレイ」の確認試験を準用する。

（2）　ブクリョウ　白色又はわずかに淡赤色を帯びた白色で，質は堅いが砕きやすい。味はないがやや粘液ようである。

必要に応じて，「ブクリョウ」の確認試験を準用する。

（３）　タクシャ　淡黄褐色～淡褐色でコルク層をつける部位はやや暗色を呈する。ルーペ視するとき，褐色～淡褐色のはん点が散在する。切面は粒状で，繊維性ではない。わずかににおい及び味がある。

（４）　カッセキ　白色～淡紅色の粉末性の結晶塊で，砕くと容易に微細な粉末となる。粉末はややざらつき，皮膚につきやすい。粉末を水で潤すとき，やや暗色を帯び，可塑性となる。特異なにおいがあり，味はほとんどない。かめば細かい砂をかむような感じがある。

粉末を封入剤と共にスライドガラスとカバーガラスの間で十分にすりつぶしたものを鏡検するとき，円形～多角形を呈する径 10μm 以上の結晶を多く認める。

必要に応じて，「カッセキ」の確認試験を準用する。

乾燥減量　10%以下。

灰　　分　24%以下。

【 339 】　K139

成分及び分量又は本質	日本薬局方	トウキ	3.0g
	〃	シャクヤク	3.0g
	〃	センキュウ	3.0g
	〃	ジオウ	3.0g
	〃	チョレイ	3.0g
	〃	ブクリョウ	3.0g
	〃	タクシャ	3.0g
	〃	カッセキ	3.0g
		全　　量	24.0g
	局外生規	アキョウ	3.0g
製造方法	アキョウを除く以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製し，これにアキョウ 3.0g を添付する。		
用法及び用量	本品 1 包に，水約 500mL を加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，添付のアキョウを煎液に入れ，再び 5 分ほど熱して溶かし，煎液を 3 回に分けて食間に服用する。上記は大人の 1 日量である。 15 才未満 7 才以上　大人の 2/3，7 才未満 4 才以上　大人の 1/2，4 才未満 2 才以上　大人の 1/3，2 才未満　大人の 1/4 以下を服用する。		
効能又は効果	体力に関わらず使用でき，皮膚が乾燥し，色つやが悪く，胃腸障害のない人で，排尿異常があり口が渇くものの次の諸症：排尿困難，排尿痛，残尿感，頻尿		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器，ただし，アキョウは気密容器		
規格及び試験方法	分包品については別記のとおり。		
備考	猪苓湯合四物湯		

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品 1 包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　トウキ　外面は暗褐色～赤褐色で，縦じわがあり，切断面は淡黄色～黄褐色を呈する。特異なにおいがあり，味はわずかに甘く，後にやや辛い。

横切片を鏡検するとき，コルク層は 4～10 層からなり，その内側に数層の厚角組織が続いている。皮部には分泌細胞に囲まれた多数の樹脂道並びにしばしば大きなすき間がある。形成層は長方形に偏圧された数層の細胞からなり，明らかに皮部と木部とを区別する。木部では多数の道管と放射組織とが交互に放射状に配列し，その外方の道管は単独又は数個集まってやや密に配列してくさび状をなすが，中心部付近の道管は極めてまばらに存在する。でんぷん粒は径 19μm 以下，まれに 2～5 個の複粒があり，複粒の径は 25μm に達し，しばしばのり化している。

（２）　シャクヤク　外面は褐色～淡灰褐色を呈し，横断面はち密で淡灰褐色を呈し，木部には淡褐色の放射状の線がある。わずかに特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後に渋くてわずかに苦い。

必要に応じて，「シャクヤク」の確認試験を準用する。

（３）　センキュウ　外面は灰褐色～暗褐色で，切断面は灰白色～灰褐色，半透明で，ときにはうつろがある。質は密で堅い。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，皮部及び髄には油道が散在する。木部には厚膜で木化した木部繊維が大小不同の群をなして存在する。でんぷん粒は，通例，のり化していて，まれに径 5～25μm のでんぷん粒を認めることがある。シュウ酸カルシウム結晶は認めない。

（４）　ジオウ　外面は黄褐色～黒褐色を呈し，深い縦みぞ及びくびれがある。質は柔らかく粘性である。横断面は黄褐色～黒褐色で，皮部は木部より色が濃く，ほとんど髄を認めない。特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後にやや苦い。

横切片を鏡検するとき，コルク層は 7～15 層で，皮部はすべて柔細胞からなり，外皮部に褐色の分泌物を含む細胞が散在する。木部はほとんど柔細胞で満たされ，放射状に並ぶ道管は側孔のある網紋があり，弱い木化反応を呈する。

（５）　チョレイ　外面は黒褐色を呈し，切断面はやや柔らかくコルクようで，ほぼ白色～淡褐色を呈し，内部には白色のまだら模様がある。質は軽い。味がない。

必要に応じて，「チョレイ」の確認試験を準用する。

（６）　ブクリョウ　白色又はわずかに淡赤色を帯びた白色で，質は堅いが砕きやすい。味はないがやや粘液ようである。

必要に応じて，「ブクリョウ」の確認試験を準用する。

（７）　タクシャ　淡黄褐色～淡褐色でコルク層をつける部位はやや暗色を呈する。ルーペ視するとき，褐色～淡褐色のはん点が散在する。切面は粒状で，繊維性ではない。わずかににおい及び味がある。

（８）　カッセキ　白色～淡紅色の粉末性の結晶塊で，砕くと容易に微細な粉末となる。粉末はややざらつき，皮膚につきやすい。粉末を水で潤すとき，やや暗色を帯び，可塑性となる。特異なにおいがあり，味はほとんどない。かめば細かい砂をかむような感じがある。

粉末を封入剤と共にスライドガラスとカバーガラスの間で十分にすりつぶしたものを鏡検するとき，円形～多角形を呈する径 10μm 以上の結晶を多く認める。

必要に応じて，「カッセキ」の確認試験を準用する。

乾燥減量　10%以下。

灰　　分　24%以下。

【 340 】　K140

成分及び分量又は本質	日本薬局方	トウキ	3.0g
	〃	ダイオウ	3.0g
	別紙規格	乾燥硫酸ナトリウム	1.7g
	日本薬局方	キジツ	3.0g
	〃	コウボク	2.0g
	〃	チンピ	2.0g
	〃	モクツウ	2.0g
	〃	コウカ	2.0g
	〃	カンゾウ	2.0g
	〃	ソボク	2.0g
		全　量	22.7g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。		
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。		
効能又は効果	体力中等度以上で，下腹部に圧痛があって便秘しがちなものの次の諸症：月経不順，月経痛，更年期障害，腰痛，便秘，打ち身（打撲），高血圧の随伴症状（頭痛，めまい，肩こり）		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	通導散料		

規格及び試験方法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品1包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　トウキ　外面は暗褐色～赤褐色で，縦じわがあり，切断面は淡黄色～黄褐色を呈する。特異なにおいがあり，味はわずかに甘く，後にやや辛い。

横切片を鏡検するとき，コルク層は4～10層からなり，その内側に数層の厚角組織が続いている。皮部には分泌細胞に囲まれた多数の油道及びしばしば大きなすき間がある。形

成層は長方形に偏圧された数層の細胞からなり，明らかに皮部と木部とを区別する。木部では多数の道管と放射組織とが交互に放射状に配列し，その外方の道管は単独又は数個集まってやや密に配列してくさび状をなすが，中心部付近の道管は極めてまばらに存在する。でんぷん粒は径 19μm 以下，まれに 2～5 個の複粒があり，複粒の径は 25μm に達し，しばしばのり化している。

（２）　ダイオウ　暗褐色～黄褐色～淡褐色を呈し，ルーペ視すると入り組んだ不規則な模様がある。質はおおむね粗で繊維性ではない。特異なにおいがあり，味はわずかに渋くて苦い。かめば細かい砂をかむような感じがあり，だ液を黄色に染める。

必要に応じて，「ダイオウ」の確認試験を準用する。

（３）　乾燥硫酸ナトリウム　白色の粉末で，味はやや苦く，塩辛い。

また，別紙規格「乾燥硫酸ナトリウム」の確認試験を準用する。

（４）　キジツ　外面は濃緑褐色～褐色で，つやがなく，油室による多数のくぼんだ細点がある。切断面は淡灰褐色を呈し，内果皮を付ける部分は褐色を呈する。特異なにおいがあり，味は苦い。

必要に応じて，「キジツ」の確認試験を準用する。

（５）　コウボク　外面は灰白色～灰褐色を呈し，内面は淡褐色～暗紫褐色，切断面は淡赤褐色を呈し，繊維性である。わずかに芳香があり，味は苦い。

横切片を鏡検するとき，コルク層は厚く，ほぼ等径性の石細胞が環状に内接する。一次皮部は狭く，内しょう部には繊維群が点在し，二次皮部の放射組織間には師部繊維群が階段状に並ぶ。油細胞の多数は一次皮部に，少数は二次皮部に散在し，狭い放射組織内にも認められることがある。

必要に応じて，「コウボク」の確認試験を準用する。

（６）　チンピ　外面は黄赤色～暗黄褐色で，油室による多数の小さいくぼみがあり，内面は白色～淡灰黄褐色である。厚さ約 2mm で，質は軽くてもろい。芳香があり，味は苦くて，わずかに刺激性である。

必要に応じて，「チンピ」の確認試験を準用する。

（７）　モクツウ　外側のコルク層は灰褐色で，円形又は横に長いだ円形の皮目がある。皮部は暗灰褐色を呈し，木部は淡褐色で，灰白色の放射組織と交互に配列する。髄は淡灰黄色で，明らかである。味はわずかにえぐい。

横切片を鏡検するとき，師部の外辺を囲む弧状の輪層は主として結晶細胞列をなす繊維束と石細胞群とからなり，皮部の放射組織は単晶を含む厚膜細胞からなる。形成層は明らかで，束外では著しく内方に湾入している。髄周辺の細胞は，はなはだ厚膜で，しばしば単晶を含んでいる。でんぷん粒の大きさは 8mm 以下である。

必要に応じて，「モクツウ」の確認試験を準用する。

（８）　コウカ　赤色～赤褐色の花冠，花柄，黄色の花柱及び雄しべからなり，全長は約 1cm，花冠は筒状で 5 裂し，雄しべは 5 本で，長い柱頭をもつ雌しべを囲んでいる。花粉はほぼ球形で，径約 50μm，黄色で表面に細かい突起がある。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

必要に応じて，「コウカ」の確認試験を準用する。

（９）　カンゾウ　外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現わす。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に 1～3 細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には 3～10 細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞中にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

（10）　ソボク　切片，削片又は短い木片で，黄赤色～灰黄褐色を呈し，ときには淡褐色～灰白色の辺材を付けることがある。質は堅い。横断面には年輪様の紋様がある。におい及び味がほとんどない。

横切片を鏡検するとき，1～2 列の細長い細胞からなる放射組織がある。放射組織間は繊維細胞からなり，楕円形で大きな道管が散在する。木部の最も内側の柔細胞中にはシュウ酸カルシウムの単晶が認められる。

必要に応じて，「ソボク」の確認試験を準用する。

乾燥減量　10%以下。

灰　　分　15%以下。

別紙規格　　**乾燥硫酸ナトリウムの規格及び試験方法**

本品を乾燥したものは定量するとき，硫酸ナトリウム（Na_2SO_4）99.0%以上を含む。

性　　状　本品は白色の粉末で，味はやや苦く，塩辛い。

本品は水に溶けやすく，エタノール（95）にほとんど溶けない。

確認試験　本品の水溶液（1→20）はナトリウム塩及び硫酸塩の定性反応を呈する。

純度試験　（１）　溶状及び液性　本品 0.5g に新たに煮沸し冷却した水 5mL を加えて溶かすとき，液は無色澄明で，中性である。

（２）　塩化物　本品 0.5g をとり，試験を行う。比較液には 0.01mol/L 塩酸 0.50mL を加える（0.036%以下）。

（３）　重金属　本品 2.0g をとり，第 1 法により操作し，試験を行う。比較液には鉛標準液 2.0mL を加える（10ppm 以下）。

（４）　ヒ素　本品 1.0g をとり，第 1 法により操作し，試験を行う（2ppm 以下）。

乾燥減量　11.4%以下（2g，105℃，4 時間）。

定 量 法　本品を乾燥し，その約 0.4g を精密に量り，水 200mL を加えて溶かし，塩酸 1mL を加えて煮沸し，熱時塩化バリウム試液 8mL を徐々に加える。この液を水浴上で 1 時間加熱したのち，冷後，沈殿をろ取し，洗液に硝酸銀試液を加えても混濁を生じなくなるまで水で洗い，乾燥し，恒量になるまで強熱し，重量を量り，硫酸バリウム（$BaSO_4$：233.40）の量とする。

硫酸ナトリウム（Na_2SO_4）の量（mg）

＝硫酸バリウム（$BaSO_4$）の量（mg）×0.6086

【 341 】　K141

成分及び分量 又は本質	日本薬局方　トウニン　4.0g 〃　ケイヒ　2.0g 〃　カンゾウ　2.0g 〃　硫酸マグネシウム水和物　2.0g 〃　ダイオウ　0.5g 全　量　10.5g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。
効能又は効果	体力中等度以上で，のぼせて便秘しがちなものの次の諸症：月経不順，月経困難症，月経痛，月経時や産後の精神不安，腰痛，便秘，高血圧の随伴症状（頭痛，めまい，肩こり），痔疾，打撲症
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器
規格及び試験方法	別記のとおり。
備考	桃核承気湯

規格及び試験方法

性　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品1包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬及び白色粉末につき，次の試験を行う。

（1）　トウニン　種皮は薄く，外面は赤褐色を帯び，表面にはすれて落ちやすい石細胞となった表皮細胞があって，粉をふいたようである。切断面は類白色である。味はわずかに苦く，油ようである。

表皮の表面を鏡検するとき，数個ずつ集合する石細胞はおおむね円形で，その細胞膜は均等に厚く，側面視では方形又は長方形を呈する。

必要に応じて，「トウニン」の確認試験を準用する。

（2）　ケイヒ　外面は暗赤褐色を呈し，内面は赤褐色を呈し，平滑である。横断面は赤褐色を呈し淡褐色の薄層が見られる。特異なにおいがあり，味は甘く，辛く，後にやや粘液性で，わずかに収れん性である。

横切片を鏡検するとき，一次皮部と二次皮部はほとんど連続した石細胞環で区分され，環の外辺にはほぼ円形に結集した繊維束を伴い，環の各石細胞の膜はしばしばU字形に肥厚する。二次皮部中には石細胞を認めず，まばらに少数の厚膜繊維を認める。柔組織中には油細胞，粘液細胞及び微細なシュウ酸カルシウムの針晶を含む細胞があり，柔細胞中にはでんぷん粒を含む。

（３）　カンゾウ　外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現わす。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に1～3細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には3～10細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞中にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

（４）　硫酸マグネシウム水和物　結晶性粉末で，水に溶けやすく，味は苦く，清涼味及び塩味がある。

必要に応じて，「硫酸マグネシウム水和物」の確認試験を準用する。

（５）　ダイオウ　暗褐色～黄褐色～淡褐色を呈し，ルーペ視すると入り組んだ不規則な模様がある。質はおおむね粗で繊維性ではない。特異なにおいがあり，味はわずかに渋くて苦い。かめば細かい砂をかむような感じがあり，だ液を黄色に染める。

必要に応じて，「ダイオウ」の確認試験を準用する。

乾燥減量　20％以下。

【 342 】　K142

成分及び分量又は本質	日本薬局方　トウキ　5.0g 〃　シャクヤク　3.0g 〃　センキュウ　3.0g 〃　ボウフウ　3.0g 〃　ジオウ　4.0g 〃　ケイガイ　1.5g 〃　オウギ　1.5g 〃　カンゾウ　1.0g 〃　シツリシ　3.0g 〃　カシュウ　2.0g 全　量　27.0g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。
効能又は効果	体力中等度以下で，冷え症で，皮膚が乾燥するものの次の諸症：湿疹・皮膚炎（分泌物の少ないもの），かゆみ
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器
規格及び試験方法	別記のとおり。
備考	当帰飲子

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品1包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　トウキ　外面は暗褐色～赤褐色で，縦じわがあり，切断面は淡黄色～黄褐色を呈する。特異なにおいがあり，味はわずかに甘く，後にやや辛い。

横切片を鏡検するとき，コルク層は4～10層からなり，その内側に数層の厚角組織が続いている。皮部には分泌細胞に囲まれた多数の樹脂道並びにしばしば大きなすき間がある。形成層は長方形に偏圧された数層の細胞からなり，明らかに皮部と木部とを区別す

る。木部では多数の道管と放射組織とが交互に放射状に配列し，その外方の道管は単独又は数個集まってやや密に配列してくさび状をなすが，中心部付近の道管は極めてまばらに存在する。でんぷん粒は径 19μm 以下，まれに 2～5 個の複粒があり，複粒の径は 25μm に達し，しばしばのり化している。

（２）　シャクヤク　外面は褐色～淡灰褐色を呈し，横断面はち密で淡灰褐色を呈し，木部には淡褐色の放射状の線がある。わずかに特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後に渋くてわずかに苦い。

必要に応じて，「シャクヤク」の確認試験を準用する。

（３）　センキュウ　外面は灰褐色～暗褐色で，切断面は灰白色～灰褐色，半透明で，ときにはうつろがある。質は密で堅い。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，皮部及び髄には油道が散在する。木部には厚膜で木化した木部繊維が大小不同の群をなして存在する。でんぷん粒は，通例，のり化していて，まれに径 5～25μm のでんぷん粒を認めることがある。シュウ酸カルシウム結晶は認めない。

（４）　ボウフウ　外面は淡褐色で，多数の縦じわがある。横断面の周辺は灰褐色で，空げきが多く，中央は円形に黄色を呈する。味はわずかに甘い。

（５）　ジオウ　外面は黄褐色～黒褐色を呈し，深い縦みぞ及びくびれがある。質は柔らかく粘性である。横断面は黄褐色～黒褐色で，皮部は木部より色が濃く，ほとんど髄を認めない。特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後にやや苦い。

横切片を鏡検するとき，コルク層は 7～15 層で，皮部はすべて柔細胞からなり，外皮部に褐色の分泌物を含む細胞が散在する。木部はほとんど柔細胞で満たされ，放射状に並ぶ道管は側孔のある網紋があり，弱い木化反応を呈する。

（６）　ケイガイ　茎，輪散花序に集合したがく筒，これら及びときには葉の砕片，種子ようの微粒の分果からなる。茎は方形で外面はおおむね紫褐色，径約 1mm である。がく筒は淡褐色～黄緑色で長さ 2～3mm，ルーペ視するとき，先端はきょ歯辺，筒部には数条の線があり，唇形花又は果実を含み，茎とともに類白色の短毛を認める。分果は黄褐色～黒色，両端の細いだ円体で長さ 1～1.5mm，径は長さのほぼ 1/2 である。特異な芳香があり，口に含むとわずかに清涼感がある。

必要に応じて，「ケイガイ」の確認試験を準用する。

（７）　オウギ　外面は淡灰黄色～淡褐黄色で，不規則なあらい縦じわがあり，折面は繊維性である。横断面をルーペ視するとき，最外層には周皮があり，皮部は淡黄白色，木部は淡黄色，形成層付近はやや褐色を帯びる。木部から皮部にわたって白色の放射組織が認められる。太いものではしばしば多数の放射状の裂け目となっている。わずかに特異なにおいがあり，味は甘い。

（８）　カンゾウ　外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現わす。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に 1～3 細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には 3～10 細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞中にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

（９）　シツリシ　5 角星状で，5 個の分果からなり，径 7～12mm，しばしば各分果に分離している。外面は灰緑色～灰褐色を呈し，各分果の外面に長短 2 対のとげがある。その 1 対は長さ 3～7mm，他は長さ 2～5mm である。肋線上に多くの小突起がある。果皮は堅く，切面は淡黄色を呈する。分果は 1～3 個の種子を含む。ほとんどにおいがなく，味は初め緩和で，後に苦い。

横切片を鏡検するとき，外果皮は 1 層の表皮からなり，中果皮は柔組織と厚壁細胞層からなり，内果皮は数層の繊維細胞層からなる。中果皮と内果皮との間にはシュウ酸カルシウムの単晶を含む 1 層の細胞層がある。種子の子葉中には油滴及びアリューロン粒を含み，でんぷん粒が認められることがある。

必要に応じて，「シツリシ」の確認試験を準用する。

（10）　カシュウ　ほぼ紡錘形を呈し，長さ 10～15cm，径 2～5cm。外面は赤褐色～暗褐色で，粗いしわがある。横切面は淡赤褐色又は淡灰褐色で，中央部に大型の維管束とその回りに小形の多数の異常維管束が不規則に散在する。質は重く堅い。特異な弱いにおいがあり，味は渋くてやや苦い。

横切片を鏡検するとき，最外層は数層のコルク層からなり，コルク細胞には褐色の物質が含まれる。皮層は柔組織からなる。各異常維管束は環状の形成層とそれを挟む師部と木部からなる。師部に外接して繊維が見られる。根の中心部は木化している。柔組織中には単粒及び 2～8 個の複粒のでんぷん粒とシュウ酸カルシウムの集晶を含む。でんぷん粒のへそは明瞭である。

必要に応じて，「カシュウ」の確認試験を準用する。

乾燥減量　15%以下。

灰　　分　7%以下。

【 343 】　K143

成分及び分量 又は本質	日本薬局方　トウキ　4.0g 〃　ケイヒ　4.0g 〃　ショウキョウ　1.0g 〃　タイソウ　4.0g 〃　シャクヤク　6.0g 〃　カンゾウ　2.0g 全　量　21.0g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。
効能又は効果	体力虚弱で，疲労しやすく血色のすぐれないものの次の諸症：月経痛，月経困難症，月経不順，腹痛，下腹部痛，腰痛，痔，脱肛の痛み，病後・術後の体力低下
貯蔵方法及び 有効期間	密閉容器
規格及び試験方法	別記のとおり。
備考	当帰建中湯

規格及び試験方法

性　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品1包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　トウキ　外面は暗褐色～赤褐色で，縦じわがあり，切断面は淡黄色～黄褐色を呈する。特異なにおいがあり，味はわずかに甘く，後にやや辛い。

横切片を鏡検するとき，コルク層は4～10層からなり，その内側に数層の厚角組織が続いている。皮部には分泌細胞に囲まれた多数の樹脂道並びにしばしば大きなすき間がある。形成層は長方形に偏圧された数層の細胞からなり，明らかに皮部と木部とを区別する。木部では多数の道管と放射組織とが交互に放射状に配列し，その外方の道管は単独又は数個集まってやや密に配列してくさび状をなすが，中心部付近の道管は極めてまばらに存在する。でんぷん粒は径19μm以下，まれに2～5個の複粒があり，複粒の径は25μmに達し，しばしばのり化している。

（２）　ケイヒ　外面は暗赤褐色を呈し，内面は赤褐色を呈し，平滑である。横断面は赤褐色を呈し淡褐色の薄層が見られる。特異なにおいがあり，味は甘く，辛く，後にやや粘液性で，わずかに収れん性である。

横切片を鏡検するとき，一次皮部と二次皮部はほとんど連続した石細胞環で区分され，環の外辺にはほぼ円形に結集した繊維束を伴い，環の各石細胞の膜はしばしばU字形に肥厚する。二次皮部中には石細胞を認めず，まばらに少数の厚膜繊維を認める。柔組織中には油細胞，粘液細胞及び微細なシュウ酸カルシウムの針晶を含む細胞があり，柔細胞中にはでんぷん粒を含む。

（３）　ショウキョウ　淡灰黄色の周皮を付けたままか，又はその一部をはぎとってあり，表面は灰白色～淡灰褐色で，しばしば白粉を付けている。横断面は繊維性，粉性で，淡帯黄褐色を呈し，皮層と中心柱とに分かれる。横断面をルーペ視するとき，その全面に維管束及び分泌物が褐色の細点として散在している。特異なにおいがあり，味は極めて辛い。

（４）　タイソウ　外面は赤褐色であらいしわがあるか，又は暗灰赤色で細かいしわがあり，いずれもつやがある。外果皮は薄く革質で，中果皮は暗灰褐色を呈し，海綿ようで柔らかく粘着性があり，内果皮は極めて堅く，種子は偏平である。わずかに特異なにおいがあり，味は甘い。

（５）　シャクヤク　外面は褐色～淡灰褐色を呈し，横断面はち密で淡灰褐色を呈し，木部には淡褐色の放射状の線がある。わずかに特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後に渋くてわずかに苦い。

必要に応じて，「シャクヤク」の確認試験を準用する。

（６）　カンゾウ　外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現わす。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に1～3細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には3～10細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞中にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

乾燥減量　15%以下。

灰　　分　10%以下。

【 344 】　K144

成分及び分量 又は本質	日本薬局方	トウキ	3.0g
	〃	シャクヤク	3.0g
	〃	センキュウ	3.0g
	〃	オウゴン	3.0g
	〃	ビャクジュツ	1.5g
		全　量	13.5g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。		
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，熱いうちに煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。 本剤は必ず1日分ずつ煎じ，数日分をまとめて煎じないこと。		
効能又は効果	体力中等度以下のものの次の諸症：産前産後の障害（貧血，疲労倦怠，めまい，むくみ）		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	当帰散料		

規格及び試験方法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品1包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　トウキ　外面は暗褐色～赤褐色で，縦じわがあり，切断面は暗褐色～黄褐色を呈する。特異なにおいがあり，味はわずかに甘く，後にやや辛い。

横切片を鏡検するとき，コルク層は4～10層からなり，その内側に数層の厚角組織がある。皮部には分泌細胞に囲まれた多数の油道及びしばしば大きなすき間がある。皮部と木部の境界は明らかで，木部では多数の道管と放射組織とが交互に放射状に配列し，その外方の道管は単独又は数個集まってやや密に配列してくさび状をなすが，中心部付近の道管は極めてまばらに存在する。でんぷん粒は径19μm以下，まれに2～5個の複粒があり，複粒の径は25μmに達し，しばしばのり化している。

（２）　シャクヤク　外面は褐色～淡灰褐色を呈し，横断面はち密で淡灰褐色を呈し，木部には淡褐色の放射状の線がある。わずかに特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後に渋くてわずかに苦い。

必要に応じて，「シャクヤク」の確認試験を準用する。

（３）　センキュウ　外面は灰褐色～暗褐色で，切断面は灰白色～灰褐色，半透明で，ときにはうつろがある。質は密で堅い。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，皮部及び髄には油道が散在する。木部には厚膜で木化した木部繊維が大小不同の群をなして存在する。でんぷん粒は，通例，のり化していて，まれに径5～25μm の粒として認めることがある。シュウ酸カルシウム結晶は認めない。

（４）　オウゴン　外面は黄褐色を呈し，切断面は黄色～黄褐色を呈し，縦に繊維性のすじが見られる。味はわずかに苦い。

必要に応じて，「オウゴン」の確認試験を準用する。

（５）　ビャクジュツ　外面は淡灰黄色～淡黄白色で，ところどころ灰褐色を呈し，横切面には淡黄褐色～褐色の分泌物による細点がある。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，皮部の柔組織中にはしばしば師部の外側に接して繊維束があり，放射組織の末端部には淡褐色～褐色の内容物を含む油室がある。木部には大きい髄を囲んで放射状に配列した短径の道管とそれを囲む著しい繊維束がある。髄及び放射組織中には皮部と同様な油室があり，柔組織中にはイヌリンの結晶及びシュウ酸カルシウムの小針晶を含む。

必要に応じて，「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。

乾燥減量　15％以下。

灰　　分　5％以下。

【 345 】　K144—①

成分及び分量 又は本質	日本薬局方　トウキ　1.2g 〃　シャクヤク　1.2g 〃　センキュウ　1.2g 〃　オウゴン　1.2g 〃　ビャクジュツ　0.6g 全　量　5.4g
製造方法	以上の生薬をそれぞれ末とし，散剤の製法により製する。ただし，分包散剤とする。
用法及び用量	大人 1 回 1.8g，1 日 3 回，食前又は空腹時に服用する。 15 才未満 7 才以上　大人の 2/3，7 才未満 4 才以上　大人の 1/2，4 才未満 2 才以上　大人の 1/3，2 才未満　大人の 1/4 以下を服用する。
効能又は効果	体力中等度以下のものの次の諸症：産前産後の障害（貧血，疲労倦怠，めまい，むくみ）
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器
規格及び試験方法	別記のとおり。
備考	当帰散

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は淡褐色の粉末で，特異なにおいがある。

確認試験

（1）　トウキ　本品の粉末 2g にジエチルエーテル 10mL を加え，還流冷却器を付け，水浴上で 10 分間加熱し，冷後，ろ過し，ろ液を試料溶液とする。

別に「トウキ」の粉末 1g をとり，試料溶液と同様に操作して対照溶液とする。

これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び対照溶液 10μL ずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲル（蛍光剤入り）を用いて調製した薄層板にスポットする。次にクロロホルム・アセトン混液（4：2）を展開溶媒として約 10cm 展開した後，薄層板を風乾する。

これに紫外線（主波長 365nm）を照射するとき，*Rf* 値約 0.71 付近に紫色蛍光のスポットを認める。

（2）　シャクヤク　本品の粉末 2g にメタノール 10mL を加え，還流冷却器を付け，水浴上で 10 分間加熱し，冷後，ろ過し，ろ液を試料溶液とする。

別に「シャクヤク」の粉末 1g をとり，試料溶液と同様に操作して対照溶液とする。

これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び対照溶液10μLずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲルを用いて調製した薄層板にスポットする。次にトルエン・ギ酸・ギ酸エチル混液（3：1：6）を展開溶媒として約10cm展開した後，薄層板を風乾する。

これに塩化鉄（Ⅲ）試液を均等に噴霧するとき，*Rf*値約0.5付近に暗紫色のスポットを認める。

（3）　センキュウ　本品の粉末2gにジエチルエーテル10mLを加え，還流冷却器を付け，水浴上で10分間加熱し，冷後，ろ過し，ろ液を試料溶液とする。

別に「センキュウ」の粉末1gをとり，試料溶液と同様に操作して対照溶液とする。

これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び対照溶液10μLずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲル（蛍光剤入り）を用いて調製した薄層板にスポットする。次にクロロホルム・アセトン・ギ酸混液（4：2：0.5）を展開溶媒として約10cm展開した後，薄層板を風乾する。

これに紫外線（主波長365nm）を照射するとき，*Rf*値約0.73付近に白色蛍光のスポットを認める。

（4）　オウゴン　本品の粉末2gにメタノール10mLを加え，還流冷却器を付け，水浴上で10分間加熱し，冷後，ろ過し，ろ液を試料溶液とする。

別に，「オウゴン」の粉末1gをとり，試料溶液と同様に操作して，対照溶液とする。

これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び対照溶液10μLずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲルを用いて調製した薄層板にスポットする。次にクロロホルム・メタノール混液（3：1）を展開溶媒として約10cm展開した後，薄層板を風乾する。これに塩化鉄（Ⅲ）試液を均等に噴霧するとき，*Rf*値約0.86付近に褐色のスポットを認める。

（5）　ビャクジュツ　本品の粉末2gにヘキサン10mLを加え，還流冷却器を付け，水浴上で10分間加熱し，冷後，ろ過し，ろ液を試料溶液とする。

別に「ビャクジュツ」の粉末1gをとり，試料溶液と同様に操作して対照溶液とする。

これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び対照溶液10μLずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲルを用いて調製した薄層板にスポットする。次にヘキサン・ベンゼン・酢酸エチル混液（14：3：3）を展開溶媒として約10cm展開した後，薄層板を風乾する。

これに*p*－ジメチルアミノベンズアルデヒド試液を均等に噴霧し，100℃で5分間加熱するとき，*Rf*値約0.89付近に紫色のスポットを認める。

乾燥減量　15％以下。

灰　　分　5％以下。

【 346 】　K145

成分及び分量又は本質	日本薬局方	トウキ	3.0g
	〃	ケイヒ	3.0g
	〃	シャクヤク	3.0g
	〃	モクツウ	3.0g
	〃	サイシン	2.0g
	〃	カンゾウ	1.5～2.0g
	〃	タイソウ	5.0g
	〃	ゴシュユ	2.0g
	〃	ショウキョウ	1.0g
		全　　量	23.5～24.0g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。		
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。		
効能又は効果	体力中等度以下で，手足の冷えを感じ，下肢の冷えが強く，下肢又は下腹部が痛くなりやすいものの次の諸症：冷え症，しもやけ，頭痛，下腹部痛，腰痛，下痢，月経痛		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	当帰四逆加呉茱萸生姜湯		

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品1包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　トウキ　外面は暗褐色～赤褐色で，縦じわがあり，切断面は淡黄色～黄褐色を呈する。特異なにおいがあり，味はわずかに甘く，後にやや辛い。

横切片を鏡検するとき，コルク層は4～10層からなり，その内側に数層の厚角組織が続いている。皮部には分泌細胞に囲まれた多数の樹脂道並びにしばしば大きなすき間がある。形成層は長方形に偏圧された数層の細胞からなり，明らかに皮部と木部とを区別す

る。木部では多数の道管と放射組織とが交互に放射状に配列し，その外方の道管は単独又は数個集まってやや密に配列してくさび状をなすが，中心部付近の道管は極めてまばらに存在する。でんぷん粒は径 19μm 以下，まれに 2～5 個の複粒があり，複粒の径は 25μm に達し，しばしばのり化している。

（２）　ケイヒ　外面は暗赤褐色を呈し，内面は赤褐色を呈し，平滑である。横断面は赤褐色を呈し淡褐色の薄層が見られる。特異なにおいがあり，味は甘く，辛く，後にやや粘液性で，わずかに収れん性である。

横切片を鏡検するとき，一次皮部と二次皮部はほとんど連続した石細胞環で区分され，環の外辺にはほぼ円形に結集した繊維束を伴い，環の各石細胞の膜はしばしば U 字形に肥厚する。二次皮部中には石細胞を認めず，まばらに少数の厚膜繊維を認める。柔組織中には油細胞，粘液細胞及び微細なシュウ酸カルシウムの針晶を含む細胞があり，柔細胞中にはでんぷん粒を含む。

（３）　シャクヤク　外面は褐色～淡灰褐色を呈し，横断面はち密で淡灰褐色を呈し，木部には淡褐色の放射状の線がある。わずかに特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後に渋くてわずかに苦い。

必要に応じて，「シャクヤク」の確認試験を準用する。

（４）　モクツウ　外側のコルク層は灰褐色で，円形又は横に長いだ円形の皮目がある。皮部は暗灰褐色を呈し，木部は淡褐色で，灰白色の放射組織と交互に配列する。髄は淡灰黄色で，明らかである。味はわずかにえぐい。

横切片を鏡検するとき，師部の外辺を囲む弧状の輪層は主として結晶細胞列をなす繊維束と石細胞群とからなり，皮部の放射組織は単晶を含む厚膜細胞からなる。形成層は明らかで，束外では著しく内方に湾入している。髄周辺の細胞は，はなはだ厚膜で，しばしば単晶を含んでいる。でんぷん粒の大きさは 8μm 以下である。

必要に応じて，「モクツウ」の確認試験を準用する。

（５）　サイシン　根の外面は淡褐色で，径約 1mm，切断面は黄白色である。根茎は不整に湾曲し外面は暗褐色を呈する。特異なにおいがあり，味は辛く舌をやや麻ひする。

（６）　カンゾウ　外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現わす。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に 1～3 細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には 3～10 細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞中にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

（７）　タイソウ　外面は赤褐色であらいしわがあるか，又は暗灰赤色で細かいしわがあり，いずれもつやがある。外果皮は薄く革質で，中果皮は暗灰褐色を呈し，海綿ようで柔らかく粘着性があり，内果皮は極めて堅く，種子は偏平である。わずかに特異なにおいがあり，味は甘い。

（８）　ゴシュユ　偏球形又は球形を呈し，外面は暗褐色～灰褐色，多くの油室がくぼんだ小点として認められ，その中心には花柱の残基があるが，しばしばこれは脱落している。果柄は長さ 2～5mm で，灰緑色の毛を密生している。果皮は，通例，開裂し，子房は

5 室に分かれ，各室中には倒卵球形又は球形の褐色～黒褐色又は帯青黒色のつやのある種子がある。特異なにおいがあり，味は辛く，後に残留性の苦味がある。

必要に応じて，「ゴシュユ」の確認試験を準用する。

（９）　ショウキョウ　淡灰黄色の周皮を付けたままか，又はその一部をはぎとってあり，表面は灰白色～淡灰褐色で，しばしば白粉を付けている。横断面は繊維性，粉性で，淡帯黄褐色を呈し，皮層と中心柱とに分かれる。横断面をルーペ視するとき，その全面に維管束及び分泌物が褐色の細点として散在している。特異なにおいがあり，味は極めて辛い。

乾燥減量　15%以下。

灰　　分　5%以下。

【 347 】　K146

成分及び分量又は本質	日本薬局方	トウキ	3.0g
	〃	ケイヒ	3.0g
	〃	シャクヤク	3.0g
	〃	モクツウ	3.0g
	〃	サイシン	2.0g
	〃	カンゾウ	1.2～2.0g
	〃	タイソウ	5.0g
		全　　量	20.2～21.0g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。		
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。		
効能又は効果	体力中等度以下で，手足が冷えて下腹部が痛くなりやすいものの次の諸症：しもやけ，下腹部痛，腰痛，下痢，月経痛，冷え症		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	当帰四逆湯		

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品1包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　トウキ　外面は暗褐色～赤褐色で，縦じわがあり，切断面は淡黄色～黄褐色を呈する。特異なにおいがあり，味はわずかに甘く，後にやや辛い。

横切片を鏡検するとき，コルク層は4～10層からなり，その内側に数層の厚角組織が続いている。皮部には分泌細胞に囲まれた多数の樹脂道並びにしばしば大きなすき間がある。形成層は長方形に偏圧された数層の細胞からなり，明らかに皮部と木部とを区別する。木部では多数の道管と放射組織とが交互に放射状に配列し，その外方の道管は単独又は数個集まってやや密に配列してくさび状をなすが，中心部付近の道管は極めてまばらに存在する。でんぷん粒は径19μm以下，まれに2～5個の複粒があり，複粒の径は25μmに達し，しばしばのり化している。

（２）　ケイヒ　外面は暗赤褐色を呈し，内面は赤褐色を呈し，平滑である。横断面は赤褐色を呈し淡褐色の薄層が見られる。特異なにおいがあり，味は甘く，辛く，後にやや粘液性で，わずかに収れん性である。

横切片を鏡検するとき，一次皮部と二次皮部はほとんど連続した石細胞環で区分され，環の外辺にはほぼ円形に結集した繊維束を伴い，環の各石細胞の膜はしばしばU字形に肥厚する。二次皮部中には石細胞を認めず，まばらに少数の厚膜繊維を認める。柔組織中には油細胞，粘液細胞及び微細なシュウ酸カルシウムの針晶を含む細胞があり，柔細胞中にはでんぷん粒を含む。

（３）　シャクヤク　外面は褐色～淡灰褐色を呈し，横断面はち密で淡灰褐色を呈し，木部には淡褐色の放射状の線がある。わずかに特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後に渋くてわずかに苦い。

必要に応じて，「シャクヤク」の確認試験を準用する。

（４）　モクツウ　外側のコルク層は灰褐色で，円形又は横に長いだ円形の皮目がある。皮部は暗灰褐色を呈し，木部は淡褐色で，灰白色の放射組織と交互に配列する。髄は淡灰黄色で，明らかである。味はわずかにえぐい。

横切片を鏡検するとき，師部の外辺を囲む弧状の輪層は主として結晶細胞列をなす繊維束と石細胞群とからなり，皮部の放射組織は単晶を含む厚膜細胞からなる。形成層は明らかで，束外では著しく内方に湾入している。髄周辺の細胞は，はなはだ厚膜で，しばしば単晶を含んでいる。でんぷん粒の大きさは8μm以下である。

必要に応じて，「モクツウ」の確認試験を準用する。

（５）　サイシン　根の外面は淡褐色で，径約1mm，切断面は黄白色である。根茎は不整に湾曲し外面は暗褐色を呈する。特異なにおいがあり，味は辛く舌をやや麻ひする。

（６）　カンゾウ　外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現わす。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に1～3細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には3～10細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞中にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

（７）　タイソウ　外面は赤褐色であらいしわがあるか，又は暗灰赤色で細かいしわがあり，いずれもつやがある。外果皮は薄く革質で，中果皮は暗灰褐色を呈し，海綿ようで柔らかく粘着性があり，内果皮は極めて堅く，種子は偏平である。わずかに特異なにおいがあり，味は甘い。

乾燥減量　15％以下。

灰　　分　6％以下。

【 348 】　K147

成分及び分量 又 は 本 質	日本薬局方	トウキ	3.0g
	〃	シャクヤク	6.0g
	〃	ブクリョウ	4.0g
	〃	タクシャ	4.0g
	〃	センキュウ	3.0g
	〃	ビャクジュツ	4.0g
		全　　量	24.0g
製 造 方 法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。		
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。		
効能又は効果	体力虚弱で，冷え症で貧血の傾向があり疲労しやすく，ときに下腹部痛，頭重，めまい，肩こり，耳鳴り，動悸などを訴えるものの次の諸症：月経不順，月経異常，月経痛，更年期障害，産前産後あるいは流産による障害（貧血，疲労倦怠，めまい，むくみ），めまい・立ちくらみ，頭重，肩こり，腰痛，足腰の冷え症，しもやけ，むくみ，しみ，耳鳴り		
貯蔵方法及び 有 効 期 間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備　　考	当帰芍薬散料		

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験（Ⅰ）　本品1包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　トウキ　外面は暗褐色～赤褐色で，縦じわがあり，切断面は淡黄色～黄褐色を呈する。特異なにおいがあり，味はわずかに甘く，後にやや辛い。

横切片を鏡検するとき，コルク層は4～10層からなり，その内側に数層の厚角組織が続いている。皮部には分泌細胞に囲まれた多数の樹脂道並びにしばしば大きなすき間がある。形成層は長方形に偏圧された数層の細胞からなり，明らかに皮部と木部とを区別する。木部では多数の道管と放射組織とが交互に放射状に配列し，その外方の道管は単独又

は数個集まってやや密に配列してくさび状をなすが，中心部付近の道管は極めてまばらに存在する。でんぷん粒は径 19μm 以下，まれに 2～5 個の複粒があり，複粒の径は 25μm に達し，しばしばのり化している。

（２）　シャクヤク　外面は褐色～淡灰褐色を呈し，横断面はち密で淡灰褐色を呈し，木部には淡褐色の放射状の線がある。わずかに特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後に渋くてわずかに苦い。

必要に応じて，「シャクヤク」の確認試験を準用する。

（３）　ブクリョウ　白色又はわずかに淡赤色を帯びた白色で，質は堅いが砕きやすい。味はないがやや粘液ようである。

必要に応じて，「ブクリョウ」の確認試験を準用する。

（４）　タクシャ　淡黄褐色～淡褐色でコルク層をつける部位はやや暗色を呈する。ルーペ視するとき，褐色～淡褐色のはん点が散在する。切面は粒状で，繊維性ではない。わずかににおい及び味がある。

（５）　センキュウ　外面は灰褐色～暗褐色で，切断面は灰白色～灰褐色，半透明で，ときにはうつろがある。質は密で堅い。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，皮部及び髄には油道が散在する。木部には厚膜で木化した木部繊維が大小不同の群をなして存在する。でんぷん粒は，通例，のり化していて，まれに径 5～25μm のでんぷん粒を認めることがある。シュウ酸カルシウム結晶は認めない。

（６）　ビャクジュツ　外面は淡灰黄色～淡黄白色で，ところどころ灰褐色を呈し，横切面には淡黄褐色～褐色の分泌物による細点がある。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，皮部の柔組織中にはしばしば師部の外側に接して繊維束があり，放射組織の末端部には淡褐色～褐色の内容物を含む油室がある。木部には大きい髄を囲んで放射状に配列した短径の道管とそれを囲む著しい繊維束がある。髄及び放射組織中には皮部と同様な油室があり，柔組織中にはイヌリンの小球晶及びシュウ酸カルシウムの針晶を含む。

必要に応じて，「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。

確認試験（Ⅱ）

（１）　トウキ　本品の粉末 2g にジエチルエーテル 10mL を加え，還流冷却器を付け，水浴上で 10 分間加熱し，冷後，ろ過し，ろ液を試料溶液とする。

別に「トウキ」の粉末 1g をとり，試料溶液と同様に操作して対照溶液とする。

これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び対照溶液 10mL ずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲル（蛍光剤入り）を用いて調製した薄層板にスポットする。次にクロロホルム・アセトン混液（4：2）を展開溶媒として約 10cm 展開した後，薄層板を風乾する。

これに紫外線（主波長 365nm）照射をするとき，*Rf* 値約 0.76 付近に紫色蛍光のスポットを認める。

（２）　シャクヤク　本品の粉末 2g にメタノール 10mL を加え，還流冷却器を付け，水浴上で 10 分間加熱し，冷後，ろ過し，ろ液を試料溶液とする。

別に「シャクヤク」の粉末 1g をとり，試料溶液と同様に操作して対照溶液とする。

これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び対照溶液10μLずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲルを用いて調製した薄層板にスポットする。次にトルエン・ギ酸・ギ酸エチル混液（3：1：6）を展開溶媒として約10cm展開した後，薄層板を風乾する。

これに塩化鉄（Ⅲ）試液を均等に噴霧するとき，*Rf*値約0.59付近に暗紫色のスポットを認める。

（3）　センキュウ　本品の粉末2gにジエチルエーテル10mLを加え，還流冷却器を付け，水浴上で10分間加熱し，冷後，ろ過し，ろ液を試料溶液とする。

別に「センキュウ」の粉末1gをとり，試料溶液と同様に操作して対照溶液とする。

これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び対照溶液10μLずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲル（螢光剤入り）を用いて調製した薄層板にスポットする。次にクロロホルム・アセトン・ギ酸混液（4：2：0.5）を展開溶媒として約10cm展開した後，薄層板を風乾する。

これに紫外線（主波長365nm）照射をするとき，*Rf*値約0.59付近に紫色のスポットを認める。

（4）　ビャクジュツ　本品の粉末2gにヘキサン10mLを加え，還流冷却器を付け，水浴上で10分間加熱し，冷後，ろ過し，ろ液を試料溶液とする。

別に「ビャクジュツ」の粉末1gをとり，試料溶液と同様に操作して対照溶液とする。

これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び対照溶液10μLずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲルを用いて調製した薄層板にスポットする。次にヘキサン・ベンゼン・酢酸エチル混液（14：3：3）を展開溶媒として約10cm展開した後，薄層板を風乾する。

これに*p*－ジメチルアミノベンズアルデヒド試液を均等に噴霧し，105℃で5分間加熱するとき，*Rf*値約0.66付近に紅色のスポットを認める。

乾燥減量　15％以下。

灰　　分　5％以下。

【 349 】　K147—①

成分及び分量又は本質	日本薬局方　トウキ末　0.4g 〃　シャクヤク末　2.2g 〃　ブクリョウ末　0.6g 〃　タクシャ末　1.1g 〃　センキュウ末　1.1g 〃　ビャクジュツ末　0.6g 全　量　6.0g
製造方法	以上をとり，散剤の製法により製し，3包とする。
用法及び用量	大人1日3回，1回1包，食前又は空腹時に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。
効能又は効果	体力虚弱で，冷え症で貧血の傾向があり疲労しやすく，ときに下腹部痛，頭重，めまい，肩こり，耳鳴り，動悸などを訴えるものの次の諸症：月経不順，月経異常，月経痛，更年期障害，産前産後あるいは流産による障害（貧血，疲労倦怠，めまい，むくみ），めまい・立ちくらみ，頭重，肩こり，腰痛，足腰の冷え症，しもやけ，むくみ，しみ，耳鳴り
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器
規格及び試験方法	別記のとおり。
備考	当帰芍薬散

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は淡灰褐色～淡褐色の粉末で，特異なにおいがある。

確認試験　本品に薄めたグリセリン（1→2）又は抱水クロラール50gを水15mL及びグリセリン10mLの混液に溶かした液を滴加して鏡検するとき，表面粒状を呈する無色のでんぷん塊，階紋及び網紋導管，離生油室を認める（トウキ）；菌糸，顆粒体，粘液板又はそれらを含む偽組織の破片を認める（ブクリョウ）；でんぷん粒又はシュウ酸カルシウムの集晶を含む円形，鈍多角形又は長形の柔細胞を認め，この細胞膜には孔紋がある。重縁孔，孔紋，階紋導管の破片を認める（シャクヤク）；イヌリンの小球晶を含んだ柔細胞及び褐色の内容物を含む油室があり，少数の石細胞を認める（ビャクジュツ）；だ円形のでんぷん粒又はこれを含む柔組織の片を認める（タクシャ）；代用繊維，分泌道，退廃師管と特異の形をした厚膜の木部繊維を認める（センキュウ）。

乾燥減量　20%以下。

灰　　分　5%以下。

【 350 】　K148

成分及び分量又は本質	日本薬局方　トウキ　5.0g 〃　ハンゲ　5.0g 〃　シャクヤク　3.0g 〃　コウボク　3.0g 〃　ケイヒ　3.0g 〃　ニンジン　3.0g 〃　カンキョウ　1.5g 〃　オウギ　1.5g 〃　サンショウ　1.5g 〃　カンゾウ　1.0g 全　量　27.5g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。
効能又は効果	体力中等度以下で，背中に冷感があり，腹部膨満感や腹痛・胸背部痛のあるものの次の諸症：胸痛，腹痛，胃炎
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器
規格及び試験方法	別記のとおり。
備考	当帰湯

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品1包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　トウキ　外面は暗褐色～赤褐色で，縦じわがあり，切断面は淡黄色～黄褐色を呈する。特異なにおいがあり，味はわずかに甘く，後にやや辛い。

横切片を鏡検するとき，コルク層は4～10層からなり，その内側に数層の厚角組織が続いている。皮部には分泌細胞に囲まれた多数の樹脂道並びにしばしば大きなすき間がある。形成層は長方形に偏圧された数層の細胞からなり，明らかに皮部と木部とを区別す

る。木部では多数の道管と放射組織とが交互に放射状に配列し，その外方の道管は単独又は数個集まってやや密に配列してくさび状をなすが，中心部付近の道管は極めてまばらに存在する。でんぷん粒は径 19μm 以下，まれに 2～5 個の複粒があり，複粒の径は 25μm に達し，しばしばのり化している。

（２）　ハンゲ　外面は白色～灰白黄色，上部には茎の跡がくぼみとなり，その周辺には根の跡がくぼんだ細点となっている。横断面は白色，粉性である。味は初めなく，やや粘液性で，後に強いえぐ味を残す。

横切片を鏡検するとき，主としてでんぷん粒を充満した柔組織からなり，わずかにシュウ酸カルシウムの束晶を含んだ粘液細胞がその間に認められる。でんぷん粒は主として 2～3 個の複粒で，通例，径 10～15μm，単粒は通例径 3～7μm である。束晶は長さ 25～150μm である。

（３）　シャクヤク　外面は褐色～淡灰褐色を呈し，横断面はち密で淡灰褐色を呈し，木部には淡褐色の放射状の線がある。わずかに特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後に渋くてわずかに苦い。

必要に応じて，「シャクヤク」の確認試験を準用する。

（４）　コウボク　外面は灰白色～灰褐色を呈し，内面は淡褐色～褐色，切断面は淡赤褐色を呈し，繊維性である。わずかに芳香があり，味は苦い。

横切片を鏡検するとき，コルク層は厚く，ほぼ等径性の石細胞が環状に内接する。一次皮部は狭く，内しょう部には繊維群が点在し，二次皮部の放射組織間には師部繊維群が階段状に並ぶ。油細胞の多数は一次皮部に，少数は二次皮部に散在し，狭い放射組織内にも認められることがある。

必要に応じて，「コウボク」の確認試験を準用する。

（５）　ケイヒ　外面は暗赤褐色を呈し，内面は赤褐色を呈し，平滑である。横断面は赤褐色を呈し淡褐色の薄層が見られる。特異なにおいがあり，味は甘く，辛く，後にやや粘液性で，わずかに収れん性である。

横切片を鏡検するとき，一次皮部と二次皮部はほとんど連続した石細胞環で区分され，環の外辺にはほぼ円形に結集した繊維束を伴い，環の各石細胞の膜はしばしば U 字形に肥厚する。二次皮部中には石細胞を認めず，まばらに少数の厚膜繊維を認める。柔組織中には油細胞，粘液細胞及び微細なシュウ酸カルシウムの針晶を含む細胞があり，柔細胞中にはでんぷん粒を含む。

（６）　ニンジン　外面は淡黄褐色～淡灰褐色を呈し，縦じわがあり，横断面は淡黄褐色を呈し，形成層の付近は褐色を呈する。特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後にやや苦い。

必要に応じて，「ニンジン」の確認試験を準用する。

（７）　カンキョウ　偏圧した不規則な塊状でしばしば分枝する。分枝した各部はやや湾曲した卵形又は長卵形を呈し，長さ 2～4cm，径 1～2cm である。外面は灰黄色～灰黄褐色で，しわ及び輪節がある。折面は褐色～暗褐色で透明感があり角質である。横切面をルーペ視するとき皮層と中心柱は区分され，全面に維管束が散在する。特異なにおいがあり，味は極めて辛い。

横切片を鏡検するとき，外側よりコルク層，皮層，内皮，中心柱が認められる。皮層と中心柱は一層の内皮によって区分される。皮層及び中心柱は柔組織からなり，繊維束で囲

まれた維管束が散在する。柔組織中には黄色の油様物質を含む油細胞が散在し，柔細胞中にはシュウ酸カルシウムの単晶が含まれ，でんぷんは糊化している。

必要に応じて，「カンキョウ」の確認試験を準用する。

（８） オウギ 外面は淡灰黄色～淡褐黄色で，不規則なあらい縦じわがあり，折面は繊維性である。横断面をルーペ視するとき，最外層には周皮があり，皮部は淡黄白色，木部は淡黄色，形成層付近はやや褐色を帯びる。木部から皮部にわたって白色の放射組織が認められる。太いものではしばしば多数の放射状の裂け目となっている。わずかに特異なにおいがあり，味は甘い。

（９） サンショウ 偏球形のさく果の果皮で，開裂した径約 5mm の 2 心皮からなり，1 果柄に，通例，2～3 個合着するが，しばしば，そのうちの 1 個は，い縮退化していることがある。外面は暗黄赤色～暗赤褐色で，多数のくぼんだ小点があり，内面は淡黄白色である。特異な芳香があり，味は辛く舌を麻ひする。

横切片を鏡検するとき，外面表皮とこれに接する 1 細胞層中には赤褐色のタンニン質及びアントシアンを含み，果皮内部には径約 500μm に達する大きな油室があり，ところどころにらせん紋道管を主とする維管束が点在し，内層は石細胞層からなり，内面表皮細胞は極めて小さい。

（10） カンゾウ 外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現わす。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に 1～3 細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には 3～10 細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞中にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

乾燥減量 15%以下。

灰　　分 5%以下。

【 351 】　K149

成分及び分量 又は本質	日本薬局方　トウキ　3.0g 〃　クジン　3.0g 〃　バイモ　3.0g 全　量　9.0g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。
効能又は効果	体力中等度以下のものの次の諸症：小便がしぶって出にくいもの，排尿困難
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器
規格及び試験方法	別記のとおり。
備考	当帰貝母苦参丸料

規格及び試験方法

性　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品1包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　トウキ　外面は暗褐色～赤褐色で，縦じわがあり，切断面は淡黄色～黄褐色を呈する。特異なにおいがあり，味はわずかに甘く，後にやや辛い。

横切片を鏡検するとき，コルク層は4～10層からなり，その内側に数層の厚角組織が続いている。皮部には分泌細胞に囲まれた多数の樹脂道並びにしばしば大きなすき間がある。形成層は長方形に偏圧された数層の細胞からなり，明らかに皮部と木部とを区別する。木部では多数の道管と放射組織とが交互に放射状に配列し，その外方の道管は単独又は数個集まってやや密に配列してくさび状をなすが，中心部付近の道管は極めてまばらに存在する。でんぷん粒は径19μm以下，まれに2～5個の複粒があり，複粒の径は25μmに達し，しばしばのり化している。

（2）　クジン　外面は暗褐色～黄褐色で，切断面は黄白色～淡灰褐色を呈し，繊維性である。味は極めて苦く，残留性である。

必要に応じて，「クジン」の確認試験を準用する。

（３）　バイモ　偏球形を呈し，肥厚した 2 個のりん片葉からなり，径 2～3cm，高さ 1～2cm，しばしば分離したものがある。外面及び内面は白色～淡黄褐色，内面の基部はやや暗色を呈する。石灰を散布して乾燥したものは白粉を付けている。折面は白色を呈し，粉性である。特異な弱いにおいがあり，味は苦い。

横切片を鏡検するとき，最外層は 1 層の表皮からなりその内側は柔組織で満たされ，多数の維管束が散在する。柔組織中にはでんぷん粒を含む。でんぷん粒は主に単粒で，径 5～50μm，層紋が明瞭で，長卵形～卵形又は三角状卵形，まれに 2～3 個からなる複粒もある。また，表皮細胞及び道管付近の柔細胞にはシュウ酸カルシウムの単晶を含む。

必要に応じて，「バイモ」の確認試験を準用する。

乾燥減量　15%以下。

灰　　分　10%以下。

【 352 】　K150

成分及び分量又は本質	日本薬局方	カッコン	5.0g
	〃	ケイヒ	3.0g
	〃	シャクヤク	3.0g
	〃	マオウ	2.0g
	〃	ショウキョウ	0.5g
	〃	ジオウ	4.0g
	〃	タイソウ	1.0g
	〃	カンゾウ	1.0g
	〃	ドクカツ	2.0g
		全　量	21.5g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。		
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。		
効能又は効果	体力中等度又はやや虚弱なものの次の諸症：四十肩，五十肩，寝ちがえ，肩こり		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	独活葛根湯		

規格及び試験方法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品1包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　カッコン　淡灰黄色～灰白色を呈し，繊維性でやや粉性である。味はわずかに甘い。横切片を鏡検するとき，師部には結晶細胞列を伴った繊維束，木部には道管及び木部繊維が著しく，柔組織を満たすでんぷん粒は長径2～18μm，多くは8～12μmの数面からなる多面体の単粒，まれに2～3個からなる複粒で，中央にへそ又は欠裂を認め，層紋がある。

（２）　ケイヒ　外面は暗赤褐色を呈し，内面は赤褐色を呈し，平滑である。横断面は赤褐色を呈し淡褐色の薄層が見られる。特異なにおいがあり，味は甘く，辛く，後にやや粘液性で，わずかに収れん性である。

横切片を鏡検するとき，一次皮部と二次皮部はほとんど連続した石細胞環で区分され，環の外辺にはほぼ円形に結集した繊維束を伴い，環の各石細胞の膜はしばしばU字形に肥厚する。二次皮部中には石細胞を認めず，まばらに少数の厚膜繊維を認める。柔組織中には油細胞，粘液細胞及び微細なシュウ酸カルシウムの針晶を含む細胞があり，柔細胞中にはでんぷん粒を含む。

（３）　シャクヤク　外面は褐色～淡灰褐色を呈し，横断面はち密で淡灰褐色を呈し，木部には淡褐色の放射状の線がある。わずかに特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後に渋くてわずかに苦い。

必要に応じて，「シャクヤク」の確認試験を準用する。

（４）　マオウ　細い円柱状又はだ円柱を呈し，長さ3～10mm，径1～2mm，淡緑色～黄緑色である。表面に多数の平行する縦みぞがあり，節部には，長さ2～4mmの2枚のりん片状の葉が対生し，その基部は合着して筒状になっている。りん片状の葉の色は淡褐色～褐色である。茎の横断面をルーペ視するとき，円形～だ円形で，周囲部は灰緑色～黄緑色を呈し，中心部には赤緑色の物質が充満しているか，又は中空のところがある。味は渋くてわずかに苦く，やや麻ひ性である。

必要に応じて，「マオウ」の確認試験を準用する。

（５）　ショウキョウ　淡灰黄色の周皮を付けたままか，又はその一部をはぎとってあり，表面は灰白色～淡灰褐色で，しばしば白粉を付けている。横断面は繊維性，粉性で，淡帯黄褐色を呈し，皮層と中心柱とに分かれる。横断面をルーペ視するとき，その全面に維管束及び分泌物が褐色の細点として散在している。特異なにおいがあり，味は極めて辛い。

（６）　ジオウ　外面は黄褐色～黒褐色を呈し，深い縦みぞ及びくびれがある。質は柔らかく粘性である。横断面は黄褐色～黒褐色で，皮部は木部より色が濃く，ほとんど髄を認めない。特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後にやや苦い。

横切片を鏡検するとき，コルク層は7～15層で，皮部はすべて柔細胞からなり，外皮部に褐色の分泌物を含む細胞が散在する。木部はほとんど柔細胞で満たされ，放射状に並ぶ道管は側孔のある網紋があり，弱い木化反応を呈する。

（７）　タイソウ　外面は赤褐色であらいしわがあるか，又は暗灰赤色で細かいしわがあり，いずれもつやがある。外果皮は薄く革質で，中果皮は暗灰褐色を呈し，海綿ようで柔らかく粘着性があり，内果皮は極めて堅く，種子は偏平である。わずかに特異なにおいがあり，味は甘い。

（８）　カンゾウ　外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現わす。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に1～3細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には3～10細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞中

にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

（９）　ドクカツ　湾曲した不整円柱状～塊状を呈する根茎で，ときに短い根を付けることがある。長さ 4～12cm，径 2.5～7cm，しばしば縦割又は横切されている。上部には茎の跡による大きなくぼみが 1～数個あるか，又は径 1.5～2.5cm の茎の短い残基を 1 個付けるものがある。外面は暗褐色～黄褐色を呈し，縦じわがあり，根の基部又はその跡がある。横切面は灰黄褐色～黄褐色を呈し，油道による褐色の細点が散在し，多くの裂け目がある。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，最外層はコルク層で，コルク石細胞からなる層がある。これに続き数層の厚角組織が認められる。維管束と放射組織は明瞭で，髄は広い。師部の外側に師部繊維群が認められることがある。皮部及び髄に離生細胞間隙からなる油道が認められる。木部は道管，木部繊維及び厚壁化することがある木部柔組織からなる。髄中には維管束が散在する。また，柔細胞にはシュウ酸カルシウムの集晶が認められる。でんぷん粒は，単粒又は 2～6 個の複粒である。

必要に応じて，「ドクカツ」の確認試験を準用する。

乾燥減量　15％以下。

灰　　分　5％以下。

【 353 】　K151

成分及び分量又は本質	日本薬局方	ドクカツ	2.0g
	〃	キョウカツ	2.0g
	〃	ボウフウ	2.0g
	〃	ケイヒ	2.0g
	〃	ダイオウ	2.0g
	〃	タクシャ	2.0g
	〃	トウキ	3.0g
	〃	トウニン	3.0g
	〃	レンギョウ	3.0g
	〃	ボウイ	5.0g
	〃	オウバク	5.0g
	〃	カンゾウ	1.5g
		全　　量	32.5g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。		
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。		
効能又は効果	体力中等度なものの次の諸症：腰痛，手足の屈伸痛		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	独活湯		

規格及び試験方法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品1包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　ドクカツ　湾曲した不整円柱状～塊状を呈する根茎で，ときに短い根を付けることがある。長さ4～12cm，径2.5～7cm，しばしば縦割又は横切されている。上部には茎の跡による大きなくぼみが1～数個あるか，又は径1.5～2.5cmの茎の短い残基を1個付け

るものがある。外面は暗褐色～黄褐色を呈し，縦じわがあり，根の基部又はその跡がある。横切面は灰黄褐色～黄褐色を呈し，油道による褐色の細点が散在し，多くの裂け目がある。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，最外層はコルク層で，コルク石細胞からなる層がある。これに続き数層の厚角組織が認められる。維管束と放射組織は明瞭で，髄は広い。師部の外側に師部繊維群が認められることがある。皮部及び髄に離生細胞間隙からなる油道が認められる。木部は道管，木部繊維及び厚壁化することがある木部柔組織からなる。髄中には維管束が散在する。また，柔細胞にはシュウ酸カルシウムの集晶が認められる。でんぷん粒は，単粒又は 2～6 個の複粒である。

必要に応じて，「ドクカツ」の確認試験を準用する。

（２）　キョウカツ　やや湾曲した円柱形～円錐形を呈し，長さ 3～10cm，径 5～20mm，ときに根茎は分枝する。外面は黄褐色～暗褐色である。根茎はその頂端にやや円形にくぼんだ茎の跡があり，ときには短い茎の残基を付け，外面には隆起した節があり，節間は，通例，短い。節にはいぼ状突起となった根の跡がある。根の外面には粗い縦じわ及びいぼ状突起となった側根の跡がある。質は軽くややもろくて折りやすい。横切面には多くの放射状の裂け目があり，皮部は黄褐色～褐色，木部は淡黄色～淡灰黄色，髄は灰白色～淡褐色を呈し，ルーペ視するとき，皮部及び髄には油道による褐色の細点を認める。特異なにおいがあり，味は初めわずかに酸味があり，後にやや辛く，わずかに麻痺性である。

横切片を鏡検するとき，最外層は数層～十数層のコルク層からなり，その内側に数層の厚角組織がある。皮層には多数の油道があり，大きいものでは径が 300μm に達する。また皮層には放射状に大きなすき間がある。髄にも油道があり，大きいものでは径が 500μm に達する。柔組織中には単粒及び 2～3 個の複粒のでんぷん粒を含む。

必要に応じて，「キョウカツ」の確認試験を準用する。

（３）　ボウフウ　外面は淡褐色で，多数の縦じわがある。横断面の周辺は灰褐色で，空げきが多く，中央は円形に黄色を呈する。味はわずかに甘い。

（４）　ケイヒ　外面は暗赤褐色を呈し，内面は赤褐色を呈し，平滑である。横断面は赤褐色を呈し淡褐色の薄層が見られる。特異なにおいがあり，味は甘く，辛く，後にやや粘液性で，わずかに収れん性である。

横切片を鏡検するとき，一次皮部と二次皮部はほとんど連続した石細胞環で区分され，環の外辺にはほぼ円形に結集した繊維束を伴い，環の各石細胞の膜はしばしば U 字形に肥厚する。二次皮部中には石細胞を認めず，まばらに少数の厚膜繊維を認める。柔組織中には油細胞，粘液細胞及び微細なシュウ酸カルシウムの針晶を含む細胞があり，柔細胞中にはでんぷん粒を含む。

（５）　ダイオウ　暗褐色～黄褐色～淡褐色を呈し，ルーペ視すると入り組んだ不規則な模様がある。質はおおむね粗で繊維性ではない。特異なにおいがあり，味はわずかに渋くて苦い。かめば細かい砂をかむような感じがあり，だ液を黄色に染める。

必要に応じて，「ダイオウ」の確認試験を準用する。

（６）　タクシャ　淡黄褐色～淡褐色でコルク層をつける部位はやや暗色を呈する。ルーペ視するとき，褐色～淡褐色のはん点が散在する。切面は粒状で，繊維性ではない。わずかににおい及び味がある。

（７）　トウキ　外面は暗褐色～赤褐色で，縦じわがあり，切断面は淡黄色～黄褐色を呈する。特異なにおいがあり，味はわずかに甘く，後にやや辛い。

横切片を鏡検するとき，コルク層は 4～10 層からなり，その内側に数層の厚角組織が続いている。皮部には分泌細胞に囲まれた多数の樹脂道並びにしばしば大きなすき間がある。形成層は長方形に偏圧された数層の細胞からなり，明らかに皮部と木部とを区別する。木部では多数の道管と放射組織とが交互に放射状に配列し，その外方の道管は単独又は数個集まってやや密に配列してくさび状をなすが，中心部付近の道管は極めてまばらに存在する。でんぷん粒は径 19μm 以下，まれに 2～5 個の複粒があり，複粒の径は 25μm に達し，しばしばのり化している。

（８）　トウニン　種皮は薄く，外面は赤褐色を帯び，表面にはすれて落ちやすい石細胞となった表皮細胞があって，粉をふいたようである。切断面は類白色である。味はわずかに苦く，油ようである。

表皮の表面を鏡検するとき，数個ずつ集合する石細胞はおおむね円形で，その細胞膜は均等に厚く，側面視では方形又は長方形を呈する。

必要に応じて，「トウニン」の確認試験を準用する。

（９）　レンギョウ　外面は淡褐色～暗褐色を呈し，淡灰色の小隆起点が散在し，内面は黄褐色である。特異な芳香があり，味はわずかに収れん性である。

必要に応じて，「レンギョウ」の確認試験を準用する。

（10）　ボウイ　外面は暗灰褐色を呈し，縦みぞがあり，横断面の外部は暗灰褐色のコルク層でおおわれ，内部には灰褐色の道管部と暗褐色の放射組織とが交互に放射状に配列する。味は苦い。

横切片を鏡検するとき，一次皮部にはシュウ酸カルシウムの針晶を含み，一次皮部及び内しょうには著しく膜の厚い石細胞が認められ，道管部では大小の道管がほぼ階段状に配列する。放射組織の細胞の大部分は木化せず，径 3～10μm のでんぷん粒及びシュウ酸カルシウムの小針晶を含み，ところどころに極めて厚膜の大きな石細胞が散在する。

必要に応じて，「ボウイ」の確認試験を準用する。

（11）　オウバク　外面は灰黄褐色～灰褐色で，内面は黄色～暗黄褐色で，細かい縦線がある。横断面は鮮黄色でやや繊維性である。横切面をルーペ視するとき，皮部外層は黄色で薄く，石細胞が黄褐色の点状に分布する。皮部内層は厚く，一次放射組織は外方に向かうにしたがい幅が広がり，それらの一次放射組織の間に，多くの二次放射組織が集まってほぼ三角形の師部を形成し，この組織に褐色を呈する師部繊維束が層積して接線方向に並び，放射組織と交錯して格子状を呈する。味は極めて苦く，粘液性で，だ液を黄色に染める。

必要に応じて，「オウバク」の確認試験を準用する。

（12）　カンゾウ　外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現わす。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に 1～3 細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には 3～10 細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞中にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

乾燥減量　10%以下。

灰　　分　7%以下。

【 354 】　K152

成分及び分量又は本質	日本薬局方	ビャクジュツ	1.5g
	〃	ブクリョウ	1.5g
	〃	チンピ	1.5g
	〃	コウブシ	1.5g
	〃	オウゴン	1.5g
	〃	ソウジュツ	1.5g
	局外生規	テンナンショウ	1.5g
	日本薬局方	イレイセン	1.5g
	〃	キョウカツ	1.5g
	〃	ハンゲ	2.0g
	〃	カンゾウ	1.0～1.5g
	〃	ショウキョウ	0.6g
		全　　量	17.1～17.6g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。		
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。		
効能又は効果	体力中等度で，肩や上腕などに痛みがあるものの次の諸症：四十肩，五十肩		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	二朮湯		

規格及び試験方法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品1包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（１）　ビャクジュツ　外面は淡灰黄色～淡黄白色で，ところどころ灰褐色を呈し，横切面には淡黄褐色～褐色の分泌物による細点がある。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，皮部の柔組織中にはしばしば師管の外側に接して繊維束があり，放射組織の末端部には淡褐色～褐色の内容物を含む油室がある。木部には大きい髄を囲んで放射状に配列した短径の道管とそれを囲む著しい繊維束がある。髄及び放射組織中には皮部と同様な油室があり，柔組織中にはイヌリンの小球晶及びシュウ酸カルシウムの針晶を含む。

必要に応じて，「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。

（２）　ブクリョウ　白色又はわずかに淡赤色を帯びた白色で，質は堅いが砕きやすい。味はないがやや粘液ようである。

必要に応じて，「ブクリョウ」の確認試験を準用する。

（３）　チンピ　外面は黄赤色～暗黄褐色で，油室による多数の小さいくぼみがあり，内面は白色～淡灰黄褐色である。厚さ約 2mm で，質は軽くてもろい，芳香があり，味は苦くて，わずかに刺激性である。

必要に応じて，「チンピ」の確認試験を準用する。

（４）　コウブシ　外面は灰褐色～灰黒褐色を呈し，不整な輪節があり，その部分に一方に向かって多数の毛がある。質は堅く，横断面は赤褐色～淡黄色を呈し，ろうようのつやを帯び，皮層部の厚さは中心柱の径とほぼ等しいか又はわずかに薄い。横断面をルーペ視するとき，外面は繊維束が褐色のはん点として輪状に並び，皮層部にはところどころに維管束が赤褐色のはん点として，また分泌細胞が黄褐色の微小なはん点として多数存在する。中心柱には多数の維管束が点又は線として散在する。わずかに特異なにおい及び味がある。

（５）　オウゴン　外面は黄褐色～暗褐色を呈し，切断面は黄色～帯褐黄色を呈し，縦に繊維性のすじが見られる。味はわずかに苦い。

必要に応じて，「オウゴン」の確認試験を準用する。

（６）　ソウジュツ　外面は暗灰褐色～暗黄褐色である。横断面は淡褐色～赤褐色の分泌物による細点を認める。しばしば白色綿状の結晶を析出する。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，皮部の柔組織中には，通例，繊維束を欠き，放射組織の末端部には淡褐色～黄褐色の内容物を含む油室がある。木部は形成層に接して道管を囲んだ繊維束が放射状に配列し，髄及び放射組織中には皮部と同様な油室がある。柔細胞中にはイヌリンの球晶及びシュウ酸カルシウムの針晶を含む。

（７）　テンナンショウ　外面は類白色～淡灰褐色～淡褐色を呈し，切断面は類白色，粉性である。質は堅いがもろい。味は初め緩和で，後極めてえぐい。

横切片を鏡検するとき，主としてでんぷん粒を充満した柔細胞からなり，粘液道及びシュウ酸カルシウムの束晶を含んだ粘液細胞を認める。

必要に応じて，局外生規「テンナンショウ」の確認試験を準用する。

（８）　イレイセン　短い根茎と多数の細長い根からなる。根は長さ 10～20cm，径 1～2mm，外面は褐色～黒褐色を呈し，細かい縦じわがあり，折りやすく，皮層と中心柱は離れやすい。根の横断面は灰白色～淡黄褐色を呈し，中心柱は淡灰黄色～黄色，ルーペ視す

るとき，中心柱はほぼ円形で，木部の 2～4 箇所がわずかに湾入している。根茎は長さ 2～4cm，径 5～20mm，表面は淡灰褐色～灰褐色で，皮部は脱落し繊維状を呈し，しばしば隆起した節があり，頂端に木質の茎の残基を付ける。弱いにおいがあり，味はほとんどない。

根の横切片を鏡検するとき，最外層は一層の表皮からなり，表皮下に一層の外皮がある。内皮により皮層と中心柱に区分される。皮層は柔組織からなる。木部の 2～4 箇所がわずかに湾入し，その部分に師部があり，しばしば繊維を含む。柔組織中には単粒及び 2～8 個の複粒のでんぷん粒を含む。

必要に応じて，「イレイセン」の確認試験を準用する。

（9） キョウカツ やや湾曲した円柱形～円錐形を呈し，長さ 3～10cm，径 5～20mm，ときに根茎は分枝する。外面は黄褐色～暗褐色である。根茎はその頂端にやや円形にくぼんだ茎の跡があり，ときには短い茎の残基を付け，外面には隆起した節があり，節間は，通例，短い。節にはいぼ状突起となった根の跡がある。根の外面には粗い縦じわ及びいぼ状突起となった側根の跡がある。質は軽くややもろくて折りやすい。横切面には多くの放射状の裂け目があり，皮部は黄褐色～褐色，木部は淡黄色～淡灰黄色，髄は灰白色～淡褐色を呈し，ルーペ視するとき，皮部及び髄には油道による褐色の細点を認める。特異なにおいがあり，味は初めわずかに酸味があり，後にやや辛く，わずかに麻痺性である。

横切片を鏡検するとき，最外層は数層～十数層のコルク層からなり，その内側に数層の厚角組織がある。皮層には多数の油道があり，大きいものでは径が 300μm に達する。また皮層には放射状に大きなすき間がある。髄にも油道があり，大きいものでは径が 500μm に達する。柔組織中には単粒及び 2～3 個の複粒のでんぷん粒を含む。

必要に応じて，「キョウカツ」の確認試験を準用する。

（10） ハンゲ 外面は白色～灰白黄色，上部には茎の跡がくぼみとなり，その周辺には根の跡がくぼんだ細点となっている。横断面は白色，粉性である。味は初めなく，やや粘液性で，後に強いえぐ味を残す。

横切片を鏡検するとき，主としてでんぷん粒を充満した柔組織からなり，わずかにシュウ酸カルシウムの束晶を含んだ粘液細胞がその間に認められる。でんぷん粒は主として 2～3 個の複粒で，通例，径 10～15μm，単粒は通例径 3～7μm である。束晶は長さ 25～150μm である。

（11） カンゾウ 外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現わす。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に 1～3 細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には 3～10 細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞中にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

（12） ショウキョウ 淡灰黄色の周皮を付けたままか，又はその一部をはぎとってあり，表面は灰白色～淡灰褐色で，しばしば白粉を付けている。横断面は繊維性，粉性で，淡帯黄褐色を呈し，皮層と中心柱とに分かれる。横断面をルーペ視するとき，その全面に

維管束及び分泌物が褐色の細点として散在している。特異なにおいがあり，味は極めて辛い。

乾燥減量　15%以下。

灰　　分　5%以下。

【 355 】　K153

成分及び分量又は本質	日本薬局方	ハンゲ	5.0g
	〃	ブクリョウ	5.0g
	〃	チンピ	4.0g
	〃	ショウキョウ	1.0g
	〃	カンゾウ	1.0g
		全　　量	16.0g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。		
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。		
効能又は効果	体力中等度で，悪心，嘔吐があるものの次の諸症：悪心，嘔吐，胃部不快感，慢性胃炎，二日酔		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	二陳湯		

規格及び試験方法

性　　状　本品はわずかに芳香性のにおいがある。

確認試験　本品1包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　ハンゲ　外面は白色～灰白黄色，上部には茎の跡がくぼみとなり，その周辺には根の跡がくぼんだ細点となっている。横断面は白色，粉性である。味は初めなく，やや粘液性で，後に強いえぐ味を残す。

横切片を鏡検するとき，主としてでんぷん粒を充満した柔組織からなり，わずかにシュウ酸カルシウムの束晶を含んだ粘液細胞がその間に認められる。でんぷん粒は主として2～3個の複粒で，通例，径10～15μm，単粒は通例径3～7μmである。束晶は長さ25～150μmである。

（2）　ブクリョウ　白色又はわずかに淡赤色を帯びた白色で，質は堅いが砕きやすい。味はないがやや粘液ようである。

必要に応じて，「ブクリョウ」の確認試験を準用する。

（３）　チンピ　外面は黄赤色～暗黄褐色で，油室による多数の小さいくぼみがあり，内面は白色～淡灰黄褐色である。厚さ約 2mm で，質は軽くてもろい，芳香があり，味は苦くて，わずかに刺激性である。

必要に応じて，「チンピ」の確認試験を準用する。

（４）　ショウキョウ　淡灰黄色の周皮を付けたままか，又はその一部をはぎとってあり，表面は灰白色～淡灰褐色で，しばしば白粉を付けている。横断面は繊維性，粉性で，淡帯黄褐色を呈し，皮層と中心柱とに分かれる。横断面をルーペ視するとき，その全面に維管束及び分泌物が褐色の細点として散在している。特異なにおいがあり，味は極めて辛い。

（５）　カンゾウ　外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現わす。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に 1～3 細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には 3～10 細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞中にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

乾燥減量　15％以下。

灰　　分　10％以下。

【 356 】　K154

成分及び分量 又は本質	日本薬局方	トウキ	3.0g
	〃	センキュウ	3.0g
	〃	ビャクジュツ	3.0g
	〃	コウブシ	3.0g
	〃	ケイヒ	2.0g
	〃	オウゴン	2.0g
	〃	ニンジン	2.0g
	〃	ビンロウジ	2.0g
	〃	オウレン	1.5g
	〃	モッコウ	1.5g
	〃	チョウジ	0.5g
	〃	カンゾウ	1.0～1.5g
	〃	ダイオウ	0～0.5g
		全　量	24.5～25.5g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。		
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。		
効能又は効果	体力中等度以上で，のぼせとめまいのあるものの次の諸症：産前産後の神経症，月経不順，血の道症，更年期障害，神経症		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	女神散料		

規格及び試験方法

性　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品1包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　トウキ　外面は暗褐色～赤褐色で，縦じわがあり，切断面は淡黄色～黄褐色を呈する。特異なにおいがあり，味はわずかに甘く，後にやや辛い。

横切片を鏡検するとき，コルク層は 4～10 層からなり，その内側に数層の厚角組織が続いている。皮部には分泌細胞に囲まれた多数の樹脂道並びにしばしば大きなすき間がある。形成層は長方形に偏圧された数層の細胞からなり，明らかに皮部と木部とを区別する。木部では多数の道管と放射組織とが交互に放射状に配列し，その外方の道管は単独又は数個集まってやや密に配列してくさび状をなすが，中心部付近の道管は極めてまばらに存在する。でんぷん粒は径 19μm 以下，まれに 2～5 個の複粒があり，複粒の径は 25μm に達し，しばしばのり化している。

（2）　センキュウ　外面は灰褐色～暗褐色で，切断面は灰白色～灰褐色，半透明で，ときにはうつろがある。質は密で堅い。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，皮部及び髄には油道が散在する。木部には厚膜で木化した木部繊維が大小不同の群をなして存在する。でんぷん粒は，通例，のり化していて，まれに径 5～25μm のでんぷん粒を認めることがある。シュウ酸カルシウム結晶は認めない。

（3）　ビャクジュツ　外面は淡灰黄色～淡黄白色で，ところどころ灰褐色を呈し，横切面には淡黄褐色～褐色の分泌物による細点がある。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，皮部の柔組織中にはしばしば師管の外側に接して繊維束があり，放射組織の末端部には淡褐色～褐色の内容物を含む油室がある。木部には大きい髄を囲んで放射状に配列した短径の道管とそれを囲む著しい繊維束がある。髄及び放射組織中には皮部と同様な油室があり，柔組織中にはイヌリンの小球晶及びシュウ酸カルシウムの針晶を含む。

必要に応じて，「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。

（4）　コウブシ　外面は灰褐色～灰黒褐色を呈し，不整な輪節があり，その部分に一方に向かって多数の毛がある。質は堅く，横断面は赤褐色～淡黄色を呈し，ろうようのつやを帯び，皮層部の厚さは中心柱の径とほぼ等しいか又はわずかに薄い。横断面をルーペ視するとき，外面は繊維束が褐色のはん点として輪状に並び，皮層部にはところどころに維管束が赤褐色のはん点として，また分泌細胞が黄褐色の微小なはん点として多数存在する。中心柱には多数の維管束が点又は線として散在する。わずかに特異なにおい及び味がある。

（5）　ケイヒ　外面は暗赤褐色を呈し，内面は赤褐色を呈し，平滑である。横断面は赤褐色を呈し淡褐色の薄層が見られる。特異なにおいがあり，味は甘く，辛く，後にやや粘液性で，わずかに収れん性である。

横切片を鏡検するとき，一次皮部と二次皮部はほとんど連続した石細胞環で区分され，環の外辺にはほぼ円形に結集した繊維束を伴い，環の各石細胞の膜はしばしば U 字形に肥厚する。二次皮部中には石細胞を認めず，まばらに少数の厚膜繊維を認める。柔組織中には油細胞，粘液細胞及び微細なシュウ酸カルシウムの針晶を含む細胞があり，柔細胞中にはでんぷん粒を含む。

（6）　オウゴン　外面は黄褐色～暗褐色を呈し，切断面は黄色～帯褐黄色を呈し，縦に繊維性のすじが見られる。味はわずかに苦い。

必要に応じて，「オウゴン」の確認試験を準用する。

（７）　ニンジン　外面は淡黄褐色～淡灰褐色を呈し，縦じわがあり，横断面は淡黄褐色を呈し，形成層の付近は褐色を呈する。特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後にやや苦い。

必要に応じて，「ニンジン」の確認試験を準用する。

（８）　ビンロウジ　灰褐色の種皮が白色の胚乳中に入り込んで大理石ようの模様を呈する。味は渋くてわずかに苦い。

必要に応じて，「ビンロウジ」の確認試験を準用する。

（９）　オウレン　根茎の径は 2～7mm で，外面は灰黄褐色～褐色を呈し，輪節及び多数の根の基部を認め，横断面はやや繊維性で，コルク層は淡灰褐色，皮部は黄褐色，木部は黄色，髄は黄褐色である。味は極めて苦く，残留性で，だ液を黄色に染める。

横切片を鏡検するとき，コルク層は薄膜のコルク細胞からなり，皮部柔組織中にはコルク層に近い部位に石細胞群，形成層に近い部位に黄色の師部繊維の認められるものが多い。木部は主として道管，仮道管，木部繊維からなり，放射組織は明らかで，髄は大きく，髄中には石細胞あるいは厚膜木化した細胞を伴った石細胞を認めることがある。柔細胞には細かいでんぷん粒を含むが，結晶を含まない。

必要に応じて，「オウレン」の確認試験を準用する。

（10）　モッコウ　外面は黄褐色～灰褐色で，あらい縦じわがある。横断面は黄褐色～暗褐色で，ルーペ視するとき，環状暗色の形成層が認められ，木部組織と放射組織が放射状の模様を呈し，ところどころに大きな裂け目と褐色の油室が散在している。特異なにおいがあり，味は苦い。

（11）　チョウジ　暗褐色～暗赤色のつぼみで，長さ 1～1.8cm，やや偏平な四りょう柱状の花床と，その上端には厚いがく片 4 枚及び 4 枚の膜質花べんとがあり，花べんは重なり合いほぼ球形を呈する。花べんに包まれた内部には多数の雄しべと 1 本の花柱とがある。強い特異なにおいがあり，味はやくようで，後わずかに舌を麻ひする。

必要に応じて，「チョウジ」の確認試験を準用する。

（12）　カンゾウ　外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現わす。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に 1～3 細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には 3～10 細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞中にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

（13）　ダイオウ　暗褐色～黄褐色～淡褐色を呈し，ルーペ視すると入り組んだ不規則な模様がある。質はおおむね粗で繊維性ではない。特異なにおいがあり，味はわずかに渋くて苦い。かめば細かい砂をかむような感じがあり，だ液を黄色に染める。

必要に応じて，「ダイオウ」の確認試験を準用する。

乾燥減量　15％以下。

灰　　分　5％以下。

【 357 】　K155

成分及び分量 又は本質	日本薬局方　ニンジン　3.0g 〃　カンゾウ　3.0g 〃　ビャクジュツ　3.0g 〃　カンキョウ　3.0g 全　量　12.0g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。
効能又は効果	体力虚弱で，疲れやすくて手足などが冷えやすいものの次の諸症：胃腸虚弱，下痢，嘔吐，胃痛，腹痛，急・慢性胃炎
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器
規格及び試験方法	別記のとおり。
備考	人参湯

規格及び試験方法

性　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品1包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　ニンジン　外面は淡黄褐色～淡灰褐色を呈し，縦じわがあり，横断面は淡黄褐色を呈し，形成層の付近は褐色を呈する。特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後にやや苦い。

必要に応じて，「ニンジン」の確認試験を準用する。

（2）　カンゾウ　外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現わす。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に1～3細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には3～10細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞中

にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

（３）　ビャクジュツ　外面は淡灰黄色～淡黄白色で，ところどころ灰褐色を呈し，横切面には淡黄褐色～褐色の分泌物による細点がある。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，皮部の柔組織中にはしばしば師管の外側に接して繊維束があり，放射組織の末端部には淡褐色～褐色の内容物を含む油室がある。木部には大きい髄を囲んで，放射状に配列した短径の道管とそれを囲む著しい繊維束がある。髄及び放射組織中には皮部と同様な油室があり，柔組織中にはイヌリンの小球晶及びシュウ酸カルシウムの針晶を含む。

必要に応じて，「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。

（４）　カンキョウ　偏圧した不規則な塊状でしばしば分枝する。分枝した各部はやや湾曲した卵形又は長卵形を呈し，長さ 2～4cm，径 1～2cm である。外面は灰黄色～灰黄褐色で，しわ及び輪節がある。折面は褐色～暗褐色で透明感があり角質である。横切面をルーペ視するとき皮層と中心柱は区分され，全面に維管束が散在する。特異なにおいがあり，味は極めて辛い。

横切片を鏡検するとき，外側よりコルク層，皮層，内皮，中心柱が認められる。皮層と中心柱は一層の内皮によって区分される。皮層及び中心柱は柔組織からなり，繊維束で囲まれた維管束が散在する。柔組織中には黄色の油様物質を含む油細胞が散在し，柔細胞中にはシュウ酸カルシウムの単晶が含まれ，でんぷんは糊化している。

必要に応じて，「カンキョウ」の確認試験を準用する。

乾燥減量　15%以下。

灰　　分　8%以下。

【 358 】　K155—①

成分及び分量 又は本質	日本薬局方　ニンジン　3.0g 〃　カンゾウ　3.0g 〃　ビャクジュツ　3.0g 〃　カンキョウ　3.0g 全　量　12.0g
製造方法	以上の生薬をそれぞれ末とし，「ハチミツ」を結合剤として丸剤の製法により丸剤 120 個とする。
用法及び用量	大人 1 日 3 回，1 回 20 個，食前又は空腹時に服用する。 15 才未満 7 才以上　大人の 2/3，7 才未満 5 才以上　大人の 1/2 を服用する。
効能又は効果	体力虚弱で，疲れやすくて手足などが冷えやすいものの次の諸症：胃腸虚弱，下痢，嘔吐，胃痛，腹痛，急・慢性胃炎
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器
規格及び試験方法	別記のとおり。
備考	理中丸

規 格 及 び 試 験 方 法

性　状　本品は淡黄白色～淡黄褐色で，ショウガのにおいがある。

確認試験

（1）　ニンジン　本品の粉末 5g にメタノール 20mL を加え，還流冷却器を付けて水浴上で 15 分間穏やかに煮沸し，冷後，ろ過し，ろ液を試料溶液とする。別に薄層クロマトグラフ用ジンセノサイド Rg_1 1mg をメタノール 1mL に溶かし，標準溶液とする。これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び標準溶液 10μL ずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲルを用いて調製した薄層板にスポットする。次にクロロホルム・メタノール・水混液（13：7：2）の下層を展開溶媒として約 10cm 展開した後，薄層板を風乾する。これに希硫酸を均等に噴霧し，110℃で 5 分間加熱するとき試料溶液から得た数個のスポットのうち 1 個のスポットは，標準溶液から得た赤紫色のスポットと色調及び *Rf* 値が等しい。

（2）　カンゾウ　本品の粉末 2g にエタノール（95）・水混液（7：3）10mL を加え，水浴上で 5 分間振り混ぜながら加熱し，冷後，ろ過し，ろ液を試料溶液とする。別に薄層クロマトグラフ用グリチルリチン酸 5mg をエタノール（95）・水混液（7：3）1mL に溶かし，標準溶液とする。これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液 10μL 及び標準溶液 4μL を薄層クロマトグラフ用シリカゲル（蛍光剤入り）を用いて調製した薄層板にスポットする。次に 1－ブタノール・水・酢酸（100）混液（7：2：1）

を展開溶媒として約 10cm 展開した後，薄層板を風乾する。これに紫外線（主波長 254nm）を照射するとき，試料溶液から得た数個のスポットのうち 1 個のスポットは，標準溶液から得た暗紫色のスポットと色調及び *Rf* 値が等しい。

（３）　ビャクジュツ　本品の粉末 2g に石油エーテル 30mL を加え，10 分間振り混ぜた後，ろ過する。ろ液を減圧留去し，残留物を石油エーテル 1mL に溶かし，試料溶液とする。別にビャクジュツの粉末 0.2g をとり，試料溶液と同様に操作して標準溶液とする。これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液 10μL 及び標準溶液 4μL を薄層クロマトグラフ用シリカゲルを用いて調製した薄層板にスポットする。次にヘキサン・ベンゼン・酢酸エチル混液（14：3：3）を展開溶媒として約 10cm 展開した後，薄層板を風乾する。これに *p*－ジメチルアミノベンズアルデヒド試液を均等に噴霧し，105℃で 5 分間加熱するとき，試料溶液から得たクロマトグラムの中で，数個のスポットは標準溶液から得たスポットと色調及び *Rf* 値が等しい。

（４）　カンキョウ　本品の粉末に，薄めたグリセリン（1→2）又は抱水クロラール 50g を水 15mL とグリセリン 10mL の混液に溶かした液を滴加して鏡検するとき，径 20～30μm の球形，卵円形又は袋状でへそが偏在するでんぷん粒を認める。

【 359 】　K156

成分及び分量又は本質	日本薬局方	ニンジン	3.0g
	〃	トウキ	4.0g
	〃	シャクヤク	2.0g
	〃	ジオウ	4.0g
	〃	ビャクジュツ	4.0g
	〃	ブクリョウ	4.0g
	〃	ケイヒ	2.5g
	〃	オウギ	1.5g
	〃	チンピ	2.0g
	〃	オンジ	2.0g
	〃	ゴミシ	1.0g
	〃	カンゾウ	1.0g
		全　　量	31.0g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。		
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。		
効能又は効果	体力虚弱なものの次の諸症：病後・術後などの体力低下，疲労倦怠，食欲不振，ねあせ，手足の冷え，貧血		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	人参養栄湯		

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品1包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　ニンジン　外面は淡黄褐色～淡灰褐色を呈し，縦じわがあり，横断面は淡黄褐色を呈し，形成層の付近は褐色を呈する。特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後にやや苦い。

必要に応じて，「ニンジン」の確認試験を準用する。

（2）　トウキ　外面は暗褐色～赤褐色で，縦じわがあり，切断面は淡黄色～黄褐色を呈する。特異なにおいがあり，味はわずかに甘く，後にやや辛い。

横切片を鏡検するとき，コルク層は 4～10 層からなり，その内側に数層の厚角組織が続いている。皮部には分泌細胞に囲まれた多数の樹脂道並びにしばしば大きなすき間がある。形成層は長方形に偏圧された数層の細胞からなり，明らかに皮部と木部とを区別する。木部では多数の道管と放射組織とが交互に放射状に配列し，その外方の道管は単独又は数個集まってやや密に配列してくさび状をなすが，中心部付近の道管は極めてまばらに存在する。でんぷん粒は径 19μm 以下，まれに 2～5 個の複粒があり，複粒の径は 25μm に達し，しばしばのり化している。

（3）　シャクヤク　外面は褐色～淡灰褐色を呈し，横断面はち密で淡灰褐色を呈し，木部には淡褐色の放射状の線がある。わずかに特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後に渋くてわずかに苦い。

必要に応じて，「シャクヤク」の確認試験を準用する。

（4）　ジオウ　外面は黄褐色～黒褐色を呈し，深い縦みぞ及びくびれがある。質は柔らかく粘性である。横断面は黄褐色～黒褐色で，皮部は木部より色が濃く，ほとんど髄を認めない。特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後にやや苦い。

横切片を鏡検するとき，コルク層は 7～15 層で，皮部はすべて柔細胞からなり，外皮部に褐色の分泌物を含む細胞が散在する。木部はほとんど柔細胞で満たされ，放射状に並ぶ道管は側孔のある網紋があり，弱い木化反応を呈する。

（5）　ビャクジュツ　外面は淡灰黄色～淡黄白色で，ところどころ灰褐色を呈し，横切面には淡黄褐色～褐色の分泌物による細点がある。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，皮部の柔組織中にはしばしば師管の外側に接して繊維束があり，放射組織の末端部には淡褐色～褐色の内容物を含む油室がある。木部には大きい髄を囲んで放射状に配列した短径の道管とそれを囲む著しい繊維束がある。髄及び放射組織中には皮部と同様な油室があり，柔組織中にはイヌリンの小球晶及びシュウ酸カルシウムの針晶を含む。

必要に応じて，「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。

（6）　ブクリョウ　白色又はわずかに淡赤色を帯びた白色で，質は堅いが砕きやすい。味はないがやや粘液ようである。

必要に応じて，「ブクリョウ」の確認試験を準用する。

（7）　ケイヒ　外面は暗赤褐色を呈し，内面は赤褐色を呈し，平滑である。横断面は赤褐色を呈し淡褐色の薄層が見られる。特異なにおいがあり，味は甘く，辛く，後にやや粘液性で，わずかに収れん性である。

横切片を鏡検するとき，一次皮部と二次皮部はほとんど連続した石細胞環で区分され，環の外辺にはほぼ円形に結集した繊維束を伴い，環の各石細胞の膜はしばしば U 字形に肥厚する。二次皮部中には石細胞を認めず，まばらに少数の厚膜繊維を認める。柔組織中に

は油細胞，粘液細胞及び微細なシュウ酸カルシウムの針晶を含む細胞があり，柔細胞中にはでんぷん粒を含む。

（８）　オウギ　外面は淡灰黄色～淡褐黄色で，不規則なあらい縦じわがあり，折面は繊維性である。横断面をルーペ視するとき，最外層には周皮があり，皮部は淡黄白色，木部は淡黄色，形成層付近はやや褐色を帯びる。木部から皮部にわたって白色の放射組織が認められる。太いものではしばしば多数の放射状の裂け目となっている。わずかに特異なにおいがあり，味は甘い。

（９）　チンピ　外面は黄赤色～暗黄褐色で，油室による多数の小さいくぼみがあり，内面は白色～淡灰黄褐色である。厚さ約 2mm で，質は軽くてもろい。芳香があり，味は苦くて，わずかに刺激性である。

必要に応じて，「チンピ」の確認試験を準用する。

（10）　オンジ　外側面は淡灰褐色で横切されたものは径 2～10mm。皮部の厚さは木部の径とほぼ等しいか又は木部の径の約 1/2 で淡灰褐色を呈し，ところどころに大きな裂け目がある。木部は円形～だ円形で淡褐色を呈する。味はわずかにえぐい。

必要に応じて，「オンジ」の確認試験を準用する。

（11）　ゴミシ　暗赤色～黒褐色を呈し，表面にはしわがあり，またしばしば白い粉を付ける。果肉を除くとじん臓形の種子 1～2 個を認め，その外種皮は黄褐色～暗赤褐色を呈し，つやがあり，堅くてもろい。外種皮はたやすくはがれるが，内種皮は胚乳に密着し，背面に明らかな縫線を認める。酸味があり，後に渋くて苦い。

（12）　カンゾウ　外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現わす。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に 1～3 細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には 3～10 細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞中にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

乾燥減量　15%以下。

灰　　分　5%以下。

【 360 】　K157

成分及び分量 又は本質	日本薬局方	キジツ	3.0g
	〃	シャクヤク	3.0g
	〃	キキョウ	1.5g
		全　量	7.5g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。		
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，熱いうちに煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。 本剤は必ず1日分ずつ煎じ，数日分をまとめて煎じないこと。		
効能又は効果	体力中等度以上で，患部が化膿するものの次の諸症：化膿性皮膚疾患の初期又は軽いもの，歯肉炎，扁桃炎		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	排膿散料		

規格及び試験方法

性　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品1包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　キジツ　外面は濃緑褐色～褐色で，つやがなく，油室による多数のくぼんだ小点がある。切断面は淡灰褐色を呈し，内果皮を付ける部分は褐色を呈する。特異なにおいがあり，味は苦い。

必要に応じて，「キジツ」の確認試験を準用する。

（2）　シャクヤク　外面は褐色～淡灰褐色を呈し，横断面はち密で淡灰褐色を呈し，木部には淡褐色の放射状の線がある。わずかに特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後に渋くてわずかに苦い。

必要に応じて，「シャクヤク」の確認試験を準用する。

（3）　キキョウ　外面は皮付きは灰褐色，皮去りは白色～淡褐色を呈し，繊維性でない。横切面をルーペ視するとき，皮部は木部よりやや薄く，ほとんど白色で，ところどころにすき間があり，形成層の付近はしばしば褐色を帯びる。皮部の厚さは木部の径よりや

や薄く，ほとんど白色で，ところどころにすき間があり，木部は白色～淡褐色を呈し，その組織は皮部よりもやや密である。味は初めなく，後にえぐくて苦い。

必要に応じて，「キキョウ」の確認試験を準用する。

乾燥減量　10%以下。

灰　　分　5%以下。

【 361 】　K157—①

成分及び分量 又は本質	日本薬局方	キジツ	3.0g
	〃	シャクヤク	1.8g
	〃	キキョウ	0.6g
		全　量	5.4g
製造方法	以上の生薬をそれぞれ末とし，散剤の製法により製する。ただし，分包散剤とする。		
用法及び用量	1回量を次のとおりとし，1日2回，食前又は空腹時に服用する。 大人（15才以上）1包2.7g，15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4を服用する。		
効能又は効果	体力中等度以上で，患部が化膿するものの次の諸症：化膿性皮膚疾患の初期又は軽いもの，歯肉炎，扁桃炎		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	排膿散		

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は淡褐色の粉末で，特異なにおいがある。

確認試験

（1）　キジツ　本品の粉末2gにメタノール10mLを加え，還流冷却器を付け，水浴上で10分間加熱し，冷後，ろ過し，ろ液を試料溶液とする。

別に「キジツ」の粉末1gをとり，試料溶液と同様に操作して対照溶液とする。

これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び対照溶液10μLずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲルを用いて調製した薄層板にスポットする。次にクロロホルム・アセトン混液（6：1）を展開溶媒として約10cm展開した後，薄層板を風乾する。

これに硫酸試液を均等に噴霧し，105℃で30分間加熱するとき，*Rf*値約0.55付近に黄色のスポットを認める。

（2）　シャクヤク　本品の粉末2gにメタノール10mLを加え，還流冷却器を付け，水浴上で10分間加熱し，冷後，ろ過し，ろ液を試料溶液とする。

別に「シャクヤク」の粉末1gをとり，試料溶液と同様に操作して対照溶液とする。

これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び対照溶液10μLずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲルを用いて調製した薄層板にスポットする。次にトルエン・ギ酸・ギ酸エチル混液（3：1：6）を展開溶媒として約10cm展開した後，薄層板を風乾する。

これに塩化鉄（Ⅲ）試液を均等に噴霧するとき，*Rf*値約0.48付近に暗紫色のスポットを認める。

（3）　キキョウ　本品の粉末2gにメタノール10mLを加え，還流冷却器を付け，水浴上で10分間加熱し，冷後，ろ過し，ろ液を試料溶液とする。

別に「キキョウ」の粉末1gをとり，試料溶液と同様に操作して対照溶液とする。

これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び対照溶液10μLずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲル（蛍光剤入り）を用いて調製した薄層板にスポットする。次に1－ブタノール・酢酸・水混液（4：1：5）を展開溶媒として約10cm展開した後，薄層板を風乾する。

これに紫外線（主波長365nm）を照射するとき，*Rf*値約0.23付近に青色の蛍光を発するスポットを認める。

乾燥減量　10%以下。

灰　　分　5%以下。

【 362 】　K158

成分及び分量 又は本質	日本薬局方	カンゾウ	1.5～3.0g
	〃	キキョウ	5.0g
	〃	ショウキョウ	0.3g
	〃	タイソウ	6.0g
		全　量	12.8～14.3g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。		
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。		
効能又は効果	体力中等度以下で，患部が化膿するものの次の諸症：化膿性皮膚疾患・歯肉炎・扁桃炎の初期または軽いもの		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	排膿湯		

規格及び試験方法

性　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品1包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　カンゾウ　外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現わす。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に1～3細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には3～10細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞中にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

（2）　キキョウ　外面は皮付きは灰褐色，皮去りは白色～淡褐色を呈し，繊維性でない。横切面をルーペ視するとき，皮部は木部よりやや薄く，ほとんど白色で，ところどこ

ろにすき間があり，形成層の付近はしばしば褐色を帯びる。木部は白色～淡褐色を呈し，その組織は皮部よりもやや密である。味は初めなく，後にえぐくて苦い。

必要に応じて，「キキョウ」の確認試験を準用する。

（３）　ショウキョウ　淡灰黄色の周皮を付けたままか，又はその一部をはぎとってあり，表面は灰白色～淡灰褐色で，しばしば白粉を付けている。横断面は繊維性，粉性で，淡帯黄褐色を呈し，皮層と中心柱とに分かれる。横断面をルーペ視するとき，その全面に維管束及び分泌物が褐色の細点として散在している。特異なにおいがあり，味は極めて辛い。

（４）　タイソウ　外面は赤褐色であらいしわがあるか，又は暗灰赤色で細かいしわがあり，いずれもつやがある。外果皮は薄く革質で，中果皮は暗灰褐色を呈し，海綿ようで柔らかく粘着性があり，内果皮は極めて堅く，種子は偏平である。わずかに特異なにおいがあり，味は甘い。

乾燥減量　15％以下。

灰　　分　5％以下。

【 363 】　K159

成分及び分量 又は本質	日本薬局方	バクモンドウ	10.0g
	〃	ハンゲ	5.0g
	〃	タイソウ	3.0g
	〃	ニンジン	2.0g
	〃	カンゾウ	2.0g
	〃	コウベイ	5.0g
		全　量	27.0g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。		
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。		
効能又は効果	体力中等度以下で，たんが切れにくく，ときに強くせきこみ，又は咽頭の乾燥感があるものの次の諸症：からぜき，気管支炎，気管支ぜんそく，咽頭炎，しわがれ声		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	麦門冬湯		

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品1包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　バクモンドウ　紡錘形を呈し，長さ10～25mm，径3～5mm，一端はややとがり，他端はやや丸みをもち，外面は淡黄色～淡黄褐色で，大小の縦じわがある。皮層は柔軟性でもろく，中心柱は強じんで折りにくい。皮層の折面は淡黄褐色を呈し，やや半透明で粘着性がある。味はわずかに甘く，粘着性である。

（2）　ハンゲ　外面は白色～灰白黄色，上部には茎の跡がくぼみとなり，その周辺には根の跡がくぼんだ細点となっている。横断面は白色，粉性である。味は初めなく，やや粘液性で，後に強いえぐ味を残す。

横切片を鏡検するとき，主としてでんぷん粒を充満した柔組織からなり，わずかにシュウ酸カルシウムの束晶を含んだ粘液細胞がその間に認められる。でんぷん粒は主として2

～3 個の複粒で，通例，径 10～15μm，単粒は通例径 3～7μm である。束晶は長さ 25～150μm である。

（３）　タイソウ　外面は赤褐色であらいしわがあるか，又は暗灰赤色で細かいしわがあり，いずれもつやがある。外果皮は薄く革質で，中果皮は暗灰褐色を呈し，海綿ようで柔らかく粘着性があり，内果皮は極めて堅く，種子は偏平である。わずかに特異なにおいがあり，味は甘い。

（４）　ニンジン　外面は淡黄褐色～淡灰褐色を呈し，縦じわがあり，横断面は淡黄褐色を呈し，形成層の付近は褐色を呈する。特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後にやや苦い。

必要に応じて，「ニンジン」の確認試験を準用する。

（５）　カンゾウ　外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現わす。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に 1～3 細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には 3～10 細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞中にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

（６）　コウベイ　楕円形を呈し，やや扁平で，長さ 4～6mm である。外面は半透明で，淡黄白色～淡褐色を呈する。一端はわずかにくぼみ，白色の胚が認められる。他端には花柱の跡に由来する褐色の小点が認められる。表面には数本の長軸方向に走るみぞがある。弱いにおいがあり，味はわずかに甘い。

横切片を鏡検するとき，最外層は果皮で，果皮中に維管束を認める。種皮は果皮と癒着し，その内側に 1～2 層のアリューロン層を認める。内胚乳の柔細胞中に単粒又は複粒のでんぷん粒を認める。

必要に応じて，「コウベイ」の確認試験を準用する。

乾燥減量　15％以下。

灰　　分　5％以下。

【 364 】　K160

成分及び分量又は本質	日本薬局方　ジオウ　5.0g 〃　サンシュユ　3.0g 〃　サンヤク　3.0g 〃　タクシャ　3.0g 〃　ブクリョウ　3.0g 〃　ボタンピ　3.0g 〃　ケイヒ　1.0g 〃　ブシ　0.5～1.0g 全　量　21.5～22.0g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。
効能又は効果	体力中等度以下で，疲れやすくて，四肢が冷えやすく，尿量減少又は多尿でときに口渇があるものの次の諸症：下肢痛，腰痛，しびれ，高齢者のかすみ目，かゆみ，排尿困難，残尿感，夜間尿，頻尿，むくみ，高血圧に伴う随伴症状の改善（肩こり，頭重，耳鳴り），軽い尿漏れ
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器
規格及び試験方法	別記のとおり。
備考	八味地黄丸料

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品1包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　ジオウ　外面は黄褐色～黒褐色を呈し，深い縦みぞ及びくびれがある。質は柔らかく粘性である。横断面は黄褐色～黒褐色で，皮部は木部より色が濃く，ほとんど髄を認めない。特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後にやや苦い。

横切片を鏡検するとき，コルク層は 7～15 層で，皮部はすべて柔細胞からなり，外皮部に褐色の分泌物を含む細胞が散在する。木部はほとんど柔細胞で満たされ，放射状に並ぶ道管は側孔のある網紋があり，弱い木化反応を呈する。

（２）　サンシュユ　偏圧された長だ円形を呈し，長さ 1.5～2cm，幅約 1cm である。表面は暗赤紫色～暗紫色を呈し，つやがあり，あらいしわがある。表面には種子を抜きとった跡の裂け目があり，頂端にがくの跡があり，基部に果柄の跡がある。質は柔軟である。酸味があって，味はわずかに甘い。

（３）　サンヤク　類白色～帯黄白色で，粉質である。味はない。

必要に応じて，「サンヤク」の確認試験を準用する。

（４）　タクシャ　淡黄褐色～淡褐色でコルク層をつける部位はやや暗色を呈する。ルーペ視するとき，褐色～淡褐色のはん点が散在する。切面は粒状で，繊維性ではない。わずかににおい及び味がある。

（５）　ブクリョウ　白色又はわずかに淡赤色を帯びた白色である。外層が残存するものは暗褐色～暗赤褐色で，きめがあらく，裂け目がある。質は堅いが砕きやすい。ほとんどにおいがなく，味はないがやや粘液ようである。

必要に応じて，「ブクリョウ」の確認試験を準用する。

（６）　ボタンピ　外面は暗褐色～帯紫褐色，内面は淡灰褐色～暗紫色を呈する。内面及び切断面にはしばしば白色の結晶を付着する。特異なにおいがあり，味はわずかに辛くて苦い。

必要に応じて，「ボタンピ」の確認試験を準用する。

（７）　ケイヒ　外面は暗赤褐色を呈し，内面は赤褐色を呈し，平滑である。横断面はやや繊維性で赤褐色を呈し淡褐色の薄層が見られる。特異な芳香があり，味は甘く，辛く，後にやや粘液性で，わずかに収れん性である。

横切片を鏡検するとき，一次皮部と二次皮部はほとんど連続した石細胞環で区分され，環の外辺にはほぼ円形に結集した繊維束を伴い，環の各石細胞の壁はしばしば U 字形に肥厚する。二次皮部中には石細胞を認めず，まばらに少数の厚膜繊維を認める。柔組織中には油細胞，粘液細胞及びでんぷん粒を含む。放射組織中には微細なシュウ酸カルシウムの針晶を含む細胞がある。

（８）　ブシ　本品はほぼ倒円錐形で，長さ 15～30mm，径 12～16mm，又は縦ときに横に切断され，長さ 20～60mm，幅 15～40mm，厚さ 200～700μm，又は径 12mm 以下の不整な多角形に破砕されている。外面は淡褐色～暗褐色又は黄褐色を呈する。質は堅く，通例，しわはなく，切面は平らで，淡褐色～暗褐色又は黄白色～淡黄褐色を呈し，通常角質，半透明で光沢がある。弱い特異なにおいがある。

横切片及び縦切片を鏡検するとき，外側から擬上皮，一次皮層，内皮，二次皮層，形成層，木部が認められる。一次皮層には楕円形～楕円状四角形，短径 30～75μm，長径 60～150μm の厚壁細胞がある。内皮は接線方向に長い 1 層の細胞からなっている。形成層輪は星形又は不整の多角形～円形であり，木部の道管群は V 字形を呈する。二次皮層及び髄中に独立した形成層輪が認められるものもある。道管は孔紋，階紋，網紋又はらせん紋道管である。柔細胞中のでんぷん粒は糊化している。

必要に応じて，「ブシ」の確認試験を準用する。

純度試験　本品 1 包中のアコニチン（$C_{34}H_{47}O_{11}N$：645.75）の残存量は 0.01mg 以下である。

本品 1 包を粉末とし，その重量を精密に量り，これにメタノール 50mL を加え一夜放置したのち，1 時間振とうし，ろ紙を用いてろ過する。残渣に再びメタノール 30mL を加え 1 時間振とうした後，前記ろ紙を用いてろ過する。また，この残渣をメタノール 30mL で 2 回洗い，全量を合わせ減圧下でメタノールをほとんど留去する。残留物に希塩酸 10mL を加え水浴上で加温溶解する。冷後，分液漏斗に脱脂綿を用いてろ過し，水 10mL で 2 回洗う。ろ液を合わせ，これにアンモニア水（28）を加えてアルカリ性とする。これにクロロホルム 50mL を加えてよく振り混ぜた後に下層を分取する。この操作を 2 回繰り返した後，クロロホルムを合わせ，これに水 10mL を加え洗った後，クロロホルム層を分取し，無水硫酸ナトリウムを加えて脱水する。これをろ過し，減圧下で蒸発乾固する。残留物をクロロホルム 1mL に正確に溶かして試料溶液とする。

別にアコニチン 20mg を精密に量り，クロロホルム 10mL に溶かし正確にメスアップする。この溶液 1mL を正確に量り，10mL に正確に希釈し標準溶液とする。

試料溶液及び標準溶液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。あらかじめ薄層クロマトグラフ用シリカゲルを用いて 0.25mm の厚さに調製し活性化した薄層板に試料溶液 0.3mL，標準溶液 10μL 及び 15μL を正確に塗布する。次にブタノール・酢酸・水（4：1：5）の混合溶液の上層を展開溶媒として，約 10cm 展開しこれを風乾した後，噴霧用ドラーゲンドルフ試液を均等に噴霧するとき，試料溶液から得られるアコニチンに対応するスポットの濃さは標準溶液の 10μL を塗布した方から得られるスポットより濃いことはあっても，標準溶液の 15μL を塗布した方から得られるスポットより濃くない。

乾燥減量　15%以下。

灰　　分　5%以下。

【 365 】　K160—①

成分及び分量又は本質	日本薬局方	ジオウ	2.97g
	〃	サンシュユ	1.48g
	〃	サンヤク	1.48g
	〃	タクシャ	1.11g
	〃	ブクリョウ	1.11g
	〃	ボタンピ	1.11g
	〃	ケイヒ	0.37g
	〃	ブシ	0.37g
		全　　量	10.0g
製造方法	以上の生薬をそれぞれ末とし，「ハチミツ」を結合剤として丸剤の製法により丸剤 100 個とする。		
用法及び用量	大人 1 日 3 回，1 回 20 個，食前又は空腹時に服用する。 15 才未満 7 才以上　大人の 2/3，7 才未満 5 才以上　大人の 1/2 を服用する。		
効能又は効果	体力中等度以下で，疲れやすくて，四肢が冷えやすく，尿量減少又は多尿でときに口渇があるものの次の諸症：下肢痛，腰痛，しびれ，高齢者のかすみ目，かゆみ，排尿困難，残尿感，夜間尿，頻尿，むくみ，高血圧に伴う随伴症状の改善（肩こり，頭重，耳鳴り），軽い尿漏れ		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	八味地黄丸		

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は褐色で，特異なにおいがある。

確認試験

（1）　ケイヒ　本品 50 丸を粉末とし，アセトニトリル 10mL を加え，3 分間振り混ぜた後，ろ過し，ろ液を試料溶液とする。別にケイヒ末 0.2g をとり試料溶液と同様に操作して標準溶液とする。これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び標準溶液 30μL ずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲル（蛍光剤入り）を用いて調製した薄層板にスポットする。次にトルエンを展開溶媒として約 10cm 展開した後，薄層板を風乾する。これに紫外線（主波長 254nm）を照射するとき，試料溶液から得た数個のスポットのうち 1 個のスポットは，標準溶液から得た主スポットと色調及び *Rf* 値が等し

い。また，このスポットは 2,4 - ジニトロフェニルヒドラジン試液を噴霧するとき，黄だいだい色を呈する。

（２）　ボタンピ　本品 50 丸を粉末とし，アセトニトリル 10mL を加え，3 分間振り混ぜた後，ろ過し，ろ液を試料溶液とする。別にボタンピ末 0.6g をとり試料溶液と同様に操作して標準溶液とする。これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び標準溶液 30μL ずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲル（蛍光剤入り）を用いて調製した薄層板にスポットする。次にトルエンを展開溶媒として約 10cm 展開した後，薄層板を風乾する。これに紫外線（主波長 254nm）を照射するとき，試料溶液から得た数個のスポットのうち 1 個のスポットは，標準溶液から得た主スポットと色調及び *Rf* 値が等しい。また，このスポットは塩化鉄（Ⅲ）試液を均等に噴霧するとき，紫褐色を呈する。

（３）　サンシュユ　本品 50 丸を粉末とし，メタノール 10mL を加え，3 分間振り混ぜた後，ろ過し，ろ液を試料溶液とする。別にサンシュユ末 0.8g をとり試料溶液と同様に操作して標準溶液とする。これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び標準溶液 10μL ずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲル（蛍光剤入り）を用いて調製した薄層板にスポットする。次にクロロホルム・メタノール・水混液（6：4：1）の下層を展開溶媒として約 10cm 展開した後，薄層板を風乾する。これに紫外線（主波長 254nm）を照射するとき，試料溶液から得たクロマトグラムの中に，標準溶液から得たスポットと同一の色調及び *Rf* 値を持つ数個のスポットを認める。また，このスポットは 4 - メトキシベンズアルデヒド・硫酸試液を均等に噴霧し，105℃にて 25 分間加熱するとき，同一の色調を呈する。

（４）　ジオウ　本品 50 丸を粉末とし，メタノール 10mL を加え，3 分間振り混ぜた後，ろ過し，ろ液を試料溶液とする。別にジオウ末 1.5g をとり試料溶液と同様に操作して標準溶液とする。これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び標準溶液 10μL ずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲル（蛍光剤入り）を用いて調製した薄層板にスポットする。次にクロロホルム・メタノール・水混液（6：4：1）の下層を展開溶媒として約 10cm 展開した後，薄層板を風乾する。これに紫外線（主波長 254nm）を照射するとき，試料溶液から得たクロマトグラムの中に，標準溶液から得たスポットと同一の色調及び *Rf* 値を持つ数個のスポットを認める。また，このスポットは 4 - メトキシベンズアルデヒド・硫酸試液を均等に噴霧し，105℃にて 5 分間加熱するとき，同一の色調を呈する。

（５）　タクシャ　本品 100 丸を粉末とし，アセトン 50mL を加え，3 分間振り混ぜた後，ろ過し，ろ液を蒸発乾固する。残留物にメタノール 5mL を加えて溶かし，ろ過した後，水を加えて 50mL とし，オクタデシルシリル化シリカゲル約 0.4g を充填したカートリッジカラム*に注入し，メタノール 2mL で溶出し，この溶出液を試料溶液とする。別にタクシャ末 1.1g をとり試料溶液と同様に操作して標準溶液とする。これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び標準溶液 20μL ずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲル（蛍光剤入り）を用いて調製した薄層板にスポットする。次にベンゼン・アセトン混液（3：1）を展開溶媒として約 10cm 展開した後，薄層板を風乾する。これに紫外線（主波長 254nm）を照射するとき，試料溶液から得た数個のスポットのうち 1 個のスポットは，標準溶液から得た暗紫色のスポットと色調及び *Rf* 値が等しい。また，このスポットは 4 - メトキシベンズアルデヒド・硫酸試液を均等に噴霧し，105℃にて 5 分間加熱するとき，同一の色調を呈する。

（６）　ブシ　試料溶液は，純度試験の項で調製したものをそのまま用いる。別にブシ，細末 2g をとり試料溶液と同様に操作して，標準溶液とする。これらの液につき薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び標準溶液 20μL ずつを薄層クロマトグラフ

用シリカゲルを用いて調製した薄層板にスポットする。次に 1－ブタノール・酢酸（100）・水混液（4：1：5）の上層を展開溶媒として約 10cm 展開した後，薄層板を風乾する。これに噴霧用ドラーゲンドルフ試液を均等に噴霧するとき，試料溶液から得たスポットのうち 1 個のスポットは，標準溶液から得られた主スポットと色調及び *Rf* 値が等しい。

（７）　サンヤク　本品 10 個をとり粉末とし，薄めたグリセリン（1→2）を滴加して鏡検するとき，だ円形のでんぷん粒を認める。

（８）　ブクリョウ　本品 10 個をとり粉末とし，薄めたグリセリン（1→2）を滴加して鏡検するとき，菌糸の破片を認める。

純度試験　本品 20 丸中のアコニチン（$C_{34}H_{47}O_{11}N$：645.75）の残存量は 0.01mg 以下である。本品 500 丸を粉末とし，その重量を精密に量り，これにメタノール 200mL を加え，一夜放置した後，1 時間振り混ぜ，ろ紙を用いてろ過する。残留物に再びメタノール 50mL を加え 1 時間振り混ぜた後，前記ろ紙を用いてろ過する。またこの残留物をメタノール 30mL で 2 回洗い全量を合わせて減圧下でメタノールをほとんど留去する。残留物に希塩酸 30mL を加え，水浴上で加温して溶かす。冷後，分液漏斗に脱脂綿を用いてろ過し，水 10mL で 2 回洗う。ろ液を合わせ，これにアンモニア水（28）を加えてアルカリ性とする。これにクロロホルム 30mL を加えてよく振り混ぜた後下層を分取する。この　操作を 3 回繰り返した後クロロホルム層を合わせ，これに水 10mL を加えて洗った後，クロロホルム層を分取し，無水硫酸ナトリウムを加えて脱水する。これをろ過し，減圧下で蒸発乾固する。残留物をクロロホルム 1mL に正確に溶かして試料溶液とする。別にアコニチン 10mg を精密に量り，クロロホルム 10mL に溶かし正確にメスアップし標準溶液とする。試料溶液及び標準溶液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。薄層クロマトグラフ用シリカゲルを用いて調製した薄層板に試料溶液 20μL，標準溶液 2μL 及び 5μL を正確にスポットする。次に 1－ブタノール・酢酸（100）・水混液（4：1：5）の上層を展開溶媒として約 10cm 展開した後，薄層板を風乾する。これに噴霧用ドラーゲンドルフ試液を均等に噴霧するとき，試料溶液から得られるアコニチンに対応するスポットの濃さは，標準溶液の 2μL から得られるスポットより濃いことはあっても，5μL から得られるスポットより濃くない。

［注］　*ウォーターズ社製セップパック C18 又はこれと同等の性能を有するもの。

【 366 】　K161

成分及び分量 又は本質	日本薬局方	ハンゲ	6.0g
	〃	ブクリョウ	5.0g
	〃	コウボク	3.0g
	〃	ソヨウ	2.0g
	〃	ショウキョウ	1.0g
		全　　量	17.0g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。		
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。		
効能又は効果	体力中等度をめやすとして，気分がふさいで，咽喉・食道部に異物感があり，ときに動悸，めまい，嘔気などを伴う次の諸症：不安神経症，神経性胃炎，つわり，せき，しわがれ声，のどのつかえ感		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	半夏厚朴湯		

規格及び試験方法

性　　状　本品はソヨウのにおいがある。

確認試験　本品1包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　ハンゲ　外面は白色～灰白黄色，上部には茎の跡がくぼみとなり，その周辺には根の跡がくぼんだ細点となっている。横断面は白色，粉性である。味は初めなく，やや粘液性で，後に強いえぐ味を残す。

横切片を鏡検するとき，主としてでんぷん粒を充満した柔組織からなり，わずかにシュウ酸カルシウムの束晶を含んだ粘液細胞がその間に認められる。でんぷん粒は主として2～3個の複粒で，通例，径10～15μm，単粒は通例径3～7μmである。束晶は長さ25～150μmである。

（2）　ブクリョウ　白色又はわずかに淡赤色を帯びた白色で，質は堅いが砕きやすい。味はないがやや粘液ようである。

必要に応じて，「ブクリョウ」の確認試験を準用する。

（３）　コウボク　外面は灰白色～灰褐色を呈し，内面は淡褐色～褐色，切断面は淡赤褐色を呈し，繊維性である。わずかに芳香があり，味は苦い。

横切片を鏡検するとき，コルク層は厚く，ほぼ等径性の石細胞が環状に内接する。一次皮部は狭く，内しょう部には繊維群が点在し，二次皮部の放射組織間には師部繊維群が階段状に並ぶ。油細胞の多数は一次皮部に，少数は二次皮部に散在し，狭い放射組織内にも認められることがある。

必要に応じて，「コウボク」の確認試験を準用する。

（４）　ソヨウ　縮んだ葉の細片で，両面とも帯褐紫色，あるいは上面は灰緑色～帯褐緑色で下面は帯褐紫色を呈する。茎を交えるものは，その横断面は方形である。葉をルーペ視するとき，両面にまばらに毛を認め，特に葉脈上に多く，裏面には細かい腺毛を認める。もみ砕くとき，特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

必要に応じて，「ソヨウ」の確認試験を準用する。

（５）　ショウキョウ　淡灰黄色の周皮を付けたままか，又はその一部をはぎとってあり，表面は灰白色～淡灰褐色で，しばしば白粉を付けている。横断面は繊維性，粉性で，淡帯黄褐色を呈し，皮層と中心柱とに分かれる。横断面をルーペ視するとき，その全面に維管束及び分泌物が褐色の細点として散在している。特異なにおいがあり，味は極めて辛い。

乾燥減量　15％以下。

灰　　分　5％以下。

【 367 】　K162

成分及び分量又は本質	日本薬局方	ハンゲ	5.0g
	〃	オウゴン	2.5g
	〃	カンキョウ	2.5g
	〃	ニンジン	2.5g
	〃	カンゾウ	2.5g
	〃	タイソウ	2.5g
	〃	オウレン	1.0g
		全　　量	18.5g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。		
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。		
効能又は効果	体力中等度で，みぞおちがつかえた感じがあり，ときに悪心，嘔吐があり食欲不振で腹が鳴って軟便又は下痢の傾向のあるものの次の諸症：急・慢性胃腸炎，下痢・軟便，消化不良，胃下垂，神経性胃炎，胃弱，二日酔，げっぷ，胸やけ，口内炎，神経症		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	半夏瀉心湯		

規格及び試験方法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品1包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　ハンゲ　外面は白色～灰白黄色，上部には茎の跡がくぼみとなり，その周辺には根の跡がくぼんだ細点となっている。横断面は白色，粉性である。味は初めなく，やや粘液性で，後に強いえぐ味を残す。

横切片を鏡検するとき，主としてでんぷん粒を充満した柔組織からなり，わずかにシュウ酸カルシウムの束晶を含んだ粘液細胞がその間に認められる。でんぷん粒は主として2～3個の複粒で，通例，径10～15μm，単粒は通例径3～7μmである。束晶は長さ25～150μmである。

（２）　オウゴン　外面は黄褐色～暗褐色を呈し，切断面は黄色～帯褐黄色を呈し，縦に繊維性のすじが見られる。味はわずかに苦い。

必要に応じて，「オウゴン」の確認試験を準用する。

（３）　カンキョウ　偏圧した不規則な塊状でしばしば分枝する。分枝した各部はやや湾曲した卵形又は長卵形を呈し，長さ 2～4cm，径 1～2cm である。外面は灰黄色～灰黄褐色で，しわ及び輪節がある。折面は褐色～暗褐色で透明感があり角質である。横切面をルーペ視するとき皮層と中心柱は区分され，全面に維管束が散在する。特異なにおいがあり，味は極めて辛い。

横切片を鏡検するとき，外側よりコルク層，皮層，内皮，中心柱が認められる。皮層と中心柱は一層の内皮によって区分される。皮層及び中心柱は柔組織からなり，繊維束で囲まれた維管束が散在する。柔組織中には黄色の油様物質を含む油細胞が散在し，柔細胞中にはシュウ酸カルシウムの単晶が含まれ，でんぷんは糊化している。

必要に応じて，「カンキョウ」の確認試験を準用する。

（４）　ニンジン　外面は淡黄褐色～淡灰褐色を呈し，縦じわがあり，横断面は淡黄褐色を呈し，形成層の付近は褐色を呈する。特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後にやや苦い。

必要に応じて，「ニンジン」の確認試験を準用する。

（５）　カンゾウ　外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現わす。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に 1～3 細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には 3～10 細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞中にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

（６）　タイソウ　外面は赤褐色であらいしわがあるか，又は暗灰赤色で細かいしわがあり，いずれもつやがある。外果皮は薄く革質で，中果皮は暗灰褐色を呈し，海綿ようで柔らかく粘着性があり，内果皮は極めて堅く，種子は偏平である。わずかに特異なにおいがあり，味は甘い。

（７）　オウレン　根茎の径は 2～7mm で，外面は灰黄褐色～褐色を呈し，輪節及び多数の根の基部を認め，横断面はやや繊維性で，コルク層は淡灰褐色，皮部は黄褐色，木部は黄色，髄は黄褐色である。味は極めて苦く，残留性で，だ液を黄色に染める。

横切片を鏡検するとき，コルク層は薄膜のコルク細胞からなり，皮部柔組織中にはコルク層に近い部位に石細胞群，形成層に近い部位に黄色の師部繊維の認められるものが多い。木部は主として道管，仮道管，木部繊維からなり，放射組織は明らかで，髄は大きく，髄中には石細胞あるいは厚膜木化した細胞を伴った石細胞を認めることがある。柔細胞には細かいでんぷん粒を含むが，結晶を含まない。

必要に応じて，「オウレン」の確認試験を準用する。

乾燥減量　15%以下。

灰　　分　5%以下。

【 368 】　K163

成分及び分量 又は本質	日本薬局方	ハンゲ	3.0g
	〃	ビャクジュツ	3.0g
	〃	ソウジュツ	3.0g
	〃	チンピ	3.0g
	〃	ブクリョウ	3.0g
	〃	バクガ	2.0g
	〃	テンマ	2.0g
	〃	ショウキョウ	0.5g
	別紙規格	シンキク	2.0g
	日本薬局方	オウギ	1.5g
	〃	ニンジン	1.5g
	〃	タクシャ	1.5g
	〃	オウバク	1.0g
	〃	カンキョウ	0.5g
		全　量	27.5g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。		
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，熱いうちに煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。 本剤は必ず1日分ずつ煎じ，数日分をまとめて煎じないこと。		
効能又は効果	体力中等度以下で，胃腸が弱く下肢が冷えるものの次の諸症：頭痛，頭重，立ちくらみ，めまい，蓄膿症（副鼻腔炎）		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	半夏白朮天麻湯		

規格及び試験方法

性　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品 1 包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　ハンゲ　外面は白色～灰白黄色，上部には茎の跡がくぼみとなり，その周辺には根の跡がくぼんだ細点となっている。横断面は白色，粉性である。味は初めなく，やや粘液性で，後に強いえぐ味を残す。

横切片を鏡検するとき，主としてでんぷん粒を充満した柔組織からなり，わずかにシュウ酸カルシウムの束晶を含んだ粘液細胞がその間に認められる。でんぷん粒は主として 2～3 個の複粒で，通例，径 10～15μm，単粒は通例径 3～7μm である。束晶は長さ 25～150μm である。

（2）　ビャクジュツ　外面は淡灰黄色～淡黄白色で，ところどころ灰褐色を呈し，横切面には淡黄褐色～褐色の分泌物による細点がある。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，皮部の柔組織中にはしばしば師部の外側に接して繊維束があり，放射組織の末端部には淡褐色～褐色の内容物を含む油室がある。木部には大きい髄を囲んで放射状に配列した短径の道管とそれを囲む著しい繊維束がある。髄及び放射組織中には皮部と同様な油室があり，柔組織中にはイヌリンの結晶及びシュウ酸カルシウムの小針晶を含む。

必要に応じて，「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。

（3）　ソウジュツ　外面は暗灰褐色～暗黄褐色である。横切面はほぼ円形で淡褐色～赤褐色の分泌物による細点を認める。しばしば白色綿状の結晶を析出する。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，皮部の柔組織中には，通例，繊維束を欠き，放射組織の末端部には淡褐色～黄褐色の内容物を含む油室がある。木部は形成層に接して道管を囲んだ繊維束が放射状に配列し，髄及び放射組織中には皮部と同様な油室がある。柔細胞中にはイヌリンの球晶及びシュウ酸カルシウムの針晶を含む。

（4）　チンピ　外面は黄赤色～暗黄褐色で，油室による多数の小さいくぼみがあり，内面は白色～淡灰黄褐色である。厚さ約 2mm で，質は軽くてもろい。芳香があり，味は苦くて，わずかに刺激性である。

必要に応じて，「チンピ」の確認試験を準用する。

（5）　ブクリョウ　白色又はわずかに淡赤色を帯びた白色である。外層が残存するものは暗褐色～暗赤褐色で，きめがあらく，裂け目がある。質は堅いが砕きやすい。ほとんどにおいがなく，味はないがやや粘液ようである。

必要に応じて，「ブクリョウ」の確認試験を準用する。

（6）　バクガ　卵形を呈し，長さ約 10mm，径 3～4mm で，片面に縦に腹溝が認められる。外面は淡黄色を呈し，幼芽を伴うことがあり，他端には毛があり，根をつけることがある。えい果の横折面は白色，粉性であり，質はつぶれやすく，軽い。わずかににおいがあり，味はわずかに甘い。

えい果の横切片を鏡検するとき，外側からえい（穎），果皮，種皮，内乳が認められる。内乳の周辺部には 2～4 層のアリューロン層を認め，内乳の内側にはでんぷん粒が充満している。でんぷん粒は，円形～楕円形で，径約 20μm と径約 2μm の大小が混在している。

必要に応じて，「バクガ」の確認試験を準用する。

（７）　テンマ　不整にやや湾曲した偏円柱形～偏紡錘形を呈し，長さ 5～15cm，幅 2～5cm，厚さ 1～2cm である。外面は淡黄褐色～淡黄白色を呈し，輪節及び不規則な縦じわがある。質は堅い。折面は暗褐色～黄褐色でつやがあり，角質様で膠状を呈する。特異なにおいがあり，味はほとんどない。

横切片を鏡検するとき，柔細胞中にはシュウ酸カルシウムの束針晶を認め，でんぷん粒を認めない。

必要に応じて，「テンマ」の確認試験を準用する。

（８）　ショウキョウ　淡灰黄色の周皮を付けたままか，又はその一部をはぎとってあり，表面は灰白色～淡灰褐色で，しばしば白粉を付けている。横断面は繊維性，粉性で，淡黄褐色を呈し，皮層と中心柱とに分かれる。横断面をルーペ視するとき，その全面に維管束及び分泌物が暗褐色の細点として散在している。特異なにおいがあり，味は極めて辛い。

（９）　シンキク　灰黄色～褐色の不整の塊片若しくはブロック状の塊状である。表面は粗く，平滑でなく，ところどころに暗赤色の粒が認められる。本品はわずかに発酵臭があり，味はわずかに甘い。

（10）　オウギ　外面は淡灰黄色～淡褐黄色で，不規則なあらい縦じわがあり，折面は繊維性である。横断面をルーペ視するとき，最外層には周皮があり，皮部は淡黄白色，木部は淡黄色，形成層付近はやや褐色を帯びる。木部から皮部にわたって白色の放射組織が認められるが，太いものではしばしば放射状の裂け目となっている。わずかに弱いにおいがあり，味は甘い。

（11）　ニンジン　外面は淡黄褐色～淡灰褐色を呈し，縦じわがあり，横断面は淡黄褐色を呈し，形成層の付近は褐色を呈する。特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後にやや苦い。

必要に応じて，「ニンジン」の確認試験を準用する。

（12）　タクシャ　淡黄褐色～淡褐色でコルク層をつける部位はやや暗色を呈する。ルーペ視するとき，褐色～淡褐色のはん点が散在する。切面は粒状で，繊維性ではない。わずかににおい及び味がある。

（13）　オウバク　外面は灰黄褐色～灰褐色で，内面は黄色～暗黄褐色で，細かい縦線を認める。横断面は繊維性で鮮黄色を呈する。横切面をルーペ視するとき，皮部外層は黄色で薄く，石細胞が黄褐色の点状に分布する。皮部内層は厚く，一次放射組織は外方に向かうに従い幅が広がるので二次皮部の一次放射組織間はほぼ三角形を呈し，その頂点に後生放射組織が集中する。師部繊維群は褐色で，階段状に並び，放射組織と交叉し，格子状を呈する。味は極めて苦く，粘液性で，だ液を黄色に染める。

必要に応じて，「オウバク」の確認試験を準用する。

（14）　カンキョウ　偏圧した不規則な塊状でしばしば分枝する。分枝した各部はやや湾曲した卵形又は長卵形を呈し，長さ 2～4cm，径 1～2cm である。外面は灰黄色～灰黄褐色で，しわ及び輪節がある。折面は褐色～暗褐色で透明感があり角質である。横切面をルーペ視するとき皮層と中心柱は区分され，全面に維管束が散在する。特異なにおいがあり，味は極めて辛い。

横切片を鏡検するとき，外側よりコルク層，皮層，内皮，中心柱が認められる。皮層と中心柱は一層の内皮によって区分される。皮層及び中心柱は柔組織からなり，繊維束で囲まれた維管束が散在する。柔組織中には黄色の油様物質を含む油細胞が散在し，柔細胞中にはシュウ酸カルシウムの単晶が含まれ，でんぷんは糊化している。

必要に応じて，「カンキョウ」の確認試験を準用する。

乾燥減量　13%以下。

灰　　分　5%以下。

別紙規格　　**シンキクの規格及び試験方法**

本品は通例白麹（又は小麦粉），赤小豆，杏仁，青蒿汁，蒼茸汁，野蓼汁を混合したものを圧縮して成型し，数日間発酵させた後，乾燥したものである。

性　　状　本品は灰黄色～褐色の不整の塊片もしくはブロック状の塊状である。表面は粗く，平滑でなく，ところどころに暗赤色の粒が認められる。本品はわずかに発酵臭があり，味はわずかに甘い。

確認試験

（１）　本品の粉末 2.0g に水 10mL を加え，水浴上で 5 分間加温した後，ろ過する。ろ液にヨウ素試液 1 滴を加えるとき，液は赤紫色を呈する。

（２）　本品の粉末 2.0g に水 20mL を加え，水浴中で 2～3 分加熱した後，ろ過する。ろ液 4mL にフェーリング試液 2mL を加え，水浴中で加熱するとき赤色の沈殿を生じる。

純度試験　**（１）**　重金属　本品 1.0g をとり，重金属試験法，第 3 法により操作し，試験を行う。比較液には鉛標準液 2.0mL を加える（20ppm 以下）。

（２）　ヒ素　本品 1.0g をとり，ヒ素試験法，第 3 法により検液を調製し，装置 B を用いる方法により操作し，試験を行う（2ppm 以下）。

乾燥減量　15%以下（2g，105℃，6 時間）。

灰　　分　7%以下。

酸不溶性灰分　2%以下。

エキス含量　希エタノールエキス　8%以上。

【 369 】　K164

成分及び分量又は本質	日本薬局方	チモ	5.0g
	〃	セッコウ	15.0g
	〃	カンゾウ	2.0g
	〃	ケイヒ	3.0g
	〃	コウベイ	8.0g
		全　　量	33.0g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。		
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。		
効能又は効果	体力中等度以上で，熱感，口渇，のぼせがあるものの次の諸症：のどの渇き，ほてり，湿疹・皮膚炎，皮膚のかゆみ		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	白虎加桂枝湯		

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品1包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　チモ　外面は黄褐色～褐色を呈し，質は軽くて折りやすい。横断面は淡黄褐色を呈し，これをルーペ視するとき，皮層は極めて狭く，広い中心柱には多くの維管束が不規則に点在し，粘液細胞又はその集合による多孔性を示す。味はわずかに甘く，粘液性で，後に苦い。

必要に応じて，「チモ」の確認試験を準用する。

（2）　セッコウ　光沢のある白色の重い繊維状結晶塊で，におい及び味はない。砕くとたやすく針状～微細結晶性の粉末となる。水に溶けにくい。

必要に応じて，「セッコウ」の確認試験を準用する。

（３）　カンゾウ　外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現わす。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に 1～3 細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には 3～10 細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞中にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

（４）　ケイヒ　外面は暗赤褐色を呈し，内面は赤褐色を呈し，平滑である。横断面は赤褐色を呈し淡褐色の薄層が見られる。特異なにおいがあり，味は甘く，辛く，後にやや粘液性で，わずかに収れん性である。

横切片を鏡検するとき，一次皮部と二次皮部はほとんど連続した石細胞環で区分され，環の外辺にはほぼ円形に結集した繊維束を伴い，環の各石細胞の膜はしばしば U 字形に肥厚する。二次皮部中には石細胞を認めず，まばらに少数の厚膜繊維を認める。柔組織中には油細胞，粘液細胞及び微細なシュウ酸カルシウムの針晶を含む細胞があり，柔細胞中にはでんぷん粒を含む。

（５）　コウベイ　楕円形を呈し，やや扁平で，長さ 4～6mm である。外面は半透明で，淡黄白色～淡褐色を呈する。一端はわずかにくぼみ，白色の胚が認められる。他端には花柱の跡に由来する褐色の小点が認められる。表面には数本の長軸方向に走るみぞがある。弱いにおいがあり，味はわずかに甘い。

横切片を鏡検するとき，最外層は果皮で，果皮中に維管束を認める。種皮は果皮と癒着し，その内側に 1～2 層のアリューロン層を認める。内胚乳の柔細胞中に単粒又は複粒のでんぷん粒を認める。

必要に応じて，「コウベイ」の確認試験を準用する。

乾燥減量　15％以下。

灰　　分　44％以下。

【 370 】　K165

成分及び分量又は本質	日本薬局方	チモ	5.0g
	〃	セッコウ	15.0g
	〃	カンゾウ	2.0g
	〃	ニンジン	3.0g
	〃	コウベイ	8.0g
		全　　量	33.0g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。		
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。		
効能又は効果	体力中等度以上で，熱感と口渇が強いものの次の諸症：のどの渇き，ほてり，湿疹・皮膚炎，皮膚のかゆみ		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	白虎加人参湯		

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品1包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　チモ　外面は黄褐色～褐色を呈し，質は軽くて折りやすい。横断面は淡黄褐色を呈し，これをルーペ視するとき，皮層は極めて狭く，広い中心柱には多くの維管束が不規則に点在し，粘液細胞又はその集合による多孔性を示す。味はわずかに甘く，粘液性で，後に苦い。

必要に応じて，「チモ」の確認試験を準用する。

（2）　セッコウ　光沢のある白色の重い繊維状結晶塊で，におい及び味はない。砕くとたやすく針状～微細結晶性の粉末となる。水に溶けにくい。

必要に応じて，「セッコウ」の確認試験を準用する。

（３）　カンゾウ　外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現わす。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に 1～3 細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には 3～10 細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞中にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

（４）　ニンジン　外面は淡黄褐色～淡灰褐色を呈し，縦じわがあり，横断面は淡黄褐色を呈し，形成層の付近は褐色を呈する。特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後にやや苦い。

必要に応じて，「ニンジン」の確認試験を準用する。

（５）　コウベイ　楕円形を呈し，やや扁平で，長さ 4～6mm である。外面は半透明で，淡黄白色～淡褐色を呈する。一端はわずかにくぼみ，白色の胚が認められる。他端には花柱の跡に由来する褐色の小点が認められる。表面には数本の長軸方向に走るみぞがある。弱いにおいがあり，味はわずかに甘い。

横切片を鏡検するとき，最外層は果皮で，果皮中に維管束を認める。種皮は果皮と癒着し，その内側に 1～2 層のアリューロン層を認める。内胚乳の柔細胞中に単粒又は複粒のでんぷん粒を認める。

必要に応じて，「コウベイ」の確認試験を準用する。

乾燥減量　15％以下。

灰　　分　56％以下。

【 371 】　K166

成分及び分量 又は本質	日本薬局方	チモ	5.0g
	〃	セッコウ	15.0g
	〃	カンゾウ	2.0g
	〃	コウベイ	8.0g
		全　量	30.0g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。		
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。		
効能又は効果	体力中等度以上で，熱感，口渇があるものの次の諸症：のどの渇き，ほてり，湿疹・皮膚炎，皮膚のかゆみ		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	白虎湯		

規格及び試験方法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品1包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　チモ　外面は黄褐色～褐色を呈し，質は軽くて折りやすい。横断面は淡黄褐色を呈し，これをルーペ視するとき，皮層は極めて狭く，広い中心柱には多くの維管束が不規則に点在し，粘液細胞又はその集合による多孔性を示す。味はわずかに甘く，粘液性で，後に苦い。

必要に応じて，「チモ」の確認試験を準用する。

（2）　セッコウ　光沢のある白色の重い繊維状結晶塊で，におい及び味はない。砕くとたやすく針状～微細結晶性の粉末となる。水に溶けにくい。

必要に応じて，「セッコウ」の確認試験を準用する。

（3）　カンゾウ　外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現わす。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に 1～3 細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には 3～10 細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞中にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

（4） コウベイ 楕円形を呈し，やや扁平で，長さ 4～6mm である。外面は半透明で，淡黄白色～淡褐色を呈する。一端はわずかにくぼみ，白色の胚が認められる。他端には花柱の跡に由来する褐色の小点が認められる。表面には数本の長軸方向に走るみぞがある。弱いにおいがあり，味はわずかに甘い。

横切片を鏡検するとき，最外層は果皮で，果皮中に維管束を認める。種皮は果皮と癒着し，その内側に 1～2 層のアリューロン層を認める。内胚乳の柔細胞中に単粒又は複粒のでんぷん粒を認める。

必要に応じて，「コウベイ」の確認試験を準用する。

乾燥減量 15%以下。

灰　　分 47%以下。

【 372 】　K167

成分及び分量 又は本質	日本薬局方　ビャクジュツ　4.0g 〃　コウボク　3.0g 〃　チンピ　3.0g 〃　タイソウ　3.0g 〃　ショウキョウ　1.0g 〃　ハンゲ　6.0g 〃　カンゾウ　1.5g 〃　カッコウ　1.0g 全　量　22.5g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。
効能又は効果	体力中等度で，胃がもたれて食欲がなく，ときにはきけがあるものの次の諸症：急・慢性胃炎，胃腸虚弱，消化不良，食欲不振，消化器症状のある感冒
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器
規格及び試験方法	別記のとおり。
備考	不換金正気散料

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品1包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　ビャクジュツ　外面は淡灰黄色～淡黄白色で，ところどころ灰褐色を呈し，横切面には淡黄褐色～褐色の分泌物による細点がある。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，皮部の柔組織中にはしばしば師管の外側に接して繊維束があり，放射組織の末端部には淡褐色～褐色の内容物を含む油室がある。木部には大きい髄を囲んで放射状に配列した短径の道管とそれを囲む著しい繊維束がある。髄及び放射組織中

には皮部と同様な油室があり，柔組織中にはイヌリンの小球晶及びシュウ酸カルシウムの針晶を含む。

必要に応じて，「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。

（２）　コウボク　外面は灰白色～灰褐色を呈し，内面は淡褐色～褐色，切断面は淡赤褐色を呈し，繊維性である。わずかに芳香があり，味は苦い。

横切片を鏡検するとき，コルク層は厚く，ほぼ等径性の石細胞が環状に内接する。一次皮部は狭く，内しょう部には繊維群が点在し，二次皮部の放射組織間には師部繊維群が階段状に並ぶ。油細胞の多数は一次皮部に，少数は二次皮部に散在し，狭い放射組織内にも認められることがある。

必要に応じて，「コウボク」の確認試験を準用する。

（３）　チンピ　外面は黄赤色～暗黄褐色で，油室による多数の小さいくぼみがあり，内面は白色～淡灰黄褐色である。厚さ約 2mm で，質は軽くてもろい，芳香があり，味は苦くて，わずかに刺激性である。

必要に応じて，「チンピ」の確認試験を準用する。

（４）　タイソウ　外面は赤褐色であらいしわがあるか，又は暗灰赤色で細かいしわがあり，いずれもつやがある。外果皮は薄く革質で，中果皮は暗灰褐色を呈し，海綿ようで柔らかく粘着性があり，内果皮は極めて堅く，種子は偏平である。わずかに特異なにおいがあり，味は甘い。

（５）　ショウキョウ　淡灰黄色の周皮を付けたままか，又はその一部をはぎとってあり，表面は灰白色～淡灰褐色で，しばしば白粉を付けている。横断面は繊維性，粉性で，淡帯黄褐色を呈し，皮層と中心柱とに分かれる。横断面をルーペ視するとき，その全面に維管束及び分泌物が褐色の細点として散在している。特異なにおいがあり，味は極めて辛い。

（６）　ハンゲ　外面は白色～灰白黄色，上部には茎の跡がくぼみとなり，その周辺には根の跡がくぼんだ細点となっている。横断面は白色，粉性である。味は初めなく，やや粘液性で，後に強いえぐ味を残す。

横切片を鏡検するとき，主としてでんぷん粒を充満した柔組織からなり，わずかにシュウ酸カルシウムの束晶を含んだ粘液細胞がその間に認められる。でんぷん粒は主として 2～3 個の複粒で，通例，径 10～15μm，単粒は通例径 3～7μm である。束晶は長さ 25～150μm である。

（７）　カンゾウ　外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現わす。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に 1～3 細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には 3～10 細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞中にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

（８）　カッコウ　茎及びこれに対生した葉からなる。葉はしわがよって縮み，水に浸してしわを伸ばすと，卵形～卵状長楕円形を呈し，長さ 2.5～10cm，幅 2.5～7cm，辺縁に

鈍きょ歯があり，基部は広いくさび形で葉柄を付ける。葉の上面は暗褐色，下面は灰褐色を呈し，両面に密に毛がある。茎は方柱形，中実で，表面は灰緑色を呈し，灰白色～黄白色の毛があり，髄は大きく，類白色で海綿状を呈する。ルーペ視するとき，毛，腺毛及び腺りんを認める。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

葉柄の横切片を鏡検するとき，向軸面中央は大きく突出し，その表皮の内側に厚角細胞が認められる。中央部の維管束は 2 群に分かれる。葉身主脈部の横切片を鏡検するとき，主脈の向軸面は大きく突出し，その表皮の内側に厚角細胞が認められる。中央部には扇状に配列した維管束がある。茎の横切片を鏡検するとき，表皮の内側に数細胞層の厚角組織が認められる。ときに表皮下にコルク層が発達することがある。皮層の内側には並立維管束が環状に配列し，師部の外側に師部繊維群が認められる。皮層の柔細胞中に油滴が，髄の柔細胞中にシュウ酸カルシウムの針晶，単晶又は柱状晶が認められる。

必要に応じて，「カッコウ」の確認試験を準用する。

乾燥減量　15%以下。

灰　　分　5%以下。

【 373 】　K168

成分及び分量 又 は 本 質	日本薬局方　ブクリョウ　5.0g 〃　ビャクジュツ　4.0g 〃　ニンジン　3.0g 〃　ショウキョウ　1.0g 〃　チンピ　3.0g 〃　キジツ　1.5g 全　量　17.5g
製 造 方 法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。
効能又は効果	体力中等度以下で，はきけや胸やけ，上腹部膨満感があり尿量減少するものの次の諸症：胃炎，神経性胃炎，胃腸虚弱，胸やけ
貯蔵方法及び 有 効 期 間	密閉容器
規格及び試験方法	別記のとおり。
備　　考	茯苓飲

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品1包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　ブクリョウ　白色又はわずかに淡赤色を帯びた白色で，質は堅いが砕きやすい。味はないがやや粘液ようである。

必要に応じて，「ブクリョウ」の確認試験を準用する。

（2）　ビャクジュツ　外面は淡灰黄色～淡黄白色で，ところどころ灰褐色を呈し，横切面には淡黄褐色～褐色の分泌物による細点がある。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，皮部の柔組織中にはしばしば師管の外側に接して繊維束があり，放射組織の末端部には淡褐色～褐色の内容物を含む油室がある。木部には大きい髄を囲んで放射状に配列した短径の道管とそれを囲む著しい繊維束がある。髄及び放射組織中

には皮部と同様な油室があり，柔組織中にはイヌリンの小球晶及びシュウ酸カルシウムの針晶を含む。

必要に応じて，「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。

（３）　ニンジン　外面は淡黄褐色～淡灰褐色を呈し，縦じわがあり，横断面は淡黄褐色を呈し，形成層の付近は褐色を呈する。特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後にやや苦い。

必要に応じて，「ニンジン」の確認試験を準用する。

（４）　ショウキョウ　淡灰黄色の周皮を付けたままか，又はその一部をはぎとってあり，表面は灰白色～淡灰褐色で，しばしば白粉を付けている。横断面は繊維性，粉性で，淡帯黄褐色を呈し，皮層と中心柱とに分かれる。横断面をルーペ視するとき，その全面に維管束及び分泌物が褐色の細点として散在している。特異なにおいがあり，味は極めて辛い。

（５）　チンピ　外面は黄赤色～暗黄褐色で，油室による多数の小さいくぼみがあり，内面は白色～淡灰黄褐色である。厚さ約 2mm で，質は軽くてもろい。芳香があり，味は苦くて，わずかに刺激性である。

必要に応じて，「チンピ」の確認試験を準用する。

（６）　キジツ　外面は濃緑褐色～褐色で，つやがなく，油室による多数のくぼんだ細点がある。切断面は淡灰褐色を呈し，内果皮を付ける部分は褐色を呈する。特異なにおいがあり，味は苦い。

必要に応じて，「キジツ」の確認試験を準用する。

乾燥減量　15%以下。

灰　　分　5%以下。

【 374 】　K169

成分及び分量又は本質	日本薬局方	ブクリョウ	5.0g
	〃	ビャクジュツ	4.0g
	〃	ニンジン	3.0g
	〃	ショウキョウ	1.0g
	〃	チンピ	3.0g
	〃	キジツ	1.5g
	〃	ハンゲ	4.0g
		全　量	21.5g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。		
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。		
効能又は効果	体力中等度以下で，はきけや胸やけが強く，上腹部膨満感があり尿量減少するものの次の諸症：胃炎，神経性胃炎，胃腸虚弱，胸やけ		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	茯苓飲加半夏		

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品1包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　ブクリョウ　白色又はわずかに淡赤色を帯びた白色で，質は堅いが砕きやすい。味はないがやや粘液ようである。

必要に応じて，「ブクリョウ」の確認試験を準用する。

（2）　ビャクジュツ　外面は淡灰黄色～淡黄白色で，ところどころ灰褐色を呈し，横切面には淡黄褐色～褐色の分泌物による細点がある。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，皮部の柔組織中にはしばしば師管の外側に接して繊維束があり，放射組織の末端部には淡褐色～褐色の内容物を含む油室がある。木部には大きい髄を

囲んで放射状に配列した短径の道管とそれを囲む著しい繊維束がある。髄及び放射組織中には皮部と同様な油室があり，柔組織中にはイヌリンの小球晶及びシュウ酸カルシウムの針晶を含む。

必要に応じて，「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。

（３）　ニンジン　外面は淡黄褐色～淡灰褐色を呈し，縦じわがあり，横断面は淡黄褐色を呈し，形成層の付近は褐色を呈する。特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後にやや苦い。

必要に応じて，「ニンジン」の確認試験を準用する。

（４）　ショウキョウ　淡灰黄色の周皮を付けたままか，又はその一部をはぎとってあり，表面は灰白色～淡灰褐色で，しばしば白粉を付けている。横断面は繊維性，粉性で，淡帯黄褐色を呈し，皮層と中心柱とに分かれる。横断面をルーペ視するとき，その全面に維管束及び分泌物が褐色の細点として散在している。特異なにおいがあり，味は極めて辛い。

（５）　チンピ　外面は黄赤色～暗黄褐色で，油室による多数の小さいくぼみがあり，内面は白色～淡灰黄褐色である。厚さ約 2mm で，質は軽くてもろい。芳香があり，味は苦くて，わずかに刺激性である。

必要に応じて，「チンピ」の確認試験を準用する。

（６）　キジツ　外面は濃緑褐色～褐色で，つやがなく，油室による多数のくぼんだ細点がある。切断面は淡灰褐色を呈し，内果皮を付ける部分は褐色を呈する。特異なにおいがあり，味は苦い。

必要に応じて，「キジツ」の確認試験を準用する。

（７）　ハンゲ　外面は白色～灰白黄色，上部には茎の跡がくぼみとなり，その周辺には根の跡がくぼんだ細点となっている。横断面は白色，粉性である。味は初めなく，やや粘液性で，後に強いえぐ味を残す。

横切片を鏡検するとき，主としてでんぷん粒を充満した柔組織からなり，わずかにシュウ酸カルシウムの束晶を含んだ粘液細胞がその間に認められる。でんぷん粒は主として 2～3 個の複粒で，通例，径 10～15μm，単粒は通例径 3～7μm である。束晶は長さ 25～150μm である。

乾燥減量　15％以下。

灰　　分　5％以下。

【 375 】　K170

成分及び分量 又は本質	日本薬局方	ブクリョウ	5.0g
	〃	ビャクジュツ	4.0g
	〃	ニンジン	3.0g
	〃	ショウキョウ	1.0g
	〃	チンピ	3.0g
	〃	キジツ	1.5g
	〃	ハンゲ	6.0g
	〃	コウボク	3.0g
	〃	ソヨウ	2.0g
		全　量	28.5g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。		
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。		
効能又は効果	体力中等度以下で，気分がふさいで咽喉食道部に異物感があり，ときに動悸，めまい，嘔気，胸やけ，上腹部膨満感などがあり，尿量減少するものの次の諸症：不安神経症，神経性胃炎，つわり，胸やけ，胃炎，しわがれ声，のどのつかえ感		
貯蔵方法及び 有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	茯苓飲合半夏厚朴湯		

規格及び試験方法

性　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品1包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　ブクリョウ　白色又はわずかに淡赤色を帯びた白色で，質は堅いが砕きやすい。味はないがやや粘液ようである。

必要に応じて，「ブクリョウ」の確認試験を準用する。

（２）　ビャクジュツ　外面は淡灰黄色～淡黄白色で，ところどころ灰褐色を呈し，横切面には淡黄褐色～褐色の分泌物による細点がある。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，皮部の柔組織中にはしばしば師管の外側に接して繊維束があり，放射組織の末端部には淡褐色～褐色の内容物を含む油室がある。木部には大きい髄を囲んで放射状に配列した短径の道管とそれを囲む著しい繊維束がある。髄及び放射組織中には皮部と同様な油室があり，柔組織中にはイヌリンの小球晶及びシュウ酸カルシウムの針晶を含む。

必要に応じて，「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。

（３）　ニンジン　外面は淡黄褐色～淡灰褐色を呈し，縦じわがあり，横断面は淡黄褐色を呈し，形成層の付近は褐色を呈する。特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後にやや苦い。

必要に応じて，「ニンジン」の確認試験を準用する。

（４）　ショウキョウ　淡灰黄色の周皮を付けたままか，又はその一部をはぎとってあり，表面は灰白色～淡灰褐色で，しばしば白粉を付けている。横断面は繊維性，粉性で，淡帯黄褐色を呈し，皮層と中心柱とに分かれる。横断面をルーペ視するとき，その全面に維管束及び分泌物が褐色の細点として散在している。特異なにおいがあり，味は極めて辛い。

（５）　チンピ　外面は黄赤色～暗黄褐色で，油室による多数の小さいくぼみがあり，内面は白色～淡灰黄褐色である。厚さ約 2mm で，質は軽くてもろい。芳香があり，味は苦くて，わずかに刺激性である。

必要に応じて，「チンピ」の確認試験を準用する。

（６）　キジツ　外面は濃緑褐色～褐色で，つやがなく，油室による多数のくぼんだ細点がある。切断面は淡灰褐色を呈し，内果皮を付ける部分は褐色を呈する。特異なにおいがあり，味は苦い。

必要に応じて，「キジツ」の確認試験を準用する。

（７）　ハンゲ　外面は白色～灰白黄色，上部には茎の跡がくぼみとなり，その周辺には根の跡がくぼんだ細点となっている。横断面は白色，粉性である。味は初めなく，やや粘液性で，後に強いえぐ味を残す。

横切片を鏡検するとき，主としてでんぷん粒を充満した柔組織からなり，わずかにシュウ酸カルシウムの束晶を含んだ粘液細胞がその間に認められる。でんぷん粒は主として 2～3 個の複粒で，通例，径 10～15μm，単粒は通例径 3～7μm である。束晶は長さ 25～150μm である。

（８）　コウボク　外面は灰白色～灰褐色を呈し，内面は淡褐色～褐色，切断面は淡赤褐色を呈し，繊維性である。わずかに芳香があり，味は苦い。

横切片を鏡検するとき，コルク層は厚く，ほぼ等径性の石細胞が環状に内接する。一次皮部は狭く，内しょう部には繊維群が点在し，二次皮部の放射組織間には師部繊維群が階段状に並ぶ。油細胞の多数は一次皮部に，少数は二次皮部に散在し，狭い放射組織内にも認められることがある。

必要に応じて，「コウボク」の確認試験を準用する。

（９）　ソヨウ　縮んだ葉の細片で，両面とも帯褐紫色，あるいは上面は灰緑色～帯褐緑色で下面は帯褐紫色を呈する。茎を交えるものは，その横断面は方形である。葉をルーペ視するとき，両面にまばらに毛を認め，特に葉脈上に多く，裏面には細かい腺毛を認める。もみ砕くとき，特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

必要に応じて，「ソヨウ」の確認試験を準用する。

乾燥減量　15％以下。

灰　　分　5％以下。

【 376 】　K171

成分及び分量又は本質	日本薬局方	ブクリョウ	4.0g
	〃	タクシャ	4.0g
	〃	ビャクジュツ	3.0g
	〃	ケイヒ	2.0g
	〃	カンゾウ	1.0～1.5g
	〃	ショウキョウ	1.5g
		全　　量	15.5～16.0g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。		
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。		
効能又は効果	体力中等度以下で，胃のもたれ，悪心，嘔吐のいずれかがあり，渇きを覚えるものの次の諸症：胃炎，胃腸虚弱		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	茯苓沢瀉湯		

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品1包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　ブクリョウ　白色又はわずかに淡赤色を帯びた白色で，質は堅いが砕きやすい。味はないがやや粘液ようである。

必要に応じて，「ブクリョウ」の確認試験を準用する。

（2）　タクシャ　淡黄褐色～淡褐色でコルク層をつける部位はやや暗色を呈する。ルーペ視するとき，褐色～淡褐色のはん点が散在する。切面は粒状で，繊維性ではない。わずかににおい及び味がある。

（3）　ビャクジュツ　外面は淡灰黄色～淡黄白色で，ところどころ灰褐色を呈し，横切面には淡黄褐色～褐色の分泌物による細点がある。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，皮部の柔組織中にはしばしば師管の外側に接して繊維束があり，放射組織の末端部には淡褐色～褐色の内容物を含む油室がある。木部には大きい髄を囲んで放射状に配列した短径の道管とそれを囲む著しい繊維束がある。髄及び放射組織中には皮部と同様な油室があり，柔組織中にはイヌリンの小球晶及びシュウ酸カルシウムの針晶を含む。

必要に応じて，「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。

（４）　ケイヒ　外面は暗赤褐色を呈し，内面は赤褐色を呈し，平滑である。横断面は赤褐色を呈し淡褐色の薄層が見られる。特異なにおいがあり，味は甘く，辛く，後にやや粘液性で，わずかに収れん性である。

横切片を鏡検するとき，一次皮部と二次皮部はほとんど連続した石細胞環で区分され，環の外辺にはほぼ円形に結集した繊維束を伴い，環の各石細胞の膜はしばしばU字形に肥厚する。二次皮部中には石細胞を認めず，まばらに少数の厚膜繊維を認める。柔組織中には油細胞，粘液細胞及び微細なシュウ酸カルシウムの針晶を含む細胞があり，柔細胞中にはでんぷん粒を含む。

（５）　カンゾウ　外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現わす。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に1～3細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には3～10細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞中にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

（６）　ショウキョウ　淡灰黄色の周皮を付けたままか，又はその一部をはぎとってあり，表面は灰白色～淡灰褐色で，しばしば白粉を付けている。横断面は繊維性，粉性で，淡帯黄褐色を呈し，皮層と中心柱とに分かれる。横断面をルーペ視するとき，その全面に維管束及び分泌物が褐色の細点として散在している。特異なにおいがあり，味は極めて辛い。

乾燥減量　15％以下。

灰　　分　5％以下。

【 377 】　K172

成分及び分量 又は本質	日本薬局方	ソウジュツ	2.5g
	〃	ビャクジュツ	2.5g
	〃	ブクリョウ	2.5g
	〃	チンピ	2.0g
	〃	コウボク	2.0g
	〃	コウブシ	2.0g
	〃	チョレイ	2.0g
	〃	タクシャ	2.0g
	〃	キジツ	1.0g
	局外生規	ダイフクヒ	1.0g
	日本薬局方	シュクシャ	1.0g
	〃	モッコウ	1.0g
	〃	ショウキョウ	1.0g
	局外生規	トウシンソウ	1.0g
		全　量	23.5g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。		
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，熱いうちに煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。 本剤は必ず1日分ずつ煎じ，数日分をまとめて煎じないこと。		
効能又は効果	体力中等度以上で，尿量が少なくて，ときにみぞおちがつかえて便秘の傾向のあるものの次の諸症：むくみ，排尿困難，腹部膨満感		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	分消湯		

規格及び試験方法

性　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品 1 包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　ソウジュツ　外面は暗灰褐色～暗黄褐色である。横切面はほぼ円形で，淡褐色～赤褐色の分泌物による細点を認める。しばしば白色綿状の結晶を析出する。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，周皮には石細胞を伴い，皮部の柔組織中には，通例，繊維束を欠き，放射組織の末端部には淡褐色～黄褐色の内容物を含む油室がある。木部は形成層に接して道管を囲んだ繊維束が放射状に配列し，髄及び放射組織中には皮部と同様な油室がある。柔細胞中にはイヌリンの球晶及びシュウ酸カルシウムの小針晶を含む。

（2）　ビャクジュツ　外面は淡灰黄色～淡黄白色で，ところどころ灰褐色を呈し，横切面には淡黄褐色～褐色の分泌物による細点がある。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，皮部の柔組織中にはしばしば師部の外側に接して繊維束があり，放射組織の末端部には淡褐色～褐色の内容物を含む油室がある。木部には大きい髄を囲んで放射状に配列した短径の道管とそれを囲む著しい繊維束がある。髄及び放射組織中には皮部と同様な油室があり，柔組織中にはイヌリンの結晶及びシュウ酸カルシウムの小針晶を含む。

必要に応じて，「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。

（3）　ブクリョウ　白色又はわずかに淡赤色を帯びた白色である。外層が残存するものは暗褐色～暗赤褐色で，きめがあらく，裂け目がある。質は堅いが砕きやすい。味はないがやや粘液ようである。

必要に応じて，「ブクリョウ」の確認試験を準用する。

（4）　チンピ　外面は黄赤色～暗黄褐色で，油室による多数の小さいくぼみがあり，内面は白色～淡灰黄褐色である。質は軽くてもろい。特異な芳香があり，味は苦くて，わずかに刺激性である。

必要に応じて，「チンピ」の確認試験を準用する。

（5）　コウボク　外面は灰白色～灰褐色を呈し，しばしば地衣を付け，内面は淡褐色～暗紫褐色，折面は極めて繊維性で淡赤褐色～紫褐色を呈する。わずかににおいがあり，味は苦い。

横切片を鏡検するとき，コルク層は厚く，ほぼ等径性の石細胞が環状に内接する。一次皮部は狭く，内しょう部には繊維群が点在する。二次皮部の放射組織間には師部繊維群が階段状に並び，明瞭な格子状を呈する。油細胞が一次皮部及び二部皮部に散在し，狭い放射組織内にも認められることがある。

必要に応じて，「コウボク」の確認試験を準用する。

（6）　コウブシ　紡錘形を呈し，長さ 1.5～2.5cm，径 0.5～1cm である。外面は灰褐色～灰黒褐色で，5～8 個の不整な輪節があり，その部分に毛状となった繊維束がある。質は堅い。横切面は赤褐色～淡黄色を呈し，ろうようのつやを帯び，皮層部の厚さは中心柱の径とほぼ等しいか又はわずかに薄い。これをルーペ視するとき，周辺には繊維束が褐色のはん点として輪状に並び，皮層部にはところどころに維管束が赤褐色のはん点として，また分泌細胞が黄褐色の微小なはん点として多数存在する。中心柱には多数の維管束が点又は線として散在する。わずかに特異なにおい及び味がある。

（7）　チョレイ　外面は黒褐色～灰褐色を呈し，切断面はやや柔らかくコルクようで，ほぼ白色～淡褐色を呈し，内部には白色のまだら模様がある。質は軽い。味がない。

必要に応じて，「チョレイ」の確認試験を準用する。

（8）　タクシャ　淡黄褐色～淡褐色でコルク層をつける部位はやや暗色を呈する。ルーペ視するとき，褐色～淡褐色のはん点が散在する。切面は粒状で，繊維性ではない。わずかににおい及び味がある。

（9）　キジツ　外面は濃緑褐色～褐色で，つやがなく，油室による多数のくぼんだ小点がある。切断面は淡灰褐色を呈し，内果皮を付ける部分は褐色を呈する。特異なにおいがあり，味は苦い。

必要に応じて，「キジツ」の確認試験を準用する。

（10）　ダイフクヒ　淡灰褐色～暗褐色の繊維群を主とする。ルーペ視すると，繊維群が淡褐色～暗褐色の点として認められる。味はほとんどない。

必要に応じて，局外生規「ダイフクヒ」の確認試験を準用する。

（11）　シュクシャ　ほぼ球形又はだ円形を呈し，長さ 1～1.5cm，径 0.8～1cm，外面は灰褐色～暗褐色を呈し，石灰を散布して乾燥したものは白粉を付けている。種子塊は薄い膜で三部に分かれ，各部には仮種皮によって接合する 10～20 粒の種子がある。種子は多角形の粒状で，長さ 0.3～0.5cm，径約 0.3cm，外面には暗褐色で多数の細かい突起があり，質は堅い。種子を縫線に沿って縦断し，ルーペ視するとき，切面は細長く，へそは深くくぼみ，合点はややくぼんでいる。外乳は白色で，淡黄色の内乳及び胚を包み，胚は細長い。かめば特異な芳香があり，味は辛い。

（12）　モッコウ　外側は黄褐色～灰褐色で，あらい縦じわがある。横断面は黄褐色～暗褐色で，ルーペ視するとき，環状暗色の形成層が認められ，木部組織と放射組織が放射状の模様を呈し，ところどころに大きな裂け目と褐色の油室が散在している。特異なにおいがあり，味は苦い。

必要に応じて，「モッコウ」の確認試験を準用する。

（13）　ショウキョウ　淡灰黄色の周皮を付けたままか，又はその一部をはぎとってあり，表面は灰白色～淡灰褐色で，しばしば白粉を付けている。横断面は繊維性，粉性で，淡黄褐色を呈し，皮層と中心柱とに分かれる。横断面をルーペ視するとき，その全面に維管束及び分泌物が暗褐色の細点として散在している。特異なにおいがあり，味は極めて辛い。

（14）　トウシンソウ　茎の髄　本品は細い円柱形を呈し，径 1～3mm である。外面は白色～黄白色で縦溝があり，柔らかく，引っ張ると容易に切れる。断面は白色～黄白色で，海綿状を呈する。におい及び味はほとんどない。

横切片を鏡検するとき，4～8 方向に突出した星形状の柔細胞からなり，それらが連結して網状構造となる。細胞の接合部分では細胞壁が数珠状に肥厚する。

必要に応じて，局外生規「トウシンソウ」の確認試験を準用する。

乾燥減量　14%以下。

灰　　分　6%以下。

【 378 】　K173

成分及び分量又は本質	日本薬局方	ビャクジュツ	4.0g
	〃	コウボク	3.0g
	〃	チンピ	3.0g
	〃	タイソウ	2.0g
	〃	カンゾウ	1.0g
	〃	ショウキョウ	0.5g
		全　　量	13.5g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。		
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。		
効能又は効果	体力中等度以上で，胃がもたれて消化が悪く，ときにはきけ，食後に腹が鳴って下痢の傾向のあるものの次の諸症：食べ過ぎによる胃のもたれ，急・慢性胃炎，消化不良，食欲不振		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	平胃散料		

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品1包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　ビャクジュツ　外面は淡灰黄色～淡黄白色で，ところどころ灰褐色を呈し，横切面には淡黄褐色～褐色の分泌物による細点がある。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，皮部の柔組織中にはしばしば師管の外側に接して繊維束があり，放射組織の末端部には淡褐色～褐色の内容物を含む油室がある。木部には大きい髄を囲んで放射状に配列した短径の道管とそれを囲む著しい繊維束がある。髄及び放射組織中には皮部と同様な油室があり，柔組織中にはイヌリンの小球晶及びシュウ酸カルシウムの針晶を含む。

必要に応じて，「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。

（２）　コウボク　外面は灰白色～灰褐色を呈し，内面は淡褐色～褐色，切断面は淡赤褐色を呈し，繊維性である。わずかに芳香があり，味は苦い。

横切片を鏡検するとき，コルク層は厚く，ほぼ等径性の石細胞が環状に内接する。一次皮部は狭く，内しょう部には繊維群が点在し，二次皮部の放射組織間には師部繊維群が階段状に並ぶ。油細胞の多数は一次皮部に，少数は二次皮部に散在し，狭い放射組織内にも認められることがある。

必要に応じて，「コウボク」の確認試験を準用する。

（３）　チンピ　外面は黄赤色～暗黄褐色で，油室による多数の小さいくぼみがあり，内面は白色～淡灰黄褐色である。厚さ約 2mm で，質は軽くてもろい。芳香があり，味は苦くて，わずかに刺激性である。

必要に応じて，「チンピ」の確認試験を準用する。

（４）　タイソウ　外面は赤褐色であらいしわがあるか，又は暗灰赤色で細かいしわがあり，いずれもつやがある。外果皮は薄く革質で，中果皮は暗灰褐色を呈し，海綿ようで柔らかく粘着性があり，内果皮は極めて堅く，種子は偏平である。わずかに特異なにおいがあり，味は甘い。

（５）　カンゾウ　外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現わす。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に 1～3 細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には 3～10 細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞中にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

（６）　ショウキョウ　淡灰黄色の周皮を付けたままか，又はその一部をはぎとってあり，表面は灰白色～淡灰褐色で，しばしば白粉を付けている。横断面は繊維性，粉性で，淡帯黄褐色を呈し，皮層と中心柱とに分かれる。横断面をルーペ視するとき，その全面に維管束及び分泌物が褐色の細点として散在している。特異なにおいがあり，味は極めて辛い。

乾燥減量　10%以下。

灰　　分　5%以下。

【 379 】　K174

成分及び分量又は本質	日本薬局方	ボウイ	4.0g
	〃	オウギ	5.0g
	〃	ビャクジュツ	3.0g
	〃	ショウキョウ	1.0g
	〃	タイソウ	4.0g
	〃	カンゾウ	1.5～2.0g
		全　　量	18.5～19.0g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。		
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。		
効能又は効果	体力中等度以下で，疲れやすく，汗のかきやすい傾向があるものの次の諸症：肥満に伴う関節の腫れや痛み，むくみ，多汗症，肥満症（筋肉にしまりのない，いわゆる水ぶとり）		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	防已黄耆湯		

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品はわずかに特異なにおいがある。

確認試験　本品1包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　ボウイ　外面は暗灰褐色を呈し，縦みぞがあり，横断面の外部は暗灰褐色のコルク層でおおわれ，内部には灰褐色の道管部と暗褐色の放射組織とが交互に放射状に配列する。味は苦い。

横切片を鏡検するとき，一次皮部にはシュウ酸カルシウムの針晶を含み，一次皮部及び内しょうには著しく膜の厚い石細胞が認められ，道管部では大小の道管がほぼ階段状に配列する。放射組織の細胞の大部分は木化せず，径3～10μmのでんぷん粒及びシュウ酸カルシウムの小針晶を含み，ところどころに極めて厚膜の大きな石細胞が散在する。

必要に応じて，「ボウイ」の確認試験を準用する。

（２）　オウギ　外面は淡灰黄色～淡褐黄色で，不規則なあらい縦じわがあり，折面は繊維性である。横断面をルーペ視するとき，最外層には周皮があり，皮部は淡黄白色，木部は淡黄色，形成層付近はやや褐色を帯びる。木部から皮部にわたって白色の放射組織が認められる。太いものではしばしば多数の放射状の裂け目となっている。わずかに特異なにおいがあり，味は甘い。

（３）　ビャクジュツ　外面は淡灰黄色～淡黄白色で，ところどころ灰褐色を呈し，横切面には淡黄褐色～褐色の分泌物による細点がある。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，皮部の柔組織中にはしばしば師管の外側に接して繊維束があり，放射組織の末端部には淡褐色～褐色の内容物を含む油室がある。木部には大きい髄を囲んで放射状に配列した短径の道管とそれを囲む著しい繊維束がある。髄及び放射組織中には皮部と同様な油室があり，柔組織中にはイヌリンの小球晶及びシュウ酸カルシウムの針晶を含む。

必要に応じて，「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。

（４）　ショウキョウ　淡灰黄色の周皮を付けたままか，又はその一部をはぎとってあり，表面は灰白色～淡灰褐色で，しばしば白粉を付けている。横断面は繊維性，粉性で，淡帯黄褐色を呈し，皮層と中心柱とに分かれる。横断面をルーペ視するとき，その全面に維管束及び分泌物が褐色の細点として散在している。特異なにおいがあり，味は極めて辛い。

（５）　タイソウ　外面は赤褐色であらいしわがあるか，又は暗灰赤色で細かいしわがあり，いずれもつやがある。外果皮は薄く革質で，中果皮は暗灰褐色を呈し，海綿ようで柔らかく粘着性があり，内果皮は極めて堅く，種子は偏平である。わずかに特異なにおいがあり，味は甘い。

（６）　カンゾウ　外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現わす。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に 1～3 細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には 3～10 細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞中にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

乾燥減量　15％以下。

灰　　分　10％以下。

【 380 】　K175

成分及び分量又は本質	日本薬局方	ボウイ	3.0g
	〃	オウギ	3.0g
	〃	ケイヒ	3.0g
	〃	ブクリョウ	6.0g
	〃	カンゾウ	1.5～2.0g
		全　　量	16.5～17.0g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。		
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。		
効能又は効果	体力中等度以下で，手足のむくみや冷えやすい傾向のあるものの次の諸症：手足の疼痛・しびれ感，むくみ，めまい，慢性下痢		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	防已茯苓湯		

規格及び試験方法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品1包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　ボウイ　外面は暗灰褐色を呈し，縦みぞがあり，横断面の外部は暗灰褐色のコルク層でおおわれ，内部には灰褐色の道管部と暗褐色の放射組織とが交互に放射状に配列する。味は苦い。

横切片を鏡検するとき，一次皮部にはシュウ酸カルシウムの針晶を含み，一次皮部及び内しょうには著しく膜の厚い石細胞が認められ，道管部では大小の道管がほぼ階段状に配列する。放射組織の細胞の大部分は木化せず，径3～10μmのでんぷん粒及びシュウ酸カルシウムの小針晶を含み，ところどころに極めて厚膜の大きな石細胞が散在する。

必要に応じて，「ボウイ」の確認試験を準用する。

（2）　オウギ　外面は淡灰黄色～淡褐黄色で，不規則なあらい縦じわがあり，折面は繊維性である。横断面をルーペ視するとき，最外層には周皮があり，皮部は淡黄白色，木部は淡黄色，形成層付近はやや褐色を帯びる。木部から皮部にわたって白色の放射組織が認

められる。太いものではしばしば多数の放射状の裂け目となっている。わずかに特異なにおいがあり，味は甘い。

（３）　ケイヒ　外面は暗赤褐色を呈し，内面は赤褐色を呈し，平滑である。横断面は赤褐色を呈し淡褐色の薄層が見られる。特異なにおいがあり，味は甘く，辛く，後にやや粘液性で，わずかに収れん性である。

横切片を鏡検するとき，一次皮部と二次皮部はほとんど連続した石細胞環で区分され，環の外辺にはほぼ円形に結集した繊維束を伴い，環の各石細胞の膜はしばしばU字形に肥厚する。二次皮部中には石細胞を認めず，まばらに少数の厚膜繊維を認める。柔組織中には油細胞，粘液細胞及び微細なシュウ酸カルシウムの針晶を含む細胞があり，柔細胞中にはでんぷん粒を含む。

（４）　ブクリョウ　白色又はわずかに淡赤色を帯びた白色で，質は堅いが砕きやすい。味はないがやや粘液ようである。

必要に応じて，「ブクリョウ」の確認試験を準用する。

（５）　カンゾウ　外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現わす。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に1～3細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には3～10細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞中にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

乾燥減量　15%以下。

灰　　分　5%以下。

【 381 】　K176

成分及び分量 又は本質	日本薬局方	トウキ	1.2g
	〃	シャクヤク	1.2g
	〃	センキュウ	1.2g
	〃	サンシシ	1.2g
	〃	レンギョウ	1.2g
	〃	ハッカ	1.2g
	〃	ショウキョウ	0.4g
	〃	ケイガイ	1.2g
	〃	ボウフウ	1.2g
	〃	マオウ	1.2g
	〃	ダイオウ	1.5g
	別紙規格	乾燥硫酸ナトリウム	0.6g
	日本薬局方	ビャクジュツ	2.0g
	〃	キキョウ	2.0g
	〃	オウゴン	2.0g
	〃	カンゾウ	2.0g
	〃	セッコウ	2.0g
	〃	カッセキ	3.0g
		全　量	26.3g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。		
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。		
効能又は効果	体力充実して，腹部に皮下脂肪が多く，便秘がちなものの次の諸症：高血圧や肥満に伴う動悸・肩こり・のぼせ・むくみ・便秘，蓄膿症（副鼻腔炎），湿疹・皮膚炎，ふきでもの（にきび），肥満症		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	防風通聖散料		

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品 1 包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　トウキ　外面は暗褐色～赤褐色で，縦じわがあり，切断面は淡黄色～黄褐色を呈する。特異なにおいがあり，味はわずかに甘く，後にやや辛い。

横切片を鏡検するとき，コルク層は 4～10 層からなり，その内側に数層の厚角組織が続いている。皮部には分泌細胞に囲まれた多数の樹脂道並びにしばしば大きなすき間がある。形成層は長方形に偏圧された数層の細胞からなり，明らかに皮部と木部とを区別する。木部では多数の道管と放射組織とが交互に放射状に配列し，その外方の道管は単独又は数個集まってやや密に配列してくさび状をなすが，中心部付近の道管は極めてまばらに存在する。でんぷん粒は径 19μm 以下，まれに 2～5 個の複粒があり，複粒の径は 25μm に達し，しばしばのり化している。

（2）　シャクヤク　外面は褐色～淡灰褐色を呈し，横断面はち密で淡灰褐色を呈し，木部には淡褐色の放射状の線がある。わずかに特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後に渋くてわずかに苦い。

必要に応じて，「シャクヤク」の確認試験を準用する。

（3）　センキュウ　外面は灰褐色～暗褐色で，切断面は灰白色～灰褐色，半透明で，ときにはうつろがある。質は密で堅い。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，皮部及び髄には油道が散在する。木部には厚膜で木化した木部繊維が大小不同の群をなして存在する。でんぷん粒は，通例，のり化していて，まれに径 5～25μm のでんぷん粒を認めることがある。シュウ酸カルシウム結晶は認めない。

（4）　サンシシ　果皮は薄く砕きやすく，その外面は赤褐色，黄褐色又は黒褐色を呈し，内面は黄褐色を呈し，平らでつやがある。果実の内部は 2 室に分かれ，黄赤色～暗赤色の果肉中に黒褐色又は黄赤色で長径約 5mm の偏平な種子の団塊を含む。質は軽い。弱いにおいがあり，味は苦い。

必要に応じて，「サンシン」の確認試験を準用する。

（5）　レンギョウ　外面は淡褐色～暗褐色を呈し，淡灰色の小隆起点が散在し，内面は黄褐色である。特異な芳香があり，味はわずかに収れん性である。

必要に応じて，「レンギョウ」の確認試験を準用する。

（6）　ハッカ　上面は淡褐黄色～淡緑黄色，下面は淡緑色～淡緑黄色である。葉をルーペ視するとき，両面に毛，腺毛及び腺りんをまばらに認め，腺毛及び腺りんは下面に多い。特異な芳香があり，口に含むと清涼感がある。

必要に応じて，「ハッカ」の確認試験を準用する。

（7）　ショウキョウ　淡灰黄色の周皮を付けたままか，又はその一部をはぎとってあり，表面は灰白色～淡灰褐色で，しばしば白粉を付けている。横断面は繊維性，粉性で，淡帯黄褐色を呈し，皮層と中心柱とに分かれる。横断面をルーペ視するとき，その全面に維管束及び分泌物が褐色の細点として散在している。特異なにおいがあり，味は極めて辛い。

（８）　ケイガイ　茎，輪散花序に集合したがく筒，これら及びときには葉の砕片，種子ようの微粒の分果からなる。茎は方形で外面はおおむね紫褐色，径約 1mm である。がく筒は淡褐色～黄緑色で長さ 2～3mm，ルーペ視するとき，先端はきょ歯辺，筒部には数条の線があり，唇形花又は果実を含み，茎とともに類白色の短毛を認める。分果は黄褐色～黒色，両端の細いだ円体で長さ 1～1.5mm，径は長さのほぼ 1/2 である。特異な芳香があり，口に含むとわずかに清涼感がある。

必要に応じて，「ケイガイ」の確認試験を準用する。

（９）　ボウフウ　外面は淡褐色で，多数の縦じわがある。横断面の周辺は灰褐色で，空げきが多く，中央は円形に黄色を呈する。味はわずかに甘い。

（10）　マオウ　細い円柱状又はだ円柱を呈し，長さ 3～10mm，径 1～2mm，淡緑色～黄緑色である。表面に多数の平行する縦みぞがあり，節部には，長さ 2～4mm の 2 枚のりん片状の葉が対生し，その基部は合着して筒状になっている。りん片状の葉の色は淡褐色～褐色である。茎の横断面をルーペ視するとき，円形～だ円形で，周囲部は灰緑色～黄緑色を呈し，中心部には赤緑色の物質が充満しているか，又は中空のところがある。味は渋くてわずかに苦く，やや麻ひ性である。

必要に応じて，「マオウ」の確認試験を準用する。

（11）　ダイオウ　暗褐色～黄褐色～淡褐色を呈し，ルーペ視すると入り組んだ不規則な模様がある。質はおおむね粗で繊維性ではない。特異なにおいがあり，味はわずかに渋くて苦い。かめば細かい砂をかむような感じがあり，だ液を黄色に染める。

必要に応じて，「ダイオウ」の確認試験を準用する。

（12）　乾燥硫酸ナトリウム　白色の粉末で，味はやや苦く，塩辛い。

また，別紙規格「乾燥硫酸ナトリウム」の確認試験を準用する。

（13）　ビャクジュツ　外面は淡灰黄色～淡黄白色で，ところどころ灰褐色を呈し，横切面には淡黄褐色～褐色の分泌物による細点がある。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，皮部の柔組織中にはしばしば師管の外側に接して繊維束があり，放射組織の末端部には淡褐色～褐色の内容物を含む油室がある。木部には大きい髄を囲んで放射状に配列した短径の道管とそれを囲む著しい繊維束がある。髄及び放射組織中には皮部と同様な油室があり，柔組織中にはイヌリンの小球晶及びシュウ酸カルシウムの針晶を含む。

必要に応じて，「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。

（14）　キキョウ　外面は皮付きは灰褐色，皮去りは白色～淡褐色を呈し，繊維性でない。横切面をルーペ視するとき，皮部は木部よりやや薄く，ほとんど白色で，ところどころにすき間があり，形成層の付近はしばしば褐色を帯びる。木部は白色～淡褐色を呈し，その組織は皮部よりもやや密である。味は初めなく，後にえぐくて苦い。

必要に応じて，「キキョウ」の確認試験を準用する。

（15）　オウゴン　外面は黄褐色～暗褐色を呈し，切断面は黄色～帯褐黄色を呈し，縦に繊維性のすじが見られる。味はわずかに苦い。

必要に応じて，「オウゴン」の確認試験を準用する。

（16）　カンゾウ　外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現わす。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に 1～3 細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には 3～10 細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞中にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

（17）　セッコウ　光沢のある白色の重い繊維状結晶塊で，においおよび味はない。砕くとたやすく針状～微細結晶性の粉末となる。水に溶けにくい。

必要に応じて，「セッコウ」の確認試験を準用する。

（18）　カッセキ　白色～淡紅色の粉末性の結晶塊で，砕くと容易に微細な粉末となる。粉末はややざらつき，皮膚につきやすい。粉末を水で潤すとき，やや暗色を帯び，可塑性となる。特異なにおいがあり，味はほとんどない。かめば細かい砂をかむような感じがある。

粉末を封入剤と共にスライドガラスとカバーガラスの間で十分にすりつぶしたものを鏡検するとき，円形～多角形を呈する径 10μm以上の結晶を多く認める。

必要に応じて，「カッセキ」の確認試験を準用する。

乾燥減量　15％以下。

灰　　分　24％以下。

別紙規格　　**乾燥硫酸ナトリウムの規格及び試験方法**

本品を乾燥したものは定量するとき，硫酸ナトリウム（Na_2SO_4）99.0％以上を含む。

性　　状　本品は白色の粉末で，味はやや苦く，塩辛い。

本品は水に溶けやすく，エタノール（95）にほとんど溶けない。

確認試験　本品の水溶液（1→20）はナトリウム塩及び硫酸塩の定性反応を呈する。

純度試験　（１）　溶状及び液性　本品 0.5g に新たに煮沸し冷却した水 5mL を加えて溶かすとき，液は無色澄明で，中性である。

（２）　塩化物　本品 0.5g をとり，試験を行う。比較液には 0.01mol/L 塩酸 0.50mL を加える（0.036％以下）。

（３）　重金属　本品 2.0g をとり，第 1 法により操作し，試験を行う。比較液には鉛標準液 2.0mL を加える（10ppm 以下）。

（４）　ヒ素　本品 1.0g をとり，第 1 法により操作し，試験を行う（2ppm 以下）。

乾燥減量　11.4％以下（2g，105℃，4 時間）。

定 量 法　本品を乾燥し，その約 0.4g を精密に量り，水 200mL を加えて溶かし，塩酸 1mL を加えて煮沸し，熱時塩化バリウム試液 8mL を徐々に加える。この液を水浴上で 1 時間加熱したのち，冷後，沈殿をろ取し，洗液に硝酸銀試液を加えても混濁を生じなくな

るまで水で洗い，乾燥し，恒量になるまで強熱し，重量を量り，硫酸バリウム（$BaSO_4$：233.40）の量とする。

硫酸ナトリウム（Na_2SO_4）の量（mg）

＝硫酸バリウム（$BaSO_4$）の量（mg）×0.6086

【 382 】　K177

成分及び分量 又は本質	日本薬局方　ビャクジュツ　5.5g 〃　ブクリョウ　3.0g 〃　チンピ　2.5g 〃　ニンジン　3.0g 〃　オウゴン　2.0g 〃　コウボク　2.0g 〃　タクシャ　2.0g 〃　バクモンドウ　2.0g 全　量　22.0g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。
効能又は効果	体力虚弱で，胃腸が弱いものの次の諸症：腹部膨満感，むくみ
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器
規格及び試験方法	別記のとおり。
備考	補気建中湯

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品1包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　ビャクジュツ　外面は淡灰黄色～淡黄白色で，ところどころ灰褐色を呈し，横切面には淡黄褐色～褐色の分泌物による細点がある。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，皮部の柔組織中にはしばしば師管の外側に接して繊維束があり，放射組織の末端部には淡褐色～褐色の内容物を含む油室がある。木部には大きい髄を囲んで放射状に配列した短径の道管とそれを囲む著しい繊維束がある。髄及び放射組織中には皮部と同様な油室があり，柔組織中にはイヌリンの小球晶及びシュウ酸カルシウムの針晶を含む。

必要に応じて，「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。

（２）　ブクリョウ　白色又はわずかに淡赤色を帯びた白色で，質は堅いが砕きやすい。味はないがやや粘液ようである。

必要に応じて，「ブクリョウ」の確認試験を準用する。

（３）　チンピ　外面は黄赤色～暗黄褐色で，油室による多数の小さいくぼみがあり，内面は白色～淡灰黄褐色である。厚さ約 2mm で，質は軽くてもろい。芳香があり，味は苦くて，わずかに刺激性である。

必要に応じて，「チンピ」の確認試験を準用する。

（４）　ニンジン　外面は淡黄褐色～淡灰褐色を呈し，縦じわがあり，横断面は淡黄褐色を呈し，形成層の付近は褐色を呈する。特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後にやや苦い。

必要に応じて，「ニンジン」の確認試験を準用する。

（５）　オウゴン　外面は黄褐色～暗褐色を呈し，切断面は黄色～帯褐黄色を呈し，縦に繊維性のすじが見られる。味はわずかに苦い。

必要に応じて，「オウゴン」の確認試験を準用する。

（６）　コウボク　外面は灰白色～灰褐色を呈し，内面は淡褐色～褐色，切断面は淡赤褐色を呈し，繊維性である。わずかに芳香があり，味は苦い。

横切片を鏡検するとき，コルク層は厚く，ほぼ等径性の石細胞が環状に内接する。一次皮部は狭く，内しょう部には繊維群が点在し，二次皮部の放射組織間には師部繊維群が階段状に並ぶ。油細胞の多数は一次皮部に，少数は二次皮部に散在し，狭い放射組織内にも認められることがある。

必要に応じて，「コウボク」の確認試験を準用する。

（７）　タクシャ　淡黄褐色～淡褐色でコルク層をつける部位はやや暗色を呈する。ルーペ視するとき，褐色～淡褐色のはん点が散在する。切面は粒状で，繊維性ではない。わずかににおい及び味がある。

（８）　バクモンドウ　紡錘形を呈し，長さ 10～25mm，径 3～5mm，一端はややとがり，他端はやや丸みをもち，外面は淡黄色～淡黄褐色で，大小の縦じわがある。皮層は柔軟性でもろく，中心柱は強じんで折りにくい。皮層の折面は淡黄褐色を呈し，やや半透明で粘着性がある。味はわずかに甘く，粘着性である。

乾燥減量　15％以下。

灰　　分　5％以下。

【 383 】　K178

成分及び分量又は本質	日本薬局方	ニンジン	4.0g
	〃	ビャクジュツ	4.0g
	〃	オウギ	4.0g
	〃	トウキ	3.0g
	〃	チンピ	2.0g
	〃	タイソウ	2.0g
	〃	サイコ	1.0g
	〃	カンゾウ	1.0～1.5g
	〃	ショウキョウ	0.5g
	〃	ショウマ	0.5g
		全　　量	22.0～22.5g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。		
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。		
効能又は効果	体力虚弱で，元気がなく，胃腸のはたらきが衰えて，疲れやすいものの次の諸症：虚弱体質，疲労倦怠，病後・術後の衰弱，食欲不振，ねあせ，感冒		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	補中益気湯		

規格及び試験方法

性　　状　本品は芳香性のにおいがある。

確認試験　本品1包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　ニンジン　外面は淡黄褐色～淡灰褐色を呈し，縦じわがあり，横断面は淡黄褐色を呈し，形成層の付近は褐色を呈する。特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後にやや苦い。

必要に応じて，「ニンジン」の確認試験を準用する。

（２）　ビャクジュツ　外面は淡灰黄色～淡黄白色で，ところどころ灰褐色を呈し，横切面には淡黄褐色～褐色の分泌物による細点がある。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，皮部の柔組織中にはしばしば師管の外側に接して繊維束があり，放射組織の末端部には淡褐色～褐色の内容物を含む油室がある。木部には大きい髄を囲んで放射状に配列した短径の道管とそれを囲む著しい繊維束がある。髄及び放射組織中には皮部と同様な油室があり，柔組織中にはイヌリンの小球晶及びシュウ酸カルシウムの針晶を含む。

必要に応じて，「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。

（３）　オウギ　外面は淡灰黄色～淡褐黄色で，不規則なあらい縦じわがあり，折面は繊維性である。横断面をルーペ視するとき，最外層には周皮があり，皮部は淡黄白色，木部は淡黄色，形成層付近はやや褐色を帯びる。木部から皮部にわたって白色の放射組織が認められる。太いものではしばしば多数の放射状の裂け目となっている。わずかに特異なにおいがあり，味は甘い。

（４）　トウキ　外面は暗褐色～赤褐色で，縦じわがあり，切断面は淡黄色～黄褐色を呈する。特異なにおいがあり，味はわずかに甘く，後にやや辛い。

横切片を鏡検するとき，コルク層は 4～10 層からなり，その内側に数層の厚角組織が続いている。皮部には分泌細胞に囲まれた多数の樹脂道並びにしばしば大きなすき間がある。形成層は長方形に偏圧された数層の細胞からなり，明らかに皮部と木部とを区別する。木部では多数の道管と放射組織とが交互に放射状に配列し，その外方の道管は単独又は数個集まってやや密に配列してくさび状をなすが，中心部付近の道管は極めてまばらに存在する。でんぷん粒は径 19μm 以下，まれに 2～5 個の複粒があり，複粒の径は 25μm に達し，しばしばのり化している。

（５）　チンピ　外面は黄赤色～暗黄褐色で，油室による多数の小さいくぼみがあり，内面は白色～淡灰黄褐色である。厚さ約 2mm で，質は軽くてもろい。芳香があり，味は苦くて，わずかに刺激性である。

必要に応じて，「チンピ」の確認試験を準用する。

（６）　タイソウ　外面は赤褐色であらいしわがあるか，又は暗灰赤色で細かいしわがあり，いずれもつやがある。外果皮は薄く革質で，中果皮は暗灰褐色を呈し，海綿ようで柔らかく粘着性があり，内果皮は極めて堅く，種子は偏平である。わずかに特異なにおいがあり，味は甘い。

（７）　サイコ　外面は灰褐色～褐色で，深いしわがあるものがあり，横断面では，皮部は褐色，木部は淡褐色を呈する。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，皮部にはしばしば接線方向に長い裂け目があり，皮部の厚さは半径の 1/3～1/2 で，径 15～35μm の胞間性離生油道がやや多数散在し，木部には道管が放射状若しくはほぼ階段状に配列し，ところどころに繊維群があり，根頭部の髄には皮部と同様の油道がある。柔細胞中にはでんぷん粒を満たし，また油滴を認める。

必要に応じて，「サイコ」の確認試験を準用する。

（８）　カンゾウ　外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現わす。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に 1～3 細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には 3～10 細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞中にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

（９）　ショウキョウ　淡灰黄色の周皮を付けたままか，又はその一部をはぎとってあり，表面は灰白色～淡灰褐色で，しばしば白粉を付けている。横断面は繊維性，粉性で，淡帯黄褐色を呈し，皮層と中心柱とに分かれる。横断面をルーペ視するとき，その全面に維管束及び分泌物が褐色の細点として散在している。特異なにおいがあり，味は極めて辛い。

（10）　ショウマ　外面は暗褐色を呈し，切断面では木部は淡褐色～灰褐色繊維性で，網目状を呈する。質は軽い。味は苦くてわずかに渋い。

乾燥減量　15％以下。

灰　　分　5％以下。

【 384 】　K179

成分及び分量 又は本質	日本薬局方　マオウ　3.0～4.0g 〃　キョウニン　4.0g 〃　ケイヒ　3.0g 〃　カンゾウ　1.0～1.5g 全　量　11.0～12.5g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。
効能又は効果	体力充実して，かぜのひきはじめで，さむけがして発熱，頭痛があり，せきが出て身体のふしぶしが痛く汗が出ていないものの次の諸症：感冒，鼻かぜ，気管支炎，鼻づまり
貯蔵方法及び 有効期間	密閉容器
規格及び試験方法	別記のとおり。
備考	麻黄湯

規格及び試験方法

性　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品1包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　マオウ　細い円柱状又はだ円柱を呈し，長さ3～10mm，径1～2mm，淡緑色～黄緑色である。表面に多数の平行する縦みぞがあり，節部には，長さ2～4mmの2枚のりん片状の葉が対生し，その基部は合着して筒状になっている。りん片状の葉の色は淡褐色～褐色である。茎の横断面をルーペ視するとき，円形～だ円形で，周囲部は灰緑色～黄緑色を呈し，中心部には赤緑色の物質が充満しているか，又は中空のところがある。味は渋くてわずかに苦く，やや麻ひ性である。

必要に応じて，「マオウ」の確認試験を準用する。

（2）　キョウニン　種皮は褐色で，表面にはすれて落ちやすい石細胞となった表皮細胞があって，粉をふいたようである。切断面は類白色である。味は苦く，油ようである。

表皮の表面を鏡検するとき，数個ずつ集合する石細胞はおおむね円形で，その細胞膜は均等に著しく厚くなり，径 60～90μm，側面視では鈍三角形で，細胞膜は先端部で著しく厚い。

必要に応じて，「キョウニン」の確認試験を準用する。

（3）　ケイヒ　外面は暗赤褐色を呈し，内面は赤褐色を呈し，平滑である。横断面は赤褐色を呈し淡褐色の薄層が見られる。特異なにおいがあり，味は甘く，辛く，後にやや粘液性で，わずかに収れん性である。

横切片を鏡検するとき，一次皮部と二次皮部はほとんど連続した石細胞環で区分され，環の外辺にはほぼ円形に結集した繊維束を伴い，環の各石細胞の膜はしばしば U 字形に肥厚する。二次皮部中には石細胞を認めず，まばらに少数の厚膜繊維を認める。柔細胞中には油細胞，粘液細胞及び微細なシュウ酸カルシウムの針晶を含む細胞があり，柔細胞中にはでんぷん粒を含む。

（4）　カンゾウ　外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現わす。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に 1～3 細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には 3～10 細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞中にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

乾燥減量　10%以下。

灰　　分　10%以下。

【 385 】　K180

成分及び分量 又は本質	日本薬局方　マオウ　4.0g 〃　キョウニン　3.5g 〃　カンゾウ　2.0g 〃　セッコウ　8.0g 全　量　17.5g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。
効能又は効果	体力中等度以上で，せきが出て，ときにのどが渇くものの次の諸症：せき，小児ぜんそく，気管支ぜんそく，気管支炎，感冒，痔の痛み
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器
規格及び試験方法	別記のとおり。
備考	麻杏甘石湯

規格及び試験方法

性　状　本品はカンゾウのにおいがある。

確認試験　本品1包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬及び白色粉末につき，次の試験を行う。

（1）　マオウ　細い円柱状又はだ円柱を呈し，長さ3～10mm，径1～2mm，淡緑色～黄緑色である。表面に多数の平行する縦みぞがあり，節部には，長さ2～4mmの2枚のりん片状の葉が対生し，その基部は合着して筒状になっている。りん片状の葉の色は淡褐色～褐色である。茎の横断面をルーペ視するとき，円形～だ円形で，周囲部は灰緑色～黄緑色を呈し，中心部には赤緑色の物質が充満しているか，又は中空のところがある。味は渋くてわずかに苦く，やや麻ひ性である。

必要に応じて，「マオウ」の確認試験を準用する。

（2）　キョウニン　種皮は褐色で，表面にはすれて落ちやすい石細胞となった表皮細胞があって，粉をふいたようである。切断面は類白色である。味は苦く，油ようである。

表皮の表面を鏡検するとき，数個ずつ集合する石細胞はおおむね円形で，その細胞膜は均等に著しく厚くなり，径60～90μm，側面視では鈍三角形で，細胞膜は先端部で著しく厚い。

必要に応じて，「キョウニン」の確認試験を準用する。

（3）　カンゾウ　外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現わす。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に 1～3 細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には 3～10 細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞中にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

（4）　セッコウ　光沢のある白色の重い繊維状結晶塊で，におい及び味はない。砕くとたやすく針状～微細結晶性の粉末となる。水に溶けにくい。

必要に応じて，「セッコウ」の確認試験を準用する。

乾燥減量　20%以下。

【 386 】　K181

成分及び分量 又は本質	日本薬局方　マオウ　4.0g 〃　キョウニン　3.0g 〃　ヨクイニン　10.0g 〃　カンゾウ　2.0g 全　量　19.0g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。
効能又は効果	体力中等度なものの次の諸症：関節痛，神経痛，筋肉痛，いぼ，手足のあれ（手足の湿疹・皮膚炎）
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器
規格及び試験方法	別記のとおり。
備考	麻杏薏甘湯

規格及び試験方法

性　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品1包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　マオウ　細い円柱状又はだ円柱を呈し，長さ3～10mm，径1～2mm，淡緑色～黄緑色である。表面に多数の平行する縦みぞがあり，節部には，長さ2～4mmの2枚のりん片状の葉が対生し，その基部は合着して筒状になっている。りん片状の葉の色は淡褐色～褐色である。茎の横断面をルーペ視するとき，円形～だ円形で，周囲部は灰緑色～黄緑色を呈し，中心部には赤緑色の物質が充満しているか，又は中空のところがある。味は渋くてわずかに苦く，やや麻ひ性である。

必要に応じて，「マオウ」の確認試験を準用する。

（2）　キョウニン　種皮は褐色で，表面にはすれて落ちやすい石細胞となった表皮細胞があって，粉をふいたようである。切断面は類白色である。味は苦く，油ようである。

表皮の表面を鏡検するとき，数個ずつ集合する石細胞はおおむね円形で，その細胞膜は均等に著しく厚くなり，径60～90μm，側面視では鈍三角形で，細胞膜は先端部で著しく厚い。

必要に応じて，「キョウニン」の確認試験を準用する。

（３）　ヨクイニン　卵形又は広卵形を呈し，頂端及び基部はややくぼみ，長さ約6mm，幅約 5mm，背面は丸くふくれ，腹面の中央には縦に深いみぞがある。背面はほぼ白色，粉質で，腹面のみぞ及びその他の表面のところどころに褐色膜質の果皮及び種皮が付いている。横断面をルーペ視するとき，背面は白色の内乳からなり，腹面のくぼみには淡黄色の胚盤がある。質は堅い。味はわずかに甘く，歯間に粘着する。

必要に応じて，「ヨクイニン」の確認試験を準用する。

（４）　カンゾウ　外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現わす。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に 1～3 細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には 3～10 細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞中にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

乾燥減量　10%以下。

灰　　分　6%以下。

【 387 】　K182

成分及び分量又は本質	日本薬局方	マシニン	5.0g
	〃	シャクヤク	2.0g
	〃	キジツ	2.0g
	〃	コウボク	2.0g
	〃	ダイオウ	3.5～4.0g
	〃	キョウニン	2.0g
		全　　量	16.5～17.0g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。		
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4を服用する。		
効能又は効果	体力中等度以下で，ときに便が硬く塊状なものの次の諸症：便秘，便秘に伴う頭重・のぼせ・湿疹・皮膚炎・ふきでもの（にきび）・食欲不振（食欲減退）・腹部膨満・腸内異常醗酵・痔などの症状の緩和		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	麻子仁丸料		

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品1包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　マシニン　わずかに偏平な卵球形を呈し，長さ4～5mm，径3～4mm，外面は灰緑色～灰褐色を呈する。一端はややとがり，他の一端には果柄の跡があり，両側には稜線がある。外面はつやがあり，白色の網脈模様がある。果皮はやや堅い。種子はやや緑色を帯び，内部には灰白色の胚乳がある。100粒の質量は1.6～2.7 gである。ほとんどにおいはないが，かめば香ばしく，味は緩和で油様である。

横切片を鏡検するとき，外果皮は1層の表皮からなり，中果皮は柔組織，色素細胞層，及び短小細胞列からなり，内果皮は1層の放射方向に長い石細胞層からなる。種皮は管状細胞層と海綿状組織からなる。種子の内側には1層の柔細胞からなる周乳と1層～数層の

柔細胞からなる内乳がある。胚の大部分は柔組織からなり胚軸の中央及び子葉の各部に維管束が認められる。胚の柔組織にはアリューロン粒及び油滴を含む。

必要に応じて，「マシニン」の確認試験を準用する。

（２）　シャクヤク　外面は褐色～淡灰褐色を呈し，横断面はち密で淡灰褐色を呈し，木部には淡褐色の放射状の線がある。わずかに特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後に渋くてわずかに苦い。

必要に応じて，「シャクヤク」の確認試験を準用する。

（３）　キジツ　外面は濃緑褐色～褐色でつやがなく，油室による多数のくぼんだ小点がある。切断面は淡灰褐色を呈し，内果皮を付ける部分は褐色を呈する。特異なにおいがあり，味は苦い。

必要に応じて，「キジツ」の確認試験を準用する。

（４）　コウボク　外面は灰白色～灰褐色を呈し，内面は淡褐色～褐色，切断面は淡赤褐色を呈し，繊維性である。わずかに芳香があり，味は苦い。

横切片を鏡検するとき，コルク層は厚く，ほぼ等径性の石細胞が環状に内接する。一次皮部は狭く，内しょう部には繊維群が点在し，二次皮部の放射組織間には師部繊維群が階段状に並ぶ。油細胞の多数は一次皮部に，少数は二次皮部に散在し，狭い放射組織内にも認められることがある。

必要に応じて，「コウボク」の確認試験を準用する。

（５）　ダイオウ　暗褐色～黄褐色～淡褐色を呈し，ルーペ視すると入り組んだ不規則な模様がある。質はおおむね粗で繊維性ではない。特異なにおいがあり，味はわずかに渋くて苦い。かめば細かい砂をかむような感じがあり，だ液を黄色に染める。

（６）　キョウニン　種皮は褐色で，表面にはすれて落ちやすい石細胞となった表皮細胞があって，粉をふいたようである。切断面は類白色である。味は苦く，油ようである。

表皮の表面を鏡検するとき，数個ずつ集合する石細胞はおおむね円形で，その細胞膜は均等に著しく厚くなり，径 60～90μm，側面視では鈍三角形で，細胞膜は先端部で著しく厚い。

必要に応じて，「キョウニン」の確認試験を準用する。

乾燥減量　10％以下。

灰　　分　6％以下。

成分及び分量 又は本質	日本薬局方　マシニン　5.0g 〃　シャクヤク　2.0g 〃　キジツ　2.0g 〃　コウボク　2.0g 〃　ダイオウ　3.5～4.0g 〃　キョウニン　2.0g 全　量　16.5～17.0g
製造方法	以上の生薬をそれぞれ末とし，「ハチミツ」を結合剤として丸剤の製法により丸剤 170 個とする。
用法及び用量	大人 1 日 3 回，1 回 20～30 個を頓服する。又は，大人 1 回 20～30 個を 1 日 2～3 回食前又は空腹時に服用する。 15 才未満 7 才以上　大人の 2/3，7 才未満 5 才以上　大人の 1/2 を服用する。
効能又は効果	体力中等度以下で，ときに便が硬く塊状なものの次の諸症：便秘，便秘に伴う頭重・のぼせ・湿疹・皮膚炎・ふきでもの（にきび）・食欲不振（食欲減退）・腹部膨満・腸内異常醗酵・痔などの症状の緩和
貯蔵方法及び 有効期間	密閉容器
規格及び試験方法	別記のとおり。
備考	麻子仁丸

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は褐色～黄褐色で，特異なにおいがある。

確認試験

（1）　マシニン　（ⅰ）　本品の粉末 2g に無水酢酸 10mL を加えてよく振り混ぜ，2 分間放置した後，ろ過する。ろ液 1mL に硫酸 0.5mL を穏やかに加えるとき，境界面は赤褐色～赤色を呈する。

（ⅱ）　本品の粉末 2g に水 10mL を加え，水浴上で 2～3 分間加温した後，ろ過する。ろ液にニンヒドリン試液 1mL を加え，水浴中 3 分間加熱するとき，液は紫～青紫色を呈する。

（2）　シャクヤク　本品の粉末 2g にメタノール 10mL を加え，水浴上で 5 分間加温し，冷後，ろ過する。ろ液を蒸発乾固し，残留物をメタノール 1mL に溶かし試料溶液とする。別に薄層クロマトグラフ用ペオニフロリン 1mg をメタノール 1mL に溶かし，標準溶液とする。これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び

標準溶液 10μL ずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲルを用いて調製した薄層板にスポットする。次にクロロホルム・メタノール・水混液（26：14：5）の下層を展開溶媒として約 10cm 展開した後，薄層板を風乾する。これに 4 - メトキシベンズアルデヒド・硫酸試液を均等に噴霧し，105℃で 5 分間加熱するとき，試料溶液から得たクロマトグラムの中に，標準溶液から得たスポットと同一の色調及び *Rf* 値をもつスポットを認める。

（３）　キジツ　本品の粉末 2g にメタノール 10mL を加え，2 分間穏やかに煮沸した後，ろ過し，ろ液 5mL にリボン状のマグネシウム 0.1g 及び塩酸 1mL を加えて放置するとき，液は赤紫色を呈する。

（４）　コウボク　本品の粉末 2g にメタノール 10mL を加え，水浴上で 5 分間加温し，冷後，ろ過する。ろ液を蒸発乾固し，残留物をメタノール 1mL に溶かし試料溶液とする。別にコウボクの粉末 0.5g をとり，試料溶液と同様に操作して標準溶液とする。これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び標準溶液 10μL ずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲルを用いて調製した薄層板にスポットする。次に 3-メチル-1-ブタノール・水・酢酸（100）混液（3：3：2）の上層を展開溶媒として約 10cm 展開した後，薄層板を 80℃で 10 分間乾燥する。これに噴霧用ドラーゲンドルフ試液を均等に噴霧するとき，試料溶液から得たクロマトグラムの中に標準溶液から得たスポットと同一の色調及び *Rf* 値をもつスポットを認める。

（５）　ダイオウ　本品の粉末 4g にテトラヒドロフラン・水混液（7：3）40mL を加え，30 分間振り混ぜた後，遠心分離する。上澄液を分液漏斗に移し，塩化ナトリウム 13g を加え，30 分間振り混ぜる。分離した水層を不溶の塩化ナトリウムと共に分取し，1mol/L 塩酸試液を加えて pH1.5 に調整する。この液を別の分液漏斗に移し，テトラヒドロフラン 30mL を加えて 10 分間振り混ぜた後，分離したテトラヒドロフラン層を分取し，試料溶液とする。別に薄層クロマトグラフ用センノシド A1mg をテトラヒドロフラン・水混液（7：3）4mL に溶かし，標準溶液とする。これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び標準溶液 40μL ずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲルを用いて調製した薄層板に原線に沿って長さ 10mm にスポットする。次に酢酸エチル・*n*－プロパノール・水・酢酸（100）混液（40：40：30：1）を展開溶媒として約 15cm 展開した後，薄層板を風乾する。これに紫外線（主波長 365nm）を照射するとき，試料溶液から得た数個のスポットのうち 1 個のスポットは，標準溶液から得た赤色の蛍光を発するスポットと色調及び *Rf* 値が等しい。

（６）　キョウニン　本品の粉末 10g をソックスレー抽出器に入れ，石油エーテル 100mL を加え，50℃で 5 時間抽出する。次に残留物をソックスレー抽出器に入れ，エタノール（95）10mL を加え，95℃で 5 時間抽出する。エタノール（95）抽出液を蒸発乾固し，残留物を 95%メタノール 20mL に溶かし，試料溶液とする。別にアミグダリン 10mg をメタノール 2mL に溶かし，標準溶液とする。これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び標準溶液 10μL ずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲルを用いて調製した薄層板にスポットする。次にクロロホルム・メタノール・水混液（4：4：1）を展開溶媒として約 10cm 展開した後，薄層板を風乾する。これに 1%α－ナフトールエタノール溶液・20%硫酸混液（1：1）を均等に噴霧し，105℃で 5 分間加熱するとき試料溶液から得たクロマトグラムの中に標準溶液から得たスポットと同一の色調及び *Rf* 値をもつスポットを認める。

【 389 】　K183

成分及び分量又は本質	日本薬局方	マオウ	4.0g
	〃	トウキ	4.0g
	〃	ビャクジュツ	4.0g
	〃	ヨクイニン	8.0g
	〃	ケイヒ	3.0g
	〃	シャクヤク	3.0g
	〃	カンゾウ	2.0g
		全　　量	28.0g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。		
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。		
効能又は効果	体力中等度で，関節や筋肉のはれや痛みがあるものの次の諸症：関節痛，筋肉痛，神経痛		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	薏苡仁湯		

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品1包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　マオウ　細い円柱状又はだ円柱を呈し，長さ3～10mm，径1～2mm，淡緑色～黄緑色である。表面に多数の平行する縦みぞがあり，節部には，長さ2～4mmの2枚のりん片状の葉が対生し，その基部は合着して筒状になっている。りん片状の葉の色は淡褐色～褐色である。茎の横断面をルーペ視するとき，円形～だ円形で，周囲部は灰緑色～黄緑色を呈し，中心部には赤緑色の物質が充満しているか，又は中空のところがある。味は渋くてわずかに苦く，やや麻ひ性である。

必要に応じて，「マオウ」の確認試験を準用する。

（２）　トウキ　外面は暗褐色～赤褐色で，縦じわがあり，切断面は淡黄色～黄褐色を呈する。特異なにおいがあり，味はわずかに甘く，後にやや辛い。

横切片を鏡検するとき，コルク層は 4～10 層からなり，その内側に数層の厚角組織が続いている。皮部には分泌細胞に囲まれた多数の樹脂道並びにしばしば大きなすき間がある。形成層は長方形に偏圧された数層の細胞からなり，明らかに皮部と木部とを区別する。木部では多数の道管と放射組織とが交互に放射状に配列し，その外方の道管は単独又は数個集まってやや密に配列してくさび状をなすが，中心部付近の道管は極めてまばらに存在する。でんぷん粒は径 19μm 以下，まれに 2～5 個の複粒があり，複粒の径は 25μm に達し，しばしばのり化している。

（３）　ビャクジュツ　外面は淡灰黄色～淡黄白色で，ところどころ灰褐色を呈し，横切面には淡黄褐色～褐色の分泌物による細点がある。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，皮部の柔組織中にはしばしば師部の外側に接して繊維束があり，放射組織の末端部には淡褐色～褐色の内容物を含む油室がある。木部には大きい髄を囲んで放射状に配列した短径の道管とそれを囲む著しい繊維束がある。髄及び放射組織中には皮部と同様な油室があり，柔組織中にはイヌリンの結晶及びシュウ酸カルシウムの小針晶を含む。

必要に応じて，「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。

（４）　ヨクイニン　卵形又は広卵形を呈し，頂端及び基部はややくぼみ，長さ約 6mm，幅約 5mm，背面は丸くふくれ，腹面の中央には縦に深いみぞがある。背面はほぼ白色，粉質で，腹面のみぞ及びその他の表面のところどころに褐色膜質の果皮及び種皮が付いている。横断面をルーペ視するとき，背面は白色の内乳からなり，腹面のくぼみには淡黄色の胚盤がある。質は堅い。味はわずかに甘く，歯間に粘着する。

必要に応じて，「ヨクイニン」の確認試験を準用する。

（５）　ケイヒ　外面は暗赤褐色を呈し，内面は赤褐色を呈し，平滑である。横断面は赤褐色を呈し淡褐色の薄層が見られる。特異なにおいがあり，味は甘く，辛く，後にやや粘液性で，わずかに収れん性である。

横切片を鏡検するとき，一次皮部と二次皮部はほとんど連続した石細胞環で区分され，環の外辺にはほぼ円形に結集した繊維束を伴い，環の各石細胞の膜はしばしば U 字形に肥厚する。二次皮部中には石細胞を認めず，まばらに少数の厚膜繊維を認める。柔組織中には油細胞，粘液細胞及び微細なシュウ酸カルシウムの針晶を含む細胞があり，柔細胞中にはでんぷん粒を含む。

（６）　シャクヤク　外面は褐色～淡灰褐色を呈し，横断面はち密で淡灰褐色を呈し，木部には淡褐色の放射状の線がある。わずかに特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後に渋くてわずかに苦い。

必要に応じて，「シャクヤク」の確認試験を準用する。

（７）　カンゾウ　外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現わす。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に 1～3 細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には 3～10 細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木

部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞中にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

乾燥減量　15%以下。

灰　　分　5%以下。

【 390 】　K184

成分及び分量又は本質	日本薬局方	トウキ	3.0g
	〃	センキュウ	3.0g
	〃	ブクリョウ	4.0g
	〃	ビャクジュツ	4.0g
	〃	サイコ	2.0g
	〃	カンゾウ	1.5g
	〃	チョウトウコウ	3.0g
		全　　量	20.5g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。		
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。		
効能又は効果	体力中等度をめやすとして，神経がたかぶり，怒りやすい，イライラなどがあるものの次の諸症：神経症，不眠症，小児夜泣き，小児疳症（神経過敏），歯ぎしり，更年期障害，血の道症		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	抑肝散料		

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品1包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　トウキ　外面は暗褐色～赤褐色で，縦じわがあり，切断面は淡黄色～黄褐色を呈する。特異なにおいがあり，味はわずかに甘く，後にやや辛い。

横切片を鏡検するとき，コルク層は4～10層からなり，その内側に数層の厚角組織が続いている。皮部には分泌細胞に囲まれた多数の樹脂道並びにしばしば大きなすき間がある。形成層は長方形に偏圧された数層の細胞からなり，明らかに皮部と木部とを区別する。木部では多数の道管と放射組織とが交互に放射状に配列し，その外方の道管は単独又は数個集まってやや密に配列してくさび状をなすが，中心部付近の道管は極めてまばらに

存在する。でんぷん粒は径 19μm 以下，まれに 2～5 個の複粒があり，複粒の径は 25μm に達し，しばしばのり化している。

（２）　センキュウ　外面は灰褐色～暗褐色で，切断面は灰白色～灰褐色，半透明で，ときにはうつろがある。質は密で堅い。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，皮部及び髄には油道が散在する。木部には厚膜で木化した木部繊維が大小不同の群をなして存在する。でんぷん粒は，通例，のり化していて，まれに径 5～25μm のでんぷん粒を認めることがある。シュウ酸カルシウム結晶は認めない。

（３）　ブクリョウ　白色又はわずかに淡赤色を帯びた白色で，質は堅いが砕きやすい。味はないがやや粘液ようである。

必要に応じて，「ブクリョウ」の確認試験を準用する。

（４）　ビャクジュツ　外面は淡灰黄色～淡黄白色で，ところどころ灰褐色を呈し，横切面には淡黄褐色～褐色の分泌物による細点がある。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，皮部の柔組織中にはしばしば師管の外側に接して繊維束があり，放射組織の末端部には淡褐色～褐色の内容物を含む油室がある。木部には大きい髄を囲んで放射状に配列した短径の道管とそれを囲む著しい繊維束がある。髄及び放射組織中には皮部と同様な油室があり，柔組織中にはイヌリンの小球晶及びシュウ酸カルシウムの針晶を含む。

必要に応じて，「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。

（５）　サイコ　外面は灰褐色～褐色で，深いしわがあるものがあり，横断面では，皮部は褐色，木部は淡褐色を呈する。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，皮部にはしばしば接線方向に長い裂け目があり，皮部の厚さは半径の 1/3～1/2 で，径 15～35μm の胞間性離生油道がやや多数散在し，木部には道管が放射状若しくはほぼ階段状に配列し，ところどころに繊維群があり，根頭部の髄には皮部と同様の油道がある。柔細胞中にはでんぷん粒を満たし，また油滴を認める。

必要に応じて，「サイコ」の確認試験を準用する。

（６）　カンゾウ　外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現わす。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に 1～3 細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には 3～10 細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞中にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

（７）　チョウトウコウ　かぎ状のとげ又はとげが対生又は単生する短い茎からなる。とげは長さ 1～4cm で，湾曲して先端はとがり，外面は赤褐色～暗褐色，又は黄褐色を呈し，毛を付けるものもある。横切面は長楕円形～楕円形で，淡褐色を呈する。茎は細長い方柱形～円柱形で，径 2～5mm，外面は赤褐色～暗褐色，又は黄褐色を呈し，横切面は方形で，髄は淡褐色で方形～楕円形を呈するか又は空洞化している。質は堅い。ほとんどにおいがなく，味はほとんどない。

とげの横切面を鏡検するとき，表皮のクチクラは平滑又は歯牙上の細かい凹凸があり，師部に外接する繊維はほぼ環状に配列し，皮部の柔細胞中にはシュウ酸カルシウムの砂晶を認める。

必要に応じて，「チョウトウコウ」の確認試験を準用する。

乾燥減量　15%以下。

灰　　分　5%以下。

【 391 】　K185

成分及び分量又は本質	日本薬局方	トウキ	3.0g
	〃	センキュウ	3.0g
	〃	ブクリョウ	4.0g
	〃	ビャクジュツ	4.0g
	〃	サイコ	2.0g
	〃	ハンゲ	5.0g
	〃	カンゾウ	1.5g
	〃	チンピ	3.0g
	〃	チョウトウコウ	3.0g
		全　　量	28.5g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。		
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。		
効能又は効果	体力中等度をめやすとして，やや消化器が弱く，神経がたかぶり，怒りやすい，イライラなどがあるものの次の諸症：神経症，不眠症，小児夜泣き，小児疳症（神経過敏），更年期障害，血の道症，歯ぎしり		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	抑肝散料加陳皮半夏		

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品1包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　トウキ　外面は暗褐色～赤褐色で，縦じわがあり，切断面は淡黄色～黄褐色を呈する。特異なにおいがあり，味はわずかに甘く，後にやや辛い。

横切片を鏡検するとき，コルク層は4～10層からなり，その内側に数層の厚角組織が続いている。皮部には分泌細胞に囲まれた多数の樹脂道並びにしばしば大きなすき間がある。形成層は長方形に偏圧された数層の細胞からなり，明らかに皮部と木部とを区別す

る。木部では多数の道管と放射組織とが交互に放射状に配列し，その外方の道管は単独又は数個集まってやや密に配列してくさび状をなすが，中心部付近の道管は極めてまばらに存在する。でんぷん粒は径 19μm 以下，まれに 2～5 個の複粒があり，複粒の径は 25μm に達し，しばしばのり化している。

（２）　センキュウ　外面は灰褐色～暗褐色で，切断面は灰白色～灰褐色，半透明で，ときにはうつろがある。質は密で堅い。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，皮部及び髄には油道が散在する。木部には厚膜で木化した木部繊維が大小不同の群をなして存在する。でんぷん粒は，通例，のり化していて，まれに径 5～25μm のでんぷん粒を認めることがある。シュウ酸カルシウム結晶は認めない。

（３）　ブクリョウ　白色又はわずかに淡赤色を帯びた白色で，質は堅いが砕きやすい。味はないがやや粘液ようである。

必要に応じて，「ブクリョウ」の確認試験を準用する。

（４）　ビャクジュツ　外面は淡灰黄色～淡黄白色で，ところどころ灰褐色を呈し，横切面には淡黄褐色～褐色の分泌物による細点がある。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，皮部の柔組織中にはしばしば師管の外側に接して繊維束があり，放射組織の末端部には淡褐色～褐色の内容物を含む油室がある。木部には大きい髄を囲んで放射状に配列した短径の道管とそれを囲む著しい繊維束がある。髄及び放射組織中には皮部と同様な油室があり，柔組織中にはイヌリンの小球晶及びシュウ酸カルシウムの針晶を含む。

必要に応じて，「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。

（５）　サイコ　外面は灰褐色～褐色で，深いしわがあるものがあり，横断面では，皮部は褐色，木部は淡褐色を呈する。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，皮部にはしばしば接線方向に長い裂け目があり，皮部の厚さは半径の 1/3～1/2 で，径 15～35μm の胞間性離生油道がやや多数散在し，木部には道管が放射状若しくはほぼ階段状に配列し，ところどころに繊維群があり，根頭部の髄には皮部と同様の油道がある。柔細胞中にはでんぷん粒を満たし，また油滴を認める。

必要に応じて，「サイコ」の確認試験を準用する。

（６）　ハンゲ　外面は白色～灰白黄色，上部には茎の跡がくぼみとなり，その周辺には根の跡がくぼんだ細点となっている。横断面は白色，粉性である。味は初めなく，やや粘液性で，後に強いえぐ味を残す。

横切片を鏡検するとき，主としてでんぷん粒を充満した柔組織からなり，わずかにシュウ酸カルシウムの束晶を含んだ粘液細胞がその間に認められる。でんぷん粒は主として 2～3 個の複粒で，通例，径 10～15μm，単粒は通例径 3～7μm である。束晶は長さ 25～150μm である。

（７）　カンゾウ　外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現わす。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に 1～3 細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には 3～10 細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木

部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞中にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

（８）　チンピ　外面は黄赤色～暗黄褐色で，油室による多数の小さいくぼみがあり，内面は白色～淡灰黄褐色である。厚さ約 2mm で，質は軽くてもろい。芳香があり，味は苦くて，わずかに刺激性である。

必要に応じて，「チンピ」の確認試験を準用する。

（９）　チョウトウコウ　かぎ状のとげ又はとげが対生又は単生する短い茎からなる。とげは長さ 1～4cm で，湾曲して先端はとがり，外面は赤褐色～暗褐色，又は黄褐色を呈し，毛を付けるものもある。横切面は長楕円形～楕円形で，淡褐色を呈する。茎は細長い方柱形～円柱形で，径 2～5mm，外面は赤褐色～暗褐色，又は黄褐色を呈し，横切面は方形で，髄は淡褐色で方形～楕円形を呈するか又は空洞化している。質は堅い。ほとんどにおいがなく，味はほとんどない。

とげの横切面を鏡検するとき，表皮のクチクラは平滑又は歯牙上の細かい凹凸があり，師部に外接する繊維はほぼ環状に配列し，皮部の柔細胞中にはシュウ酸カルシウムの砂晶を認める。

必要に応じて，「チョウトウコウ」の確認試験を準用する。

乾燥減量　15％以下。

灰　　分　5％以下。

【 392 】　K186

成分及び分量又は本質	日本薬局方	ニンジン	4.0g
	〃	ビャクジュツ	4.0g
	〃	ブクリョウ	4.0g
	〃	ハンゲ	4.0g
	〃	チンピ	2.0g
	〃	タイソウ	2.0g
	〃	カンゾウ	1.0g
	〃	ショウキョウ	0.5g
		全　　量	21.5g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。		
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。		
効能又は効果	体力が中等度以下で，胃腸が弱く，食欲がなく，みぞおちがつかえ，疲れやすく，貧血性で手足が冷えやすいものの次の諸症：胃炎，胃腸虚弱，胃下垂，消化不良，食欲不振，胃痛，嘔吐		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	六君子湯		

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品1包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　ニンジン　外面は淡黄褐色～淡灰褐色を呈し，縦じわがあり，横断面は淡黄褐色を呈し，形成層の付近は褐色を呈する。特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後にやや苦い。

必要に応じて，「ニンジン」の確認試験を準用する。

（２）　ビャクジュツ　外面は淡灰黄色～淡黄白色で，ところどころ灰褐色を呈し，横切面には淡黄褐色～褐色の分泌物による細点がある。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，皮部の柔組織中にはしばしば師管の外側に接して繊維束があり，放射組織の末端部には淡褐色～褐色の内容物を含む油室がある。木部には大きい髄を囲んで放射状に配列した短径の道管とそれを囲む著しい繊維束がある。髄及び放射組織中には皮部と同様な油室があり，柔組織中にはイヌリンの小球晶及びシュウ酸カルシウムの針晶を含む。

必要に応じて，「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。

（３）　ブクリョウ　白色又はわずかに淡赤色を帯びた白色で，質は堅いが砕きやすい。味はないがやや粘液ようである。

必要に応じて，「ブクリョウ」の確認試験を準用する。

（４）　ハンゲ　外面は白色～灰白黄色，上部には茎の跡がくぼみとなり，その周辺には根の跡がくぼんだ細点となっている。横断面は白色，粉性である。味は初めなく，やや粘液性で，後に強いえぐ味を残す。

横切片を鏡検するとき，主としてでんぷん粒を充満した柔組織からなり，わずかにシュウ酸カルシウムの束晶を含んだ粘液細胞がその間に認められる。でんぷん粒は主として 2～3 個の複粒で，通例，径 10～15μm，単粒は通例径 3～7μm である。束晶は長さ 25～150μm である。

（５）　チンピ　外面は黄赤色～暗黄褐色で，油室による多数の小さいくぼみがあり，内面は白色～淡灰黄褐色である。厚さ約 2mm で，質は軽くてもろい。芳香があり，味は苦くて，わずかに刺激性である。

必要に応じて，「チンピ」の確認試験を準用する。

（６）　タイソウ　外面は赤褐色であらいしわがあるか，又は暗灰赤色で細かいしわがあり，いずれもつやがある。外果皮は薄く革質で，中果皮は暗灰褐色を呈し，海綿ようで柔らかく粘着性があり，内果皮は極めて堅く，種子は偏平である。わずかに特異なにおいがあり，味は甘い。

（７）　カンゾウ　外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現わす。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に 1～3 細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には 3～10 細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞中にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

（８）　ショウキョウ　淡灰黄色の周皮を付けたままか，又はその一部をはぎとってあり，表面は灰白色～淡灰褐色で，しばしば白粉を付けている。横断面は繊維性，粉性で，淡帯黄褐色を呈し，皮層と中心柱とに分かれる。横断面をルーペ視するとき，その全面に維管束及び分泌物が褐色の細点として散在している。特異なにおいがあり，味は極めて辛い。

乾燥減量　15%以下。

灰　　分　5%以下。

【 393 】　K187

成分及び分量 又は本質	日本薬局方	サイシン	2.0g
	〃	ショウマ	2.0g
	〃	カンゾウ	1.5g
	〃	ボウフウ	2.0g
	〃	リュウタン	1.0g
		全　量	8.5g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。		
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。		
効能又は効果	歯痛，抜歯後の疼痛		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	立効散料		

規格及び試験方法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品1包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　サイシン　根の外面は淡褐色で，径約1mm，切断面は黄白色である。根茎は不整に湾曲し外面は暗褐色を呈する。特異なにおいがあり，味は辛く舌をやや麻ひする。

（2）　ショウマ　外面は暗褐色を呈し，切断面では木部は淡褐色～灰褐色繊維性で，網目状を呈する。質は軽い。味は苦くてわずかに渋い。

（3）　カンゾウ　外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現わす。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に1～3細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には3～10細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞中

にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

（４）　ボウフウ　外面は淡褐色で，多数の縦じわがある。横断面の周辺は灰褐色で，空げきが多く，中央は円形に黄色を呈する。味はわずかに甘い。

（５）　リュウタン　根の径は約 3mm，外面は灰黄褐色で，あらい縦じわがあり，切断面は黄褐色を呈する。味は極めて苦く，残留性である。

根の横切片を鏡検するとき，幼若な根では表皮，外皮及び数層の一次皮部を残すが，通例，その最外層は数個の娘細胞に分割した特異な細胞からなる内皮で，しばしばこれに内接して 1～2 層の厚角組織がある。二次皮部はところどころに裂け目があり，不規則に師管を分布し，木部には道管がやや放射状に配列し，木部内師管があり，根茎部には大きい髄があり，髄には師管を認めることがある。柔細胞中にはシュウ酸カルシウムの針晶，板晶又は砂晶あるいは油滴を含み，でんぷん粒は，通例，認めない。

必要に応じて，「リュウタン」の確認試験を準用する。

乾燥減量　10%以下。

灰　　分　6%以下。

成分及び分量又は本質	日本薬局方	トウキ	5.0g
	〃	ジオウ	5.0g
	〃	モクツウ	5.0g
	〃	オウゴン	3.0g
	〃	タクシャ	3.0g
	〃	シャゼンシ	3.0g
	〃	リュウタン	1.0g
	〃	サンシシ	1.0g
	〃	カンゾウ	1.0g
		全　量	27.0g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。		
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。		
効能又は効果	体力中等度以上で，下腹部に熱感や痛みがあるものの次の諸症：排尿痛，残尿感，尿のにごり，こしけ（おりもの），頻尿		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	竜胆瀉肝湯		

規格及び試験方法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品1包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　トウキ　外面は暗褐色～赤褐色で，縦じわがあり，切断面は淡黄色～黄褐色を呈する。特異なにおいがあり，味はわずかに甘く，後にやや辛い。

横切片を鏡検するとき，コルク層は4～10層からなり，その内側に数層の厚角組織が続いている。皮部には分泌細胞に囲まれた多数の樹脂道並びにしばしば大きなすき間がある。形成層は長方形に偏圧された数層の細胞からなり，明らかに皮部と木部とを区別する。木部では多数の道管と放射組織とが交互に放射状に配列し，その外方の道管は単独又

は数個集まってやや密に配列してくさび状をなすが，中心部付近の道管は極めてまばらに存在する。でんぷん粒は径 19μm 以下，まれに 2～5 個の複粒があり，複粒の径は 25μm に達し，しばしばのり化している。

（2） ジオウ 外面は黄褐色～黒褐色を呈し，深い縦みぞ及びくびれがある。質は柔らかく粘性である。横断面は黄褐色～黒褐色で，皮部は木部より色が濃く，ほとんど髄を認めない。特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後にやや苦い。

横切片を鏡検するとき，コルク層は 7～15 層で，皮部はすべて柔細胞からなり，外皮部に褐色の分泌物を含む細胞が散在する。木部はほとんど柔細胞で満たされ，放射状に並ぶ道管は側孔のある網紋があり，弱い木化反応を呈する。

（3） モクツウ 外側のコルク層は灰褐色で，円形又は横に長いだ円形の皮目がある。皮部は暗灰褐色を呈し，木部は淡褐色で，灰白色の放射組織と交互に配列する。髄は淡灰黄色で，明らかである。味はわずかにえぐい。

横切片を鏡検するとき，師部の外辺を囲む弧状の輪層は主として結晶細胞列をなす繊維束と石細胞群とからなり，皮部の放射組織は単晶を含む厚膜細胞からなる。形成層は明らかで，束外では著しく内方に湾入している。髄周辺の細胞は，はなはだ厚膜で，しばしば単晶を含んでいる。でんぷん粒の大きさは 8μm 以下である。

必要に応じて，「モクツウ」の確認試験を準用する。

（4） オウゴン 外面は黄褐色～暗褐色を呈し，切断面は黄色～帯褐黄色を呈し，縦に繊維性のすじが見られる。味はわずかに苦い。

必要に応じて，「オウゴン」の確認試験を準用する。

（5） タクシャ 淡黄褐色～淡褐色でコルク層をつける部位はやや暗色を呈する。ルーペ視するとき，褐色～淡褐色のはん点が散在する。切面は粒状で，繊維性ではない。わずかににおい及び味がある。

（6） シャゼンシ 長さ 2～2.5mm，幅 0.7～1mm，厚さ 0.3～0.5mm の偏だ円体で，つやのある褐色～黄褐色を呈する。ルーペ視するとき，ほぼ平滑で背面は弓状に隆起するが，腹面はややくぼんでいる。珠孔及び縫線は認められない。味はわずかに苦く，粘液性である。

横切片を鏡検するとき，種皮は粘液を含む表皮，栄養層及びほぼ等径性の細胞からなる色素層の 3 層からなり，その内部には種皮より厚い内乳が 2 枚の子葉を包んでいる。

必要に応じて，「シャゼンシ」の確認試験を準用する。

（7） リュウタン 根の径は約 3mm，外面は灰黄褐色で，あらい縦じわがあり，切断面は黄褐色を呈する。味は極めて苦く，残留性である。

根の横切片を鏡検するとき，幼若な根では表皮，外皮及び数層の一次皮部を残すが，通例，その最外層は数個の娘細胞に分割した特異な細胞からなる内皮で，しばしばこれに内接して 1～2 層の厚角組織がある。二次皮部はところどころに裂け目があり，不規則に師管を分布し，木部には道管がやや放射状に配列し，木部内師管があり，根茎部には大きい髄があり，髄には師管を認めることがある。柔細胞中にはシュウ酸カルシウムの針晶，板晶又は砂晶あるいは油滴を含み，でんぷん粒は，通例，認めない。

必要に応じて，「リュウタン」の確認試験を準用する。

（8） サンシシ 果皮は薄く砕きやすく，その外面は赤褐色，黄赤色又は黒褐色を呈し，内面は黄褐色を呈し，平らでつやがある。果実の内部は 2 室に分かれ，黄赤色～暗赤

色の果肉中に黒褐色又は黄赤色で長径約 5mm の偏平な種子の団塊を含む。質は軽い。特異なにおいがあり，味は苦い。

必要に応じて，「サンシシ」の確認試験を準用する。

（９）　カンゾウ　外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現わす。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に 1～3 細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には 3～10 細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞中にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

乾燥減量　10%以下。

灰　　分　6%以下。

【 395 】　K189

成分及び分量 又は本質	日本薬局方　ブクリョウ　6.0g 〃　カンキョウ　3.0g 〃　ビャクジュツ　3.0g 〃　カンゾウ　2.0g 全　量　14.0g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。
効能又は効果	体力中等度以下で，腰から下肢に冷えと痛みがあって，尿量が多いものの次の諸症：腰痛，腰の冷え，夜尿症，神経痛
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器
規格及び試験方法	別記のとおり。
備考	苓姜朮甘湯

規格及び試験方法

性　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品1包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　ブクリョウ　白色又はわずかに淡赤色を帯びた白色で，質は堅いが砕きやすい。味はないがやや粘液ようである。

必要に応じて，「ブクリョウ」の確認試験を準用する。

（2）　カンキョウ　偏圧した不規則な塊状でしばしば分枝する。分枝した各部はやや湾曲した卵形又は長卵形を呈し，長さ2～4cm，径1～2cmである。外面は灰黄色～灰黄褐色で，しわ及び輪節がある。折面は褐色～暗褐色で透明感があり角質である。横切面をルーペ視するとき皮層と中心柱は区分され，全面に維管束が散在する。特異なにおいがあり，味は極めて辛い。

横切片を鏡検するとき，外側よりコルク層，皮層，内皮，中心柱が認められる。皮層と中心柱は一層の内皮によって区分される。皮層及び中心柱は柔組織からなり，繊維束で囲まれた維管束が散在する。柔組織中には黄色の油様物質を含む油細胞が散在し，柔細胞中にはシュウ酸カルシウムの単晶が含まれ，でんぷんは糊化している。

必要に応じて，「カンキョウ」の確認試験を準用する。

（3）　ビャクジュツ　外面は淡灰黄色～淡黄白色で，ところどころ灰褐色を呈し，横切面には淡黄褐色～褐色の分泌物による細点がある。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，皮部の柔組織中にはしばしば師管の外側に接して繊維束があり，放射組織の末端部には淡褐色～褐色の内容物を含む油室がある。木部には大きい髄を囲んで放射状に配列した短径の道管とそれを囲む著しい繊維束がある。髄及び放射組織中には皮部と同様な油室があり，柔組織中にはイヌリンの小球晶及びシュウ酸カルシウムの針晶を含む。

必要に応じて，「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。

（4）　カンゾウ　外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現わす。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に 1～3 細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には 3～10 細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞中にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

乾燥減量　15%以下。

灰　　分　5%以下。

【 396 】　K190

成分及び分量 又 は 本 質	日本薬局方　ブクリョウ　6.0g 〃　ケイヒ　4.0g 〃　タイソウ　4.0g 〃　カンゾウ　2.0g 全　量　16.0g
製 造 方 法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。
効能又は効果	体力中等度以下で，のぼせや動悸があり神経がたかぶるものの次の諸症：動悸，精神不安
貯蔵方法及び 有 効 期 間	密閉容器
規格及び試験方法	別記のとおり。
備　　考	苓桂甘棗湯

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品1包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　ブクリョウ　白色又はわずかに淡赤色を帯びた白色で，質は堅いが砕きやすい。味はないがやや粘液ようである。

必要に応じて，「ブクリョウ」の確認試験を準用する。

（2）　ケイヒ　外面は暗赤褐色を呈し，内面は赤褐色を呈し，平滑である。横断面は赤褐色を呈し淡褐色の薄層が見られる。特異なにおいがあり，味は甘く，辛く，後にやや粘液性で，わずかに収れん性である。

横切片を鏡検するとき，一次皮部と二次皮部はほとんど連続した石細胞環で区分され，環の外辺にはほぼ円形に結集した繊維束を伴い，環の各石細胞の膜はしばしばU字形に肥厚する。二次皮部中には石細胞を認めず，まばらに少数の厚膜繊維を認める。柔組織中には油細胞，粘液細胞及び微細なシュウ酸カルシウムの針晶を含む細胞があり，柔細胞中にはでんぷん粒を含む。

（３）　タイソウ　外面は赤褐色であらいしわがあるか，又は暗灰赤色で細かいしわがあり，いずれもつやがある。外果皮は薄く革質で，中果皮は暗灰褐色を呈し，海綿ようで柔らかく粘着性があり，内果皮は極めて堅く，種子は偏平である。わずかに特異なにおいがあり，味は甘い。

（４）　カンゾウ　外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現わす。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に 1～3 細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には 3～10 細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞中にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

乾燥減量　15％以下。

灰　　分　5％以下。

【 397 】　K191

成分及び分量 又は本質	日本薬局方　ブクリョウ　4.0g 〃　ケイヒ　3.0g 〃　カンゾウ　2.0g 〃　ビャクジュツ　2.0g 全　量　11.0g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。
効能又は効果	体力中等度以下で，めまい，ふらつきがあり，ときにのぼせや動悸があるものの次の諸症：立ちくらみ，めまい，頭痛，耳鳴り，動悸，息切れ，神経症，神経過敏
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器
規格及び試験方法	別記のとおり。
備考	苓桂朮甘湯

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品1包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　ブクリョウ　白色又はわずかに淡赤色を帯びた白色で，質は堅いが砕きやすい。味はないがやや粘液ようである。

必要に応じて，「ブクリョウ」の確認試験を準用する。

（2）　ケイヒ　外面は暗赤褐色を呈し，内面は赤褐色を呈し，平滑である。横断面は赤褐色を呈し淡褐色の薄層が見られる。特異なにおいがあり，味は甘く，辛く，後にやや粘液性で，わずかに収れん性である。

横切片を鏡検するとき，一次皮部と二次皮部はほとんど連続した石細胞環で区分され，環の外辺にはほぼ円形に結集した繊維束を伴い，環の各石細胞の膜はしばしばU字形に肥厚する。二次皮部中には石細胞を認めず，まばらに少数の厚膜繊維を認める。柔組織中に

は油細胞，粘液細胞及び微細なシュウ酸カルシウムの針晶を含む細胞があり，柔組織中にはでんぷん粒を含む。

（３）　カンゾウ　外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現わす。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に 1～3 細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には 3～10 細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞中にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

（４）　ビャクジュツ　外面は淡灰黄色～淡黄白色で，ところどころ灰褐色を呈し，横切面には淡黄褐色～褐色の分泌物による細点がある。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，皮部の柔組織中にはしばしば師管の外側に接して繊維束があり，放射組織の末端部には淡褐色～褐色の内容物を含む油室がある。木部には大きい髄を囲んで放射状に配列した短径の道管とそれを囲む著しい繊維束がある。髄及び放射組織中には皮部と同様な油室があり，柔組織中にはイヌリンの小球晶及びシュウ酸カルシウムの針晶を含む。

必要に応じて，「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。

乾燥減量　20％以下。

灰　　分　5％以下。

【 398 】　K192

成分及び分量又は本質	日本薬局方	ジオウ	5.0g
	〃	サンシュユ	3.0g
	〃	サンヤク	3.0g
	〃	タクシャ	3.0g
	〃	ブクリョウ	3.0g
	〃	ボタンピ	3.0g
		全　　量	20.0g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。		
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。		
効能又は効果	体力中等度以下で，疲れやすくて尿量減少又は多尿で，ときに手足のほてり，口渇があるものの次の諸症：排尿困難，残尿感，頻尿，むくみ，かゆみ，夜尿症，しびれ		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	六味地黄丸料		

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品1包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　ジオウ　外面は黄褐色～黒褐色を呈し，深い縦みぞ及びくびれがある。質は柔らかく粘性である。横断面は黄褐色～黒褐色で，皮部は木部より色が濃く，ほとんど髄を認めない。特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後にやや苦い。

横切片を鏡検するとき，コルク層は7～15層で，皮部はすべて柔細胞からなり，外皮部に褐色の分泌物を含む細胞が散在する。木部はほとんど柔細胞で満たされ，放射状に並ぶ道管は側孔のある網紋があり，弱い木化反応を呈する。

（2）　サンシュユ　偏圧された長だ円形を呈し，長さ1.5～2cm，幅約1cmである。表面は暗赤紫色～暗紫色を呈し，つやがあり，あらいしわがある。表面には種子を抜きとっ

た跡の裂け目があり，頂端にがくの跡があり，基部に果柄の跡がある。質は柔軟である。酸味があって，味はわずかに甘い。

（３）　サンヤク　類白色～帯黄白色で，粉質である。味はない。

必要に応じて，「サンヤク」の確認試験を準用する。

（４）　タクシャ　淡黄褐色～淡褐色でコルク層をつける部位はやや暗色を呈する。ルーペ視するとき，褐色～淡褐色のはん点が散在する。切面は粒状で，繊維性ではない。わずかににおい及び味がある。

（５）　ブクリョウ　白色又はわずかに淡赤色を帯びた白色である。外層が残存するものは暗褐色～暗赤褐色で，きめがあらく，裂け目がある。質は堅いが砕きやすい。ほとんどにおいがなく，味はないがやや粘液ようである。

必要に応じて，「ブクリョウ」の確認試験を準用する。

（６）　ボタンピ　外面は暗褐色～帯紫褐色，内面は淡灰褐色～暗紫色を呈する。内面及び切断面にはしばしば白色の結晶を付着する。特異なにおいがあり，味はわずかに辛くて苦い。

必要に応じて，「ボタンピ」の確認試験を準用する。

乾燥減量　15％以下。

灰　　分　5％以下。

【 399 】　K192—①

成分及び分量 又は本質	日本薬局方　ジオウ　3.2g 〃　サンシュユ　1.6g 〃　サンヤク　1.6g 〃　タクシャ　1.2g 〃　ブクリョウ　1.2g 〃　ボタンピ　1.2g 全　量　10.0g
製造方法	以上の生薬をそれぞれ末とし，「ハチミツ」を結合剤として丸剤の製法により丸剤 100 個とする。
用法及び用量	大人 1 日 3 回，1 回 20 個，食前又は空腹時に服用する。 15 才未満 7 才以上　大人の 2/3，7 才未満 5 才以上　大人の 1/2 を服用する。
効能又は効果	体力中等度以下で，疲れやすくて尿量減少又は多尿で，ときに手足のほてり，口渇があるものの次の諸症：排尿困難，残尿感，頻尿，むくみ，かゆみ，夜尿症，しびれ
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器
規格及び試験方法	別記のとおり。
備考	六味地黄丸

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は，褐色で，特異なにおいがある。

確認試験

（1）　ボタンピ　本品 50 丸を粉末とし，ヘキサン 10mL を加え，3 分間振り混ぜた後，ろ過し，ろ液を試料溶液とする。別にボタンピ末 0.6g をとり試料溶液と同様に操作して標準溶液とする。これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び標準溶液 30μL ずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲル（蛍光剤入り）を用いて調製した薄層板にスポットする。次にクロロホルムを展開溶媒として約 10cm 展開した後，薄層板を風乾する。これに紫外線（主波長 254nm）を照射するとき，試料溶液から得た数個のスポットのうち 1 個のスポットは，標準溶液から得た主スポットと色調及び *Rf* 値が等しい。また，このスポットは塩化鉄（Ⅲ）試液を均等に噴霧するとき，紫褐色を呈する。

（2）　サンシュユ　本品 50 丸を粉末とし，メタノール 10mL を加え，3 分間振り混ぜた後，ろ過し，ろ液を試料溶液とする。別にサンシュユ末 0.8g をとり試料溶液と同様に操

作して標準溶液とする。これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び標準溶液 10μL ずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲル（蛍光剤入り）を用いて調製した薄層板にスポットする。次にクロロホルム・メタノール・水混液（6：4：1）の下層を展開溶媒として約 10cm 展開した後，薄層板を風乾する。これに紫外線（主波長 254nm）を照射するとき，試料溶液から得たクロマトグラムの中に，標準溶液から得たスポットと同一の色調及び *Rf* 値を持つ数個のスポットを認める。また，このスポットは 4 - メトキシベンズアルデヒド・硫酸試液を均等に噴霧し，105℃にて 5 分間加熱するとき，同一の色調を呈する。

（３）　ジオウ　本品 50 丸を粉末とし，メタノール 10mL を加え，3 分間振り混ぜた後，ろ過し，ろ液を試料溶液とする。別にジオウ末 1.6g をとり試料溶液と同様に操作して標準溶液とする。これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び標準溶液 10μL ずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲル（蛍光剤入り）を用いて調製した薄層板にスポットする。次にクロロホルム・メタノール・水混液（6：4：1）の下層を展開溶媒として約 10cm 展開した後，薄層板を風乾する。これに紫外線（主波長 254nm）を照射するとき，試料溶液から得たクロマトグラムの中に，標準溶液から得たスポットと同一の色調及び *Rf* 値を持つ数個のスポットを認める。また，このスポットは 4 - メトキシベンズアルデヒド・硫酸試液を均等に噴霧し，105℃にて 5 分間加熱するとき，同一の色調を呈する。

（４）　タクシャ　本品 100 丸を粉末とし，アセトン 50mL を加え，3 分間振り混ぜた後，ろ過し，ろ液を蒸発乾固する。残留物にメタノール 5mL を加えて溶かした後，ろ過し，ろ液に水を加えて 50mL とし，オクタデシルシリル化シリカゲル約 0.4g を充填したカートリッジカラム*に注入し，メタノール 2mL で溶出し，この溶出液を試料溶液とする。別にタクシャ末 1.2g をとり試料溶液と同様に操作して標準溶液とする。これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び標準溶液 20μL ずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲル（蛍光剤入り）を用いて調製した薄層板にスポットする。次にベンゼン・アセトン混液（3：1）を展開溶媒として約 10cm 展開した後，薄層板を風乾する。これに紫外線（主波長 254nm）を照射するとき，試料溶液から得た数個のスポットのうち 1 個のスポットは，標準溶液から得た暗紫色のスポットと色調及び *Rf* 値が等しい。また，このスポットは 4 - メトキシベンズアルデヒド・硫酸試液を均等に噴霧し，105℃にて 5 分間加熱するとき，緑褐色を呈する。

（５）　サンヤク　本品 10 個をとり，粉末とし，薄めたグリセリン（1→2）を滴加して鏡検するとき，だ円形のでんぷん粒を認める。

（６）　ブクリョウ　本品 10 個をとり，粉末とし，薄めたグリセリン（1→2）を滴加して鏡検するとき，菌糸の破片を認める。

［注］　*ウォーターズ社製セップパック C18 又はこれと同等の性能を有するもの。

【 400 】　K193

成分及び分量 又は本質	日本薬局方　オウギ　3.0g 〃　シャクヤク　3.0g 〃　ケイヒ　3.0g 〃　ショウキョウ　1.5g 〃　タイソウ　4.0g 全　量　14.5g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。
効能又は効果	体力中等度以下のものの次の諸症：身体や四肢のしびれ，顔面・口腔内のしびれ，湿疹・皮膚炎
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器
規格及び試験方法	別記のとおり。
備考	黄耆桂枝五物湯

規格及び試験方法

性　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品1包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）オウギ　外面は淡灰黄色～淡褐黄色で，不規則なあらい縦じわがあり，折面は繊維性である。

横断面をルーペ視するとき，最外層には周皮があり，皮部は淡黄白色，木部は淡黄色，形成層付近はやや褐色を帯びる。木部から皮部にわたって白色の放射組織が認められるが，太いものではしばしば放射状の裂け目となっている。わずかに弱いにおいがあり，味は甘い。

（２）シャクヤク　外面は褐色～淡灰褐色を呈し，横断面はち密で淡灰褐色を呈し，木部には淡褐色の放射状の線がある。わずかに特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後に渋くてわずかに苦い。

必要に応じて，「シャクヤク」の確認試験を準用する。

（３）ケイヒ　外面は暗赤褐色を呈し，内面は赤褐色を呈し，平滑である。横断面は赤褐色を呈し淡褐色の薄層が見られる。特異なにおいがあり，味は甘く，辛く，後にやや粘液性で，わずかに収れん性である。

横切片を鏡検するとき，一次皮部と二次皮部はほとんど連続した石細胞環で区分され，環の外辺にはほぼ円形に結集した繊維束を伴い，環の各石細胞の膜はしばしばＵ字型に肥厚する。二次皮部中には石細胞を認めず，まばらに少数の厚膜繊維を認める。柔組織中には油細胞，粘液細胞及び微細なシュウ酸カルシウムの針晶を含む細胞があり，柔細胞中にはでんぷん粒を含む。

（４）ショウキョウ　淡灰黄色の周皮をつけたままか，又はその一部をはぎとってあり，表面は灰白色～淡灰褐色で，しばしば白粉を付けている。横断面は繊維性，粉性で，淡帯黄褐色を呈し，皮層と中心柱とに分かれる。横断面をルーペ視するとき，その全面に維管束及び分泌物が褐色の細点として散在している。特異なにおいがあり，味は極めて辛い。

（５）タイソウ　外面は赤褐色であらいしわがあるか，又は暗灰赤色で細かいしわがあり，いずれもつやがある。外果皮は薄く革質で，中果皮は暗灰褐色を呈し，海綿の様で柔らかく粘着性があり，内果皮は極めて堅く，種子は偏平である。わずかに特異なにおいがあり，味は甘い。

乾燥減量　14%以下。

灰　　分　5%以下。

【 401 】　K194

成分及び分量又は本質	日本薬局方　シャクヤク　4.0g 〃　サイコ　5.0g 局外生規　ドベッコウ　3.0g 日本薬局方　キジツ　2.0g 〃　カンゾウ　1.5g 〃　ブクリョウ　3.0g 〃　ショウキョウ　1.0g 〃　タイソウ　2.0g 全　量　21.5g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。
効能又は効果	体力中等度又はやや虚弱で，胸腹部に重苦しさがあり，ときに背中に痛みがあるものの次の諸症：慢性の発熱，腹痛，胃痛
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器
規格及び試験方法	別記のとおり。
備考	解労散料

規格及び試験方法

性　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品1包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（１）シャクヤク　外面は褐色～淡灰褐色を呈し，横断面はち密で淡灰褐色を呈し，木部には淡褐色の放射状の線がある。わずかに特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後に渋くてわずかに苦い。

必要に応じて，「シャクヤク」の確認試験を準用する。

（２）サイコ　外面は灰褐色～褐色で，深いしわがあるものがあり，横断面では，皮部は褐色，木部は淡褐色を呈する。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，皮部にはしばしば接線方向に長い裂け目があり，皮部の厚さは半径の1/3～1/2 で，径 15～35μmの胞間性離生油道がやや多数散在し，木部には道管が放射状若しくはほぼ階段状に配列し，ところどころに繊維群があり，根頭部の髄には皮部と同様の油道がある。柔細胞中にはでんぷん粒を満たし，また油滴を認める。

必要に応じて，「サイコ」の確認試験を準用する。

（３）ドベッコウ　不整皿状に湾曲した広だ円形～卵円形で，長さ 10～20cm，幅 7～15cm，厚さ 1.5～3mm，外面は黒褐色～黒緑色で，中央部はわずかに骨節が隆起し，両側に肋骨ようの線紋と細かいしわがある。内面は類白色で中央に隆起した脊椎骨があり，肋骨は 8 対で，左右に突出する。角質で堅く，折りやすい。特異なにおいがあり，味はほとんどない。

（４）キジツ　外面は濃緑褐色～褐色で，つやがなく，油室による多数のくぼんだ小点がある。切断面は淡灰褐色を呈し，内果皮を付ける部分は褐色を呈する。特異なにおいがあり，味は苦い。

必要に応じて，「キジツ」の確認試験を準用する。

（５）カンゾウ　外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現す。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に 1～3 細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には 3～10 細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞内にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

（６）ブクリョウ　白色又はわずかに淡赤色を帯びた白色で質は堅いが砕きやすい。味はないがやや粘液ようである。

必要に応じて，「ブクリョウ」の確認試験を準用する。

（７）ショウキョウ　淡灰黄色の周皮をつけたままか，又はその一部をはぎとってあり，表面は灰白色～淡灰褐色で，しばしば白粉を付けている。横断面は繊維性，粉性で，淡帯黄褐色を呈し，皮層と中心柱とに分かれる。横断面をルーペ視するとき，その全面に維管束及び分泌物が褐色の細点として散在している。特異なにおいがあり，味は極めて辛い。

（８）タイソウ　外面は赤褐色であらいしわがあるか，又は暗灰赤色で細かいしわがあり，いずれもつやがある。外果皮は薄く革質で，中果皮は暗灰褐色を呈し，海綿の様で柔らかく粘着性があり，内果皮は極めて堅く，種子は偏平である。わずかに特異なにおいがあり，味は甘い。

乾燥減量　13%以下。

灰　　分　20%以下。

【 402 】　K195

成分及び分量又は本質	日本薬局方　トウキ　3.0g 〃　センキュウ　3.0g 〃　シャクヤク　3.0g 〃　ジオウ　3.0g 〃　ソウジュツ　3.0g 〃　バクモンドウ　5.0g 〃　ニンジン　2.0g 〃　ゴシツ　2.0g 〃　オウバク　1.5g 〃　ゴミシ　1.5g 〃　オウレン　1.5g 〃　チモ　1.5g 〃　トチュウ　1.5g 全　量　31.5g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。
効能又は効果	体力虚弱で，血色がすぐれないものの次の諸症：下肢の筋力低下，神経痛，関節の腫れや痛み
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器
規格及び試験方法	別記のとおり。
備考	加味四物湯

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品 1 包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）トウキ　外面は暗褐色～赤褐色で，縦じわがあり，切断面は淡黄色～黄褐色を呈する。特異なにおいがあり，味はわずかに甘く，後にやや辛い。

横切片を鏡検するとき，コルク層は 4～10 層からなり，その内側に数層の厚角組織が続いている。皮部には分泌細胞に囲まれた多数の樹脂道並びにしばしば大きなすき間がある。形成層は長方形に偏圧された数層の細胞からなり，明らかに皮部と木部を区別する。木部では多数の道管と放射組織とが交互に放射状に配列し，その外方の道管は単独または数個集まってやや密に配列してくさび状をなすが，中心部付近の道管は極めてまばらに存在する。でんぷん粒は径 19μm 以下，まれに 2～5 個の複粒があり，複粒の径は 25μm に達し，しばしばのり化している。

（2）センキュウ　外面は灰褐色～暗褐色で，切断面は灰白色～灰褐色，半透明で，ときにはうつろがある。質は密で堅い。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，皮部及び髄には油道が散在する。木部には厚膜で木化した木部繊維が大小不同の群をなして存在する。でんぷん粒は，通例，のり化していて，まれに径 5～25μm のでんぷん粒を認めることがある。シュウ酸カルシウム結晶は認めない。

（3）シャクヤク　外面は褐色～淡灰褐色を呈し，横断面はち密で淡灰褐色を呈し，木部には淡褐色の放射状の線がある。わずかに特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後に渋くてわずかに苦い。

必要に応じて，「シャクヤク」の確認試験を準用する。

（4）ジオウ　外面は黄褐色～黒褐色を呈し，深い縦みぞ及びくびれがある。質は柔らかく粘性である。横断面は黄褐色～黒褐色で，皮部は木部より色が濃く，ほとんど髄を認めない。特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後にやや苦い。

横切片を鏡検するとき，コルク層は 7～15 層で，皮部はすべて柔細胞からなり，外皮部に褐色の分泌物を含む細胞が散在する。木部はほとんど柔細胞で満たされ，放射状に並ぶ道管は側孔のある網紋があり，弱い木化反応を呈する。

（5）ソウジュツ　外面は暗灰褐色～暗黄褐色である。横断面は淡褐色～赤褐色の分泌物による細点を認める。しばしば白色綿状の結晶を析出する。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，皮部の柔組織中には，通例，繊維束を欠き，放射組織の末端部には淡褐色～黄褐色の内容物を含む油室がある。木部は形成層に接して道管を囲んだ繊維束が放射状に配列し，髄及び放射組織中には皮部と同様な油室がある。柔細胞中にはイヌリンの球晶及びシュウ酸カルシウムの針晶を含む。

（6）バクモンドウ　紡錘形を呈し，長さ 10～25mm，径 3～5mm，一端はややとがり，他端はやや丸みをもち，外面は淡黄色～淡黄褐色で，大小の縦じわがある。皮層は柔軟性でもろく，中心柱は強じんで折りにくい。皮層の折面は淡黄褐色を呈し，やや半透明で粘着性がある。味はわずかに甘く，粘着性である。

（7）ニンジン　外面は淡黄褐色～淡灰褐色を呈し，縦じわがあり，横断面は淡黄褐色を呈し，形成層の付近は褐色を呈する。特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後にやや苦い。

必要に応じて，「ニンジン」の確認試験を準用する。

（８）ゴシツ　表面は灰黄色～黄褐色で，多数の縦じわがある。切断面は灰白色～淡褐色を呈し，黄白色の木部を認める。味はわずかに甘く，粘液性である。

横切片を鏡検するとき，皮部はやや明らかな形成層によって木部と区別できる。木部の中心には小さい原生木部があり，これを囲んで同心円状の環状維管束が外方に配列し，柔細胞の中にはシュウ酸カルシウムの砂晶を含み，でんぷん粒は認めない。

必要に応じて，「ゴシツ」の確認試験を準用する。

（９）オウバク　外面は灰黄褐色～灰褐色で，内面は黄色～暗黄褐色で，細かい縦線がある。横断面は鮮黄色でやや繊維性である。横切面をルーペ視するとき，皮部外層は黄色で薄く，石細胞が黄褐色の点状に分布する。皮部内層は厚く，一次放射組織は外方に向かうにしたがい幅が広がり，それらの一次放射組織の間に，多くの二次放射組織が集まってほぼ三角形の師部を形成し，この組織に褐色を呈する師部繊維束が層積して接線方向に並び，放射組織と交錯して格子状を呈する。味は極めて苦く，粘液性で，だ液を黄色に染める。

必要に応じて，「オウバク」の確認試験を準用する。

（10）ゴミシ　暗赤色～黒褐色を呈し，表面にはしわがあり，またしばしば白い粉を付ける。果肉を除くとじん臓型の種子 1～2 個を認め，その外種皮は黄褐色～暗赤褐色を呈し，つやがあり，堅くてもろい。外種皮はたやすくはがれるが，内種皮は胚乳に密着し，背面に明らかな縫線を認める。酸味があり，後に渋くて苦い。

（11）オウレン　根茎の径は 2～7mm で，外面は灰黄褐色～褐色を呈し，輪節及び多数の根の基部を認め，横断面はやや繊維性で，コルク層は淡灰褐色，皮部は黄褐色，木部は黄色，髄は黄褐色である。味は極めて苦く，残留性で，だ液を黄色に染める。

横切片を鏡検するとき，コルク層は薄膜のコルク細胞からなり，皮部柔組織中にはコルク層に近い部位に石細胞群，形成層に近い部位に黄色の師部繊維の認められるものが多い。木部は主として道管，仮道管，木部繊維からなり，放射組織は明らかで，髄は大きく，髄中には石細胞あるいは厚膜木化した細胞を伴った石細胞を認めることがある。柔細胞には細かいでんぷん粒を含むが，結晶を含まない。

必要に応じて，「オウレン」の確認試験を準用する。

（12）チモ　外面は黄褐色～褐色を呈し，質は軽くて折りやすい。横断面は淡黄褐色を呈し，これをルーペ視するとき，皮層は極めて狭く，広い中心柱には多くの維管束が不規則に点在し，粘液細胞又はその集合による多孔性を示す。味はわずかに甘く，粘液性で，後に苦い。

必要に応じて，「チモ」の確認試験を準用する。

（13）トチュウ　厚さ 2～6mm の粗皮を除いた半管状又は板状の皮片である。外面は淡灰褐色～灰褐色で粗雑であるが，ときにコルク層が剥離され赤褐色を呈することもある。内面は暗褐色～褐色を呈し，平滑で細かい縦線があり，折ると白絹ようのグッタペルカ（熱可塑性のゴムよう物質）の糸が出る。わずかに特異なにおいがあり，味はわずかに甘い。

横切片を鏡検するとき，柔組織内にはグッタペルカを含む柔細胞があり，師部には石細胞層及び繊維層を認め，放射組織は 2～3 細胞列からなり，シュウ酸カルシウムの結晶を含まない。

必要に応じて，「トチュウ」の確認試験を準用する。

乾燥減量　13%以下。

灰　　分　6%以下。

【 403 】　K196

成分及び分量又は本質	日本薬局方　ジオウ　5.0g 〃　サンシュユ　3.0g 〃　サンヤク　3.0g 〃　タクシャ　3.0g 〃　ブクリョウ　3.0g 〃　ボタンピ　3.0g 〃　クコシ　5.0g 〃　キクカ　3.0g 全　量　28.0g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。
効能又は効果	体力中等度以下で，疲れやすく胃腸障害がなく，尿量減少又は多尿で，ときに手足のほてりや口渇があるものの次の諸症：かすみ目，つかれ目，のぼせ，頭重，めまい，排尿困難，頻尿，むくみ，視力低下
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器
規格及び試験方法	別記のとおり。
備考	杞菊地黄丸料

規格及び試験方法

性　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品1包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（１）ジオウ　外面は黄褐色～黒褐色を呈し，深い縦みぞ及びくびれがある。質は柔らかく粘性である。横断面は黄褐色～黒褐色で，皮部は木部より色が濃く，ほとんど髄を認めない。特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後にやや苦い。

横切片を鏡検するとき，コルク層は 7～15 層で，皮部はすべて柔細胞からなり，外皮部に褐色の分泌物を含む細胞が散在する。木部はほとんど柔細胞で満たされ，放射状に並ぶ道管は側孔のある網紋があり，弱い木化反応を呈する。

（２）サンシュユ　偏圧された長だ円形を呈し，長さ 1.5～2cm，幅約 1cm である。表面は暗赤紫色～暗紫色を呈し，つやがあり，あらいしわがある。表面には種子を抜き取った跡の裂け目があり，頂端にがくの跡があり，基部に果柄の跡がある。質は柔軟である。酸味があって，味はわずかに甘い。

（３）サンヤク　類白色～帯黄白色で，粉質である。味はない。

必要に応じて，「サンヤク」の確認試験を準用する。

（４）タクシャ　淡黄褐色～淡褐色でコルク層を付ける部位はやや暗色を呈する。ルーペ視するとき，褐色～淡褐色のはん点が散在する。切面は粒状で，繊維性ではない。わずかににおい及び味がある。

（５）ブクリョウ　白色又はわずかに淡赤色を帯びた白色で質は堅いが砕きやすい。味はないがやや粘液ようである。

必要に応じて，「ブクリョウ」の確認試験を準用する。

（６）ボタンピ　外面は暗褐色～帯紫褐色，内面は淡灰褐色～暗紫色を呈する。内面及び切断面にはしばしば白色の結晶を付着する。特異なにおいがあり，味はわずかに辛くて苦い。

必要に応じて，「ボタンピ」の確認試験を準用する。

（７）クコシ　先のとがった紡錘形を呈し，長さ 6～20mm，径 3～8mm，果皮は赤色～暗赤色を呈し，表面に粗いしわがある。横切面をルーペ視するとき果実は 2 室に分かれ，内部に淡褐色～淡黄褐色で径約 2mm の偏平な腎臓形の多数の種子がある。特異なにおいがあり，味は甘く，後わずかに苦い。

必要に応じて，「クコシ」の確認試験を準用する。

（８）キクカ　径約 15～40mm の頭花で，総ほうは 3～4 列の総ほう片からなり，総ほう外片は線形～ひ針形，内片は狭卵形～卵形を呈する。舌状花は多数で，類白色～黄色，管状花は少数で淡黄褐色を呈し，ときに退化して欠くことがある。総ほうの外面は緑褐色～褐色を呈する。質は軽く，砕きやすい。特有のにおいがあり，味はわずかに苦い。

必要に応じて，「キクカ」の確認試験を準用する。

乾燥減量　15%以下。

灰　　分　6%以下。

【 404 】　K197

成分及び分量 又は本質	日本薬局方　サイコ　5.0g 〃　ハンゲ　5.0g 〃　オウゴン　3.0g 〃　ニンジン　3.0g 〃　タイソウ　3.0g 〃　コウブシ　4.0g 〃　ソヨウ　1.5g 〃　カンゾウ　1.5g 〃　チンピ　2.0g 〃　ショウキョウ　1.0g 全　量　29.0g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。
効能又は効果	体力中等度で，ときに脇腹（腹）からみぞおちあたりにかけて苦しく，やや神経質で気鬱傾向を認めるものの次の諸症：耳鳴り，耳閉感
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器
規格及び試験方法	別記のとおり。
備考	柴蘇飲

規格及び試験方法

性　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品 1 包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）サイコ　外面は灰褐色～褐色で，深いしわがあるものがあり，横断面では，皮部は褐色，木部は淡褐色を呈する。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，皮部にはしばしば接線方向に長い裂け目があり，皮部の厚さは半径の 1/3～1/2 で，径 15～35μm の胞間性離生油道がやや多数散在し，木部には道管が放射状若しくはほぼ階段状に配列し，ところどころに繊維群があり，根頭部の髄には皮部と同様の油道がある。柔細胞中にはでんぷん粒を満たし，また油滴を認める。

必要に応じて，「サイコ」の確認試験を準用する。

（2）ハンゲ　外面は白色～灰白黄色，上部には茎の跡がくぼみとなり，その周辺には根の跡がくぼんだ細点となっている。横断面は白色，粉性である。味は初めなく，やや粘液性で，後に強いえぐ味を残す。

横切片を鏡検するとき，主としてでんぷん粒を充満した柔組織からなり，わずかにシュウ酸カルシウムの束晶を含んだ粘液細胞がその間に認められる。でんぷん粒は主として 2～3 個の複粒で，通例，径 10～15μm，単粒は通例径 3～7μm である。束晶は長さ 25～150μm である。

（3）オウゴン　外面は黄褐色～暗褐色を呈し，切断面は黄色～帯褐黄色を呈し，縦に繊維性のすじが見られる。味はわずかに苦い。

必要に応じて，「オウゴン」の確認試験を準用する。

（4）ニンジン　外面は淡黄褐色～淡灰褐色を呈し，縦じわがあり，横断面は淡黄褐色を呈し，形成層の付近は褐色を呈する。特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後にやや苦い。

必要に応じて，「ニンジン」の確認試験を準用する。

（5）タイソウ　外面は赤褐色であらいしわがあるか，又は暗灰赤色で細かいしわがあり，いずれもつやがある。外果皮は薄く革質で，中果皮は暗灰褐色を呈し，海綿の様で柔らかく粘着性があり，内果皮は極めて堅く，種子は偏平である。わずかに特異なにおいがあり，味は甘い。

（6）コウブシ　外面は灰褐色～灰黒褐色を呈し，不整な輪節があり，その部分に一方に向かって多数の毛がある。質は堅く，横断面は赤褐色～淡黄色を呈し，ろうようのつやを帯び，皮層部の厚さは中心柱の径とほぼ等しいか又はわずかに薄い。横断面をルーペ視するとき，外面は繊維束が褐色のはん点として輪状に並び，皮層部にはところどころに維管束が赤褐色のはん点として，また分泌細胞が黄褐色の微小なはん点として多数存在する。中心柱には多数の維管束が点又は線として散在する。わずかに特異なにおい及び味がある。

（7）ソヨウ　縮んだ葉の細片で，両面とも帯褐紫色，又は上面は灰緑色～帯褐緑色で下面は帯褐紫色を呈する。茎を交えるものは，その横断面は方形である。葉をルーペ視するとき，両面にまばらに毛を認め，特に葉脈上に多く，裏面には細かい腺毛を認める。もみ砕くとき，特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

（8）カンゾウ　外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現す。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に 1～3 細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には 3～10 細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部

柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞内にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

（９）チンピ　外面は黄赤色～暗黄褐色で，油室による多数の小さいくぼみがあり，内面は白色～淡灰黄褐色である。厚さ約 2mm で，質は軽くてもろい。芳香があり，味は苦くて，わずかに刺激性である。

必要に応じて，「チンピ」の確認試験を準用する。

（10）ショウキョウ　淡灰黄色の周皮をつけたままか，又はその一部をはぎとってあり，表面は灰白色～淡灰褐色で，しばしば白粉を付けている。横断面は繊維性，粉性で，淡帯黄褐色を呈し，皮層と中心柱とに分かれる。横断面をルーペ視するとき，その全面に維管束及び分泌物が褐色の細点として散在している。特異なにおいがあり，味は極めて辛い。

乾燥減量　13%以下。

灰　　分　5%以下。

【 405 】　K198

成分及び分量 又は本質	日本薬局方　タクシャ　5.0g 〃　ビャクジュツ　2.0g 全　量　7.0g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。
効能又は効果	めまい，頭重
貯蔵方法及び 有効期間	密閉容器
規格及び試験方法	別記のとおり。
備考	沢瀉湯

規格及び試験方法

性　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品1包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）タクシャ　淡黄褐色～淡褐色でコルク層を付ける部位はやや暗色を呈する。ルーペ視するとき，褐色～淡褐色のはん点が散在する。切面は粒状で，繊維性ではない。わずかににおい及び味がある。

（2）ビャクジュツ　外面は淡灰黄色～淡黄白色で，ところどころ灰褐色を呈し，横切面には淡黄褐色～褐色の分泌物による細点がある。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，皮部の柔組織中にはしばしば師管の外側に接して繊維束があり，放射組織の末端部には淡褐色～褐色の内容物を含む油室がある。木部には大きい髄を囲んで放射状に配列した短径の道管とそれを囲む著しい繊維束がある。髄及び放射組織中には皮部と同様な油室があり，柔組織中にはイヌリンの小球晶及びシュウ酸カルシウムの針晶を含む。

必要に応じて，「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。

灰　　分　6%以下。

【 406 】 K199

成分及び分量又は本質	日本薬局方 ジオウ 5.0g 〃 サンシュユ 3.0g 〃 サンヤク 3.0g 〃 タクシャ 3.0g 〃 ブクリョウ 3.0g 〃 ボタンピ 3.0g 〃 チモ 3.0g 〃 オウバク 3.0g 全 量 26.0g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。
効能又は効果	体力中等度以下で，疲れやすく胃腸障害がなく，口渇があるものの次の諸症：顔や四肢のほてり，排尿困難，頻尿，むくみ
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器
規格及び試験方法	別記のとおり。
備考	知柏地黄丸料

規格及び試験方法

性　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品1包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（１）ジオウ　外面は黄褐色～黒褐色を呈し，深い縦みぞ及びくびれがある。質は柔らかく粘性である。横断面は黄褐色～黒褐色で，皮部は木部より色が濃く，ほとんど髄を認めない。特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後にやや苦い。

横切片を鏡検するとき，コルク層は 7～15 層で，皮部はすべて柔細胞からなり，外皮部に褐色の分泌物を含む細胞が散在する。木部はほとんど柔細胞で満たされ，放射状に並ぶ道管は側孔のある網紋があり，弱い木化反応を呈する。

（２）サンシュユ　偏圧された長だ円形を呈し，長さ 1.5～2cm，幅約 1cm である。表面は暗赤紫色～暗紫色を呈し，つやがあり，あらいしわがある。表面には種子を抜き取った跡の裂け目があり，頂端にがくの跡があり，基部に果柄の跡がある。質は柔軟である。酸味があって，味はわずかに甘い。

（３）サンヤク　類白色～帯黄白色で，粉質である。味はない。

必要に応じて，「サンヤク」の確認試験を準用する。

（４）タクシャ　淡黄褐色～淡褐色でコルク層を付ける部位はやや暗色を呈する。ルーペ視するとき，褐色～淡褐色のはん点が散在する。切面は粒状で，繊維性ではない。わずかににおい及び味がある。

（５）ブクリョウ　白色又はわずかに淡赤色を帯びた白色で質は堅いが砕きやすい。味はないがやや粘液ようである。

必要に応じて，「ブクリョウ」の確認試験を準用する。

（６）ボタンピ　外面は暗褐色～帯紫褐色，内面は淡灰褐色～暗紫色を呈する。内面及び切断面にはしばしば白色の結晶を付着する。特異なにおいがあり，味はわずかに辛くて苦い。

必要に応じて，「ボタンピ」の確認試験を準用する。

（７）チモ　外面は黄褐色～褐色を呈し，質は軽くて折りやすい。横断面は淡黄褐色を呈し，これをルーペ視するとき，皮層は極めて狭く，広い中心柱には多くの維管束が不規則に点在し，粘液細胞又はその集合による多孔性を示す。味はわずかに甘く，粘液性で，後に苦い。

必要に応じて，「チモ」の確認試験を準用する。

（８）オウバク　外面は灰黄褐色～灰褐色で，内面は黄色～暗黄褐色で，細かい縦線がある。横断面は鮮黄色でやや繊維性である。横切面をルーペ視するとき，皮部外層は黄色で薄く，石細胞が黄褐色の点状に分布する。皮部内層は厚く，一次放射組織は外方に向かうにしたがい幅が広がり，それらの一次放射組織の間に，多くの二次放射組織が集まってほぼ三角形の師部を形成し，この組織に褐色を呈する師部繊維束が層積して接線方向に並び，放射組織と交錯して格子状を呈する。味は極めて苦く，粘液性で，だ液を黄色に染める。

必要に応じて，「オウバク」の確認試験を準用する。

乾燥減量　13%以下。

灰　　分　5%以下。

【 407 】　K200

成分及び分量又は本質	日本薬局方　ケイヒ　4.0g 〃　シャクヤク　6.0g 〃　カンゾウ　2.0g 〃　タイソウ　4.0g 〃　サンショウ　2.0g 〃　カンキョウ　1.0g 〃　ニンジン　3.0g 全　量　22.0g 日本薬局方　コウイ　20.0g
製造方法	コウイを除く以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製し，これにコウイ 20g を添付する。
用法及び用量	本品 1 包に水約 500mL を加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，熱いうちに煎じかすを除き，添付のコウイを煎液に入れ，かきまぜながら 5 分ほど熱してコウイを溶かし，3 回に分けて食間に服用する。上記は大人の 1 日量である。 15 才未満 7 才以上　大人の 2/3，7 才未満 4 才以上　大人の 1/2，4 才未満 2 才以上　大人の 1/3，2 才未満　大人の 1/4 以下を服用する。 本剤は必ず 1 日分ずつ煎じ，数日分をまとめて煎じないこと。
効能又は効果	体力中等度以下で，腹痛を伴うものの次の諸症：慢性胃腸炎，下痢，便秘
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器
規格及び試験方法	別記のとおり。
備考	中建中湯

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品 1 包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）ケイヒ　外面は暗赤褐色を呈し，内面は赤褐色を呈し，平滑である。横断面は赤褐色を呈し淡褐色の薄層が見られる。特異なにおいがあり，味は甘く，辛く，後にやや粘液性で，わずかに収れん性である。

横切片を鏡検するとき，一次皮部と二次皮部はほとんど連続した石細胞環で区分され，環の外辺にはほぼ円形に結集した繊維束を伴い，環の各石細胞の膜はしばしば U 字型に肥厚する。二次皮部中には石細胞を認めず，まばらに少数の厚膜繊維を認める。柔組織中には油細胞，粘液細胞及び微細なシュウ酸カルシウムの針晶を含む細胞があり，柔細胞中にはでんぷん粒を含む。

（2）シャクヤク　外面は褐色～淡灰褐色を呈し，横断面はち密で淡灰褐色を呈し，木部には淡褐色の放射状の線がある。わずかに特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後に渋くてわずかに苦い。

必要に応じて，「シャクヤク」の確認試験を準用する。

（3）カンゾウ　外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現す。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に 1～3 細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には 3～10 細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞内にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

（4）タイソウ　外面は赤褐色であらいしわがあるか，又は暗灰赤色で細かいしわがあり，いずれもつやがある。外果皮は薄く革質で，中果皮は暗灰褐色を呈し，海綿の様で柔らかく粘着性があり，内果皮は極めて堅く，種子は偏平である。わずかに特異なにおいがあり，味は甘い。

（5）サンショウ　偏球形のかく果の果皮で，開裂した径約 5mm の 2 心皮からなり，1 果柄に，通例，2～3 個合着するが，しばしば，そのうちの 1 個は，い縮退化していることがある。外面は暗黄赤色～暗赤褐色で，多数のくぼんだ小点があり，内面は淡黄白色である。特異な芳香があり，味は辛く舌を麻ひする。

横切片を鏡検するとき，外面表皮とこれに接する 1 細胞層中には赤褐色のタンニン質を含み，果皮内部には径約 500μm に達する油室があり，ところどころにらせん紋道管を主とする維管束が点在し，ない層は石細胞層からなり，内面表皮細胞は極めて小さい。

（6）カンキョウ　偏圧した不規則な塊状でしばしば分枝する。分枝した各部はやや湾曲した卵形又は長卵形を呈し，長さ 2～4cm，径 1～2cm である。外面は灰黄色～灰黄褐色で，しわ及び輪節がある。折面は褐色～暗褐色で透明感があり角質である。横切面をルーペ視するとき皮層と中心柱は区分され，全面に維管束が散在する。特異なにおいがあり，味は極めて辛い。

横切片を鏡検するとき，外側よりコルク層，皮層，内皮，中心柱が認められる。皮層と中心柱は一層の内皮によって区分される。皮層及び中心柱は柔組織からなり，繊維束で囲まれた維管束が散在する。柔組織中には黄色の油よう物質を含む油細胞が散在し，柔細胞中にはシュウ酸カルシウムの単晶が含まれ，でんぷんはのり化している。

必要に応じて，「カンキョウ」の確認試験を準用する。

（7）ニンジン　外面は淡黄褐色～淡灰褐色を呈し，縦じわがあり，横断面は淡黄褐色を呈し，形成層の付近は褐色を呈する。特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後にやや苦い。

必要に応じて，「ニンジン」の確認試験を準用する。

乾燥減量　14%以下。

灰　　分　5%以下。

【 408 】　K201

成分及び分量又は本質	日本薬局方　トウキ　3.0g 〃　タクシャ　4.0g 〃　センキュウ　3.0g 〃　シャクヤク　6.0g 〃　ブクリョウ　4.0g 〃　ビャクジュツ　4.0g 〃　オウギ　3.0g 〃　チョウトウコウ　4.0g 全　量　31.0g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。
効能又は効果	体力虚弱で血圧が高く，冷え症で貧血の傾向があり，疲労しやすく，ときに，下腹部痛，頭重，めまい，肩こり，耳鳴り，動悸などを訴えるものの次の諸症：高血圧の随伴症状（のぼせ，肩こり，耳鳴り，頭重）
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器
規格及び試験方法	別記のとおり。
備考	当帰芍薬散料加黄耆釣藤

規格及び試験方法

性　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品1包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（１）トウキ　外面は暗褐色～赤褐色で，縦じわがあり，切断面は淡黄色～黄褐色を呈する。特異なにおいがあり，味はわずかに甘く，後にやや辛い。

横切片を鏡検するとき，コルク層は 4～10 層からなり，その内側に数層の厚角組織が続いている。皮部には分泌細胞に囲まれた多数の樹脂道並びにしばしば大きなすき間がある。形成層は長方形に偏圧された数層の細胞からなり，明らかに皮部と木部を区別する。木部では多数の道管と放射組織とが交互に放射状に配列し，その外方の道管は単独または数個集まってやや密に配列してくさび状をなすが，中心部付近の道管は極めてまばらに存在する。でんぷん粒は径 19μm 以下，まれに 2～5 個の複粒があり，複粒の径は 25μm に達し，しばしばのり化している。

（２）タクシャ　淡黄褐色～淡褐色でコルク層を付ける部位はやや暗色を呈する。ルーペ視するとき，褐色～淡褐色のはん点が散在する。切面は粒状で，繊維性ではない。わずかににおい及び味がある。

（３）センキュウ　外面は灰褐色～暗褐色で，切断面は灰白色～灰褐色，半透明で，ときにはうつろがある。質は密で堅い。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，皮部及び髄には油道が散在する。木部には厚膜で木化した木部繊維が大小不同の群をなして存在する。でんぷん粒は，通例，のり化していて，まれに径 5～25μm のでんぷん粒を認めることがある。シュウ酸カルシウム結晶は認めない。

（４）シャクヤク　外面は褐色～淡灰褐色を呈し，横断面はち密で淡灰褐色を呈し，木部には淡褐色の放射状の線がある。わずかに特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後に渋くてわずかに苦い。

必要に応じて，「シャクヤク」の確認試験を準用する。

（５）ブクリョウ　白色又はわずかに淡赤色を帯びた白色で質は堅いが砕きやすい。味はないがやや粘液ようである。

必要に応じて，「ブクリョウ」の確認試験を準用する。

（６）ビャクジュツ　外面は淡灰黄色～淡黄白色で，ところどころ灰褐色を呈し，横切面には淡黄褐色～褐色の分泌物による細点がある。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，皮部の柔組織中にはしばしば師管の外側に接して繊維束があり，放射組織の末端部には淡褐色～褐色の内容物を含む油室がある。木部には大きい髄を囲んで放射状に配列した短径の道管とそれを囲む著しい繊維束がある。髄及び放射組織中には皮部と同様な油室があり，柔組織中にはイヌリンの小球晶及びシュウ酸カルシウムの針晶を含む。

必要に応じて，「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。

（７）オウギ　外面は淡灰黄色～淡褐黄色で，不規則なあらい縦じわがあり，折面は繊維性である。

横断面をルーペ視するとき，最外層には周皮があり，皮部は淡黄白色，木部は淡黄色，形成層付近はやや褐色を帯びる。木部から皮部にわたって白色の放射組織が認められるが，太いものではしばしば放射状の裂け目となっている。わずかに弱いにおいがあり，味は甘い。

（８）チョウトウコウ　かぎ状のとげ又はとげが対生又は単生する短い茎からなる。とげは長さ 1～4cm で，湾曲して先端はとがり，外面は赤褐色～暗褐色，又は黄褐色を呈し，毛を付けるものもある。横切面は長だ円形～だ円形で，淡褐色を呈する。茎は細長い方柱形～円柱形で，径 2～5mm，外面は赤褐色～暗褐色，又は黄褐色を呈し，横切面は方形で，髄は淡褐色で方形～だ円形を呈するか又は空洞化している。質は堅い。ほとんどにおいがなく，味はほとんどない。

とげの横切面を鏡検するとき，表皮のクチクラは平滑又は歯牙上の細かい凹凸があり，師部に外接する繊維はほぼ環状に配列し，皮部の柔細胞中にはシュウ酸カルシウムの砂晶を認める。

必要に応じて，「チョウトウコウ」の確認試験を準用する。

乾燥減量　13%以下。

灰　　分　5%以下。

【 409 】　K202

成分及び分量又は本質	日本薬局方　トウキ　3.0g 〃　タクシャ　4.0g 〃　センキュウ　3.0g 〃　シャクヤク　6.0g 〃　ブクリョウ　4.0g 〃　ビャクジュツ　4.0g 〃　ニンジン　2.0g 全　量　26.0g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。
効能又は効果	体力虚弱で胃腸が弱く，冷え症で貧血の傾向があり，疲労しやすく，ときに下腹部痛，頭重，めまい，肩こり，耳鳴り，動悸などを訴えるものの次の諸症：月経不順，月経異常，月経痛，更年期障害，産前産後あるいは流産による障害（貧血，疲労倦怠，めまい，むくみ），めまい・立ちくらみ，頭重，肩こり，腰痛，足腰の冷え症，しもやけ，むくみ，しみ，耳鳴り
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器
規格及び試験方法	別記のとおり。
備考	当帰芍薬散料加人参

規格及び試験方法

性　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品１包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（１）トウキ　外面は暗褐色～赤褐色で，縦じわがあり，切断面は淡黄色～黄褐色を呈する。特異なにおいがあり，味はわずかに甘く，後にやや辛い。

横切片を鏡検するとき，コルク層は 4～10 層からなり，その内側に数層の厚角組織が続いている。皮部には分泌細胞に囲まれた多数の樹脂道並びにしばしば大きなすき間がある。形成層は長方形に偏圧された数層の細胞からなり，明らかに皮部と木部を区別する。木部では多数の道管と放射組織とが交互に放射状に配列し，その外方の道管は単独または数個集まってやや密に配列してくさび状をなすが，中心部付近の道管は極めてまばらに存在する。でんぷん粒は径 19μm 以下，まれに 2～5 個の複粒があり，複粒の径は 25μm に達し，しばしばのり化している。

（２）タクシャ　淡黄褐色～淡褐色でコルク層を付ける部位はやや暗色を呈する。ルーペ視するとき，褐色～淡褐色のはん点が散在する。切面は粒状で，繊維性ではない。わずかににおい及び味がある。

（３）センキュウ　外面は灰褐色～暗褐色で，切断面は灰白色～灰褐色，半透明で，ときにはうつろがある。質は密で堅い。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，皮部及び髄には油道が散在する。木部には厚膜で木化した木部繊維が大小不同の群をなして存在する。でんぷん粒は，通例，のり化していて，まれに径 5～25μm のでんぷん粒を認めることがある。シュウ酸カルシウム結晶は認めない。

（４）シャクヤク　外面は褐色～淡灰褐色を呈し，横断面はち密で淡灰褐色を呈し，木部には淡褐色の放射状の線がある。わずかに特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後に渋くてわずかに苦い。

必要に応じて，「シャクヤク」の確認試験を準用する。

（５）ブクリョウ　白色又はわずかに淡赤色を帯びた白色で質は堅いが砕きやすい。味はないがやや粘液ようである。

必要に応じて，「ブクリョウ」の確認試験を準用する。

（６）ビャクジュツ　外面は淡灰黄色～淡黄白色で，ところどころ灰褐色を呈し，横切面には淡黄褐色～褐色の分泌物による細点がある。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，皮部の柔組織中にはしばしば師管の外側に接して繊維束があり，放射組織の末端部には淡褐色～褐色の内容物を含む油室がある。木部には大きい髄を囲んで放射状に配列した短径の道管とそれを囲む著しい繊維束がある。髄及び放射組織中には皮部と同様な油室があり，柔組織中にはイヌリンの小球晶及びシュウ酸カルシウムの針晶を含む。

必要に応じて，「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。

（７）ニンジン　外面は淡黄褐色～淡灰褐色を呈し，縦じわがあり，横断面は淡黄褐色を呈し，形成層の付近は褐色を呈する。特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後にやや苦い。

必要に応じて，「ニンジン」の確認試験を準用する。

乾燥減量　14%以下。

灰　　分　5%以下。

【 410 】　K203

成分及び分量又は本質	日本薬局方　キキョウ　4.0g 〃　カンゾウ　3.0g 〃　タイソウ　3.0g 〃　シャクヤク　3.0g 〃　ショウキョウ　1.0g 〃　キジツ　3.0g 全　量　17.0g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，熱いうちに煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。 本剤は必ず1日分ずつ煎じ，数日分をまとめて煎じないこと。
効能又は効果	化膿性皮膚疾患の初期又は軽いもの，歯肉炎，扁桃炎
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器
規格及び試験方法	別記のとおり。
備考	排膿散及湯

規格及び試験方法

性　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品1包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）キキョウ　外面は皮付きは灰褐色，皮去りは白色～淡褐色を呈し，繊維性ではない。横切面をルーペ視するとき，皮部は木部よりやや薄く，ほとんど白色で，ところどころにすき間があり，形成層の付近はしばしば褐色を帯びる。皮部の厚さは木部の径よりやや薄く，ほとん

ど白色で，ところどころすき間があり，木部は白色～淡褐色を呈し，その組織は皮部よりもやや密である。味は初めなく，後にえぐくて苦い。

必要に応じて，「キキョウ」の確認試験を準用する。

（２）カンゾウ　外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現す。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に 1～3 細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には 3～10 細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞内にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

（３）タイソウ　外面は赤褐色であらいしわがあるか，又は暗灰赤色で細かいしわがあり，いずれもつやがある。外果皮は薄く革質で，中果皮は暗灰褐色を呈し，海綿の様で柔らかく粘着性があり，内果皮は極めて堅く，種子は偏平である。わずかに特異なにおいがあり，味は甘い。

（４）シャクヤク　外面は褐色～淡灰褐色を呈し，横断面はち密で淡灰褐色を呈し，木部には淡褐色の放射状の線がある。わずかに特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後に渋くてわずかに苦い。

必要に応じて，「シャクヤク」の確認試験を準用する。

（５）ショウキョウ　淡灰黄色の周皮をつけたままか，又はその一部をはぎとってあり，表面は灰白色～淡灰褐色で，しばしば白粉を付けている。横断面は繊維性，粉性で，淡帯黄褐色を呈し，皮層と中心柱とに分かれる。横断面をルーペ視するとき，その全面に維管束及び分泌物が褐色の細点として散在している。特異なにおいがあり，味は極めて辛い。

（６）キジツ　外面は濃緑褐色～褐色で，つやがなく，油室による多数のくぼんだ小点がある。切断面は淡灰褐色を呈し，内果皮を付ける部分は褐色を呈する。特異なにおいがあり，味は苦い。

必要に応じて，「キジツ」の確認試験を準用する。

乾燥減量　13%以下。

灰　　分　6%以下。

【 411 】　K204

成分及び分量 又は本質	日本薬局方　ハンゲ　3.0g 〃　ブクリョウ　3.0g 〃　チンピ　3.0g 〃　タイソウ　2.0g 〃　カンゾウ　2.0g 〃　コウボク　6.0g 〃　ニンジン　3.0g 〃　カッコウ　3.0g 〃　ビャクジュツ　3.0g 〃　ショウキョウ　1.0g 全　量　29.0g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。
効能又は効果	体力虚弱で，胃腸が弱いものの次の諸症：発熱，下痢，嘔吐，食欲不振のいずれかを伴う感冒
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器
規格及び試験方法	別記のとおり。
備考	八解散料

規格及び試験方法

性　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品 1 包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）ハンゲ　外面は白色～灰白黄色，上部には茎の跡がくぼみとなり，その周辺には根の跡がくぼんだ細点となっている。横断面は白色，粉性である。味は初めなく，やや粘液性で，後に強いえぐ味を残す。

横切片を鏡検するとき，主としてでんぷん粒を充満した柔組織からなり，わずかにシュウ酸カルシウムの束晶を含んだ粘液細胞がその間に認められる。でんぷん粒は主として 2～3 個の複粒で，通例，径 10～15μm，単粒は通例径 3～7μm である。束晶は長さ 25～150μm である。

（2）ブクリョウ　白色又はわずかに淡赤色を帯びた白色で質は堅いが砕きやすい。味はないがやや粘液ようである。

必要に応じて，「ブクリョウ」の確認試験を準用する。

（3）チンピ　外面は黄赤色～暗黄褐色で，油室による多数の小さいくぼみがあり，内面は白色～淡灰黄褐色である。厚さ約 2mm で，質は軽くてもろい。芳香があり，味は苦くて，わずかに刺激性である。

必要に応じて，「チンピ」の確認試験を準用する。

（4）タイソウ　外面は赤褐色であらいしわがあるか，又は暗灰赤色で細かいしわがあり，いずれもつやがある。外果皮は薄く革質で，中果皮は暗灰褐色を呈し，海綿の様で柔らかく粘着性があり，内果皮は極めて堅く，種子は偏平である。わずかに特異なにおいがあり，味は甘い。

（5）カンゾウ　外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現す。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に 1～3 細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には 3～10 細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞内にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

（6）コウボク　外面は灰白色～灰褐色を呈し，内面は淡褐色～褐色，切断面は淡赤褐色を呈し，繊維性である。わずかに芳香があり，味は苦い。

横切片を鏡検するとき，コルク層は厚く，ほぼ等径性の石細胞が環状に内接する。一次皮部は狭く，内しょう部には繊維群が点在し，二次皮部の放射組織間には師部繊維群が階段状に並ぶ。油細胞の多数は一次皮部に，少数は二次皮部に散在し，狭い放射組織内にも認められることがある。

必要に応じて，「コウボク」の確認試験を準用する。

（7）ニンジン　外面は淡黄褐色～淡灰褐色を呈し，縦じわがあり，横断面は淡黄褐色を呈し，形成層の付近は褐色を呈する。特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後にやや苦い。

必要に応じて，「ニンジン」の確認試験を準用する。

（8）カッコウ　茎及びこれに対生した葉からなる。葉はしわがよって縮み，水に浸してしわを伸ばすと，卵形～卵状長だ円形を呈し，長さ 2.5～10cm，幅 2.5～7cm，辺縁に鈍きょ歯があり，基部は広いくさび形で葉柄を付ける。葉の上面は暗褐色，下面は灰褐色を呈し，両面に

密に毛がある。茎は方柱形，中実で，表面は灰緑色を呈し，灰白色～黄白色の毛があり，髄は大きく，類白色で海綿状を呈する。ルーペ視するとき，毛，腺毛及び腺りんを認める。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

葉柄の横切片を鏡検するとき，向軸面中央は大きく突出し，その表皮の内側に厚角細胞が認められている。中央部には扇状に配列した維管束がある。茎の横切片を鏡検するとき，表皮の内側に数細胞層の厚角組織が見られる。ときに表皮下にコルク層が発達することがある。皮層の内側には並立維管束が環状に配列し，師部の外側に師部繊維群が認められる。皮層の柔細胞中に油滴が，髄の柔細胞中にシュウ酸カルシウムの針晶，単晶又は柱状晶が認められる。

必要に応じて，「カッコウ」の確認試験を準用する。

（９）ビャクジュツ　外面は淡灰黄色～淡黄白色で，ところどころ灰褐色を呈し，横切面には淡黄褐色～褐色の分泌物による細点がある。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，皮部の柔組織中にはしばしば師管の外側に接して繊維束があり，放射組織の末端部には淡褐色～褐色の内容物を含む油室がある。木部には大きい髄を囲んで放射状に配列した短径の道管とそれを囲む著しい繊維束がある。髄及び放射組織中には皮部と同様な油室があり，柔組織中にはイヌリンの小球晶及びシュウ酸カルシウムの針晶を含む。

必要に応じて，「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。

（10）ショウキョウ　淡灰黄色の周皮をつけたままか，又はその一部をはぎとってあり，表面は灰白色～淡灰褐色で，しばしば白粉を付けている。横断面は繊維性，粉性で，淡帯黄褐色を呈し，皮層と中心柱とに分かれる。横断面をルーペ視するとき，その全面に維管束及び分泌物が褐色の細点として散在している。特異なにおいがあり，味は極めて辛い。

乾燥減量　14%以下。

灰　　分　6%以下。

【 412 】　K205

成分及び分量又は本質	日本薬局方　ジオウ　5.0g 〃　サンシュユ　3.0g 〃　サンヤク　3.0g 〃　タクシャ　3.0g 〃　ブクリョウ　3.0g 〃　ボタンピ　3.0g 〃　バクモンドウ　6.0g 〃　ゴミシ　2.0g 全　量　28.0g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。
効能又は効果	体力中等度以下で，疲れやすく胃腸障害がなく，ときにせき，口渇があるものの次の諸症：下肢痛，腰痛，しびれ，高齢者のかすみ目，かゆみ，排尿困難，頻尿，むくみ，息切れ，からぜき
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器
規格及び試験方法	別記のとおり。
備考	味麦地黄丸料

規格及び試験方法

性　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品1包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（１）ジオウ　外面は黄褐色～黒褐色を呈し，深い縦みぞ及びくびれがある。質は柔らかく粘性である。横断面は黄褐色～黒褐色で，皮部は木部より色が濃く，ほとんど髄を認めない。特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後にやや苦い。

横切片を鏡検するとき，コルク層は 7～15 層で，皮部はすべて柔細胞からなり，外皮部に褐色の分泌物を含む細胞が散在する。木部はほとんど柔細胞で満たされ，放射状に並ぶ道管は側孔のある網紋があり，弱い木化反応を呈する。

（２）サンシュユ　偏圧された長だ円形を呈し，長さ 1.5～2cm，幅約 1cm である。表面は暗赤紫色～暗紫色を呈し，つやがあり，あらいしわがある。表面には種子を抜き取った跡の裂け目があり，頂端にがくの跡があり，基部に果柄の跡がある。質は柔軟である。酸味があって，味はわずかに甘い。

（３）サンヤク　類白色～帯黄白色で，粉質である。味はない。

必要に応じて，「サンヤク」の確認試験を準用する。

（４）タクシャ　淡黄褐色～淡褐色でコルク層を付ける部位はやや暗色を呈する。ルーペ視するとき，褐色～淡褐色のはん点が散在する。切面は粒状で，繊維性ではない。わずかににおい及び味がある。

（５）ブクリョウ　白色又はわずかに淡赤色を帯びた白色で質は堅いが砕きやすい。味はないがやや粘液ようである。

必要に応じて，「ブクリョウ」の確認試験を準用する。

（６）ボタンピ　外面は暗褐色～帯紫褐色，内面は淡灰褐色～暗紫色を呈する。内面及び切断面にはしばしば白色の結晶を付着する。特異なにおいがあり，味はわずかに辛くて苦い。

必要に応じて，「ボタンピ」の確認試験を準用する。

（７）バクモンドウ　紡錘形を呈し，長さ 10～25mm，径 3～5mm，一端はややとがり，他端はやや丸みをもち，外面は淡黄色～淡黄褐色で，大小の縦じわがある。皮層は柔軟性でもろく，中心柱は強じんで折りにくい。皮層の折面は淡黄褐色を呈し，やや半透明で粘着性がある。味はわずかに甘く，粘着性である。

（８）ゴミシ　暗赤色～黒褐色を呈し，表面にはしわがあり，またしばしば白い粉を付ける。果肉を除くとじん臓型の種子 1～2 個を認め，その外種皮は黄褐色～暗赤褐色を呈し，つやがあり，堅くてもろい。外種皮はたやすくはがれるが，内種皮は胚乳に密着し，背面に明らかな縫線を認める。酸味があり，後に渋くて苦い。

乾燥減量　14%以下。

灰　　分　5%以下。

【 413 】　K206

成分及び分量 又は本質	日本薬局方　ブクリョウ　4.0g 〃　サイシン　2.0g 〃　ケイヒ　3.0g 〃　オウレン　2.0g 〃　ビャクジュツ　2.0g 〃　カンゾウ　2.0g 〃　シャゼンシ　2.0g 全　量　17.0g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。
効能又は効果	体力中等度で，ときにめまい，ふらつき，動悸があるものの次の諸症：急・慢性結膜炎，目の充血，流涙（なみだ目）
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器
規格及び試験方法	別記のとおり。
備考	明朗飲

規格及び試験方法

性　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品1包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）ブクリョウ　白色又はわずかに淡赤色を帯びた白色で質は堅いが砕きやすい。味はないがやや粘液ようである。

必要に応じて，「ブクリョウ」の確認試験を準用する。

（２）サイシン　根の外面は淡褐色で，径約 1mm，切断面は黄白色である。根茎は不整に湾曲し外面は暗褐色を呈する。特異なにおいがあり，味は辛く舌をやや麻ひする。

（３）ケイヒ　外面は暗赤褐色を呈し，内面は赤褐色を呈し，平滑である。横断面は赤褐色を呈し淡褐色の薄層が見られる。特異なにおいがあり，味は甘く，辛く，後にやや粘液性で，わずかに収れん性である。

横切片を鏡検するとき，一次皮部と二次皮部はほとんど連続した石細胞環で区分され，環の外辺にはほぼ円形に結集した繊維束を伴い，環の各石細胞の膜はしばしば U 字型に肥厚する。二次皮部中には石細胞を認めず，まばらに少数の厚膜繊維を認める。柔組織中には油細胞，粘液細胞及び微細なシュウ酸カルシウムの針晶を含む細胞があり，柔細胞中にはでんぷん粒を含む。

（４）オウレン　根茎の径は 2～7mm で，外面は灰黄褐色～褐色を呈し，輪節及び多数の根の基部を認め，横断面はやや繊維性で，コルク層は淡灰褐色，皮部は黄褐色，木部は黄色，髄は黄褐色である。味は極めて苦く，残留性で，だ液を黄色に染める。

横切片を鏡検するとき，コルク層は薄膜のコルク細胞からなり，皮部柔組織中にはコルク層に近い部位に石細胞群，形成層に近い部位に黄色の師部繊維の認められるものが多い。木部は主として道管，仮道管，木部繊維からなり，放射組織は明らかで，髄は大きく，髄中には石細胞あるいは厚膜木化した細胞を伴った石細胞を認めることがある。柔細胞には細かいでんぷん粒を含むが，結晶を含まない。

必要に応じて，「オウレン」の確認試験を準用する。

（５）ビャクジュツ　外面は淡灰黄色～淡黄白色で，ところどころ灰褐色を呈し，横切面には淡黄褐色～褐色の分泌物による細点がある。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，皮部の柔組織中にはしばしば師管の外側に接して繊維束があり，放射組織の末端部には淡褐色～褐色の内容物を含む油室がある。木部には大きい髄を囲んで放射状に配列した短径の道管とそれを囲む著しい繊維束がある。髄及び放射組織中には皮部と同様な油室があり，柔組織中にはイヌリンの小球晶及びシュウ酸カルシウムの針晶を含む。

必要に応じて，「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。

（６）カンゾウ　外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現す。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に 1～3 細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には 3～10 細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞内にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

（７）シャゼンシ　長さ 2～2.5mm，幅 0.7～1mm，厚さ 0.3～0.5mm の偏だ円体で，つやのある褐色～黄褐色を呈する。ルーペ視するとき，ほぼ平滑で背面は球状に隆起するが，腹面はややくぼんでいる。珠孔及び縫線は認められない。味はわずかに苦く，粘液性である。

横切片を鏡検するとき，種皮は粘液を含む表皮，栄養層及びほぼ等径性の細胞からなる色素層の 3 層からなり，その内部には種皮より厚い内乳が 2 枚の子葉を包んでいる。

必要に応じて，「シャゼンシ」の確認試験を準用する。

乾燥減量　13%以下。

灰　　分　5%以下。

【 414 】　K207

成分及び分量 又は本質	日本薬局方　トウキ　3.0g 〃　チョウトウコウ　3.0g 〃　センキュウ　3.0g 〃　ビャクジュツ　4.0g 〃　ブクリョウ　4.0g 〃　サイコ　2.0g 〃　カンゾウ　1.5g 〃　シャクヤク　4.0g 〃　オウレン　0.3g 全　量　24.8g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。
効能又は効果	体力中等度以上をめやすとして，神経のたかぶりが強く，怒りやすい，イライラなどがあるものの次の諸症：神経症，不眠症，小児夜泣き，小児疳症（神経過敏），歯ぎしり，更年期障害，血の道症
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器
規格及び試験方法	別記のとおり。
備考	抑肝散料加芍薬黄連

規格及び試験方法

性　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品 1 包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）トウキ　外面は暗褐色～赤褐色で，縦じわがあり，切断面は淡黄色～黄褐色を呈する。特異なにおいがあり，味はわずかに甘く，後にやや辛い。

横切片を鏡検するとき，コルク層は 4～10 層からなり，その内側に数層の厚角組織が続いている。皮部には分泌細胞に囲まれた多数の樹脂道並びにしばしば大きなすき間がある。形成層は長方形に偏圧された数層の細胞からなり，明らかに皮部と木部を区別する。木部では多数の道管と放射組織とが交互に放射状に配列し，その外方の道管は単独または数個集まってやや密に配列してくさび状をなすが，中心部付近の道管は極めてまばらに存在する。でんぷん粒は径 19μm 以下，まれに 2～5 個の複粒があり，複粒の径は 25μm に達し，しばしばのり化している。

（2）チョウトウコウ　かぎ状のとげ又はとげが対生又は単生する短い茎からなる。とげは長さ 1～4cm で，湾曲して先端はとがり，外面は赤褐色～暗褐色，又は黄褐色を呈し，毛を付けるものもある。横切面は長だ円形～だ円形で，淡褐色を呈する。茎は細長い方柱形～円柱形で，径 2～5mm，外面は赤褐色～暗褐色，又は黄褐色を呈し，横切面は方形で，髄は淡褐色で方形～だ円形を呈するか又は空洞化している。質は堅い。ほとんどにおいがなく，味はほとんどない。

とげの横切面を鏡検するとき，表皮のクチクラは平滑又は歯牙上の細かい凹凸があり，師部に外接する繊維はほぼ環状に配列し，皮部の柔細胞中にはシュウ酸カルシウムの砂晶を認める。

必要に応じて，「チョウトウコウ」の確認試験を準用する。

（3）センキュウ　外面は灰褐色～暗褐色で，切断面は灰白色～灰褐色，半透明で，ときにはうつろがある。質は密で堅い。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，皮部及び髄には油道が散在する。木部には厚膜で木化した木部繊維が大小不同の群をなして存在する。でんぷん粒は，通例，のり化していて，まれに径 5～25μm のでんぷん粒を認めることがある。シュウ酸カルシウム結晶は認めない。

（4）ビャクジュツ　外面は淡灰黄色～淡黄白色で，ところどころ灰褐色を呈し，横切面には淡黄褐色～褐色の分泌物による細点がある。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，皮部の柔組織中にはしばしば師管の外側に接して繊維束があり，放射組織の末端部には淡褐色～褐色の内容物を含む油室がある。木部には大きい髄を囲んで放射状に配列した短径の道管とそれを囲む著しい繊維束がある。髄及び放射組織中には皮部と同様な油室があり，柔組織中にはイヌリンの小球晶及びシュウ酸カルシウムの針晶を含む。

必要に応じて，「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。

（5）ブクリョウ　白色又はわずかに淡赤色を帯びた白色で質は堅いが砕きやすい。味はないがやや粘液ようである。

必要に応じて，「ブクリョウ」の確認試験を準用する。

（6）サイコ　外面は灰褐色～褐色で，深いしわがあるものがあり，横断面では，皮部は褐色，木部は淡褐色を呈する。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，皮部にはしばしば接線方向に長い裂け目があり，皮部の厚さは半径の 1/3～1/2 で，径 15～35μm の胞間性離生油道がやや多数散在し，木部には道管が放射状若しくはほぼ階段状に配列し，ところどころに繊維群があり，根頭部の髄には皮部と同様の油道がある。柔細胞中にはでんぷん粒を満たし，また油滴を認める。

必要に応じて，「サイコ」の確認試験を準用する。

（７）カンゾウ　外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現す。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に 1～3 細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には 3～10 細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞内にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

（８）シャクヤク　外面は褐色～淡灰褐色を呈し，横断面はち密で淡灰褐色を呈し，木部には淡褐色の放射状の線がある。わずかに特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後に渋くてわずかに苦い。

必要に応じて，「シャクヤク」の確認試験を準用する。

（９）オウレン　根茎の径は 2～7mm で，外面は灰黄褐色～褐色を呈し，輪節及び多数の根の基部を認め，横断面はやや繊維性で，コルク層は淡灰褐色，皮部は黄褐色，木部は黄色，髄は黄褐色である。味は極めて苦く，残留性で，だ液を黄色に染める。

横切片を鏡検するとき，コルク層は薄膜のコルク細胞からなり，皮部柔組織中にはコルク層に近い部位に石細胞群，形成層に近い部位に黄色の師部繊維の認められるものが多い。木部は主として道管，仮道管，木部繊維からなり，放射組織は明らかで，髄は大きく，髄中には石細胞あるいは厚膜木化した細胞を伴った石細胞を認めることがある。柔細胞には細かいでんぷん粒を含むが，結晶を含まない。

必要に応じて，「オウレン」の確認試験を準用する。

乾燥減量　13%以下。

灰　　分5%以下。

【 415 】　K208

成分及び分量又は本質	日本薬局方　トウキ　4.0g 〃　ビャクジュツ　2.0g 〃　センキュウ　4.0g 〃　カンゾウ　2.0g 〃　シャクヤク　4.0g 〃　ジオウ　4.0g 〃　ブクリョウ　4.0g 〃　ケイヒ　3.0g 全　量　27.0g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。
効能又は効果	体力中等度又はやや虚弱で，ときにのぼせ，ふらつきがあるものの次の諸症：更年期障害，立ちくらみ，めまい，動悸，息切れ，貧血
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器
規格及び試験方法	別記のとおり。
備考	連珠飲

規格及び試験方法

性　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品1包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（１）トウキ　外面は暗褐色～赤褐色で，縦じわがあり，切断面は淡黄色～黄褐色を呈する。特異なにおいがあり，味はわずかに甘く，後にやや辛い。

横切片を鏡検するとき，コルク層は 4～10 層からなり，その内側に数層の厚角組織が続いている。皮部には分泌細胞に囲まれた多数の樹脂道並びにしばしば大きなすき間がある。形成層は長方形に偏圧された数層の細胞からなり，明らかに皮部と木部を区別する。木部では多数の道管と放射組織とが交互に放射状に配列し，その外方の道管は単独または数個集まってやや密に配列してくさび状をなすが，中心部付近の道管は極めてまばらに存在する。でんぷん粒は径 19μm 以下，まれに 2～5 個の複粒があり，複粒の径は 25μm に達し，しばしばのり化している。

（２）ビャクジュツ　外面は淡灰黄色～淡黄白色で，ところどころ灰褐色を呈し，横切面には淡黄褐色～褐色の分泌物による細点がある。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，皮部の柔組織中にはしばしば師管の外側に接して繊維束があり，放射組織の末端部には淡褐色～褐色の内容物を含む油室がある。木部には大きい髄を囲んで放射状に配列した短径の道管とそれを囲む著しい繊維束がある。髄及び放射組織中には皮部と同様な油室があり，柔組織中にはイヌリンの小球晶及びシュウ酸カルシウムの針晶を含む。

必要に応じて，「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。

（３）センキュウ　外面は灰褐色～暗褐色で，切断面は灰白色～灰褐色，半透明で，ときにはうつろがある。質は密で堅い。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，皮部及び髄には油道が散在する。木部には厚膜で木化した木部繊維が大小不同の群をなして存在する。でんぷん粒は，通例，のり化していて，まれに径 5～25μm のでんぷん粒を認めることがある。シュウ酸カルシウム結晶は認めない。

（４）カンゾウ　外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現す。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に 1～3 細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には 3～10 細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞内にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

（５）シャクヤク　外面は褐色～淡灰褐色を呈し，横断面はち密で淡灰褐色を呈し，木部には淡褐色の放射状の線がある。わずかに特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後に渋くてわずかに苦い。

必要に応じて，「シャクヤク」の確認試験を準用する。

（６）ジオウ　外面は黄褐色～黒褐色を呈し，深い縦みぞ及びくびれがある。質は柔らかく粘性である。横断面は黄褐色～黒褐色で，皮部は木部より色が濃く，ほとんど髄を認めない。特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後にやや苦い。

横切片を鏡検するとき，コルク層は 7～15 層で，皮部はすべて柔細胞からなり，外皮部に褐色の分泌物を含む細胞が散在する。木部はほとんど柔細胞で満たされ，放射状に並ぶ道管は側孔のある網紋があり，弱い木化反応を呈する。

（７）ブクリョウ　白色又はわずかに淡赤色を帯びた白色で質は堅いが砕きやすい。味はないがやや粘液ようである。

必要に応じて，「ブクリョウ」の確認試験を準用する。

（８）ケイヒ　外面は暗赤褐色を呈し，内面は赤褐色を呈し，平滑である。横断面は赤褐色を呈し淡褐色の薄層が見られる。特異なにおいがあり，味は甘く，辛く，後にやや粘液性で，わずかに収れん性である。

横切片を鏡検するとき，一次皮部と二次皮部はほとんど連続した石細胞環で区分され，環の外辺にはほぼ円形に結集した繊維束を伴い，環の各石細胞の膜はしばしばU字型に肥厚する。二次皮部中には石細胞を認めず，まばらに少数の厚膜繊維を認める。柔組織中には油細胞，粘液細胞及び微細なシュウ酸カルシウムの針晶を含む細胞があり，柔細胞中にはでんぷん粒を含む。

乾燥減量　14%以下。

灰　　分　6%以下。

【 416 】　K209

成分及び分量又は本質	日本薬局方	ハンゲ	5.0g
	〃	サイコ	3.0g
	局外生規	ドベッコウ	3.0g
	日本薬局方	キキョウ	3.0g
	〃	ビンロウジ	3.0g
	〃	ニンジン	2.0g
	〃	ショウキョウ	1.0g
	〃	キジツ	1.0g
	〃	ゴシュユ	1.0g
		全　量	22.0g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。		
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。		
効能又は効果	体力中等度で，みぞおちに抵抗感があって，肩がこり，足が冷えるものの次の諸症：慢性胃炎，胃痛，食欲不振		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	延年半夏湯		

規格及び試験方法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品1包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（１）ハンゲ　外面は白色～灰白黄色，上部には茎の跡がくぼみとなり，その周辺には根の跡がくぼんだ細点となっている。横断面は白色，粉性である。味は初めなく，やや粘液性で，後に強いえぐ味を残す。

横切片を鏡検するとき，主としてでんぷん粒を充満した柔組織からなり，わずかにシュウ酸カルシウムの束晶を含んだ粘液細胞がその間に認められる。でんぷん粒は主として 2～3 個の複粒で，通例，径 10～15μm，単粒は通例径 3～7μm である。束晶は長さ 25～150μm である。

（２）サイコ　外面は灰褐色～褐色で，深いしわがあるものがあり，横断面では，皮部は褐色，木部は淡褐色を呈する。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，皮部にはしばしば接線方向に長い裂け目があり，皮部の厚さは半径の 1/3～1/2 で，径 15～35μm の胞間性離生油道がやや多数散在し，木部には道管が放射状若しくはほぼ階段状に配列し，ところどころに繊維群があり，根頭部の髄には皮部と同様の油道がある。柔細胞中にはでんぷん粒を満たし，また油滴を認める。

必要に応じて，「サイコ」の確認試験を準用する。

（３）ドベッコウ　不整皿状に湾曲した広だ円形～卵円形で，長さ 10～20cm，幅 7～15cm，厚さ 1.5～3mm，外面は黒褐色～黒緑色で，中央部はわずかに骨節が隆起し，両側に肋骨ようの線紋と細かいしわがある。内面は類白色で中央に隆起した脊椎骨があり，肋骨は 8 対で，左右に突出する。角質で堅く，折りやすい。特異なにおいがあり，味はほとんどない。

（４）キキョウ　外面は皮付きは灰褐色，皮去りは白色～淡褐色を呈し，繊維性ではない。横切面をルーペ視するとき，皮部は木部よりやや薄く，ほとんど白色で，ところどころにすき間があり，形成層の付近はしばしば褐色を帯びる。皮部の厚さは木部の径よりやや薄く，ほとんど白色で，ところどころすき間があり，木部は白色～淡褐色を呈し，その組織は皮部よりもやや密である。味は初めなく，後にえぐくて苦い。

必要に応じて，「キキョウ」の確認試験を準用する。

（５）ビンロウジ　灰褐色の種皮が白色の胚乳中に入り込んで大理石ようの模様を呈する。味は渋くてわずかに苦い。

必要に応じて，「ビンロウジ」の確認試験を準用する。

（６）ニンジン　外面は淡黄褐色～淡灰褐色を呈し，縦じわがあり，横断面は淡黄褐色を呈し，形成層の付近は褐色を呈する。特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後にやや苦い。

必要に応じて，「ニンジン」の確認試験を準用する。

（７）ショウキョウ　淡灰黄色の周皮をつけたままか，又はその一部をはぎとってあり，表面は灰白色～淡灰褐色で，しばしば白粉を付けている。横断面は線維性，粉性で，淡帯黄褐色を呈し，皮層と中心柱とに分かれる。横断面をルーペ視するとき，その全面に維管束及び分泌物が褐色の細点として散在している。特異なにおいがあり，味は極めて辛い。

（８）キジツ　外面は濃緑褐色～褐色で，つやがなく，油室による多数のくぼんだ小点がある。切断面は淡灰褐色を呈し，内果皮を付ける部分は褐色を呈する。特異なにおいがあり，味は苦い。

必要に応じて，「キジツ」の確認試験を準用する。

（９）ゴシュユ　偏球形又は球形を呈し，外面は暗褐色～灰褐色，多くの油室がくぼんだ小点として認められ，その中心には花柱の残基があるが，しばしばこれは脱落している。花柄は長さ 2～5ｍｍで，灰緑色の毛を密生している。果皮は，通例，開裂し，子房は 5 室に分かれ，各

室中には倒卵球形又は球形の褐色～黒褐色又は帯青黒色のつやのある種子が存在する。特異なにおいがあり，味は辛く，後に残留性の苦味がある。

必要に応じて，「ゴシュユ」の確認試験を準用する。

乾燥減量　14%以下。

灰　　分　20%以下。

【 417 】　K210

成分及び分量又は本質	日本薬局方	オウレン	2.0g
	〃	オウゴン	2.0g
	〃	オウバク	2.0g
	〃	サンシシ	2.0g
	〃	サイコ	2.0g
	〃	インチンコウ	2.0g
	〃	リュウタン	2.0g
	〃	モクツウ	2.0g
	〃	カッセキ	3.0g
	〃	ショウマ	1.5g
	〃	カンゾウ	1.5g
	局外生規	トウシンソウ	1.5g
	日本薬局方	ダイオウ	0～1.5g
		全　　量	23.5～25.0g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。		
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。		
効能又は効果	比較的体力があり，血色がよいものの次の諸症：小便がしぶって出にくいもの，痔疾（いぼ痔，痔痛，痔出血）		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	加味解毒湯		

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品 1 包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）オウレン　根茎の径は 2～7mm で，外面は灰黄褐色～褐色を呈し，輪節及び多数の根の基部を認め，横断面はやや繊維性で，コルク層は淡灰褐色，皮部は黄褐色，木部は黄色，髄は黄褐色である。味は極めて苦く，残留性で，だ液を黄色に染める。

横切片を鏡検するとき，コルク層は薄膜のコルク細胞からなり，皮部柔組織中にはコルク層に近い部位に石細胞群，形成層に近い部位に黄色の師部繊維の認められるものが多い。木部は主として道管，仮道管，木部繊維からなり，放射組織は明らかで，髄は大きく，髄中には石細胞あるいは厚膜木化した細胞を伴った石細胞を認めることがある。柔細胞には細かいでんぷん粒を含むが，結晶を含まない。

必要に応じて，「オウレン」の確認試験を準用する。

（2）オウゴン　外面は黄褐色～暗褐色を呈し，切断面は黄色～帯褐黄色を呈し，縦に繊維性のすじが見られる。味はわずかに苦い。

必要に応じて，「オウゴン」の確認試験を準用する。

（3）オウバク　外面は灰黄褐色～灰褐色で，内面は黄色～暗黄褐色で，細かい縦線がある。横断面は鮮黄色でやや繊維性である。横切面をルーペ視するとき，皮部外層は黄色で薄く，石細胞が黄褐色の点状に分布する。皮部内層は厚く，一次放射組織は外方に向かうにしたがい幅が広がり，それらの一次放射組織の間に，多くの二次放射組織が集まってほぼ三角形の師部を形成し，この組織に褐色を呈する師部繊維束が層積して接線方向に並び，放射組織と交錯して格子状を呈する。味は極めて苦く，粘液性で，だ液を黄色に染める。

必要に応じて，「オウバク」の確認試験を準用する。

（4）サンシシ　果皮は薄く砕きやすく，その外面は赤褐色，黄褐色を呈し，内面は黄褐色を呈し，平らでつやがある。果実の内部は 2 室に分かれ，黄赤色～暗赤色の果肉中に黒褐色又は黄赤色で長径約 5mm の偏平な種子の団塊を含む。質は軽い。特異なにおいがあり，味は苦い。

必要に応じて，「サンシシ」の確認試験を準用する。

（5）サイコ　外面は灰褐色～褐色で，深いしわがあるものがあり，横断面では，皮部は褐色，木部は淡褐色を呈する。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，皮部にはしばしば接線方向に長い裂け目があり，皮部の厚さは半径の 1/3～1/2 で，径 15～35μm の胞間性離生油道がやや多数散在し，木部には道管が放射状若しくはほぼ階段状に配列し，ところどころに繊維群があり，根頭部の髄には皮部と同様の油道がある。柔細胞中にはでんぷん粒を満たし，また油滴を認める。

必要に応じて，「サイコ」の確認試験を準用する。

（6）インチンコウ　卵形～球形の長さ 1.5～2mm，径約 2mm の頭花を主とし，糸状の葉と花序軸からなる。頭花の外面は淡緑色～淡黄褐色，葉の外面は緑色～緑褐色，花序軸の外面は緑褐色～暗褐色を呈する。頭花をルーペ視するとき，膜質の総ほう片及び筒花又はそう果が見られる。特異な弱いにおいがあり，味はやや辛く，わずかに麻ひ性である。

必要に応じて，「インチンコウ」の確認試験を準用する。

（7）リュウタン　根の径は約 3mm，外面は灰黄褐色で，あらい縦じわあり，切断面は黄褐色を呈する。味は極めて苦く，残留性である。

根の横切片を鏡検するとき，幼弱な根では表皮，外皮及び数層の一次皮部を残すが，通例，その最外層は数個の娘細胞に分割した特異な細胞からなる内皮で，しばしばこれに内接して 1～2 層の厚角組織がある。二次皮部はところどころに裂け目があり，不規則に師管を分布し，木部には道管がやや放射状に配列し，木部内師管があり，根茎部には大きい髄があり，髄には師管を認めることがる。柔細胞内にはシュウ酸カルシウムの針晶，板晶又は砂晶あるいは油滴を含み，でんぷん粒は，通例，認めない。

必要に応じて，「リュウタン」の確認試験を準用する。

（８）モクツウ　外側のコルク層は灰褐色で，円形または横に長いだ円形の皮目がある。皮部は暗灰褐色を呈し，木部は淡褐色で，灰白色の放射組織と交互に配列する。髄は淡灰黄色で，明らかである。味はわずかにえぐい。

横切片を鏡検するとき，師部の外辺を囲む弧状の輪層は主として結晶細胞列をなす繊維束と石細胞群とからなり，皮部の放射組織は単晶を含む厚膜細胞からなる。形成層は明らかで，束外では著しく内方に湾入している。髄周辺の細胞は，はなはだ厚膜で，しばしば単晶を含んでいる。でんぷん粒の大きさは 8μm 以下である。

必要に応じて，「モクツウ」の確認試験を準用する。

（９）カッセキ　白色～淡紅色の粉末性の結晶塊で，砕くと容易に微細な粉末となる。なめらかな感触があり，皮膚につきやすい。におい及び味がほとんどなく，かめば細かい砂をかむような感じがある。

必要に応じて，「カッセキ」の確認試験を準用する。

（10）ショウマ　外面は暗褐色を呈し，切断面では木部は淡褐色～灰褐色繊維性で，網目状を呈する。質は軽い。味は苦くてわずかに渋い。

（11）カンゾウ　外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現す。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に 1～3 細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には 3～10 細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞内にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

（12）トウシンソウ　細い円柱形を呈し，径 1～3mm である。外面は白色～黄白色で縦溝があり，柔らかく，引っ張ると容易に切れる。断面は白色～黄白色で，海綿状を呈する。におい及び味はほとんどない。横切片を検鏡するとき，4～8 方向に突出した星形状の柔細胞からなり，それらが連結して網状構造となる。細胞の接合部分では細胞壁が数珠状に肥厚する。

必要に応じて，局外生規「トウシンソウ」の確認試験を準用する。

（13）ダイオウ　暗褐色～黄褐色～淡褐色を呈し，ルーペ視すると入り組んだ不規則な模様がある。質はおおむね粗で繊維性ではない。特異なにおいがあり，味はわずかに渋くて苦い。かめば細かい砂をかむような感じがあり，だ液を黄色に染める。

必要に応じて，「ダイオウ」の確認試験を準用する。

乾燥減量　12%以下。

灰　　分　20%以下。

【 418 】　K211

成分及び分量 又は本質	日本薬局方	ビャクジュツ	4.0g
	〃	チンピ	3.0g
	〃	ショウキョウ	0.5g
	別紙規格	シンキク	2.0g
	日本薬局方	サンザシ	2.0g
	〃	コウボク	3.0g
	〃	カンゾウ	1.0g
	〃	タイソウ	2.0g
	別紙規格	麦芽	2.0g
		全　量	19.5g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。		
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。		
効能又は効果	体力中等度で，胃がもたれて食欲がなく，ときに胸やけがあるものの次の諸症：急・慢性胃炎，食欲不振，消化不良，胃腸虚弱，腹部膨満感		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	加味平胃散料		

規格及び試験方法

性　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品１包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（１）ビャクジュツ　外面は淡灰黄色～淡黄白色で，ところどころ灰褐色を呈し，横切面には淡黄褐色～褐色の分泌物による細点がある。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，皮部の柔組織中にはしばしば師管の外側に接して繊維束があり，放射組織の末端部には淡褐色～褐色の内容物を含む油室がある。木部には大きい髄を囲んで放射状に配列した短径の道管とそれを囲む著しい繊維束がある。髄及び放射組織中には皮部と同様な油室があり，柔組織中にはイヌリンの小球晶及びシュウ酸カルシウムの針晶を含む。

必要に応じて，「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。

（２）チンピ　外面は黄赤色～暗黄褐色で，油室による多数の小さいくぼみがあり，内面は白色～淡灰黄褐色である。厚さ約 2mm で，質は軽くてもろい。芳香があり，味は苦くて，わずかに刺激性である。

必要に応じて，「チンピ」の確認試験を準用する。

（３）ショウキョウ　淡灰黄色の周皮をつけたままか，又はその一部をはぎとってあり，表面は灰白色～淡灰褐色で，しばしば白粉を付けている。横断面は繊維性，粉性で，淡帯黄褐色を呈し，皮層と中心柱とに分かれる。横断面をルーペ視するとき，その全面に維管束及び分泌物が褐色の細点として散在している。特異なにおいがあり，味は極めて辛い。

（４）シンキク　灰黄色～褐色の不整の塊片もしくはブロック状の塊状である。表面は粗く，平滑でなく，ところどころに暗赤色の粒が認められる。わずかに発酵臭があり，味はわずかに甘い。

（５）サンザシ　ほぼ球形で，径 8～14mm である。外面は黄褐色～灰褐色を呈し，細かい網目状のしわがあり，一端には径 4～6mm のくぼみがあって，その周辺にはしばしばがくの基部が残存し，他端には短い果柄又はその残基がある。真果は通例 5 室でしばしば 5 個に分裂する。この分果の長さは 5～8mm，淡褐色を呈し，通例，各々1 個の種子を含む。ほとんどにおいがなく，わずかに酸味がある。

中央部の横切片を鏡検するとき，最外層は比較的厚いクチクラ層で被われた表皮からなる。クチクラは表皮細胞の側壁まで入り込み楔状を呈す。表皮細胞及びその直下の 2～3 層の柔細胞中には黄褐色～赤褐色の内容物が認められる。その内側は柔組織からなり，維管束が散在し，単独又は 2～数個集まった石細胞が多数出現する。シュウ酸カルシウムの集晶及び単晶が認められる。真果の果皮は主として厚壁細胞よりなる。種子は種皮で被われ，その内側に外胚乳，内胚乳，子葉を認める。真果の果皮の厚壁細胞中及び種皮の細胞中にシュウ酸カルシウム単晶が認められる。

必要に応じて，「サンザシ」の確認試験を準用する。

（６）コウボク　外面は灰白色～灰褐色を呈し，内面は淡褐色～褐色，切断面は淡赤褐色を呈し，繊維性である。わずかに芳香があり，味は苦い。

横切片を鏡検するとき，コルク層は厚く，ほぼ等径性の石細胞が環状に内接する。一次皮部は狭く，内しょう部には繊維群が点在し，二次皮部の放射組織間には師部繊維群が階段状に並ぶ。油細胞の多数は一次皮部に，少数は二次皮部に散在し，狭い放射組織内にも認められることがある。

必要に応じて，「コウボク」の確認試験を準用する。

（７）カンゾウ　外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現す。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に 1～3 細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には 3～10 細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞内にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

（８）タイソウ　外面は赤褐色であらいしわがあるか，又は暗灰赤色で細かいしわがあり，いずれもつやがある。外果皮は薄く革質で，中果皮は暗灰褐色を呈し，海綿の様で柔らかく粘着性があり，内果皮は極めて堅く，種子は偏平である。わずかに特異なにおいがあり，味は甘い。

（９）麦芽　紡錘形で，長さ 5～10mm，直径 2～4mm で，一端には芽があり，通例他の一端には根がある。外面は黄褐色～褐色を呈し，5 本の隆起線がある。質は堅くもろい。折面は白色で粉質である。味はわずかに甘い。

乾燥減量　15%以下。

灰　　分　5%以下。

別紙規格　　**シンキクの規格及び試験方法**

本品は通例白麹（又は小麦粉），赤小豆，杏仁，青蘞汁，蒼茸汁，野蓼汁を混合したものを圧縮して成型し，数日間発酵させた後，乾燥したものである。

性状　本品は灰黄色～褐色の不整の塊片もしくはブロック状の塊状である。表面は粗く，平滑でなく，ところどころに暗赤色の粒が認められる。本品はわずかに発酵臭があり，味はわずかに甘い。

確認試験　（１）　本品の粉末 2.0g に水 10mL を加え，水浴上で 5 分間加熱した後，ろ過する。ろ液にヨウ素試液 1 滴を加えるとき，液は赤紫色を呈する。

（２）　本品の粉末 2.0g に水 20mL を加え，水浴上で 5 分間加熱した後，ろ過する。ろ液 4mL にフェーリング試液 2mL を加え，水浴中で加熱するとき赤色の沈殿を生じる。

純度試験　（１）　重金属　本品 1.0g をとり，重金属試験法，第 3 法により操作し，試験を行う。比較液には鉛標準液 2.0mL を加える（20ppm）。

（２）　ヒ素　本品 1.0g をとり，ヒ素試験法，第 3 法により検液を調製し，装置 B を用いる方法により操作し，試験を行う（2ppm 以下）。

乾燥減量　15%以下（2g，105℃，6 時間）。

灰　　分　7%以下。

酸不溶性灰分　2%以下。

エキス含量　希エタノールエキス　8%以上。

別紙規格　　**麦芽の規格及び試験方法**

本品はオオムギ Hordeum vulgare Linne var.hexastichon Aschers（Gramineae）の発芽した穎果である。

性　　状　本品は紡錘形で，長さ 5～10mm，直径 2～4mm で，一端には芽があり，通例，他の一端には根がある。外面は黄褐色～褐色を呈し，5 本の隆起線がある。質は堅くもろい。折面は白色で粉質である。本品は弱いにおいがあり，味はわずかに甘い。

確認試験　本品の粉末 1.0g に水 10mL を加え，5 分間振り混ぜた後，ろ過し，ろ液 2～3 滴にフェーリング試液 5mL を加え穏やかに 3 分間煮沸した後に静置するとき，赤色の沈殿を生じる。

乾燥減量　12%以下（2g，105℃，6 時間）。

灰　　分　5%以下。

酸不溶性灰分　2%以下。

エキス含量　希エタノールエキス　13%以上。

【 419 】　K212

成分及び分量又は本質	日本薬局方　ジャショウシ　10g 〃　トウキ　10g 〃　イレイセン　10g 〃　クジン　10g 全　量　40g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。
用法及び用量	本品1包に水約1000mLを加えて，700mLぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液で患部を洗浄又は患部に温湿布する。
効能又は効果	ただれ，かゆみ，たむし
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器
規格及び試験方法	別記のとおり。
備考	蛇床子湯

規格及び試験方法

性　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品1包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）ジャショウシ　だ円体の双懸果で，しばしば分離している。長さ2～3mm，幅1～2mm，外面は淡褐色～褐色を呈し，各分果には通例5本の翼状を呈する隆起線がある。分果の接合面はほぼ平らである。特異なにおいがあり，かめば特異な香気があり，後やや麻ひ性である。

横切片を鏡検するとき，各隆起線間に1個の油道があり，分果が果柄に合着する面には通例2個の油道がある。隆起線はやや木化した柔細胞からなり，基部には維管束がある。隆起線の表皮細胞及び柔細胞にはシュウ酸カルシウムの単晶を含み，胚乳の柔細胞中には油滴及びアリューロン粒を含み，でんぷん粒が認められることがある。

必要に応じて，「ジャショウシ」の確認試験を準用する。

（2）トウキ　外面は暗褐色～赤褐色で，縦じわがあり，切断面は淡黄色～黄褐色を呈する。特異なにおいがあり，味はわずかに甘く，後にやや辛い。

横切片を鏡検するとき，コルク層は 4～10 層からなり，その内側に数層の厚角組織が続いている。皮部には分泌細胞に囲まれた多数の樹脂道並びにしばしば大きなすき間がある。形成層は長方形に偏圧された数層の細胞からなり，明らかに皮部と木部を区別する。木部では多数の道管と放射組織とが交互に放射状に配列し，その外方の道管は単独または数個集まってやや密に配列してくさび状をなすが，中心部付近の道管は極めてまばらに存在する。でんぷん粒は径 19μm 以下，まれに 2～5 個の複粒があり，複粒の径は 25μm に達し，しばしばのり化している。

（３）イレイセン　短い根茎と多数の細長い根からなる。根は長さ 10～20cm，径 1～2mm，外面は褐色～黒褐色を呈し，細かい縦じわがあり，折りやすく，皮層と中心柱は離れやすい。根の横断面は灰白色～淡黄褐色を呈し，中心柱は淡灰黄色～黄色，ルーペ視するとき，中心柱はほぼ円形で，木部の 2～4 箇所がわずかに湾入している。根茎は長さ 2～4cm，径 5～20mm，表面は淡灰褐色～灰褐色で，皮部は脱落し繊維状を呈し，しばしば隆起した節があり，頂端に木質の茎の残基を付ける。弱いにおいがあり，味はほとんどない。

根の横切片を鏡検するとき，最外層は一層の表皮からなり，表皮下に一層の外皮がある。内皮により皮層と中心柱に区分される。皮層は柔組織からなる。木部の 2～4 箇所がわずかに湾入し，その部分に支部があり，しばしば繊維を含む。柔組織中には単粒及び 2～8 個の複粒のでんぷん粒を含む。

必要に応じて，「イレイセン」の確認試験を準用する。

（４）クジン　外面は暗褐色～黄褐色で，切断面は黄白色～淡灰褐色を呈し，繊維性である。味は極めて苦く，残留性である。

必要に応じて，「クジン」の確認試験を準用する。

乾燥減量　13%以下。

灰　　分　10%以下。

【 420 】　K213

成分及び分量又は本質	日本薬局方　硫酸アルミニウムカリウム水和物　2.0g 〃　カンゾウ　2.0g 〃　オウレン　2.0g 〃　オウバク　2.0g 〃　コウカ　2.0g 全　量　10.0g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。
用法及び用量	本品1包に水約300mLを加えて，200mLぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液で洗眼又は温湿布する。
効能又は効果	ものもらい，ただれ目，はやり目
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器
規格及び試験方法	別記のとおり。
備考	蒸眼一方

規格及び試験方法

性　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品1包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）硫酸アルミニウムカリウム水和物　無色～白色の結晶又は粉末で，においはなく，味はやや甘く，強い収れん性がある。

必要に応じて，「硫酸アルミニウムカリウム水和物」の確認試験を準用する。

（2）カンゾウ　外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現す。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に1～3細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には3～10細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部

柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞内にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

（３）オウレン　根茎の径は 2～7mm で，外面は灰黄褐色～褐色を呈し，輪節及び多数の根の基部を認め，横断面はやや繊維性で，コルク層は淡灰褐色，皮部は黄褐色，木部は黄色，髄は黄褐色である。味は極めて苦く，残留性で，だ液を黄色に染める。

横切片を鏡検するとき，コルク層は薄膜のコルク細胞からなり，皮部柔組織中にはコルク層に近い部位に石細胞群，形成層に近い部位に黄色の師部繊維の認められるものが多い。木部は主として道管，仮道管，木部繊維からなり，放射組織は明らかで，髄は大きく，髄中には石細胞あるいは厚膜木化した細胞を伴った石細胞を認めることがある。柔細胞には細かいでんぷん粒を含むが，結晶を含まない。

必要に応じて，「オウレン」の確認試験を準用する。

（４）オウバク　外面は灰黄褐色～灰褐色で，内面は黄色～暗黄褐色で，細かい縦線がある。横断面は鮮黄色でやや繊維性である。横切面をルーペ視するとき，皮部外層は黄色で薄く，石細胞が黄褐色の点状に分布する。皮部内層は厚く，一次放射組織は外方に向かうにしたがい幅が広がり，それらの一次放射組織の間に，多くの二次放射組織が集まってほぼ三角形の師部を形成し，この組織に褐色を呈する師部繊維束が層積して接線方向に並び，放射組織と交錯して格子状を呈する。味は極めて苦く，粘液性で，だ液を黄色に染める。

必要に応じて，「オウバク」の確認試験を準用する。

（５）コウカ　赤色～赤褐色の花冠，花柄，黄色の花柱及び雄しべからなり，全長は約 1cm，花冠は筒状で 5 裂し，雄しべは 5 本で，長い柱頭をもつ雌しべを囲んでいる。花粉はほぼ球形で，径約 50μm，黄色で表面に細かい突起がある。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

必要に応じて，「コウカ」の確認試験を準用する。

乾燥減量　20%以下。

灰　　分　13%以下

【 421 】　K214

成分及び分量又は本質	局外生規　ウバイ　2.0g 日本薬局方　サンショウ　2.0g 〃　ビンロウジ　2.0g 〃　キジツ　2.0g 〃　モッコウ　2.0g 〃　シュクシャ　2.0g 〃　コウブシ　2.0g 〃　ケイヒ　2.0g 局外生規　センレンシ　2.0g 日本薬局方　コウボク　2.0g 〃　カンゾウ　2.0g 〃　カンキョウ　2.0g 全　量　24.0g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。
効能又は効果	回虫の駆除
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器
規格及び試験方法	別記のとおり。
備考	椒梅湯

規格及び試験方法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品 1 包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）ウバイ　果肉とこれに密着した内果皮，及び種子から成り果肉は黒色，外表面をつける部分はときに白色を帯びる。質は柔らかく粘性である。内果皮は淡褐色～帯赤褐色でややつやがあり堅い。厚さは約 2mm である。種子は偏圧した左右不均等な卵形を呈し，一端は鋭くとがり，他の一端は丸みを帯びてここに合点がある。長さ約 1cm，幅約 0.8cm，厚さ約 0.5cm，種皮は暗赤褐色で，合点から先端部に向かう維管束の走行による浅い縦じわがある。胚乳は褐色を呈する。わずかに特異なにおいがあり，果肉部には強い酸味がある。

必要に応じて，局外生規「ウバイ」の確認試験を準用する。

（2）サンショウ　偏球形のかく果の果皮で，開裂した径約 5mm の 2 心皮からなり，1 果柄に，通例，2～3 個合着するが，しばしば，そのうちの 1 個は，い縮退化していることがある。外面は暗黄赤色～暗赤褐色で，多数のくぼんだ小点があり，内面は淡黄白色である。特異な芳香があり，味は辛く舌を麻ひする。

横切片を鏡検するとき，外面表皮とこれに接する 1 細胞層中には赤褐色のタンニン質を含み，果皮内部には径約 500μm に達する油室があり，ところどころにらせん紋道管を主とする維管束が点在し，ない層は石細胞層からなり，内面表皮細胞は極めて小さい。

（3）ビンロウジ　灰褐色の種皮が白色の胚乳中に入り込んで大理石ようの模様を呈する。味は渋くてわずかに苦い。

必要に応じて，「ビンロウジ」の確認試験を準用する。

（4）キジツ　外面は濃緑褐色～褐色で，つやがなく，油室による多数のくぼんだ小点がある。切断面は淡灰褐色を呈し，内果皮を付ける部分は褐色を呈する。特異なにおいがあり，味は苦い。

必要に応じて，「キジツ」の確認試験を準用する。

（5）モッコウ　外面は黄褐色～灰褐色で，あらい縦じわがる。横断面は黄褐色～暗褐色で，ルーペ視するとき，環状暗色の形成層が認められ，木部組織と放射組織が放射状の模様を呈し，ところどころに大きな裂け目と褐色の油室が散在している。特異なにおいがあり，味は苦い。

（6）シュクシャ　ほぼ球形またはだ円形を呈し，長さ 1～1.5cm，径 0.8～1cm，外面は灰褐色～暗褐色を呈し，石灰を散布して乾燥したものは白粉を付けている。種子塊は薄い膜で 3 室に分かれ，各室に 10～20 個の種子を含む。種子は多角形の粒状で，長さ 3～5mm，径約 3mm，表面には多数の細かい突起があり，質は堅い。種子を縫線に沿って縦断すると，断面は細長く，へそは深くくぼみ，合点はややくぼんでいる。種皮は暗褐色，外乳は白色で，淡黄色の内乳及び胚を包み，胚は細長い。かめば特異なにおいがあり，味は辛い。

（7）コウブシ　外面は灰褐色～灰黒褐色を呈し，不整な輪節があり，その部分に一方に向かって多数の毛がある。質は堅く，横断面は赤褐色～淡黄色を呈し，ろうようのつやを帯び，皮層部の厚さは中心柱の径とほぼ等しいか又はわずかに薄い。横断面をルーペ視するとき，外面は繊維束が褐色のはん点として輪状に並び，皮層部にはところどころに維管束が赤褐色のはん点として，また分泌細胞が黄褐色の微小なはん点として多数存在する。中心柱には多数の維管束が点又は線として散在する。わずかに特異なにおい及び味がある。

（8）ケイヒ　外面は暗赤褐色を呈し，内面は赤褐色を呈し，平滑である。横断面は赤褐色を呈し淡褐色の薄層が見られる。特異なにおいがあり，味は甘く，辛く，後にやや粘液性で，わずかに収れん性である。

横切片を鏡検するとき，一次皮部と二次皮部はほとんど連続した石細胞環で区分され，環の外辺にはほぼ円形に結集した繊維束を伴い，環の各石細胞の膜はしばしばU字型に肥厚する。二次皮部中には石細胞を認めず，まばらに少数の厚膜繊維を認める。柔組織中には油細胞，粘液細胞及び微細なシュウ酸カルシウムの針晶を含む細胞があり，柔細胞中にはでんぷん粒を含む。

（９）センレンシ　ほぼ球形を呈し，径1～3cmである。一端は少しくぼみ，他端に雌しべの花柱の跡が小さな点として認められる。外面は淡黄緑色～褐色，又は淡黄色～赤褐色で光沢があり，少しくぼんでいるか，又はしわがある。濃褐色，黄褐色又は褐色の斑点がある。特異なにおいがあり，味は初め酸味があり，後に苦い。

必要に応じて，局外生規「センレンシ」の確認試験を準用する。

（10）コウボク　外面は灰白色～灰褐色を呈し，内面は淡褐色～褐色，切断面は淡赤褐色を呈し，繊維性である。わずかに芳香があり，味は苦い。

横切片を鏡検するとき，コルク層は厚く，ほぼ等径性の石細胞が環状に内接する。一次皮部は狭く，内しょう部には繊維群が点在し，二次皮部の放射組織間には師部繊維群が階段状に並ぶ。油細胞の多数は一次皮部に，少数は二次皮部に散在し，狭い放射組織内にも認められることがある。

必要に応じて，「コウボク」の確認試験を準用する。

（11）カンゾウ　外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現す。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に1～3細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には3～10細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞内にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

（12）カンキョウ　偏圧した不規則な塊状でしばしば分枝する。分枝した各部はやや湾曲した卵形又は長卵形を呈し，長さ2～4cm，径1～2cmである。外面は灰黄色～灰黄褐色で，しわ及び輪節がある。折面は褐色～暗褐色で透明感があり角質である。横切面をルーペ視するとき皮層と中心柱は区分され，全面に維管束が散在する。特異なにおいがあり，味は極めて辛い。

横切片を鏡検するとき，外側よりコルク層，皮層，内皮，中心柱が認められる。皮層と中心柱は一層の内皮によって区分される。皮層及び中心柱は柔組織からなり，繊維束で囲まれた維管束が散在する。柔組織中には黄色の油よう物質を含む油細胞が散在し，柔細胞中にはシュウ酸カルシウムの単晶が含まれ，でんぷんはのり化している。

必要に応じて，「カンキョウ」の確認試験を準用する。

乾燥減量　15%以下。

灰　　分　6%以下。

【 422 】　K215

成分及び分量又は本質	局外生規	ジンギョウ	3.0g
	日本薬局方	キョウカツ	5.0g
	〃	オウギ	3.0g
	〃	ボウフウ	2.0g
	〃	ショウマ	1.5g
	〃	カンゾウ	1.5g
	〃	マオウ	1.5g
	〃	サイコ	1.5g
	局外生規	コウホン	0.5g
	日本薬局方	サイシン	0.5g
	〃	コウカ	0.5g
		全　量	20.5g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。		
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。		
効能又は効果	体力中等度なものの次の症状：かゆみのある痔疾		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	秦艽羌活湯		

規格及び試験方法

性　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品１包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（１）ジンギョウ　類円錐形を呈し，上部が太く，下部が細く，長さ 6～30cm，径 0.5～4cm である。根には縦じわがあり，多くはらせん状にねじれる。また，しばしば分枝することもあり，ときに内部が腐朽するものもある。外面は灰黄色～暗褐色を呈し，根頭部にわずかに葉しょうが残るものもある。根の中央部から先端部に細根の跡がある。横切面において木部は円形を呈するか，又は周皮が発達するものでは分断されて幾つかの部分に分かれる。皮部は黄白色～暗褐色，木部は黄白色～黄褐色を呈する。特異なにおいがあり，味は苦く，残留性である。

必要に応じて，局外生規「ジンギョウ」の確認試験を準用する。

（２）キョウカツ　やや湾曲した円柱形～円錐形を呈し，長さ 3～10cm，径 5～20mm，ときに根茎は分枝する。外面は黄褐色～暗褐色である。根茎はその頂端にやや円形にくぼんだ茎の跡があり，ときには短い茎の残基を付け，外面には隆起した節があり，節間は，通例，短い。節にはいぼ状突起となった側根の跡がある。質はやや軽くもろくて折りやすい。横切面には多くの放射状の裂け目があり，皮部は黄褐色～褐色，木部は淡黄色～淡灰黄色，髄は灰白色～淡褐色を呈し，ルーペ視するとき，皮部及び髄には油道による褐色の細点を認める。特異なにおいがあり，味は始めわずかに酸味があり，後にやや辛く，わずかに麻ひ性である。

横切片を鏡検するとき，最外層は数層～十数層のコルク層からなり，その内側に数層の厚角組織がある。皮層には多数の油道があり，大きいものでは径が 300μm に達する。また皮層には放射状に大きなすき間がある。髄にも油道があり，大きいものでは径が 500μm に達する。柔組織中には単粒及び 2～3 個の複粒のでんぷん粒を含む。

必要に応じて，「キョウカツ」の確認試験を準用する。

（３）オウギ　外面は淡灰黄色～淡褐黄色で，不規則なあらい縦じわがあり，折面は繊維性である。横断面をルーペ視するとき，最外層には周皮があり，皮部は淡黄白色，木部は淡黄色，形成層付近はやや褐色を帯びる。木部から皮部にわたって白色の放射組織が認められるが，太いものではしばしば放射状の裂け目となっている。わずかに弱いにおいがあり，味は甘い。

（４）ボウフウ　外面は淡褐色で，多数の縦じわがある。横断面の周辺は灰褐色で，間げきが多く，中央は円形に黄色を呈する。味はわずかに甘い。

（５）ショウマ　外面は暗褐色を呈し，切断面では木部は淡褐色～灰褐色繊維性で，網目状を呈する。質は軽い。味は苦くてわずかに渋い。

（６）カンゾウ　外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現す。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に 1～3 細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には 3～10 細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞内にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

（７）マオウ　細い円柱状又はだ円柱を呈し，長さ 3～10mm，径 1～2mm，淡緑色～黄緑色である。表面に多数の平行する縦みぞがあり，節部には，長さ 2～4mm の 2 枚のりん片状の葉が対生し，その基部は合着して筒状になっている。りん片状の葉の色は淡褐色～褐色である。茎の横断面をルーペ視するとき，円形～だ円形で，周囲部は灰緑色～黄緑色を呈し，中心部には赤緑色の物質が充満しているか，又は中空のところがある。味は渋くてわずかに苦く，やや麻ひ性である。

必要に応じて，「マオウ」の確認試験を準用する。

（８）サイコ　外面は灰褐色～褐色で，深いしわがあるものがあり，横断面では，皮部は褐色，木部は淡褐色を呈する。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，皮部にはしばしば接線方向に長い裂け目があり，皮部の厚さは半径の 1/3～1/2 で，径 15～35μm の胞間性離生油道がやや多数散在し，木部には道管が放射状若しくはほぼ階段状に配列し，ところどころに繊維群があり，根頭部の髄には皮部と同様の油道がある。柔細胞中にはでんぷん粒を満たし，また油滴を認める。

必要に応じて，「サイコ」の確認試験を準用する。

（９）コウホン　根茎は不規則な結節状～円柱状を呈し，長さ 1.5～9cm，径 0.5～2cm，頂端には円形にくぼんだ茎の跡があるか，又は短い茎の残基を付け，外面は灰褐色～黒褐色を呈し，突出した結節及び根の跡がある。質は軽く折りやすいが，切面は，通例，やや繊維性である。本品の根は長さ 1～10cm，径 2～5mm，外面は灰黄褐色～暗黄褐色を呈し，縦じわ及び点状突起となった細根の跡があり，質はやや繊維性で，折りにくい。特異なにおいがあり，味は初めわずかに苦く，後やや麻ひ性である。

必要に応じて，局外生規「コウホン」の確認試験を準用する。

（10）サイシン　根の外面は淡褐色で，径約 1mm，切断面は黄白色である。根茎は不整に湾曲し外面は暗褐色を呈する。特異なにおいがあり，味は辛く舌をやや麻ひする。

（11）コウカ　赤色～赤褐色の花冠，花柄，黄色の花柱及び雄しべからなり，全長は約 1cm，花冠は筒状で 5 裂し，雄しべは 5 本で，長い柱頭をもつ雌しべを囲んでいる。花粉はほぼ球形で，径約 50μm，黄色で表面に細かい突起がある。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

必要に応じて，「コウカ」の確認試験を準用する。

乾燥減量　13%以下。

灰　　分　7%以下。

【 423 】　K216

成分及び分量又は本質	局外生規　ジンギョウ　2.0g 日本薬局方　タクシャ　2.0g 〃　チンピ　2.0g 〃　サイコ　2.0g 〃　ボウフウ　2.0g 〃　トウキ　3.0g 〃　ソウジュツ　3.0g 〃　カンゾウ　1.0g 〃　オウバク　1.0g 〃　ショウマ　1.0g 〃　ダイオウ　1.0g 〃　トウニン　3.0g 〃　コウカ　1.0g 全　量　24.0g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1包として製する。
用法及び用量	本品1包に水約500mLを加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を3回に分けて食間に服用する。上記は大人の1日量である。 15才未満7才以上　大人の2/3，7才未満4才以上　大人の1/2，4才未満2才以上　大人の1/3，2才未満　大人の1/4以下を服用する。
効能又は効果	体力中等度で，便秘傾向があるものの次の症状：痔核で排便痛のあるもの
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器
規格及び試験方法	別記のとおり。
備考	秦艽防風湯

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品 1 包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）ジンギョウ　類円錐形を呈し，上部が太く，下部が細く，長さ 6～30cm，径 0.5～4cm である。根には縦じわがあり，多くはらせん状にねじれる。また，しばしば分枝することもあり，ときに内部が腐朽するものもある。外面は灰黄色～暗褐色を呈し，根頭部にわずかに葉しょうが残るものもある。根の中央部から先端部に細根の跡がある。横切面において木部は円形を呈するか，又は周皮が発達するものでは分断されて幾つかの部分に分かれる。皮部は黄白色～暗褐色，木部は黄白色～黄褐色を呈する。特異なにおいがあり，味は苦く，残留性である。

必要に応じて，局外生規「ジンギョウ」の確認試験を準用する。

（2）タクシャ　淡黄褐色～淡褐色でコルク層を付ける部位はやや暗色を呈する。ルーペ視するとき，褐色～淡褐色のはん点が散在する。切面は粒状で，繊維性ではない。わずかににおい及び味がある。

（3）チンピ　外面は黄赤色～暗黄褐色で，油室による多数の小さいくぼみがあり，内面は白色～淡灰黄褐色である。厚さ約 2mm で，質は軽くてもろい。芳香があり，味は苦くて，わずかに刺激性である。

必要に応じて，「チンピ」の確認試験を準用する。

（4）サイコ　外面は灰褐色～褐色で，深いしわがあるものがあり，横断面では，皮部は褐色，木部は淡褐色を呈する。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，皮部にはしばしば接線方向に長い裂け目があり，皮部の厚さは半径の 1/3～1/2 で，径 15～35μm の胞間性離生油道がやや多数散在し，木部には道管が放射状若しくはほぼ階段状に配列し，ところどころに繊維群があり，根頭部の髄には皮部と同様の油道がある。柔細胞中にはでんぷん粒を満たし，また油滴を認める。

必要に応じて，「サイコ」の確認試験を準用する。

（5）ボウフウ　外面は淡褐色で，多数の縦じわがある。横断面の周辺は灰褐色で，間げきが多く，中央は円形に黄色を呈する。味はわずかに甘い。

（6）トウキ　外面は暗褐色～赤褐色で，縦じわがあり，切断面は淡黄色～黄褐色を呈する。特異なにおいがあり，味はわずかに甘く，後にやや辛い。

横切片を鏡検するとき，コルク層は 4～10 層からなり，その内側に数層の厚角組織が続いている。皮部には分泌細胞に囲まれた多数の樹脂道並びにしばしば大きなすき間がある。形成層は長方形に偏圧された数層の細胞からなり，明らかに皮部と木部を区別する。木部では多数の道管と放射組織とが交互に放射状に配列し，その外方の道管は単独または数個集まってやや密に配列してくさび状をなすが，中心部付近の道管は極めてまばらに存在する。でんぷん粒は径 19μm 以下，まれに 2～5 個の複粒があり，複粒の径は 25μm に達し，しばしばのり化している。

（7）ソウジュツ　外面は暗灰褐色～暗黄褐色である。横断面は淡褐色～赤褐色の分泌物による細点を認める。しばしば白色綿状の結晶を析出する。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，皮部の柔組織中には，通例，繊維束を欠き，放射組織の末端部には淡褐色～黄褐色の内容物を含む油室がある。木部は形成層に接して道管を囲んだ繊維束が放射状に配列し，髄及び放射組織中には皮部と同様な油室がある。柔細胞中にはイヌリンの球晶及びシュウ酸カルシウムの針晶を含む。

（８）カンゾウ　外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現す。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に 1～3 細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には 3～10 細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞内にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

（９）オウバク　外面は灰黄褐色～灰褐色で，内面は黄色～暗黄褐色で，細かい縦線がある。横断面は鮮黄色でやや繊維性である。横切面をルーペ視するとき，皮部外層は黄色で薄く，石細胞が黄褐色の点状に分布する。皮部内層は厚く，一次放射組織は外方に向かうにしたがい幅が広がり，それらの一次放射組織の間に，多くの二次放射組織が集まってほぼ三角形の師部を形成し，この組織に褐色を呈する師部繊維束が層積して接線方向に並び，放射組織と交錯して格子状を呈する。味は極めて苦く，粘液性で，だ液を黄色に染める。

必要に応じて，「オウバク」の確認試験を準用する。

（10）ショウマ　外面は暗褐色を呈し，切断面では木部は淡褐色～灰褐色繊維性で，網目状を呈する。質は軽い。味は苦くてわずかに渋い。

（11）ダイオウ　暗褐色～黄褐色～淡褐色を呈し，ルーペ視すると入り組んだ不規則な模様がある。質はおおむね粗で繊維性ではない。特異なにおいがあり，味はわずかに渋くて苦い。かめば細かい砂をかむような感じがあり，だ液を黄色に染める。

必要に応じて，「ダイオウ」の確認試験を準用する。

（12）トウニン　種皮は薄く，外面は赤褐色を帯び，表面にはすれて落ちやすい石細胞となった表皮細胞があって，粉をふいたようである。切断面は類白色である。味はわずかに苦く，油ようである。

表皮の表面を鏡検するとき，数個ずつ集合する石細胞はおおむね円形で，その細胞膜は均等に厚く，側面視では方形又は長方形を呈する。

必要に応じて，「トウニン」の確認試験を準用する。

（13）コウカ　赤色～赤褐色の花冠，花柄，黄色の花柱及び雄しべからなり，全長は約 1cm，花冠は筒状で 5 裂し，雄しべは 5 本で，長い柱頭をもつ雌しべを囲んでいる。花粉はほぼ球形で，径約 50μm，黄色で表面に細かい突起がある。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

必要に応じて，「コウカ」の確認試験を準用する。

乾燥減量　12%以下。

灰　　分　7%以下。

【424】　K217

成分及び分量又は本質	日本薬局方	ウヤク	2.0g
	〃	トウキ	2.0g
	〃	シャクヤク	2.0g
	〃	コウブシ	2.0g
	〃	サンザシ	2.0g
	〃	チンピ	2.0g
	〃	ブクリョウ	1.0g
	〃	ビャクジュツ	1.0g
	〃	ビンロウジ	1.0g
	〃	エンゴサク	1.0g
	〃	タクシャ	1.0g
	〃	モッコウ	0.6g
	〃	カンゾウ	0.6g
	〃	ショウキョウ	1.0g
		全　　量	19.0g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1 包として製する。		
用法及び用量	本品 1 包に水約 500mL を加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を 3 回に分けて食間に服用する。上記は大人の 1 日量である。15 才未満 7 才以上 大人の 2/3，7 才未満 4 才以上 大人の 1/2，4 才未満2 才以上　大人の 1/3，2 才未満　大人の 1/4 以下を服用する。		
効能又は効果	下腹部の痛み，乳腺の痛み		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	烏苓通気散料		

規格及び試験方法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品 1 包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（１）　ウヤク　紡錘形又はところどころくびれた連珠状を呈し，長さ 10～15cm，径 10～25mm である。外面は黄褐色～褐色を呈し，わずかに細根の跡がある。横断面の皮部は褐色，木部は淡黄褐色を呈し，褐色の同心性の輪及び放射状の線がある。質はち密で堅い。樟脳様のにおいがあり，味は苦い。

横切片を鏡検するとき，周皮を残すものでは数層のコルク層がありコルク層の一部はコルク石細胞からなる。油細胞及び繊維を含む皮部柔組織が認められることがある。木部では道管及び木部繊維と，放射組織が交互に配列する。皮部及び木部の柔細胞中にはシュウ酸カルシウムの砂晶及び柱状晶，径 1～15μm の単粒のでんぷん粒及び 2～4 粒からなる複粒のでんぷん粒を含む。

必要に応じて，「ウヤク」の確認試験を準用する。

（２）　トウキ　外面は暗褐色～赤褐色で，縦じわがあり，切断面は淡黄色～黄褐色を呈する。特異なにおいがあり，味はわずかに甘く，後にやや辛い。

横切片を鏡検するとき，コルク層は 4～10　層からなり，その内側に数層の厚角組織が続いている。皮部には分泌細胞に囲まれた多数の樹脂道並びにしばしば大きなすき間がある。形成層は長方形に偏圧された数層の細胞からなり，明らかに皮部と木部とを区別する。木部では多数の道管と放射組織とが交互に放射状に配列し，その外方の道管は単独又は数個集まってやや密に配列してくさび状をなすが，中心部付近の道管は極めてまばらに存在する。でんぷん粒は径19μm 以下，まれに2～5 個の複粒があり，複粒の径は25μm に達し，しばしばのり化している。

（３）　シャクヤク　外面は褐色～淡灰褐色を呈し，横断面はち密で淡灰褐色を呈し，木部には淡褐色の放射状の線がある。わずかに特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後に渋くてわずかに苦い。

必要に応じて，「シャクヤク」の確認試験を準用する。

（４）　コウブシ　外面は灰褐色～灰黒褐色を呈し，不整な輪節があり，その部分に一方に向かって多数の毛がある。質は堅く，横断面は赤褐色～淡黄色を呈し，ろうようのつやを帯び，皮層部の厚さは中心柱の径とほぼ等しいか又はわずかに薄い。横断面をルーペ視するとき，外面は繊維束が褐色のはん点として輪状に並び，皮層部にはところどころに維管束が赤褐色のはん点として，また分泌細胞が黄褐色の微小なはん点として多数存在する。中心柱には多数の維管束が点又は線として散在する。わずかに特異なにおい及び味がある。

（５）　サンザシ　ほぼ球形で，径 8～14mm である。外面は黄褐色～灰褐色を呈し，細かい網目状のしわがあり，一端には径 4～6mm のくぼみがあって，その周辺にはしばしばがくの基部が残存し，他端には短い果柄又はその残基がある。真果は通例 5　室でしばしば 5個に分裂する。この分果の長さは 5～8mm，淡褐色を呈し，通例，各々1 個の種子を含む。ほとんどにおいがなく，わずかに酸味がある。

中央部の横切片を鏡検するとき，最外層は比較的厚いクチクラ層で覆われた表皮からなる。クチクラは表皮細胞の側壁まで入り込みくさび状を呈する。表皮細胞及びその直下の 2～3　層の柔細胞中には黄褐色～赤褐色の内容物が認められる。その内側は柔組織からなり，維管束が散在し，単独又は2～数個集まった石細胞が多数出現する。シュウ酸カルシウムの集晶及び単晶が認められる。真果の果皮は主として厚壁細胞よりなる。種子は種皮で覆われ，その内側に周乳，内乳，子葉を認める。真果の果皮の厚壁細胞中及び種皮の細胞中にシュウ酸カルシウム単晶が認められる。

必要に応じて，「サンザシ」の確認試験を準用する。

（６） チンピ 外面は黄赤色～暗黄褐色で，油室による多数の小さいくぼみがあり，内面は白色～淡灰黄褐色である。厚さ約 2mm で，質は軽くてもろい，芳香があり，味は苦くて，わずかに刺激性である。

必要に応じて，「チンピ」の確認試験を準用する。

（７） ブクリョウ 白色又はわずかに淡赤色を帯びた白色で，質は堅いが砕きやすい。味はないがやや粘液ようである。

必要に応じて，「ブクリョウ」の確認試験を準用する。

（８） ビャクジュツ 外面は淡灰黄色～淡黄白色で，ところどころ灰褐色を呈し，横切面には淡黄褐色～褐色の分泌物による細点がある。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，皮部の柔組織中にはしばしば師管の外側に接して繊維束があり，放射組織の末端部には淡褐色～褐色の内容物を含む油室がある。木部には大きい髄を囲んで放射状に配列した短径の道管とそれを囲む著しい繊維束がある。髄及び放射組織中には皮部と同様な油室があり，柔組織中にはイヌリンの小球晶及びシュウ酸カルシウムの針晶を含む

必要に応じて，「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。

（９） ビンロウジ 灰褐色の種皮が白色の胚乳中に入り込んで大理石ようの模様を呈する。味は渋くてわずかに苦い。

必要に応じて，「ビンロウジ」の確認試験を準用する。

（１０） エンゴサク ほぼ偏球形又はこぶ状突起のある多角形を呈し，径 1～2cm で，一端に茎の跡がある。外面は灰黄色又は灰褐色で質は堅く，切断面は黄色で平滑又は灰黄緑色で粒状である。味は苦い。

必要に応じて，「エンゴサク」の確認試験を準用する。

（１１） タクシャ 淡黄褐色～淡褐色でコルク層を付ける部位はやや暗色を呈する。ルーペ視するとき，褐色～淡褐色のはん点が散在する。切面は粒状で，繊維性ではない。わずかににおい及び味がある。

（１２） モッコウ 外面は黄褐色～灰褐色で，あらい縦じわがある。横断面は黄褐色～暗褐色で，ルーペ視するとき，環状暗色の形成層が認められ，木部組織と放射組織が放射状の模様を呈し，ところどころに大きな裂け目と褐色の油室が散在している。特異なにおいがあり，味は苦い。

必要に応じて，「モッコウ」の確認試験を準用する。

（１３）カンゾウ 外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現わす。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に 1～3 細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には 3～10 細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞中にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

（１４）ショウキョウ　淡灰黄色の周皮を付けたままか，又はその一部をはぎとってあり，表面は灰白色～淡灰褐色で，しばしば白粉を付けている。横断面は繊維性，粉性で，淡帯黄褐色を呈し，皮層と中心柱とに分かれる。横断面をルーペ視するとき，その全面に維管束及び分泌物が褐色の細点として散在している。特異なにおいがあり，味は極めて辛い。

乾燥減量　15%以下。

灰　　分　5%以下。

【425】　K218

成分及び分量又は本質	日本薬局方	マオウ	4.0～6.0g
	〃	セッコウ	8.0g
	〃	ショウキョウ	1.0g
	〃	カンゾウ	1.5～2.0g
	〃	ビャクジュツ	3.0g
	〃	タイソウ	4.0g
		全　量	21.5～24.0g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1 包として製する。		
用法及び用量	本品 1 包に水約 500mL を加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を 3 回に分けて食間に服用する。上記は大人の 1 日量である。15 才未満 7 才以上　大人の 2/3，7 才未満 4 才以上　大人の 1/2，4 才未満2 才以上　大人の 1/3，2 才未満　大人の 1/4 以下を服用する。		
効能又は効果	体力中等度以上で，冷えがあって，むくみがあり，のどが渇き，汗が出て，ときに尿量が減少するものの次の諸証：むくみ，関節のはれや痛み，筋肉痛，湿疹・皮膚炎，夜尿症，目のかゆみ・痛み		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	越婢加朮湯		

規格及び試験方法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品 1 包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　マオウ　細い円柱状又はだ円柱を呈し，長さ 3～10mm，径 1～2mm，淡緑色～黄緑色である。表面に多数の平行する縦みぞがあり，節部には，長さ 2～4mm の 2 枚のりん片状の葉が対生し，その基部は合着して筒状になっている。りん片状の葉の色は淡褐色～褐色である。茎の横断面をルーペ視するとき，円形～だ円形で，周囲部は灰緑色～黄緑色を呈し，中心部には赤緑色の物質が充満しているか，又は中空のところがある。味は渋くてわずかに苦く，やや麻ひ性である。

必要に応じて，「マオウ」の確認試験を準用する。

（2）　セッコウ　光沢のある白色の重い繊維状結晶塊で，におい及び味はない。砕くとたやすく針状～微細結晶性の粉末となる。水に溶けにくい。

必要に応じて，「セッコウ」の確認試験を準用する。

（３）　ショウキョウ　淡灰黄色の周皮を付けたままか，又はその一部をはぎとってあり，表面は灰白色～淡灰褐色で，しばしば白粉を付けている。横断面は繊維性，粉性で，淡帯黄褐色を呈し，皮層と中心柱とに分かれる。横断面をルーペ視するとき，その全面に維管束及び分泌物が褐色の細点として散在している。特異なにおいがあり，味は極めて辛い。

（４）　カンゾウ　外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現わす。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に 1～3 細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には 3～10 細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞中にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

（5）　ビャクジュツ　外面は淡灰黄色～淡黄白色で，ところどころ灰褐色を呈し，横切面には淡黄褐色～褐色の分泌物による細点がある。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，皮部の柔組織中にはしばしば師管の外側に接して繊維束があり，放射組織の末端部には淡褐色～褐色の内容物を含む油室がある。木部には大きい髄を囲んで放射状に配列した短径の道管とそれを囲む著しい繊維束がある。髄及び放射組織中には皮部と同様な油室があり，柔組織中にはイヌリンの小球晶及びシュウ酸カルシウムの針晶を含む。

必要に応じて，「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。

（6）　タイソウ　外面は赤褐色であらいしわがあるか，又は暗灰赤色で細かいしわがあり，いずれもつやがある。外果皮は薄く革質で，中果皮は暗灰褐色を呈し，海綿ようで柔らかく粘着性があり，内果皮は極めて堅く，種子は偏平である。わずかに特異なにおいがあり，味は甘い。

乾燥減量　20%以下。

灰　　分　設定しない

【426】　K218—①

成分及び分量又は本質	日本薬局方	マオウ	4.0～6.0g
	〃	セッコウ	8.0g
	〃	ショウキョウ	1.0g
	〃	カンゾウ	1.5～2.0g
	〃	ソウジュツ	5.0g
	〃	タイソウ	4.0g
		全　量	21.5～24.0g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1 包として製する。		
用法及び用量	本品 1 包に水約 500mL を加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を 3 回に分けて食間に服用する。上記は大人の 1 日量である。15 才未満 7 才以上　大人の 2/3，7 才未満 4 才以上　大人の 1/2，4 才未満2 才以上　大人の 1/3，2 才未満　大人の 1/4 以下を服用する。		
効能又は効果	体力中等度以上で，冷えがあって，むくみがあり，のどが渇き，汗が出て，ときに尿量が減少するものの次の諸証：むくみ，関節のはれや痛み，筋肉痛，湿疹・皮膚炎，夜尿症，目のかゆみ・痛み		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	越婢加朮湯		

規格及び試験方法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品 1 包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　マオウ　細い円柱状又はだ円柱を呈し，長さ 3～10mm，径 1～2mm，淡緑色～黄緑色である。表面に多数の平行する縦みぞがあり，節部には，長さ 2～4mm の 2 枚のりん片状の葉が対生し，その基部は合着して筒状になっている。りん片状の葉の色は淡褐色～褐色である。茎の横断面をルーペ視するとき，円形～だ円形で，周囲部は灰緑色～黄緑色を呈し，中心部には赤緑色の物質が充満しているか，又は中空のところがある。味は渋くてわずかに苦く，やや麻ひ性である。

必要に応じて，「マオウ」の確認試験を準用する。

（２）　セッコウ　光沢のある白色の重い繊維状結晶塊で，におい及び味はない。砕くとたやすく針状～微細結晶性の粉末となる。水に溶けにくい。

必要に応じて，「セッコウ」の確認試験を準用する。

（３）　ショウキョウ　淡灰黄色の周皮を付けたままか，又はその一部をはぎとってあり，表面は灰白色～淡灰褐色で，しばしば白粉を付けている。横断面は繊維性，粉性で，淡帯黄褐色を呈し，皮層と中心柱とに分かれる。横断面をルーペ視するとき，その全面に維管束及び分泌物が褐色の細点として散在している。特異なにおいがあり，味は極めて辛い。

（４）　カンゾウ　外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現わす。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に 1～3 細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には 3～10 細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞中にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

（５）　ソウジュツ　外面は暗灰褐色～暗黄褐色である。横断面は淡褐色～赤褐色の分泌物による細点を認める。しばしば白色綿状の結晶を析出する。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，皮部の柔組織中には，通例，繊維束を欠き，放射組織の末端部には淡褐色～黄褐色の内容物を含む油室がある。木部は形成層に接して道管を囲んだ繊維束が放射状に配列し，髄及び放射組織中には皮部と同様な油室がある。柔細胞中にはイヌリンの球晶及びシュウ酸カルシウムの針晶を含む。

（6）　タイソウ　外面は赤褐色であらいしわがあるか，又は暗灰赤色で細かいしわがあり，いずれもつやがある。外果皮は薄く革質で，中果皮は暗灰褐色を呈し，海綿ようで柔らかく粘着性があり，内果皮は極めて堅く，種子は偏平である。わずかに特異なにおいがあり，味は甘い。

乾燥減量　20%以下。

灰　　分　設定しない

【427】　K219

成分及び分量又は本質	日本薬局方	レンギョウ	3.0g
	〃	オウゴン	3.0g
	〃	サンシシ	3.0g
	〃	キキョウ	3.0g
	〃	ハッカ	2.0g
	〃	カンゾウ	1.0g
	〃	ダイオウ	1.0g
	〃	セッコウ	10.0g
		全　量	26.0g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1 包として製する。		
用法及び用量	本品 1 包に水約 500mL を加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，熱いうちに煎じかすを除き，煎液を 3 回に分けて食間に服用する。上記は大人の 1日量である。 15 才未満 7 才以上 大人の 2/3，7 才未満 4 才以上 大人の 1/2，4 才未満2 才以上 大人の 1/3，2 才未満 大人の 1/4 以下を服用する。 本剤は必ず 1 日分ずつ煎じ，数日分をまとめて煎じないこと。		
効能又は効果	体力中等度以上で，胃腸の調子がすぐれないものの次の諸症：口内炎，口の中の炎症		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	加減涼膈散（浅田）料		

規格及び試験方法

性　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品 1 包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　レンギョウ　外面は淡褐色～暗褐色を呈し，淡灰色の小隆起点が散在し，内面は黄褐色である。味はない。

必要に応じて，「レンギョウ」の確認試験を準用する。

（2）オウゴン　外面は黄褐色～暗褐色を呈し，切断面は黄色～帯褐黄色を呈し，縦に繊維性のすじが見られる。味はわずかに苦い。

必要に応じて，「オウゴン」の確認試験を準用する。

（３） サンシシ 果皮は薄く砕きやすく，その外面は赤褐色，黄赤色又は黒褐色を呈し，内面は黄褐色を呈し，平らでつやがある。果実の内部は 2 室に分かれ，黄赤色～暗赤色の果肉中に黒褐色又は黄赤色で長径約 5mm の偏平な種子の団塊を含む。質は軽い。弱いにおいがあり，味は苦い。

必要に応じて，「サンシシ」の確認試験を準用する。

（４） キキョウ 外面は皮付きは灰褐色，皮去りは白色～淡褐色を呈し，繊維性でない。横切面をルーペ視するとき，皮部は木部よりやや薄く，ほとんど白色で，ところどころにすき間があり，形成層の付近はしばしば褐色を帯びる。皮部の厚さは木部の径よりやや薄く，ほとんど白色で，ところどころにすき間があり，木部は白色～淡褐色を呈し，その組織は皮部よりもやや密である。味は初めなく，後にえぐくて苦い。

必要に応じて，「キキョウ」の確認試験を準用する。

（５） ハッカ 上面は淡褐黄色～淡緑黄色，下面は淡緑色～淡緑黄色である。葉をルーペ視するとき，両面に毛，腺毛及び腺りんをまばらに認め，腺毛及び腺りんは下面に多い。特異な芳香があり，口に含むと清涼感がある。

必要に応じて，「ハッカ」の確認試験を準用する。

（６） カンゾウ 外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現わす。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に1～3細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には3～10 細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞中にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

（７） ダイオウ 暗褐色～黄褐色～淡褐色を呈し，ルーペ視すると入り組んだ不規則な模様がある。質はおおむね粗で繊維性ではない。特異なにおいがあり，味はわずかに渋くて苦い。かめば細かい砂をかむような感じがあり，だ液を黄色に染める。

必要に応じて，「ダイオウ」の確認試験を準用する。

（８） セッコウ 光沢のある白色の重い繊維状結晶塊で，におい及び味はない。砕くとたやすく針状～微細結晶性の粉末となる。水に溶けにくい。

必要に応じて，「セッコウ」の確認試験を準用する。

乾燥減量 15%以下。

灰　　分 設定しない

【428】　K220

成分及び分量又は本質	日本薬局方	レンギョウ	3.0g
	〃	オウゴン	3.0g
	〃	サンシシ	3.0g
	〃	キキョウ	3.0g
	〃	オウレン	1.0g
	〃	ハッカ	1.0g
	〃	トウキ	3.5g
	〃	ジオウ	3.5g
	〃	キジツ	1.0g
	〃	シャクヤク	3.5g
	〃	カンゾウ	1.0 g
		全　量	26.5g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1 包として製する。		
用法及び用量	本品 1 包に水約 500mL を加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を 3 回に分けて食間に服用する。上記は大人の 1 日量である。15 才未満 7 才以上 大人の 2/3，7 才未満 4 才以上 大人の 1/2，4 才未満2 才以上　大人の 1/3，2 才未満　大人の 1/4 以下を服用する。		
効能又は効果	体力中等度で，胃腸の調子がすぐれないものの次の諸症：口内炎，口の中の炎症		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	加減涼膈散（龔廷賢）料		

規格及び試験方法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品 1 包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　レンギョウ　外面は淡褐色～暗褐色を呈し，淡灰色の小隆起点が散在し，内面は黄褐色である。特異な芳香があり，味はわずかに収れん性である。

必要に応じて，「レンギョウ」の確認試験を準用する。

（２）　オウゴン　外面は黄褐色～暗褐色を呈し，切断面は黄色～帯褐黄色を呈し，縦に繊維性のすじが見られる。味はわずかに苦い。

必要に応じて，「オウゴン」の確認試験を準用する。

（３）　サンシシ　果皮は薄く砕きやすく，その外面は赤褐色～黄褐色又は黒褐色を呈し，内面は黄褐色を呈し，平らでつやがある。果実の内部は 2 室に分かれ，黄赤色～暗赤色の果肉中に黒褐色又は黄赤色で長径約 5㎜ の偏平な種子の団塊を含む。質は軽い。特異なにおいがあり，味は苦い。

必要に応じて，「サンシシ」の確認試験を準用する。

（４）　キキョウ　外面は皮付きは灰褐色，皮去りは白色～淡褐色を呈し，繊維性でない。横切面をルーペ視するとき，皮部は木部よりやや薄く，ほとんど白色で，ところどころにすき間があり，形成層の付近はしばしば褐色を帯びる。木部は白色～淡褐色を呈し，その組織は皮部よりもやや密である。味は初めなく，後にえぐくて苦い。

必要に応じて，「キキョウ」の確認試験を準用する。

（５）　オウレン　根茎の径は2～7㎜で，外面は灰黄褐色～褐色を呈し，輪節及び多数の根の 基部を認め，横断面はやや繊維性で，コルク層は淡灰褐色，皮部は黄褐色，木部は黄色，髄は黄 褐色である。味は極めて苦く，残留性で，だ液を黄色に染める。

横切片を鏡検するとき，コルク層は薄膜のコルク細胞からなり，皮部柔組織中にはコルク層に 近い部位に石細胞群，形成層に近い部位に黄色の師部繊維の認められるものが多い。木部は主と して道管，仮道管，木部繊維からなり，放射組織は明らかで，髄は大きく，髄中には石細胞ある いは厚膜木化した細胞を伴った石細胞を認めることがある。柔細胞には細かいでんぷん粒を含む が，結晶を含まない。

必要に応じて，「オウレン」の確認試験を準用する。

（６）　ハッカ　上面は淡褐黄色～淡緑黄色，下面は淡緑色～淡緑黄色である。葉をルーペ視するとき，両面に毛，腺毛及び腺りんをまばらに認め，腺毛及び腺りんは下面に多い。特異な芳香があり，口に含むと清涼感がある。

必要に応じて，「ハッカ」の確認試験を準用する。

（７）　トウキ　外面は暗褐色～赤褐色で，縦じわがあり，切断面は淡黄色～黄褐色を呈する。特異なにおいがあり，味はわずかに甘く，後にやや辛い。

横切片を鏡検するとき，コルク層は 4～10 層からなり，その内側に数層の厚角組織が続いている。皮部には分泌細胞に囲まれた多数の樹脂道並びにしばしば大きなすき間がある。形成層は長方形に偏圧された数層の細胞からなり，明らかに皮部と木部とを区別する。木部では多数の道管と放射組織とが交互に放射状に配列し，その外方の道管は単独又は数個集まってやや密に配列してくさび状をなすが，中心部付近の道管は極めてまばらに存在する。でんぷん粒は径 19μm 以下，まれに 2～5 個の複粒があり，複粒の径は 25μm に達し，しばしばのり化している。

（８）　ジオウ　外面は黄褐色～黒褐色を呈し，深い縦みぞ及びくびれがある。質は柔らかく粘性である。横断面は黄褐色～黒褐色で，皮部は木部より色が濃く，ほとんど髄を認めない。特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後にやや苦い。

横切片を鏡検するとき，コルク層は 7～15 層で，皮部はすべて柔細胞からなり，外皮部に褐色の分泌物を含む細胞が散在する。木部はほとんど柔細胞で満たされ，放射状に並ぶ道管は側孔のある網紋があり，弱い木化反応を呈する。**ニンジン**　外面は淡黄褐色～

淡灰褐色を呈し，縦じわがあり，横断面は淡黄褐色を呈し，形成層の付近は褐色を呈する。特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後にやや苦い。

（９）　キジツ　外面は濃緑褐色～褐色で，つやがなく，油室による多数のくぼんだ小点がある。切断面は淡灰褐色を呈し，内果皮を付ける部分は褐色を呈する。特異なにおいがあり，味は苦い。

必要に応じて，「キジツ」の確認試験を準用する。

（１０）シャクヤク　外面は褐色～淡灰褐色を呈し，横断面はち密で淡灰褐色を呈し，木部には淡褐色の放射状の線がある。わずかに特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後に渋くてわずかに苦い。

必要に応じて，「シャクヤク」の確認試験を準用する。

（１１）カンゾウ　外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現わす。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に 1～3 細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には 3～10 細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞中にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

乾燥減量　15%以下。

灰　　分　7%以下。

【429】　K221

成分及び分量又は本質	日本薬局方　カンゾウ　4.0g 〃　カンキョウ　2.0g 全　量　6.0g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1 包として製する。
用法及び用量	本品 1 包に水約 200mL を加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，熱いうちに煎じかすを除き，煎液を 2 回に分けて食間に服用する。上記は大人の 1 日量である。 15 才未満 7 才以上 大人の 2/3，7 才未満 4 才以上 大人の 1/2，4 才未満2 才以上 大人の 1/3，2 才未満 大人の 1/4 以下を服用する。
効能又は効果	体力虚弱で，手足が冷え，薄い唾液が口に溜まるものの次の諸症：頻尿，尿もれ，唾液分泌過多，鼻炎，しゃっくり，めまい
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器
規格及び試験方法	別記のとおり。
備考	甘草乾姜湯

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品 1 包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　カンゾウ　外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現わす。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に 1～3 細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には 3～10 細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞中にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

（2）　カンキョウ　偏圧した不規則な塊状でしばしば分枝する。分枝した各部はやや湾曲した卵形又は長卵形を呈し，長さ 2～4cm，径 1～2cm である。外面は灰黄色～灰黄褐色で，しわ及び輪節がある。折面は褐色～暗褐色で透明感があり角質である。横切面をルー

ペ視するとき皮層と中心柱は区分され，全面に維管束が散在する。特異なにおいがあり，味は極めて辛い。

横切片を鏡検するとき，外側よりコルク層，皮層，内皮，中心柱が認められる。皮層と中心柱は一層の内皮によって区分される。皮層及び中心柱は柔組織からなり，繊維束で囲まれた維管束が散在する。柔組織中には黄色の油様物質を含む油細胞が散在し，柔細胞中にはシュウ酸カルシウムの単晶が含まれ，でんぷんは糊化している。

必要に応じて，「カンキョウ」の確認試験を準用する。

乾燥減量　15%以下。

灰　　分　7%以下。

【430】　K222

成分及び分量又は本質	日本薬局方	カンゾウ	2.0g
	〃	ブシ	0.5 ~ 1.0g
	〃	ビャクジュツ	4.0g
	〃	ケイヒ	3.5g
		全　量	10 ~ 10.5g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1 包として製する。		
用法及び用量	本品 1 包に水約 500mL を加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を 3 回に分けて食間に服用する。上記は大人の 1 日量である。15 才未満 7 才以上 大人の 2/3，7 才未満 4 才以上 大人の 1/2，4 才未満2 才以上　大人の 1/3，2 才未満　大人の 1/4 以下を服用する。		
効能又は効果	体力虚弱で、痛みを伴うものの次の諸症 : 関節のはれや痛み、神経痛、感冒		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	甘草附子湯		

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品 1 包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　カンゾウ　外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現わす。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に 1～3 細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には 3～10 細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞中にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

（2）　ブシ　本品はほぼ倒円錐形で，長さ 15～30mm，径 12～16mm，又は縦ときに横に切断され，長さ 20～60mm，幅 15～40mm，厚さ 200～700μm，又は径 12mm 以下の不整な多角形に破砕されている。外面は淡褐色～暗褐色又は黄褐色を呈する。質は堅

く，通例，しわはなく，切面は平らで，淡褐色～暗褐色又は黄白色～淡黄褐色を呈し，通常角質，半透明で光沢がある。弱い特異なにおいがある。

横切片及び縦切片を鏡検するとき，外側から擬上皮，一次皮層，内皮，二次皮層，形成層，木部が認められる。一次皮層には楕円形～楕円状四角形，短径 30～75μm，長径 60～ 150μm の厚壁細胞がある。内皮は接線方向に長い 1 層の細胞からなっている。形成層輪は星形又は不整の多角形～円形であり，木部の道管群は V 字形を呈する。二次皮層及び髄中に独立した形成層輪が認められるものもある。道管は孔紋，階紋，網紋又はらせん紋道管である。柔細胞中のでんぷん粒は糊化している。

必要に応じて，「ブシ」の確認試験を準用する。

純度試験　本品 1 包中のアコニチン（$C_{34}H_{47}O_{11}N$：645.75）の残存量は 0.01mg 以下である。

本品 1 包を粉末とし，その重量を精密に量り，これにメタノール 50mL を加え一夜放置した後，1 時間振とうし，ろ紙を用いてろ過する。残渣に再びメタノール 30mL を加え1時間振とうした後，前記ろ紙を用いてろ過する。またこの残渣をメタノール 30mL で 2 回洗い，全量を合わせ減圧下でメタノールをほとんど留去する。残留物に希塩酸 10mL を加え水浴上で加温溶解する。冷後，分液ろう斗に脱脂綿を用いてろ過し，水 10mL で 2 回洗う。ろ液を合わせ，これにアンモニア水（28）を加えてアルカリ性とする。これにクロロホルム 50mL を加えて良く振り混ぜた後に下層を分取する。この操作を 2 回繰り返した後，クロロホルムを合わせ，これに水 10mL を加え洗った後，クロロホルム層を分取し，無水硫酸ナトリウムを加えて脱水する。これをろ過し，減圧下で蒸発乾固する。残留物をクロロホルム 1mL に正確に溶かして試料溶液とする。

別にアコニチン 20mg を精密に量り，クロロホルム 10mL に溶かし正確にメスアップする。この溶液 1mL を正確に量り，10mL に正確に希釈し標準溶液とする。

試料溶液及び標準溶液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。あらかじめ薄層クロマトグラフ用シリカゲルを用いて 0.25mm の厚さに調製し活性化した薄層板に試料溶液0.3mL，標準溶液10μL 及び15μL を正確に塗布する。次にブタノール・酢酸・水（4： 1：5）の混合溶液の上層を展開溶媒として，約 10cm 展開しこれを風乾した後，噴霧用ドラーゲンドルフ試液を均等に噴霧するとき，試料溶液から得られるアコニチンに対応するスポットの濃さは標準溶液の 10μL を塗布した方から得られるスポットより濃いことはあっても，標準溶液の15μL を塗布した方から得られるスポットより濃くない。

（3） ビャクジュツ　外面は淡灰黄色～淡黄白色で，ところどころ灰褐色を呈し，横切面には淡黄褐色～褐色の分泌物による細点がある。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，皮部の柔組織中にはしばしば師管の外側に接して繊維束があり，放射組織の末端部には淡褐色～褐色の内容物を含む油室がある。木部には大きい髄を囲んで放射状に配列した短径の道管とそれを囲む著しい繊維束がある。髄及び放射組織中には皮部と同様な油室があり，柔組織中にはイヌリンの小球晶及びシュウ酸カルシウムの針晶を含む。

必要に応じて，「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。

（4） ケイヒ　外面は暗赤褐色を呈し，内面は赤褐色を呈し，平滑である。横断面は赤褐色を呈し淡褐色の薄層が見られる。特異なにおいがあり，味は甘く，辛く，後にやや粘液性で，わずかに収れん性である。

横切片を鏡検するとき，一次皮部と二次皮部はほとんど連続した石細胞環で区分され，環の外辺にはほぼ円形に結集した繊維束を伴い，環の各石細胞の膜はしばしば U 字形に

肥厚する。二次皮部中には石細胞を認めず，まばらに少数の厚膜繊維を認める。柔組織中には油細胞，粘液細胞及び微細なシュウ酸カルシウムの針晶を含む細胞があり，柔細胞中にはでんぷん粒を含む。

乾燥減量　15%以下。

灰　　分　7%以下。

【431】　K223

成分及び分量又は本質	日本薬局方	ビンロウジ	4.0g
	〃	コウボク	3.0g
	〃	ケイヒ	3.0g
	局外生規	キッピ	3.0g
	日本薬局方	ソヨウ	1.5g
	〃	カンゾウ	1.0g
	〃	ダイオウ	0.5～1.0g
	〃	モッコウ	1.0g
	〃	ショウキョウ	1.0g
		全　　量	18～18.5g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1 包として製する。		
用法及び用量	本品 1 包に水約 500mL を加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を 3 回に分けて食間に服用する。上記は大人の 1 日量である。15 才未満 7 才以上 大人の 2/3，7 才未満 4 才以上 大人の 1/2，4 才未満2 才以上　大人の 1/3，2 才未満　大人の 1/4 以下を服用する。		
効能又は効果	体力中等度以上で，全身倦怠感があり，とくに下肢の倦怠感が著しいものの次の諸証：疲労倦怠感，更年期障害，動悸，息切れ，むくみ，神経症，胃腸炎，関節のはれや痛み		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	九味檳榔湯		

規格及び試験方法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品 1 包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　ビンロウジ　灰褐色の種皮が白色の胚乳中に入り込んで大理石ようの模様を呈する。味は渋くてわずかに苦い。

必要に応じて，「ビンロウジ」の確認試験を準用する。

（2）　コウボク　外面は灰白色～灰褐色を呈し，内面は淡褐色～褐色，切断面は淡赤褐色を呈し，繊維性である。わずかに芳香があり，味は苦い。

横切片を鏡検するとき，コルク層は厚く，ほぼ等径性の石細胞が環状に内接する。一次皮部は狭く，内しょう部には繊維群が点在し，二次皮部の放射組織間には師部繊維群が階段状に並ぶ。油細胞の多数は一次皮部に，少数は二次皮部に散在し，狭い放射組織内にも認められることがある。

必要に応じて，「コウボク」の確認試験を準用する。

（3） ケイヒ 外面は暗赤褐色を呈し，内面は赤褐色を呈し，平滑である。横断面は赤褐色を呈し淡褐色の薄層が見られる。特異なにおいがあり，味は甘く，辛く，後にやや粘液性で，わずかに収れん性である。

横切片を鏡検するとき，一次皮部と二次皮部はほとんど連続した石細胞環で区分され，環の外辺にはほぼ円形に結集した繊維束を伴い，環の各石細胞の膜はしばしば U 字形に肥厚する。二次皮部中には石細胞を認めず，まばらに少数の厚膜繊維を認める。柔組織中には油細胞，粘液細胞及び微細なシュウ酸カルシウムの針晶を含む細胞があり，柔細胞中にはでんぷん粒を含む。

（4） キッピ 外面は黄褐色～赤褐色を呈し，油室による多数のくぼんだ細点があり，内面は類白色～淡赤褐色を呈する。厚さ約 1mm で，質は軽くてもろい。芳香があり，味は苦い。

切片を鏡検するとき，油室は円く，径 410～730μm である。

必要に応じて，局外生規「キッピ」の確認試験を準用する。

（5） ソヨウ 縮んだ葉の細片で，両面とも帯褐紫色，あるいは上面は灰緑色～帯褐緑色で下面は帯褐紫色を呈する。茎を交えるものは，その横断面は方形である。葉をルーペ視するとき，両面にまばらに毛を認め，特に葉脈上に多く，裏面には細かい腺毛を認める。もみ砕くとき，特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

必要に応じて，「ソヨウ」の確認試験を準用する。

（6） カンゾウ 外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現わす。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に 1～3 細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には 3～10 細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞中にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

（7） ダイオウ 暗褐色～黄褐色～淡褐色を呈し，ルーペ視すると入り組んだ不規則な模様がある。質はおおむね粗で繊維性ではない。特異なにおいがあり，味はわずかに渋くて苦い。かめば細かい砂をかむような感じがあり，だ液を黄色に染める。

必要に応じて，「ダイオウ」の確認試験を準用する。

（8） モッコウ 外側は黄褐色～灰褐色で，あらい縦じわがある。横断面は黄褐色～暗褐色で，ルーペ視するとき，環状暗色の形成層が認められ，木部組織と放射組織が放射状の模様を呈し，ところどころに大きな裂け目と褐色の油室が散在している。特異なにおいがあり，味は苦い。

必要に応じて，「モッコウ」の確認試験を準用する。

（９） ショウキョウ 淡灰黄色の周皮を付けたままか，又はその一部をはぎとってあり，表面は灰白色～淡灰褐色で，しばしば白粉を付けている。横断面は繊維性，粉性で，淡帯黄褐色を呈し，皮層と中心柱とに分かれる。横断面をルーペ視するとき，その全面に維管束及び分泌物が褐色の細点として散在している。特異なにおいがあり，味は極めて辛い。

乾燥減量　15%以下。

灰　　分　7%以下。

【432】　K223—①

成分及び分量又は本質	日本薬局方	ビンロウジ	4.0g
	〃	コウボク	3.0g
	〃	ケイヒ	3.0g
	局外生規	キッピ	3.0g
	日本薬局方	ソヨウ	1.5g
	〃	カンゾウ	1.0g
	〃	モッコウ	1.0g
	〃	ショウキョウ	1.0g
	〃	ゴシュユ	1.0g
	〃	ブクリョウ	3.0g
		全量	21.5g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1 包として製する。		
用法及び用量	本品 1 包に水約 500mL を加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を 3 回に分けて食間に服用する。上記は大人の 1 日量である。15 才未満 7 才以上 大人の 2/3，7 才未満 4 才以上 大人の 1/2，4 才未満2 才以上　大人の 1/3，2 才未満　大人の 1/4 以下を服用する。		
効能又は効果	体力中等度以上で，全身倦怠感があり，とくに下肢の倦怠感が著しいものの次の諸証：疲労倦怠感，更年期障害，動悸，息切れ，むくみ，神経症，胃腸炎，関節のはれや痛み		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	九味檳榔湯		

規格及び試験方法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品 1 包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　ビンロウジ　灰褐色の種皮が白色の胚乳中に入り込んで大理石ようの模様を呈する。味は渋くてわずかに苦い。

必要に応じて，「ビンロウジ」の確認試験を準用する。

（2） コウボク 外面は灰白色～灰褐色を呈し，内面は淡褐色～褐色，切断面は淡赤褐色を呈し，繊維性である。わずかに芳香があり，味は苦い。

横切片を鏡検するとき，コルク層は厚く，ほぼ等径性の石細胞が環状に内接する。一次皮部は狭く，内しょう部には繊維群が点在し，二次皮部の放射組織間には師部繊維群が階段状に並ぶ。油細胞の多数は一次皮部に，少数は二次皮部に散在し，狭い放射組織内にも認められることがある。

必要に応じて，「コウボク」の確認試験を準用する。

（3） ケイヒ 外面は暗赤褐色を呈し，内面は赤褐色を呈し，平滑である。横断面は赤褐色を呈し淡褐色の薄層が見られる。特異なにおいがあり，味は甘く，辛く，後にやや粘液性で，わずかに収れん性である。

横切片を鏡検するとき，一次皮部と二次皮部はほとんど連続した石細胞環で区分され，環の外辺にはほぼ円形に結集した繊維束を伴い，環の各石細胞の膜はしばしば U 字形に肥厚する。二次皮部中には石細胞を認めず，まばらに少数の厚膜繊維を認める。柔組織中には油細胞，粘液細胞及び微細なシュウ酸カルシウムの針晶を含む細胞があり，柔細胞中にはでんぷん粒を含む。

（4） キッピ 外面は黄褐色～赤褐色を呈し，油室による多数のくぼんだ細点があり，内面は類白色～淡赤褐色を呈する。厚さ約 1mm で，質は軽くてもろい。芳香があり，味は苦い。

切片を鏡検するとき，油室は円く，径 410～730μm である。

必要に応じて，局外生規「キッピ」の確認試験を準用する。

（5） ソヨウ 縮んだ葉の細片で，両面とも帯褐紫色，あるいは上面は灰緑色～帯褐緑色で下面は帯褐紫色を呈する。茎を交えるものは，その横断面は方形である。葉をルーペ視するとき，両面にまばらに毛を認め，特に葉脈上に多く，裏面には細かい腺毛を認める。もみ砕くとき，特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

必要に応じて，「ソヨウ」の確認試験を準用する。

（6） カンゾウ 外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現わす。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に 1～3 細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には 3～10 細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞中にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

（7） モッコウ 外側は黄褐色～灰褐色で，あらい縦じわがある。横断面は黄褐色～暗褐色で，ルーペ視するとき，環状暗色の形成層が認められ，木部組織と放射組織が放射状の模様を呈し，ところどころに大きな裂け目と褐色の油室が散在している。特異なにおいがあり，味は苦い。

必要に応じて，「モッコウ」の確認試験を準用する。

（8） ショウキョウ 淡灰黄色の周皮を付けたままか，又はその一部をはぎとってあり，表面は灰白色～淡灰褐色で，しばしば白粉を付けている。横断面は繊維性，粉性で，淡帯黄褐

色を呈し，皮層と中心柱とに分かれる。横断面をルーペ視するとき，その全面に維管束及び分泌物が褐色の細点として散在している。特異なにおいがあり，味は極めて辛い。

（９） ゴシュユ 偏球形又は球形を呈し，外面は暗褐色～灰褐色，多くの油室がくぼんだ小点として認められ，その中心には花柱の残基があるが，しばしばこれは脱落している。果柄は長さ 2～5mm で，灰緑色の毛を密生している。果皮は，通例，開裂し，予房は 5 室に分かれ，各室中には倒卵球形又は球形の褐色～黒褐色又は帯青黒色のつやのある種子がある。特異なにおいがあり，味は辛く，後に残留性の苦味がある。

必要に応じて，「ゴシュユ」の確認試験を準用する。

（10） ブクリョウ 白色又はわずかに淡赤色を帯びた白色で，質は堅いが砕きやすい。味はないがやや粘液ようである。

必要に応じて，「ブクリョウ」の確認試験を準用する。

乾燥減量 15%以下。

灰　　分 6%以下。

【433】　K224

成分及び分量又は本質	日本薬局方	ケイヒ	3.0g
	〃	ショウキョウ	1.0g
	〃	カンゾウ	2.0g
	〃	タイソウ	3.0g
	〃	マオウ	2.0g
	〃	サイシン	2.0g
	〃	ブシ	0.3～1.0g
		全　量	13.3～14.0g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1 包として製する。		
用法及び用量	本品 1 包に水約 500mL を加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を 3 回に分けて食間に服用する。上記は大人の 1 日量である。15 才未満 7 才以上 大人の 2/3，7 才未満 4 才以上 大人の 1/2，4 才未満2 才以上　大人の 1/3，2 才未満　大人の 1/4 以下を服用する。		
効能又は効果	体力中等度以下で、さむけを訴えるものの次の諸症：感冒、気管支炎、関節のはれや痛み、水様性鼻汁を伴う鼻炎、神経痛、腰痛、冷え症		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	桂姜棗草黄辛附湯		

規格及び試験方法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品 1 包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　ケイヒ　外面は暗赤褐色を呈し，内面は赤褐色を呈し，平滑である。横断面は赤褐色を呈し淡褐色の薄層が見られる。特異なにおいがあり，味は甘く，辛く，後にやや粘液性で，わずかに収れん性である。

横切片を鏡検するとき，一次皮部と二次皮部はほとんど連続した石細胞環で区分され，環の外辺にはほぼ円形に結集した繊維束を伴い，環の各石細胞の膜はしばしば U 字形に肥厚する。二次皮部中には石細胞を認めず，まばらに少数の厚膜繊維を認める。柔組織中には油細胞，粘液細胞及び微細なシュウ酸カルシウムの針晶を含む細胞があり，柔細胞中にはでんぷん粒を含む。

（２）　ショウキョウ　淡灰黄色の周皮を付けたままか，又はその一部をはぎとってあり，表面は灰白色～淡灰褐色で，しばしば白粉を付けている。横断面は繊維性，粉性で，淡帯黄褐色を呈し，皮層と中心柱とに分かれる。横断面をルーペ視するとき，その全面に維管束及び分泌物が褐色の細点として散在している。特異なにおいがあり，味は極めて辛い。

（３）　カンゾウ　外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現わす。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に 1～3細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には 3～10 細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞中にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

（４）　タイソウ　外面は赤褐色であらいしわがあるか，又は暗灰赤色で細かいしわがあり，いずれもつやがある。外果皮は薄く革質で，中果皮は暗灰褐色を呈し，海綿ようで柔らかく粘着性があり，内果皮は極めて堅く，種子は偏平である。わずかに特異なにおいがあり，味は甘い。

（５）　マオウ　細い円柱状又はだ円柱を呈し，長さ 3～10mm，径 1～2mm，淡緑色～黄緑色である。表面に多数の平行する縦みぞがあり，節部には，長さ 2～4mm の 2 枚のりん片状の葉が対生し，その基部は合着して筒状になっている。りん片状の葉の色は淡褐色～褐色である。茎の横断面をルーペ視するとき，円形～だ円形で，周囲部は灰緑色～黄緑色を呈し，中心部には赤緑色の物質が充満しているか，又は中空のところがある。味は渋くてわずかに苦く，やや麻ひ性である。

必要に応じて，「マオウ」の確認試験を準用する。

（６）　サイシン　根の外面は淡褐色で，径約 1mm，切断面は黄白色である。根茎は不整に湾曲し外面は暗褐色を呈する。特異なにおいがあり，味は辛く舌をやや麻ひする。

（７）　ブシ　本品はほぼ倒円錐形で，長さ 15～30mm，径 12～16mm，又は縦ときに横に切断され，長さ 20～60mm，幅 15～40mm，厚さ 200～700μm，又は径 12mm 以下の不整な多角形に破砕されている。外面は淡褐色～暗褐色又は黄褐色を呈する。質は堅く，通例，しわはなく，切面は平らで，淡褐色～暗褐色又は黄白色～淡黄褐色を呈し，通常角質，半透明で光沢がある。弱い特異なにおいがある。

横切片及び縦切片を鏡検するとき，外側から擬上皮，一次皮層，内皮，二次皮層，形成層，木部が認められる。一次皮層には楕円形～楕円状四角形，短径 30～75μm，長径 60～ 150μm の厚壁細胞がある。内皮は接線方向に長い 1 層の細胞からなっている。形成層輪は星形又は不整の多角形～円形であり，木部の道管群は V 字形を呈する。二次皮層及び髄中に独立した形成層輪が認められるものもある。道管は孔紋，階紋，網紋又はらせん紋道管である。柔細胞中のでんぷん粒は糊化している。

必要に応じて，「ブシ」の確認試験を準用する。

純度試験　本品 1 包中のアコニチン（$C_{34}H_{47}O_{11}N$：645.75）の残存量は 0.01mg 以下である。

本品 1 包を粉末とし，その重量を精密に量り，これにメタノール 50mL を加え一夜放置した後，1 時間振とうし，ろ紙を用いてろ過する。残渣に再びメタノール 30mL を加え1時間振とうした後，前記ろ紙を用いてろ過する。またこの残渣をメタノール 30mL で 2 回洗い，全量を合わせ減圧下でメタノールをほとんど留去する。残留物に希塩酸 10mL を加え水浴上で加温溶解する。冷後，分液ろう斗に脱脂綿を用いてろ過し，水 10mL で 2 回洗う。ろ液を合わせ，これにアンモニア水（28）を加えてアルカリ性とする。これにクロロホルム 50mL を加えて良く振り混ぜた後に下層を分取する。この操作を 2 回繰り返した後，クロロホルムを合わせ，これに水 10mL を加え洗った後，クロロホルム層を分取し，無水硫酸ナトリウムを加えて脱水する。これをろ過し，減圧下で蒸発乾固する。残留物をクロロホルム 1mL に正確に溶かして試料溶液とする。

別にアコニチン 20mg を精密に量り，クロロホルム 10mL に溶かし正確にメスアップする。この溶液 1mL を正確に量り，10mL に正確に希釈し標準溶液とする。

試料溶液及び標準溶液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。あらかじめ薄層クロマトグラフ用シリカゲルを用いて 0.25mm の厚さに調製し活性化した薄層板に試料溶液0.3mL，標準溶液10μL 及び15μL を正確に塗布する。次にブタノール・酢酸・水（4： 1：5）の混合溶液の上層を展開溶媒として，約 10cm 展開しこれを風乾した後，噴霧用ドラーゲンドルフ試液を均等に噴霧するとき，試料溶液から得られるアコニチンに対応するスポットの濃さは標準溶液の 10μL を塗布した方から得られるスポットより濃いことはあっても，標準溶液の15μL を塗布した方から得られるスポットより濃くない。

乾燥減量　15%以下。

灰　　分　7%以下。

【434】　K225

成分及び分量又は本質	日本薬局方	ケイヒ	3.0g
	〃	シャクヤク	3.0g
	〃	カンゾウ	1.5g
	〃	マオウ	2.0 ~ 3.0g
	〃	ショウキョウ	1.0g
	〃	ビャクジュツ	4.0g
	〃	チモ	3.0g
	〃	ボウフウ	3.0g
	〃	ブシ	0.3 ~ 1.0g
		全　量	20.8 ~ 22.5g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1 包として製する。		
用法及び用量	本品 1 包に水約 500mL を加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を 3 回に分けて食間に服用する。上記は大人の 1 日量である。15 才未満 7 才以上 大人の 2/3，7 才未満 4 才以上 大人の 1/2，4 才未満2 才以上　大人の 1/3，2 才未満　大人の 1/4 以下を服用する。		
効能又は効果	体力虚弱で、皮膚が乾燥し、四肢あるいは諸関節のはれが慢性 に経過して、痛むものの次の諸症 : 関節のはれや痛み、関節炎、神経痛		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	桂枝芍薬知母湯		

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品 1 包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　ケイヒ　外面は暗赤褐色を呈し，内面は赤褐色を呈し，平滑である。横断面は赤褐色を呈し淡褐色の薄層が見られる。特異なにおいがあり，味は甘く，辛く，後にやや粘液性で，わずかに収れん性である。

横切片を鏡検するとき，一次皮部と二次皮部はほとんど連続した石細胞環で区分され，環の外辺にはほぼ円形に結集した繊維束を伴い，環の各石細胞の膜はしばしば U 字形に肥厚する。二次皮部中には石細胞を認めず，まばらに少数の厚膜繊維を認める。柔組織中

には油細胞，粘液細胞及び微細なシュウ酸カルシウムの針晶を含む細胞があり，柔細胞中にはでんぷん粒を含む。

（２）　シャクヤク　外面は褐色～淡灰褐色を呈し，横断面はち密で淡灰褐色を呈し，木部には淡褐色の放射状の線がある。わずかに特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後に渋くてわずかに苦い。

必要に応じて，「シャクヤク」の確認試験を準用する。

（３）　カンゾウ　外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現わす。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に 1～3 細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には 3～10 細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞中にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

（４）　マオウ　細い円柱状又はだ円柱を呈し，長さ 3～10mm，径 1～2mm，淡緑色～黄緑色である。表面に多数の平行する縦みぞがあり，節部には，長さ 2～4mm の 2 枚のりん片状の葉が対生し，その基部は合着して筒状になっている。りん片状の葉の色は淡褐色～褐色である。茎の横断面をルーペ視するとき，円形～だ円形で，周囲部は灰緑色～黄緑色を呈し，中心部には赤緑色の物質が充満しているか，又は中空のところがある。味は渋くてわずかに苦く，やや麻ひ性である。

必要に応じて，「マオウ」の確認試験を準用する。

（５）　ショウキョウ　淡灰黄色の周皮を付けたままか，又はその一部をはぎとってあり，表面は灰白色～淡灰褐色で，しばしば白粉を付けている。横断面は繊維性，粉性で，淡帯黄褐色を呈し，皮層と中心柱とに分かれる。横断面をルーペ視するとき，その全面に維管束及び分泌物が褐色の細点として散在している。特異なにおいがあり，味は極めて辛い。

（６）　ビャクジュツ　外面は淡灰黄色～淡黄白色で，ところどころ灰褐色を呈し，横切面には淡黄褐色～褐色の分泌物による細点がある。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，皮部の柔組織中にはしばしば師管の外側に接して繊維束があり，放射組織の末端部には淡褐色～褐色の内容物を含む油室がある。木部には大きい髄を囲んで放射状に配列した短径の道管とそれを囲む著しい繊維束がある。髄及び放射組織中には皮部と同様な油室があり，柔組織中にはイヌリンの小球晶及びシュウ酸カルシウムの針晶を含む。

必要に応じて，「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。

（７）　チモ　外面は黄褐色～褐色を呈し，質は軽くて折りやすい。横断面は淡黄褐色を呈し，これをルーペ視するとき，皮層は極めて狭く，広い中心柱には，多くの維管束が不規則に点在し，粘液細胞又はその集合による多孔性を示す。味はわずかに甘く，粘液性で，後に苦い。

必要に応じて，「チモ」の確認試験を準用する。

（８）　ボウフウ　外面は淡褐色で，多数の縦じわがある。横断面の周辺は灰褐色で，空げきが多く，中央は円形に黄色を呈する。味はわずかに甘い。

（９）　ブシ　本品はほぼ倒円錐形で，長さ 15～30mm，径 12～16mm，又は縦ときに横に切断され，長さ 20～60mm，幅 15～40mm，厚さ 200～700μm，又は径 12mm 以下の不整な多角形に破砕されている。外面は淡褐色～暗褐色又は黄褐色を呈する。質は堅く，通例，しわはなく，切面は平らで，淡褐色～暗褐色又は黄白色～淡黄褐色を呈し，通常角質，半透明で光沢がある。弱い特異なにおいがある。

横切片及び縦切片を鏡検するとき，外側から擬上皮，一次皮層，内皮，二次皮層，形成層，木部が認められる。一次皮層には楕円形～楕円状四角形，短径 30～75μm，長径 60～ 150μm の厚壁細胞がある。内皮は接線方向に長い 1 層の細胞からなっている。形成層輪は星形又は不整の多角形～円形であり，木部の道管群は V 字形を呈する。二次皮層及び髄中に独立した形成層輪が認められるものもある。道管は孔紋，階紋，網紋又はらせん紋道管である。柔細胞中のでんぷん粒は糊化している。

必要に応じて，「ブシ」の確認試験を準用する。

純度試験　本品 1 包中のアコニチン（$C_{34}H_{47}O_{11}N$：645.75）の残存量は 0.01mg 以下である。

本品 1 包を粉末とし，その重量を精密に量り，これにメタノール 50mL を加え一夜放置した後，1 時間振とうし，ろ紙を用いてろ過する。残渣に再びメタノール 30mL を加え1時間振とうした後，前記ろ紙を用いてろ過する。またこの残渣をメタノール 30mL で 2 回洗い，全量を合わせ減圧下でメタノールをほとんど留去する。残留物に希塩酸 10mL を加え水浴上で加温溶解する。冷後，分液ろう斗に脱脂綿を用いてろ過し，水 10mL で 2 回洗う。ろ液を合わせ，これにアンモニア水（28）を加えてアルカリ性とする。これにクロロホルム 50mL を加えて良く振り混ぜた後に下層を分取する。この操作を 2 回繰り返した後，クロロホルムを合わせ，これに水 10mL を加え洗った後，クロロホルム層を分取し，無水硫酸ナトリウムを加えて脱水する。これをろ過し，減圧下で蒸発乾固する。残留物をクロロホルム 1mL に正確に溶かして試料溶液とする。

別にアコニチン 20mg を精密に量り，クロロホルム 10mL に溶かし正確にメスアップする。この溶液 1mL を正確に量り，10mL に正確に希釈し標準溶液とする。

試料溶液及び標準溶液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。あらかじめ薄層クロマトグラフ用シリカゲルを用いて 0.25mm の厚さに調製し活性化した薄層板に試料溶液0.3mL，標準溶液10μL 及び15μL を正確に塗布する。次にブタノール・酢酸・水（4： 1：5）の混合溶液の上層を展開溶媒として，約 10cm 展開しこれを風乾した後，噴霧用ドラーゲンドルフ試液を均等に噴霧するとき，試料溶液から得られるアコニチンに対応するスポットの濃さは標準溶液の 10μL を塗布した方から得られるスポットより濃いことはあっても，標準溶液の15μL を塗布した方から得られるスポットより濃くない。

乾燥減量　15%以下。

灰　　分　7%以下。

【435】　K225—①

成分及び分量又は本質	日本薬局方	ケイヒ	3.0g
	〃	シャクヤク	3.0g
	〃	カンゾウ	1.5g
	〃	マオウ	2.0 ~ 3.0g
	〃	ショウキョウ	1.0g
	〃	ソウジュツ	4.0g
	〃	チモ	3.0g
	〃	ボウフウ	3.0g
	〃	ブシ	0.3 ~ 1.0g
		全　量	20.8 ~ 22.5g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1 包として製する。		
用法及び用量	本品 1 包に水約 500mL を加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を 3 回に分けて食間に服用する。上記は大人の 1 日量である。15 才未満 7 才以上 大人の 2/3，7 才未満 4 才以上 大人の 1/2，4 才未満2 才以上　大人の 1/3，2 才未満　大人の 1/4 以下を服用する。		
効能又は効果	体力虚弱で、皮膚が乾燥し、四肢あるいは諸関節のはれが慢性 に経過して、痛むものの次の諸症 : 関節のはれや痛み、関節炎、神経痛		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	桂枝芍薬知母湯		

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品 1 包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　ケイヒ　外面は暗赤褐色を呈し，内面は赤褐色を呈し，平滑である。横断面は赤褐色を呈し淡褐色の薄層が見られる。特異なにおいがあり，味は甘く，辛く，後にやや粘液性で，わずかに収れん性である。

横切片を鏡検するとき，一次皮部と二次皮部はほとんど連続した石細胞環で区分され，環の外辺にはほぼ円形に結集した繊維束を伴い，環の各石細胞の膜はしばしば U 字形に肥厚する。二次皮部中には石細胞を認めず，まばらに少数の厚膜繊維を認める。柔組織中

には油細胞，粘液細胞及び微細なシュウ酸カルシウムの針晶を含む細胞があり，柔細胞中にはでんぷん粒を含む。

（２）　シャクヤク　外面は褐色～淡灰褐色を呈し，横断面はち密で淡灰褐色を呈し，木部には淡褐色の放射状の線がある。わずかに特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後に渋くてわずかに苦い。

必要に応じて，「シャクヤク」の確認試験を準用する。

（３）　カンゾウ　外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現わす。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に 1～3 細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には 3～10 細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞中にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

（４）　マオウ　細い円柱状又はだ円柱を呈し，長さ 3～10mm，径 1～2mm，淡緑色～黄緑色である。表面に多数の平行する縦みぞがあり，節部には，長さ 2～4mm の 2 枚のりん片状の葉が対生し，その基部は合着して筒状になっている。りん片状の葉の色は淡褐色～褐色である。茎の横断面をルーペ視するとき，円形～だ円形で，周囲部は灰緑色～黄緑色を呈し，中心部には赤緑色の物質が充満しているか，又は中空のところがある。味は渋くてわずかに苦く，やや麻ひ性である。

必要に応じて，「マオウ」の確認試験を準用する。

（５）　ショウキョウ　淡灰黄色の周皮を付けたままか，又はその一部をはぎとってあり，表面は灰白色～淡灰褐色で，しばしば白粉を付けている。横断面は繊維性，粉性で，淡帯黄褐色を呈し，皮層と中心柱とに分かれる。横断面をルーペ視するとき，その全面に維管束及び分泌物が褐色の細点として散在している。特異なにおいがあり，味は極めて辛い。

（６）　ソウジュツ　外面は暗灰褐色～暗黄褐色である。横断面は淡褐色～赤褐色の分泌物による細点を認める。しばしば白色綿状の結晶を析出する。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，皮部の柔組織中には，通例，繊維束を欠き，放射組織の末端部には淡褐色～黄褐色の内容物を含む油室がある。木部は形成層に接して道管を囲んだ繊維束が放射状に配列し，髄及び放射組織中には皮部と同様な油室がある。柔細胞中にはイヌリンの球晶及びシュウ酸カルシウムの針晶を含む。

（７）　チモ　外面は黄褐色～褐色を呈し，質は軽くて折りやすい。横断面は淡黄褐色を呈し，これをルーペ視するとき，皮層は極めて狭く，広い中心柱には，多くの維管束が不規則に点在し，粘液細胞又はその集合による多孔性を示す。味はわずかに甘く，粘液性で，後に苦い。

必要に応じて，「チモ」の確認試験を準用する。

（８）　ボウフウ　外面は淡褐色で，多数の縦じわがある。横断面の周辺は灰褐色で，空げきが多く，中央は円形に黄色を呈する。味はわずかに甘い。

（９）　ブシ　本品はほぼ倒円錐形で，長さ 15～30mm，径 12～16mm，又は縦ときに横に切断され，長さ 20～60mm，幅 15～40mm，厚さ 200～700μm，又は径 12mm 以下の不整な多角形に破砕されている。外面は淡褐色～暗褐色又は黄褐色を呈する。質は堅く，通例，しわはなく，切面は平らで，淡褐色～暗褐色又は黄白色～淡黄褐色を呈し，通常角質，半透明で光沢がある。弱い特異なにおいがある。

横切片及び縦切片を鏡検するとき，外側から擬上皮，一次皮層，内皮，二次皮層，形成層，木部が認められる。一次皮層には楕円形～楕円状四角形，短径 30～75μm，長径 60～ 150μm の厚壁細胞がある。内皮は接線方向に長い 1 層の細胞からなっている。形成層輪は星形又は不整の多角形～円形であり，木部の道管群は V 字形を呈する。二次皮層及び髄中に独立した形成層輪が認められるものもある。道管は孔紋，階紋，網紋又はらせん紋道管である。柔細胞中のでんぷん粒は糊化している。

必要に応じて，「ブシ」の確認試験を準用する。

純度試験　本品 1 包中のアコニチン（$C_{34}H_{47}O_{11}N$：645.75）の残存量は 0.01mg 以下である。

本品 1 包を粉末とし，その重量を精密に量り，これにメタノール 50mL を加え一夜放置した後，1 時間振とうし，ろ紙を用いてろ過する。残渣に再びメタノール 30mL を加え1時間振とうした後，前記ろ紙を用いてろ過する。またこの残渣をメタノール 30mL で 2 回洗い，全量を合わせ減圧下でメタノールをほとんど留去する。残留物に希塩酸 10mL を加え水浴上で加温溶解する。冷後，分液ろう斗に脱脂綿を用いてろ過し，水 10mL で 2 回洗う。ろ液を合わせ，これにアンモニア水（28）を加えてアルカリ性とする。これにクロロホルム 50mL を加えて良く振り混ぜた後に下層を分取する。この操作を 2 回繰り返した後，クロロホルムを合わせ，これに水 10mL を加え洗った後，クロロホルム層を分取し，無水硫酸ナトリウムを加えて脱水する。これをろ過し，減圧下で蒸発乾固する。残留物をクロロホルム 1mL に正確に溶かして試料溶液とする。

別にアコニチン 20mg を精密に量り，クロロホルム 10mL に溶かし正確にメスアップする。この溶液 1mL を正確に量り，10mL に正確に希釈し標準溶液とする。

試料溶液及び標準溶液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。あらかじめ薄層クロマトグラフ用シリカゲルを用いて 0.25mm の厚さに調製し活性化した薄層板に試料溶液0.3mL，標準溶液10μL 及び15μL を正確に塗布する。次にブタノール・酢酸・水（4： 1：5）の混合溶液の上層を展開溶媒として，約 10cm 展開しこれを風乾した後，噴霧用ドラーゲンドルフ試液を均等に噴霧するとき，試料溶液から得られるアコニチンに対応するスポットの濃さは標準溶液の 10μL を塗布した方から得られるスポットより濃いことはあっても，標準溶液の15μL を塗布した方から得られるスポットより濃くない。

乾燥減量　15%以下。

灰　　分　7%以下。

【436】　K226

成分及び分量又は本質	日本薬局方	キキョウ	3.0g
	局外生規	シオン	1.5g
	日本薬局方	カンゾウ	2.0g
	〃	バクモンドウ	9.0g
	〃	ニンジン	1.5g
	〃	バイモ	2.5g
	〃	キョウニン	4.5g
		全　量	24.0g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1 包として製する。		
用法及び用量	本品 1 包に水約 500mL を加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を 3 回に分けて食間に服用する。上記は大人の 1 日量である。15 才未満 7 才以上　大人の 2/3，7 才未満 4 才以上　大人の 1/2，4 才未満2 才以上　大人の 1/3，2 才未満　大人の 1/4 以下を服用する。		
効能又は効果	のどが痛くて声が出ない感冒		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	外台四物湯加味		

規格及び試験方法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品 1 包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　キキョウ　外面は皮付きは灰褐色，皮去りは白色～淡褐色を呈し，繊維性でない。横切面をルーペ視するとき，皮部は木部よりやや薄く，ほとんど白色で，ところどころにすき間があり，形成層の付近はしばしば褐色を帯びる。木部は白色～淡褐色を呈し，その組織は皮部よりもやや密である。味は初めなく，後にえぐくて苦い。

必要に応じて，「キキョウ」の確認試験を準用する。

（2）　シオン　外面は淡褐色～帯紫褐色を呈し，切断面は褐色～淡褐色である。根の径は 1～2mm で，根には細かい縦じわがあり，質はやや柔軟である。特異なにおいがあり，味はわずかに苦くてややえぐい。

必要に応じて，局外生規「シオン」の確認試験を準用する。

（３）　カンゾウ　外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現わす。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に 1～3 細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には 3～10 細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞中にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

（４）　バクモンドウ　外面は淡黄色～淡黄褐色で，大小の縦じわがある。折るとき皮層は柔軟であるがもろく，中心柱は強じんである。皮層の折面は淡黄褐色を呈し，やや半透明で粘着性がある。味はわずかに甘く，粘着性である。

（５）　ニンジン　外面は淡黄褐色～淡灰褐色を呈し，縦じわがあり，横断面は淡黄褐色を呈し，形成層の付近は褐色を呈する。特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後にやや苦い。

必要に応じて，「ニンジン」の確認試験を準用する。

（６）　バイモ　偏球形を呈し，肥厚した 2 個のりん片葉からなり，径 2～3cm，高さ 1～ 2cm，しばしば分離したものがある。外面及び内面は白色～淡黄褐色，内面の基部はやや暗色を呈する。石灰を散布して乾燥したものは白粉を付けている。折面は白色を呈し，粉性である。特異な弱いにおいがあり，味は苦い。

横切片を鏡検するとき，最外層は 1 層の表皮からなりその内側は柔組織で満たされ，多数の維管束が散在する。柔組織中にはでんぷん粒を含む。でんぷん粒は主に単粒で，径 5～50μm，層紋が明瞭で，長卵形～卵形又は三角状卵形，まれに 2～3 個からなる複粒もある。また，表皮細胞及び道管付近の柔細胞にはシュウ酸カルシウムの単晶を含む。

必要に応じて，「バイモ」の確認試験を準用する。

（７）　キョウニン　種皮は褐色で，表面にはすれて落ちやすい石細胞となった表皮細胞があって，粉をふいたようである。切断面は類白色である。味は苦く，油ようである。

表皮の表面を鏡検するとき，数個ずつ集合する石細胞はおおむね円形で，その細胞膜は均等に著しく厚くなり，径 60～90μm，側面視では鈍三角形で，細胞膜は先端部で著しく厚い。

必要に応じて，「キョウニン」の確認試験を準用する。

乾燥減量　15%以下。

灰　　分　6%以下。

【437】　K227

成分及び分量又は本質	日本薬局方	サイコ	4.0g
	〃	カッコン	3.0g
	〃	マオウ	2.0g
	〃	ケイヒ	3.0g
	〃	オウゴン	3.0g
	〃	シャクヤク	3.0g
	〃	ハンゲ	3.0g
	〃	ショウキョウ	1.0g
	〃	カンゾウ	1.0g
	〃	セッコウ	5.0g
		全　　量	28.0g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1 包として製する。		
用法及び用量	本品 1 包に水約 500mL を加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を 3 回に分けて食間に服用する。上記は大人の 1 日量である。15 才未満 7 才以上 大人の 2/3，7 才未満 4 才以上 大人の 1/2，4 才未満2 才以上　大人の 1/3，2 才未満　大人の 1/4 以下を服用する。		
効能又は効果	体力中等度以上で，激しい感冒様症状を示すものの次の諸症：発熱，悪寒，頭痛，四肢の痛み，口渇，不眠，鼻腔乾燥，食欲不振，はきけ，全身倦怠		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	柴葛解肌湯		

規格及び試験方法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品 1 包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　サイコ　外面は灰褐色～褐色で，深いしわがあるものがあり，横断面では，皮部は褐色，木部は淡褐色を呈する。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，皮部にはしばしば接線方向に長い裂け目があり，皮部の厚さは半径の 1/3～1/2 で，径 15～35μm の胞間性離生油道がやや多数散在し，木部には道管が放射

状若しくはほぼ階段状に配列し，ところどころに繊維群があり，根頭部の髄には皮部と同様の油道がある。柔細胞中にはでんぷん粒を満たし，また油滴を認める。

必要に応じて，「サイコ」の確認試験を準用する。

（2） カッコン 淡灰黄色～灰白色を呈し，繊維性でやや粉性である。味はわずかに甘い。横切片を鏡検するとき，師部には結晶細胞列を伴った繊維束，木部には道管及び木部繊維が著しく，柔組織を満たすでんぷん粒は長径 2～18μm，多くは 8～12μm の数面からなる多面体の単粒，まれに 2～3 個からなる複粒で，中央にへそ又は欠裂を認め，層紋がある。

（3） マオウ 細い円柱状又はだ円柱を呈し，長さ 3～10mm，径 1～2mm，淡緑色～黄緑色である。表面に多数の平行する縦みぞがあり，節部には，長さ 2～4mm の 2 枚のりん片状の葉が対生し，その基部は合着して筒状になっている。りん片状の葉の色は淡褐色～褐色である。茎の横断面をルーペ視するとき，円形～だ円形で，周囲部は灰緑色～黄緑色を呈し，中心部には赤緑色の物質が充満しているか，又は中空のところがある。味は渋くてわずかに苦く，やや麻ひ性である。

必要に応じて，「マオウ」の確認試験を準用する。

（4） ケイヒ 外面は暗赤褐色を呈し，内面は赤褐色を呈し，平滑である。横断面は赤褐色を呈し淡褐色の薄層が見られる。特異なにおいがあり，味は甘く，辛く，後にやや粘液性で，わずかに収れん性である。

横切片を鏡検するとき，一次皮部と二次皮部はほとんど連続した石細胞環で区分され，環の外辺にはほぼ円形に結集した繊維束を伴い，環の各石細胞の膜はしばしば U 字形に肥厚する。二次皮部中には石細胞を認めず，まばらに少数の厚膜繊維を認める。柔組織中には油細胞，粘液細胞及び微細なシュウ酸カルシウムの針晶を含む細胞があり，柔細胞中にはでんぷん粒を含む。

（5） オウゴン 外面は黄褐色～暗褐色を呈し，切断面は黄色～帯褐黄色を呈し，縦に繊維性のすじが見られる。味はわずかに苦い。

必要に応じて，「オウゴン」の確認試験を準用する。

（6） シャクヤク 外面は褐色～淡灰褐色を呈し，横断面はち密で淡灰褐色を呈し，木部には淡褐色の放射状の線がある。わずかに特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後に渋くてわずかに苦い。

必要に応じて，「シャクヤク」の確認試験を準用する。

（7） ハンゲ 外面は白色～灰白黄色，上部には茎の跡がくぼみとなり，その周辺には根の跡がくぼんだ細点となっている。横断面は白色，粉性である。味は初めなく，やや粘液性で，後に強いえぐ味を残す。

横切片を鏡検するとき，主としてでんぷん粒を充満した柔組織からなり，わずかにシュウ酸カルシウムの束晶を含んだ粘液細胞がその間に認められる。でんぷん粒は主として 2～3 個の複粒で，通例，径10～15μm，単粒は通例径3～7μm である。束晶は長さ25～150μmである。

（8） ショウキョウ 淡灰黄色の周皮を付けたままか，又はその一部をはぎとってあり，表面は灰白色～淡灰褐色で，しばしば白粉を付けている。横断面は繊維性，粉性で，淡帯黄褐色を呈し，皮層と中心柱とに分かれる。横断面をルーペ視するとき，その全面に維管束及び分泌物が褐色の細点として散在している。特異なにおいがあり，味は極めて辛い。

（9） カンゾウ 外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現わす。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に 1～3 細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には 3～10 細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞中にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

（10） セッコウ 光沢のある白色の重い繊維状結晶塊で，におい及び味はない。砕くとたやすく針状～微細結晶性の粉末となる。水に溶けにくい。

必要に応じて，「セッコウ」の確認試験を準用する。

乾燥減量 15%以下。

灰　　分 設定しない

【438】　K228

成分及び分又は本質	日本薬局方	サイコ	5.0g
	〃	ハンゲ	5.0g
	〃	ショウキョウ	1.0g
	〃	オウゴン	3.0g
	局外生規	カロニン	3.0g
	日本薬局方	キキョウ	3.0g
	〃	カンゾウ	1.0g
	〃	キジツ	1.5g
		全　量	22.5g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1 包として製する。		
用法及び用量	本品 1 包に水約 500mL を加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を 3 回に分けて食間に服用する。上記は大人の 1 日量である。15 才未満 7 才以上　大人の 2/3，7 才未満 4 才以上　大人の 1/2，4 才未満2 才以上　大人の 1/3，2 才未満　大人の 1/4 以下を服用する。		
効能又は効果	体力中等度以上のものの次の諸証：せき，たん		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	柴胡枳桔湯		

規格及び試験方法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品 1 包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　サイコ　外面は灰褐色～褐色で，深いしわがあるものがあり，横断面では，皮部は褐色，木部は淡褐色を呈する。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，皮部にはしばしば接線方向に長い裂け目があり，皮部の厚さは半径の 1/3～1/2 で，径 15～35μm の胞間性離生油道がやや多数散在し，木部には道管が放射状若しくはほぼ階段状に配列し，ところどころに繊維群があり，根頭部の髄には皮部と同様の油道がある。柔細胞中にはでんぷん粒を満たし，また油滴を認める。

必要に応じて，「サイコ」の確認試験を準用する。

（２）　ハンゲ　外面は白色～灰白黄色，上部には茎の跡がくぼみとなり，その周辺には根の跡がくぼんだ細点となっている。横断面は白色，粉性である。味は初めなく，やや粘液性で，後に強いえぐ味を残す。

横切片を鏡検するとき，主としてでんぷん粒を充満した柔組織からなり，わずかにシュウ酸カルシウムの束晶を含んだ粘液細胞がその間に認められる。でんぷん粒は主として 2～3 個の複粒で，通例，径10～15μm，単粒は通例径3～7μm である。束晶は長さ25～150μmである。

（３）　ショウキョウ　淡灰黄色の周皮をつけたままか，又はその一部をはぎとってあり，表面は灰白色～淡灰褐色で，しばしば白粉を付けている。横断面は繊維性，粉性で，淡帯黄褐色を呈し，皮層と中心柱とに分かれる。横断面をルーペ視するとき，その全面に維管束及び分泌物が褐色の細点として散在している。特異なにおいがあり，味は極めて辛い。

（４）　オウゴン　外面は黄褐色～暗褐色を呈し，切断面は黄色～帯褐黄色を呈し，縦に繊維性のすじが見られる。味はわずかに苦い。

必要に応じて，「オウゴン」の確認試験を準用する。

（５）　カロニン　種子で，次の（1），(2) 又は (3) である。(1) は偏平な卵形～広卵形，ときにだ円形を呈し，多くは左右非相称である。長さ9～18mm，幅5～10mm，厚さ約3mm，灰褐色～暗赤褐色あるいは淡褐色を呈する。細まった一端にはへそと発芽口があり，この部分はやや隆起し，切形又は鈍頭を呈する。周辺に沿って幅1～3mm の縁どりがあるものと，これが明らかでないものとがある。表面はなめらかであるが，ルーペ視すると，多数の小さなくぼみが見られる。(2) は偏平な長だ円形を呈し，長さ12～15mm，幅5～7mm，厚さ約 4mm，灰白色～灰褐色を呈する。へそ及び発芽口の部分は（1）に類似するが，周辺の縁どりはおおむね明らかでなく，表面はざらつき，小隆起が密集する。（3）は（1）に類似するが，大形で，長さ18～27mm，幅10～16mm，厚さ3～6mm のもの，（1）にやや類似するがおおむね左右相称で，へそと発芽口は極めて接近し，その付近は淡黄褐色を呈するもの，及び（1）に極めて類似するものとがある。種皮をはぐと通例表面灰緑色を呈する子葉が見られる。においがなく，味は苦く油ようである。

必要に応じて，局外生規「カロニン」の確認試験を準用する。

（６）　キキョウ　外面は皮付きは灰褐色，皮去りは白色～淡褐色を呈し，繊維性でない。横切面をルーペ視するとき，皮部は木部よりやや薄く，ほとんど白色で，ところどころにすき間があり，形成層の付近はしばしば褐色を帯びる。木部は白色～淡褐色を呈し，その組織は皮部よりもやや密である。味は初めなく，後にえぐくて苦い。

必要に応じて，「キキョウ」の確認試験を準用する。

（７）　カンゾウ　外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現わす。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に 1～3 細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には 3～10 細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞中にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

（8）　キジツ　外面は濃緑褐色～褐色で，つやがなく，油室による多数のくぼんだ小点がある。切断面は淡灰褐色を呈し，内果皮を付ける部分は褐色を呈する。特異なにおいがあり，味は苦い。

必要に応じて，「キジツ」の確認試験を準用する。

乾燥減量　15%以下。

灰　　分　6%以下。

【439】　K229

成分及び分量又は本質	日本薬局方	カンゾウ	2.0~ 3.0g
	〃	カンキョウ	2.0g
	〃	ブシ	0.3 ~ 1.0g
		全　量	4.3 ~ 6.0g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1 包として製する。		
用法及び用量	本品 1 包に水約 500mL を加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を 3 回に分けて食間に服用する。上記は大人の 1 日量である。15 才未満 7 才以上 大人の 2/3，7 才未満 4 才以上 大人の 1/2，4 才未満2 才以上　大人の 1/3，2 才未満　大人の 1/4 以下を服用する。		
効能又は効果	体力虚弱あるいは体力が消耗し、手足が冷えるものの次の諸症 : 感冒、急・慢性胃腸炎、下痢、はきけ		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	四逆湯		

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品 1 包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　カンゾウ　外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現わす。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に 1～3 細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には 3～10 細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞中にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

（2）　カンキョウ　偏圧した不規則な塊状でしばしば分枝する。分枝した各部はやや湾曲した卵形又は長卵形を呈し，長さ 2～4cm，径 1～2cm である。外面は灰黄色～灰黄褐色で，しわ及び輪節がある。折面は褐色～暗褐色で透明感があり角質である。横切面をルーペ視するとき皮層と中心柱は区分され，全面に維管束が散在する。特異なにおいがあり，味は極めて辛い。

横切片を鏡検するとき，外側よりコルク層，皮層，内皮，中心柱が認められる。皮層と中心柱は一層の内皮によって区分される。皮層及び中心柱は柔組織からなり，繊維束で囲まれた維管束が散在する。柔組織中には黄色の油様物質を含む油細胞が散在し，柔細胞中にはシュウ酸カルシウムの単晶が含まれ，でんぷんは糊化している。

必要に応じて，「カンキョウ」の確認試験を準用する。

（３） ブシ 本品はほぼ倒円錐形で，長さ 15～30mm，径 12～16mm，又は縦ときに横に切断され，長さ 20～60mm，幅 15～40mm，厚さ 200～700μm，又は径 12mm 以下の不整な多角形に破砕されている。外面は淡褐色～暗褐色又は黄褐色を呈する。質は堅く，通例，しわはなく，切面は平らで，淡褐色～暗褐色又は黄白色～淡黄褐色を呈し，通常角質，半透明で光沢がある。弱い特異なにおいがある。

横切片及び縦切片を鏡検するとき，外側から擬上皮，一次皮層，内皮，二次皮層，形成層，木部が認められる。一次皮層には楕円形～楕円状四角形，短径 30～75μm，長径 60～ 150μm の厚壁細胞がある。内皮は接線方向に長い 1 層の細胞からなっている。形成層輪は星形又は不整の多角形～円形であり，木部の道管群は V 字形を呈する。二次皮層及び髄中に独立した形成層輪が認められるものもある。道管は孔紋，階紋，網紋又はらせん紋道管である。柔細胞中のでんぷん粒は糊化している。

必要に応じて，「ブシ」の確認試験を準用する。

純度試験 本品 1 包中のアコニチン（$C_{34}H_{47}O_{11}N$：645.75）の残存量は 0.01mg 以下である。

本品 1 包を粉末とし，その重量を精密に量り，これにメタノール 50mL を加え一夜放置した後，1 時間振とうし，ろ紙を用いてろ過する。残渣に再びメタノール 30mL を加え1時間振とうした後，前記ろ紙を用いてろ過する。またこの残渣をメタノール 30mL で 2 回洗い，全量を合わせ減圧下でメタノールをほとんど留去する。残留物に希塩酸 10mL を加え水浴上で加温溶解する。冷後，分液ろう斗に脱脂綿を用いてろ過し，水 10mL で 2 回洗う。ろ液を合わせ，これにアンモニア水（28）を加えてアルカリ性とする。これにクロロホルム 50mL を加えて良く振り混ぜた後に下層を分取する。この操作を 2 回繰り返した後，クロロホルムを合わせ，これに水 10mL を加え洗った後，クロロホルム層を分取し，無水硫酸ナトリウムを加えて脱水する。これをろ過し，減圧下で蒸発乾固する。残留物をクロロホルム 1mL に正確に溶かして試料溶液とする。

別にアコニチン 20mg を精密に量り，クロロホルム 10mL に溶かし正確にメスアップする。この溶液 1mL を正確に量り，10mL に正確に希釈し標準溶液とする。

試料溶液及び標準溶液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。あらかじめ薄層クロマトグラフ用シリカゲルを用いて 0.25mm の厚さに調製し活性化した薄層板に試料溶液0.3mL，標準溶液10μL 及び15μL を正確に塗布する。次にブタノール・酢酸・水（4： 1：5）の混合溶液の上層を展開溶媒として，約 10cm 展開しこれを風乾した後，噴霧用ドラーゲンドルフ試液を均等に噴霧するとき，試料溶液から得られるアコニチンに対応するスポットの濃さは標準溶液の 10μL を塗布した方から得られるスポットより濃いことはあっても，標準溶液の15μL を塗布した方から得られるスポットより濃くない。

乾燥減量 15%以下。

灰　　分 7%以下。

【440】　K230

成分及び分量又は本質	日本薬局方	サンシシ	1.5～3.0g
	〃	カンゾウ	1.0g
	〃	オウバク	2.0g
		全　量	4.5～6.0g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1 包として製する		
用法及び用量	本品 1 包に水約 160mL を加えて，60mLぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を 2回に分けて食間に温めて服用する。目の充血には洗眼。 上記は大人の 1 日量である。 15 才未満 7 才以上 大人の 2/3，7 才未満 4 才以上 大人の 1/2，4 才未満2 才以上　大人の 1/3，2 才未満　大人の 1/4 以下を服用する。		
効能又は効果	体力中等度で，冷えはなく，ときにかゆみがあるものの次の諸症：湿疹・皮膚炎，かゆみ，目の充血		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	梔子柏皮湯		

規格及び試験方法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品 1 包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　サンシシ　果皮は薄く砕きやすく，その外面は赤褐色～黄褐色又は黒褐色を呈し，内面は黄褐色を呈し，平らでつやがある。果実の内部は 2 室に分かれ，黄赤色～暗赤色の果肉中に黒褐色又は黄赤色で長径約 5mm の偏平な種子の団塊を含む。質は軽い。特異なにおいがあり，味は苦い。

必要に応じて，「サンシシ」の確認試験を準用する。

（2）　カンゾウ　外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現わす。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に 1～3 細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には 3～10 細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞中にはで

んぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

（３）　オウバク　外面は灰黄褐色～灰褐色で，内面は黄色～暗黄褐色で，細かい縦線がある。横断面は鮮黄色でやや繊維性である。横切面をルーペ視するとき，皮部外層は黄色で薄く，石細胞が黄褐色の点状に分布する。皮部内層は厚く，一次放射組織は外方に向かうにしたがい幅が広がり，それらの一次放射組織の間に，多くの二次放射組織が集まってほぼ三角形の師部を形成し，この組織に褐色を呈する師部繊維束が層積して接線方向に並び，放射組織と交錯して格子状を呈する。味は極めて苦く，粘液性で，だ液を黄色に染める。

必要に応じて，「オウバク」の確認試験を準用する。

乾燥減量　15%以下。

灰　　分　10%以下。

【441】　K231

成分及び分量又は本質	日本薬局方	トウキ	3.0g
	〃	センキュウ	3.0g
	〃	シャクヤク	3.0g
	〃	チモ	3.0g
	〃	ジオウ	3.0g
	〃	オウバク	3.0g
	〃	オウゴン	3.0g
	〃	サイコ	3.0g
	〃	ビャクシ	3.0g
	〃	コ　ウ　ブ　シ	3.0g
		全　　量	30.0g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1 包として製する。		
用法及び用量	本品 1 包に水約 500mL を加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を 3 回に分けて食間に服用する。上記は大人の 1 日量である。15 才未満 7 才以上 大人の 2/3，7 才未満 4 才以上 大人の 1/2，4 才未満2 才以上　大人の 1/3，2 才未満　大人の 1/4 以下を服用する。		
効能又は効果	体力虚弱なものの次の諸症：耳鳴り，聴力低下，めまい		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	滋腎通耳湯		

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品 1 包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　トウキ　外面は暗褐色～赤褐色で，縦じわがあり，切断面は淡黄色～黄褐色を呈する。特異なにおいがあり，味はわずかに甘く，後にやや辛い。

横切片を鏡検するとき，コルク層は 4～10 層からなり，その内側に数層の厚角組織が続いている。皮部には分泌細胞に囲まれた多数の樹脂道並びにしばしば大きなすき間がある。形成層は長方形に偏圧された数層の細胞からなり，明らかに皮部と木部とを区別する。木部では多数の道管と放射組織とが交互に放射状に配列し，その外方の道管は単独又は数個集ま

ってやや密に配列してくさび状をなすが，中心部付近の道管は極めてまばらに存在する。でんぷん粒は径19μm 以下，まれに2～5 個の複粒があり，複粒の径は25μm に達し，しばしばのり化している。

（2） センキュウ 外面は灰褐色～暗褐色で，切断面は灰白色～灰褐色，半透明で，ときにはうつろがある。質は密で堅い。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，皮部及び髄には油道が散在する。木部には厚膜で木化した木部繊維が大小不同の群をなして存在する。でんぷん粒は，通例，のり化していて，まれに径 5～25μm のでんぷん粒を認めることがある。シュウ酸カルシウム結晶は認めない。

（3） シャクヤク 外面は褐色～淡灰褐色を呈し，横断面はち密で淡灰褐色を呈し，木部には淡褐色の放射状の線がある。わずかに特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後に渋くてわずかに苦い。

必要に応じて，「シャクヤク」の確認試験を準用する。

（4） チモ 外面は黄褐色～褐色を呈し，質は軽くて折りやすい。横断面は淡黄褐色を呈し，これをルーペ視するとき，皮層は極めて狭く，広い中心柱には，多くの維管束が不規則に点在し，粘液細胞又はその集合による多孔性を示す。味はわずかに甘く，粘液性で，後に苦い。

必要に応じて，「チモ」の確認試験を準用する。

（5） ジオウ 外面は黄褐色～黒褐色を呈し，深い縦みぞ及びくびれがある。質は柔らかく粘性である。横断面は黄褐色～黒褐色で，皮部は木部より色が濃く，ほとんど髄を認めない。特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後にやや苦い。

横切片を鏡検するとき，コルク層は 7～15 層で，皮部はすべて柔細胞からなり，外皮部に褐色の分泌物を含む細胞が散在する。木部はほとんど柔細胞で満たされ，放射状に並ぶ道管は側孔のある網紋があり，弱い木化反応を呈する。

（6） オウバク 外面は灰黄褐色～灰褐色で，内面は黄色～暗黄褐色で，細かい縦線がある。横断面は鮮黄色でやや繊維性である。横切面をルーペ視するとき，皮部外層は黄色で薄く，石細胞が黄褐色の点状に分布する。皮部内層は厚く，一次放射組織は外方に向かうにしたがい幅が広がり，それらの一次放射組織の間に，多くの二次放射組織が集まってほぼ三角形の師部を形成し，この組織に褐色を呈する師部繊維束が層積して接線方向に並び，放射組織と交錯して格子状を呈する。味は極めて苦く，粘液性で，だ液を黄色に染める。

必要に応じて，「オウバク」の確認試験を準用する。

（7） ビャクシ 外面は灰褐色～暗褐色を呈し，縦じわがあり，横断面の周辺は灰白色で空げきが多く，中央部は暗褐色である。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

必要に応じて，「ビャクシ」の確認試験を準用する。

（8） オウゴン 外面は黄褐色～暗褐色を呈し，切断面は黄色～帯褐黄色を呈し，縦に繊維性のすじが見られる。味はわずかに苦い。

必要に応じて，「オウゴン」の確認試験を準用する。

（9） サイコ 外面は灰褐色～褐色で，深いしわがあるものがあり，横断面では，皮部は褐色，木部は淡褐色を呈する。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，皮部にはしばしば接線方向に長い裂け目があり，皮部の厚さは半径の 1/3～1/2 で，径 15～35μm の胞間性離生油道がやや多数散在し，木部には道管が放射状若しくはほぼ階段状に配列し，ところどころに繊維群があり，根頭部の髄には皮部と同様の油道がある。柔細胞中にはでんぷん粒を満たし，また油滴を認める。

必要に応じて，「サイコ」の確認試験を準用する。

（８） コウブシ 紡錘形を呈し，長さ 1.5～2.5cm，径 0.5～1cm である。外面は灰褐色～灰黒褐色で，5～8 個の不整な輪節があり，その部分に毛状になった繊維束がある。質は堅く，横断面は赤褐色～淡黄色を呈し，ろうようのつやを帯び，皮層部の厚さは中心柱の径とほぼ等しいか又はわずかに薄い。これをルーペ視するとき，周辺には繊維束が褐色のはん点として輪状に並び，皮層部にはところどころに維管束が赤褐色のはん点として，また分泌細胞が黄褐色の微小なはん点として多数存在する。中心柱には多数の維管束が点又は線として散在する。わずかに特異なにおい及び味がある。

乾燥減量 15%以下。

灰　　分 7%以下。

【442】　K232

成分及び分量又は本質	日本薬局方	ブクリョウ	5.0g
	〃	シャクヤク	3.0g
	〃	ビャクジュツ	3.0g
	〃	ショウキョウ	1.0g
	〃	ブシ	0.3～0.5g
		全　量	12.3～12.5g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1 包として製する。		
用法及び用量	本品 1 包に水約 500mL を加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を 3 回に分けて食間に服用する。上記は大人の 1 日量である。15 才未満 7 才以上 大人の 2/3，7 才未満 4 才以上 大人の 1/2，4 才未満2 才以上　大人の 1/3，2 才未満　大人の 1/4 以下を服用する。		
効能又は効果	体力虚弱で、冷えがあって、疲労倦怠感があり、ときに下痢、腹痛、めまいがあるものの次の諸症：下痢、急・慢性胃腸炎、胃腸虚弱、めまい、動悸、感冒、むくみ、湿疹・皮膚炎、皮膚のかゆみ		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	真武湯		

規格及び試験方法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品 1 包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　ブクリョウ　白色又はわずかに淡赤色を帯びた白色で，質は堅いが砕きやすい。味はないがやや粘液ようである。

必要に応じて，「ブクリョウ」の確認試験を準用する。

（2）　シャクヤク　外面は褐色～淡灰褐色を呈し，横断面はち密で淡灰褐色を呈し，木部には淡褐色の放射状の線がある。わずかに特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後に渋くてわずかに苦い。

必要に応じて，「シャクヤク」の確認試験を準用する。

（3）　ビャクジュツ　外面は淡灰黄色～淡黄白色で，ところどころ灰褐色を呈し，横切面には淡黄褐色～褐色の分泌物による細点がある。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，皮部の柔組織中にはしばしば師管の外側に接して繊維束があり，放射組織の末端部には淡褐色～褐色の内容物を含む油室がある。木部には大きい髄を囲んで放射状に配列した短径の道管とそれを囲む著しい繊維束がある。髄及び放射組織中には皮部と同様な油室があり，柔組織中にはイヌリンの小球晶及びシュウ酸カルシウムの針晶を含む。

必要に応じて，「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。

（４）　ショウキョウ　淡灰黄色の周皮を付けたままか，又はその一部をはぎとってあり，表面は灰白色～淡灰褐色で，しばしば白粉を付けている。横断面は繊維性，粉性で，淡帯黄褐色を呈し，皮層と中心柱とに分かれる。横断面をルーペ視するとき，その全面に維管束及び分泌物が褐色の細点として散在している。特異なにおいがあり，味は極めて辛い。

（５）　ブシ　本品はほぼ倒円錐形で，長さ 15～30mm，径 12～16mm，又は縦ときに横に切断され，長さ 20～60mm，幅 15～40mm，厚さ 200～700μm，又は径 12mm 以下の不整な多角形に破砕されている。外面は淡褐色～暗褐色又は黄褐色を呈する。質は堅く，通例，しわはなく，切面は平らで，淡褐色～暗褐色又は黄白色～淡黄褐色を呈し，通常角質，半透明で光沢がある。弱い特異なにおいがある。

横切片及び縦切片を鏡検するとき，外側から擬上皮，一次皮層，内皮，二次皮層，形成層，木部が認められる。一次皮層には楕円形～楕円状四角形，短径 30～75μm，長径 60～ 150μm の厚壁細胞がある。内皮は接線方向に長い 1 層の細胞からなっている。形成層輪は星形又は不整の多角形～円形であり，木部の道管群は V 字形を呈する。二次皮層及び髄中に独立した形成層輪が認められるものもある。道管は孔紋，階紋，網紋又はらせん紋道管である。柔細胞中のでんぷん粒は糊化している。

必要に応じて，「ブシ」の確認試験を準用する。

純度試験　本品 1 包中のアコニチン（$C_{34}H_{47}O_{11}N$：645.75）の残存量は 0.01mg 以下である。

本品 1 包を粉末とし，その重量を精密に量り，これにメタノール 50mL を加え一夜放置した後，1 時間振とうし，ろ紙を用いてろ過する。残渣に再びメタノール 30mL を加え1時間振とうした後，前記ろ紙を用いてろ過する。またこの残渣をメタノール 30mL で 2 回洗い，全量を合わせ減圧下でメタノールをほとんど留去する。残留物に希塩酸 10mL を加え水浴上で加温溶解する。冷後，分液ろう斗に脱脂綿を用いてろ過し，水 10mL で 2 回洗う。ろ液を合わせ，これにアンモニア水（28）を加えてアルカリ性とする。これにクロロホルム 50mL を加えて良く振り混ぜた後に下層を分取する。この操作を 2 回繰り返した後，クロロホルムを合わせ，これに水 10mL を加え洗った後，クロロホルム層を分取し，無水硫酸ナトリウムを加えて脱水する。これをろ過し，減圧下で蒸発乾固する。残留物をクロロホルム 1mL に正確に溶かして試料溶液とする。

別にアコニチン 20mg を精密に量り，クロロホルム 10mL に溶かし正確にメスアップする。この溶液 1mL を正確に量り，10mL に正確に希釈し標準溶液とする。

試料溶液及び標準溶液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。あらかじめ薄層クロマトグラフ用シリカゲルを用いて 0.25mm の厚さに調製し活性化した薄層板に試料溶液0.3mL，標準溶液10μL 及び15μL を正確に塗布する。次にブタノール・酢酸・水（4： 1：5）の混合溶液の上層を展開溶媒として，約 10cm 展開しこれを風乾した後，噴霧用ドラーゲンドルフ試液を均等に噴霧するとき，試料溶液から得られるアコニチンに対応するスポットの濃さは標準溶液の 10μL を塗布した方から得られるスポ

ットより濃いことはあっても，標準溶液の15μL を塗布した方から得られるスポットより濃くない。

乾燥減量　15%以下。

灰　　分　6%以下。

【443】　K232—①

成分及び分量又は本質	日本薬局方	ブクリョウ	5.0g
	〃	シャクヤク	3.0g
	〃	ソウジュツ	3.0g
	〃	ショウキョウ	1.0g
	〃	ブシ	0.3～0.5g
		全　量	12.3～12.5g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1 包として製する。		
用法及び用量	本品 1 包に水約 500mL を加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を 3 回に分けて食間に服用する。上記は大人の 1 日量である。15 才未満 7 才以上 大人の 2/3，7 才未満 4 才以上 大人の 1/2，4 才未満2 才以上　大人の 1/3，2 才未満　大人の 1/4 以下を服用する。		
効能又は効果	体力虚弱で、冷えがあって、疲労倦怠感があり、ときに下痢、腹痛、めまいがあるものの次の諸症：下痢、急・慢性胃腸炎、胃腸虚弱、めまい、動悸、感冒、むくみ、湿疹・皮膚炎、皮膚のかゆみ		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	真武湯		

規格及び試験方法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品 1 包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　ブクリョウ　白色又はわずかに淡赤色を帯びた白色で，質は堅いが砕きやすい。味はないがやや粘液ようである。

必要に応じて，「ブクリョウ」の確認試験を準用する。

（2）　シャクヤク　外面は褐色～淡灰褐色を呈し，横断面はち密で淡灰褐色を呈し，木部には淡褐色の放射状の線がある。わずかに特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後に渋くてわずかに苦い。

必要に応じて，「シャクヤク」の確認試験を準用する。

（3）　ソウジュツ　外面は暗灰褐色～暗黄褐色である。横断面は淡褐色～赤褐色の分泌物による細点を認める。しばしば白色綿状の結晶を析出する。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，皮部の柔組織中には，通例，繊維束を欠き，放射組織の末端部には淡褐色～黄褐色の内容物を含む油室がある。木部は形成層に接して道管を囲んだ繊維束が放射状に配列し，髄及び放射組織中には皮部と同様な油室がある。柔細胞中にはイヌリンの球晶及びシュウ酸カルシウムの針晶を含む。

（４）　ショウキョウ　淡灰黄色の周皮を付けたままか，又はその一部をはぎとってあり，表面は灰白色～淡灰褐色で，しばしば白粉を付けている。横断面は繊維性，粉性で，淡帯黄褐色を呈し，皮層と中心柱とに分かれる。横断面をルーペ視するとき，その全面に維管束及び分泌物が褐色の細点として散在している。特異なにおいがあり，味は極めて辛い。

（５）　ブシ　本品はほぼ倒円錐形で，長さ 15～30mm，径 12～16mm，又は縦ときに横に切断され，長さ 20～60mm，幅 15～40mm，厚さ 200～700μm，又は径 12mm 以下の不整な多角形に破砕されている。外面は淡褐色～暗褐色又は黄褐色を呈する。質は堅く，通例，しわはなく，切面は平らで，淡褐色～暗褐色又は黄白色～淡黄褐色を呈し，通常角質，半透明で光沢がある。弱い特異なにおいがある。

横切片及び縦切片を鏡検するとき，外側から擬上皮，一次皮層，内皮，二次皮層，形成層，木部が認められる。一次皮層には楕円形～楕円状四角形，短径 30～75μm，長径 60～ 150μm の厚壁細胞がある。内皮は接線方向に長い 1 層の細胞からなっている。形成層輪は星形又は不整の多角形～円形であり，木部の道管群は V 字形を呈する。二次皮層及び髄中に独立した形成層輪が認められるものもある。道管は孔紋，階紋，網紋又はらせん紋道管である。柔細胞中のでんぷん粒は糊化している。

必要に応じて，「ブシ」の確認試験を準用する。

純度試験　本品 1 包中のアコニチン（$C_{34}H_{47}O_{11}N$：645.75）の残存量は 0.01mg 以下である。

本品 1 包を粉末とし，その重量を精密に量り，これにメタノール 50mL を加え一夜放置した後，1 時間振とうし，ろ紙を用いてろ過する。残渣に再びメタノール 30mL を加え1時間振とうした後，前記ろ紙を用いてろ過する。またこの残渣をメタノール 30mL で 2 回洗い，全量を合わせ減圧下でメタノールをほとんど留去する。残留物に希塩酸 10mL を加え水浴上で加温溶解する。冷後，分液ろう斗に脱脂綿を用いてろ過し，水 10mL で 2 回洗う。ろ液を合わせ，これにアンモニア水（28）を加えてアルカリ性とする。これにクロロホルム 50mL を加えて良く振り混ぜた後に下層を分取する。この操作を 2 回繰り返した後，クロロホルムを合わせ，これに水 10mL を加え洗った後，クロロホルム層を分取し，無水硫酸ナトリウムを加えて脱水する。これをろ過し，減圧下で蒸発乾固する。残留物をクロロホルム 1mL に正確に溶かして試料溶液とする。

別にアコニチン 20mg を精密に量り，クロロホルム 10mL に溶かし正確にメスアップする。この溶液 1mL を正確に量り，10mL に正確に希釈し標準溶液とする。

試料溶液及び標準溶液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。あらかじめ薄層クロマトグラフ用シリカゲルを用いて 0.25mm の厚さに調製し活性化した薄層板に試料溶液0.3mL，標準溶液10μL 及び15μL を正確に塗布する。次にブタノール・酢酸・水（4： 1：5）の混合溶液の上層を展開溶媒として，約 10cm 展開しこれを風乾した後，噴霧用ドラーゲンドルフ試液を均等に噴霧するとき，試料溶液から得られるアコニチンに対応するスポットの濃さは標準溶液の 10μL を塗布した方から得られるスポットより濃いことはあっても，標準溶液の15μL を塗布した方から得られるスポットより濃くない。

乾燥減量　15%以下。

灰　　分　6%以下。

【444】　K233

成分及び分量又は本質	日本薬局方	ニンジン	3.0g
	〃	ビャクジュツ	3.5g
	〃	ブクリョウ	3.5g
	〃	トウキ	3.0g
	〃	シャクヤク	3.0g
	〃	ショウマ	1.0g
	〃	ゴミシ	1.0g
	局外生規	ゲンジン	1.0g
	日本薬局方	バクモンドウ	3.0g
	〃	カンゾウ	1.0g
		全　　量	23.0g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1 包として製する。		
用法及び用量	本品 1 包に水約 500mL を加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を 3 回に分けて食間に服用する。上記は大人の 1 日量である。15 才未満 7 才以上 大人の 2/3，7 才未満 4 才以上 大人の 1/2，4 才未満2 才以上　大人の 1/3，2 才未満　大人の 1/4 以下を服用する。		
効能又は効果	体力中等度以下で，胃腸が弱いものの次の諸症：口内炎，口腔や舌の荒れ・痛み，口の渇き・乾燥		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	清熱補気湯		

規格及び試験方法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品 1 包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　ニンジン　外面は淡黄褐色～淡灰褐色を呈し，縦じわがあり，横断面は淡黄褐色を呈し，形成層の付近は褐色を呈する。特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後にやや苦い。

必要に応じて，「ニンジン」の確認試験を準用する。

（２）　ビャクジュツ　外面は淡灰黄色～淡黄白色で，ところどころ灰褐色を呈し，横切面には淡黄褐色～褐色の分泌物による細点がある。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，皮部の柔組織中にはしばしば師管の外側に接して繊維束があり，放射組織の末端部には淡褐色～褐色の内容物を含む油室がある。木部には大きい髄を囲んで放射状に配列した短径の道管とそれを囲む著しい繊維束がある。髄及び放射組織中には皮部と同様な油室があり，柔組織中にはイヌリンの小球晶及びシュウ酸カルシウムの針晶を含む。

必要に応じて，「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。

（３）　ブクリョウ　白色又はわずかに淡赤色を帯びた白色で，質は堅いが砕きやすい。味はないがやや粘液ようである。

必要に応じて，「ブクリョウ」の確認試験を準用する。

（４）　トウキ　外面は暗褐色～赤褐色で，縦じわがあり，切断面は淡黄色～黄褐色を呈する。特異なにおいがあり，味はわずかに甘く，後にやや辛い。

横切片を鏡検するとき，コルク層は 4～10　層からなり，その内側に数層の厚角組織が続いている。皮部には分泌細胞に囲まれた多数の樹脂道並びにしばしば大きなすき間がある。形成層は長方形に偏圧された数層の細胞からなり，明らかに皮部と木部とを区別する。木部では多数の道管と放射組織とが交互に放射状に配列し，その外方の道管は単独又は数個集まってやや密に配列してくさび状をなすが，中心部付近の道管は極めてまばらに存在する。でんぷん粒は径19μm 以下，まれに2～5 個の複粒があり，複粒の径は25μm に達し，しばしばのり化している。

（５）　シャクヤク　外面は褐色～淡灰褐色を呈し，横断面はち密で淡灰褐色を呈し，木部には淡褐色の放射状の線がある。わずかに特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後に渋くてわずかに苦い。

必要に応じて，「シャクヤク」の確認試験を準用する。

（６）　ショウマ　外面は暗褐色を呈し，切断面では木部は淡褐色～灰褐色繊維性で，網目状を呈する。質は軽い。味は苦くてわずかに渋い。

（７）　ゴミシ　暗赤色～黒褐色を呈し，表面にはしわがあり，またしばしば白い粉を付ける。果肉を除くとじん臓型の種子 1～2 個を認め，その外種皮は黄褐色～暗赤褐色を呈し，つやがあり，堅くてもろい。外種皮はたやすくはがれるが，内種皮は胚乳に密着し，背面に明らかな縫線を認める。酸味があり，後に渋くて苦い。

（８）　ゲンジン　外面は黄褐色～褐色を呈し，切断面は黒褐色を呈する。特異なにおいがあり，味はやや甘く，後わずかに苦い。

必要に応じて，局外生規「ゲンジン」の確認試験を準用する。

（９）　バクモンドウ　紡錘形を呈し，長さ 10～25mm，径 3～5mm，一端はややとがり，他端はやや丸みをもち，外面は淡黄色～淡黄褐色で，大小の縦じわがある。皮層は柔軟性でもろく，中心柱は強じんで折りにくい。皮層の折面は淡黄褐色を呈し，やや半透明で粘着性がある。味はわずかに甘く，粘着性である。

（１０）　カンゾウ　外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現わす。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に 1～3 細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には 3～10 細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞中にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

乾燥減量　15%以下。

灰　　分　6%以下。

【445】　K234

成分及び分量又は本質	日本薬局方	トウキ	3.0g
	〃	センキュウ	3.0g
	〃	シャクヤク	3.0g
	〃	ジオウ	3.0g
	局外生規	ゲンジン	1.5g
	日本薬局方	チモ	1.5g
	〃	ゴミシ	1.5g
	〃	オウバク	1.5g
	〃	バクモンドウ	3.0g
	〃	サイコ	1.5g
	〃	ボタンピ	1.5g
		全量	24.0g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1 包として製する。		
用法及び用量	本品 1 包に水約 500mL を加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を 3 回に分けて食間に服用する。上記は大人の 1 日量である。15 才未満 7 才以上 大人の 2/3，7 才未満 4 才以上 大人の 1/2，4 才未満2 才以上　大人の 1/3，2 才未満　大人の 1/4 以下を服用する。		
効能又は効果	体力中等度以下で，胃腸障害はなく，貧血気味で皮膚が乾燥しているものの次の諸症：口内炎，口腔や舌の荒れ・痛み，口の渇き・乾燥		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	清熱補血湯		

規格及び試験方法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品 1 包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　トウキ　外面は暗褐色～赤褐色で，縦じわがあり，切断面は淡黄色～黄褐色を呈する。特異なにおいがあり，味はわずかに甘く，後にやや辛い。

横切片を鏡検するとき，コルク層は 4～10　層からなり，その内側に数層の厚角組織が続いている。皮部には分泌細胞に囲まれた多数の樹脂道並びにしばしば大きなすき間があ

る。形成層は長方形に偏圧された数層の細胞からなり，明らかに皮部と木部とを区別する。木部では多数の道管と放射組織とが交互に放射状に配列し，その外方の道管は単独又は数個集まってやや密に配列してくさび状をなすが，中心部付近の道管は極めてまばらに存在する。でんぷん粒は径19μm 以下，まれに2～5 個の複粒があり，複粒の径は25μm に達し，しばしばのり化している。

（2） センキュウ 外面は灰褐色～暗褐色で，切断面は灰白色～灰褐色，半透明で，ときにはうつろがある。質は密で堅い。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，皮部及び髄には油道が散在する。木部には厚膜で木化した木部繊維が大小不同の群をなして存在する。でんぷん粒は，通例，のり化していて，まれに径 5～25μm のでんぷん粒を認めることがある。シュウ酸カルシウム結晶は認めない。

（3） シャクヤク 外面は褐色～淡灰褐色を呈し，横断面はち密で淡灰褐色を呈し，木部には淡褐色の放射状の線がある。わずかに特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後に渋くてわずかに苦い。

必要に応じて，「シャクヤク」の確認試験を準用する。

（4） ジオウ 外面は黄褐色～黒褐色を呈し，深い縦みぞ及びくびれがある。質は柔らかく粘性である。横断面は黄褐色～黒褐色で，皮部は木部より色が濃く，ほとんど髄を認めない。特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後にやや苦い。

横切片を鏡検するとき，コルク層は 7～15 層で，皮部はすべて柔細胞からなり，外皮部に褐色の分泌物を含む細胞が散在する。木部はほとんど柔細胞で満たされ，放射状に並ぶ道管は側孔のある網紋があり，弱い木化反応を呈する。

（5） ゲンジン 外面は黄褐色～褐色を呈し，切断面は黒褐色を呈する。特異なにおいがあり，味はやや甘く，後わずかに苦い。

必要に応じて，局外生規「ゲンジン」の確認試験を準用する。

（6） チモ 外面は黄褐色～褐色を呈し，質は軽くて折りやすい。横断面は淡黄褐色を呈し，これをルーペ視するとき，皮層は極めて狭く，広い中心柱には，多くの維管束が不規則に点在し，粘液細胞又はその集合による多孔性を示す。味はわずかに甘く，粘液性で，後に苦い。

必要に応じて，「チモ」の確認試験を準用する。

（7）ゴミシ 暗赤色～黒褐色を呈し，表面にはしわがあり，またしばしば白い粉を付ける。果肉を除くとじん臓型の種子 1～2 個を認め，その外種皮は黄褐色～暗赤褐色を呈し，つやがあり，堅くてもろい。外種皮はたやすくはがれるが，内種皮は胚乳に密着し，背面に明らかな縫線を認める。酸味があり，後に渋くて苦い。

（8） オウバク 外面は灰黄褐色～灰褐色で，内面は黄色～暗黄褐色で，細かい縦線がある。横断面は鮮黄色でやや繊維性である。横切面をルーペ視するとき，皮部外層は黄色で薄く，石細胞が黄褐色の点状に分布する。皮部内層は厚く，一次放射組織は外方に向かうにしたがい幅が広がり，それらの一次放射組織の間に，多くの二次放射組織が集まってほぼ三角形の師部を形成し，この組織に褐色を呈する師部繊維束が層積して接線方向に並び，放射組織と交錯して格子状を呈する。味は極めて苦く，粘液性で，だ液を黄色に染める。

必要に応じて，「オウバク」の確認試験を準用する。

（9）バクモンドウ 紡錘形を呈し，長さ 10～25mm，径 3～5mm，一端はややとがり，他端はやや丸みをもち，外面は淡黄色～淡黄褐色で，大小の縦じわがある。皮層は柔軟性で

もろく，中心柱は強じんで折りにくい。皮層の折面は淡黄褐色を呈し，やや半透明で粘着性がある。味はわずかに甘く，粘着性である。

（１０） サイコ　外面は灰褐色～褐色で，深いしわがあるものがあり，横断面では，皮部は褐色，木部は淡褐色を呈する。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，皮部にはしばしば接線方向に長い裂け目があり，皮部の厚さは半径の 1/3～1/2 で，径 15～35μm の胞間性離生油道がやや多数散在し，木部には道管が放射状若しくはほぼ階段状に配列し，ところどころに繊維群があり，根頭部の髄には皮部と同様の油道がある。柔細胞中にはでんぷん粒を満たし，また油滴を認める。

必要に応じて，「サイコ」の確認試験を準用する。

（１１） ボタンピ　外面は暗褐色～帯紫褐色，内面は淡灰褐色～暗紫色を呈する。内面及び切断面にはしばしば白色の結晶を付着する。特異なにおいがあり，味はわずかに辛くて苦い。

必要に応じて，「ボタンピ」の確認試験を準用する。

乾燥減量　15%以下。

灰　　分　6%以下。

【446】　K235

成分及び分量又は本質	日本薬局方	オウギ	2.0g
	〃	トウキ	3.0g
	〃	ニンジン	2.5g
	〃	センキュウ	2.0g
	〃	ボウフウ	2.0g
	〃	キキョウ	2.0g
	〃	ビャクシ	1.0g
	〃	コウボク	2.0g
	〃	カンゾウ	1.0g
	〃	ケイヒ	2.0g
		全量	19.5g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1 包として製する。		
用法及び用量	本品 1 包に水約 500mL を加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を 3 回に分けて食間に服用する。上記は大人の 1 日量である。15 才未満 7 才以上 大人の 2/3，7 才未満 4 才以上 大人の 1/2，4 才未満2 才以上　大人の 1/3，2 才未満　大人の 1/4 以下を服用する。		
効能又は効果	体力虚弱で，患部が可能するものの次の諸症：化膿性皮膚疾患の初期，痔，軽いとこずれ		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	千金内托散料		

規格及び試験方法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品 1 包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　オウギ　外面は淡灰黄色～淡褐黄色で，不規則なあらい縦じわがあり，折面は繊維性である。横断面をルーペ視するとき，最外層には周皮があり，皮部は淡黄白色，木部は淡黄色，形成層付近はやや褐色を帯びる。木部から皮部にわたって白色の放射組織が認められる。太いものではしばしば多数の放射状の裂け目となっている。わずかに特異なにおいがあり，味は甘い。

（２）　トウキ　外面は暗褐色～赤褐色で，縦じわがあり，切断面は淡黄色～黄褐色を呈する。特異なにおいがあり，味はわずかに甘く，後にやや辛い。

横切片を鏡検するとき，コルク層は 4～10 層からなり，その内側に数層の厚角組織が続いている。皮部には分泌細胞に囲まれた多数の樹脂道並びにしばしば大きなすき間がある。形成層は長方形に偏圧された数層の細胞からなり，明らかに皮部と木部とを区別する。木部では多数の道管と放射組織とが交互に放射状に配列し，その外方の道管は単独又は数個集まってやや密に配列してくさび状をなすが，中心部付近の道管は極めてまばらに存在する。でんぷん粒は径19μm 以下，まれに2～5 個の複粒があり，複粒の径は25μm に達し，しばしばのり化している。

（３）　ニンジン　外面は淡黄褐色～淡灰褐色を呈し，縦じわがあり，横断面は淡黄褐色を呈し，形成層の付近は褐色を呈する。特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後にやや苦い。

必要に応じて，「ニンジン」の確認試験を準用する。

（４）　センキュウ　外面は灰褐色～暗褐色で，切断面は灰白色～灰褐色，半透明で，ときにはうつろがある。質は密で堅い。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，皮部及び髄には油道が散在する。木部には厚膜で木化した木部繊維が大小不同の群をなして存在する。でんぷん粒は，通例，のり化していて，まれに径 5～25μm のでんぷん粒を認めることがある。シュウ酸カルシウム結晶は認めない。

（５）　ボウフウ　外面は淡褐色で，多数の縦じわがある。横断面の周辺は灰褐色で，空げきが多く，中央は円形に黄色を呈する。味はわずかに甘い。

（６）　キキョウ　外面は皮付きは灰褐色，皮去りは白色～淡褐色を呈し，繊維性でない。横切面をルーペ視するとき，皮部は木部よりやや薄く，ほとんど白色で，ところどころにすき間があり，形成層の付近はしばしば褐色を帯びる。木部は白色～淡褐色を呈し，その組織は皮部よりもやや密である。味は初めなく，後にえぐくて苦い。

必要に応じて，「キキョウ」の確認試験を準用する。

（７）　ビャクシ　外面は灰褐色～暗褐色を呈し，縦じわがあり，横断面の周辺は灰白色で空げきが多く，中央部は暗褐色である。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

必要に応じて，「ビャクシ」の確認試験を準用する。

（８）　コウボク　外面は灰白色～灰褐色を呈し，内面は淡褐色～褐色，切断面は淡赤褐色を呈し，繊維性である。わずかに芳香があり，味は苦い。

横切片を鏡検するとき，コルク層は厚く，ほぼ等径性の石細胞が環状に内接する。一次皮部は狭く，内しょう部には繊維群が点在し，二次皮部の放射組織間には師部繊維群が階段状に並ぶ。油細胞の多数は一次皮部に，少数は二次皮部に散在し，狭い放射組織内にも認められることがある。

必要に応じて，「コウボク」の確認試験を準用する。

（９）　カンゾウ　外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現わす。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に 1～3 細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には 3～10 細胞列の

放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞中にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

（１０） ケイヒ　外面は暗赤褐色を呈し，内面は赤褐色を呈し，平滑である。横断面は赤褐色を呈し淡褐色の薄層が見られる。特異なにおいがあり，味は甘く，辛く，後にやや粘液性で，わずかに収れん性である。

横切片を鏡検するとき，一次皮部と二次皮部はほとんど連続した石細胞環で区分され，環の外辺にはほぼ円形に結集した繊維束を伴い，環の各石細胞の膜はしばしば U 字形に肥厚する。二次皮部中には石細胞を認めず，まばらに少数の厚膜繊維を認める。柔組織中には油細胞，粘液細胞及び微細なシュウ酸カルシウムの針晶を含む細胞があり，柔細胞中にはでんぷん粒を含む。

乾燥減量　15%以下。

灰　　分　6%以下。

【447】　K235—①

成分及び分量又は本質	日本薬局方	オウギ	2.0g
	〃	トウキ	3.0g
	〃	ニンジン	2.5g
	〃	センキュウ	2.0g
	〃	ボウフウ	2.0g
	〃	キキョウ	2.0g
	〃	ビャクシ	1.0g
	〃	コウボク	2.0g
	〃	カンゾウ	1.0g
	〃	ケイヒ	2.0g
	局外生規	キンギンカ	2.0g
		全　　量	21.5 g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1 包として製する。		
用法及び用量	本品 1 包に水約 500mL を加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を 3 回に分けて食間に服用する。上記は大人の 1 日量である。15 才未満 7 才以上 大人の 2/3，7 才未満 4 才以上 大人の 1/2，4 才未満2 才以上　大人の 1/3，2 才未満　大人の 1/4 以下を服用する。		
効能又は効果	体力虚弱で，患部が可能するものの次の諸症：化膿性皮膚疾患の初期，痔，軽いとこずれ		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	千金内托散料		

規格及び試験方法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品 1 包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　オウギ　外面は淡灰黄色～淡褐黄色で，不規則なあらい縦じわがあり，折面は繊維性である。横断面をルーペ視するとき，最外層には周皮があり，皮部は淡黄白色，木部は淡黄色，形成層付近はやや褐色を帯びる。木部から皮部にわたって白色の放射組織が認めら

れる。太いものではしばしば多数の放射状の裂け目となっている。わずかに特異なにおいがあり，味は甘い。

（２）　トウキ　外面は暗褐色～赤褐色で，縦じわがあり，切断面は淡黄色～黄褐色を呈する。特異なにおいがあり，味はわずかに甘く，後にやや辛い。

横切片を鏡検するとき，コルク層は 4～10　層からなり，その内側に数層の厚角組織が続いている。皮部には分泌細胞に囲まれた多数の樹脂道並びにしばしば大きなすき間がある。形成層は長方形に偏圧された数層の細胞からなり，明らかに皮部と木部とを区別する。木部では多数の道管と放射組織とが交互に放射状に配列し，その外方の道管は単独又は数個集まってやや密に配列してくさび状をなすが，中心部付近の道管は極めてまばらに存在する。でんぷん粒は径19μm 以下，まれに2～5 個の複粒があり，複粒の径は25μm に達し，しばしばのり化している。

（３）　ニンジン　外面は淡黄褐色～淡灰褐色を呈し，縦じわがあり，横断面は淡黄褐色を呈し，形成層の付近は褐色を呈する。特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後にやや苦い。

必要に応じて，「ニンジン」の確認試験を準用する。

（４）　センキュウ　外面は灰褐色～暗褐色で，切断面は灰白色～灰褐色，半透明で，ときにはうつろがある。質は密で堅い。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，皮部及び髄には油道が散在する。木部には厚膜で木化した木部繊維が大小不同の群をなして存在する。でんぷん粒は，通例，のり化していて，まれに径 5～25μm のでんぷん粒を認めることがある。シュウ酸カルシウム結晶は認めない。

（５）　ボウフウ　外面は淡褐色で，多数の縦じわがある。横断面の周辺は灰褐色で，空げきが多く，中央は円形に黄色を呈する。味はわずかに甘い。

（６）　キキョウ　外面は皮付きは灰褐色，皮去りは白色～淡褐色を呈し，繊維性でない。横切面をルーペ視するとき，皮部は木部よりやや薄く，ほとんど白色で，ところどころにすき間があり，形成層の付近はしばしば褐色を帯びる。木部は白色～淡褐色を呈し，その組織は皮部よりもやや密である。味は初めなく，後にえぐくて苦い。

必要に応じて，「キキョウ」の確認試験を準用する。

（７）　ビャクシ　外面は灰褐色～暗褐色を呈し，縦じわがあり，横断面の周辺は灰白色で空げきが多く，中央部は暗褐色である。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

必要に応じて，「ビャクシ」の確認試験を準用する。

（８）コウボク　外面は灰白色～灰褐色を呈し，内面は淡褐色～褐色，切断面は淡赤褐色を呈し，繊維性である。わずかに芳香があり，味は苦い。

横切片を鏡検するとき，コルク層は厚く，ほぼ等径性の石細胞が環状に内接する。一次皮部は狭く，内しょう部には繊維群が点在し，二次皮部の放射組織間には師部繊維群が階段状に並ぶ。油細胞の多数は一次皮部に，少数は二次皮部に散在し，狭い放射組織内にも認められることがある。

必要に応じて，「コウボク」の確認試験を準用する。

（９）　カンゾウ　外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現わす。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に 1～3 細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には 3～10 細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞中にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

（１０） ケイヒ 外面は暗赤褐色を呈し，内面は赤褐色を呈し，平滑である。横断面は赤褐色を呈し淡褐色の薄層が見られる。特異なにおいがあり，味は甘く，辛く，後にやや粘液性で，わずかに収れん性である。

横切片を鏡検するとき，一次皮部と二次皮部はほとんど連続した石細胞環で区分され，環の外辺にはほぼ円形に結集した繊維束を伴い，環の各石細胞の膜はしばしば U 字形に肥厚する。二次皮部中には石細胞を認めず，まばらに少数の厚膜繊維を認める。柔組織中には油細胞，粘液細胞及び微細なシュウ酸カルシウムの針晶を含む細胞があり，柔細胞中にはでんぷん粒を含む。

（１１） キンギンカ やや湾曲したこん棒状のつぼみで，長さ 1.5～3.0cm，外面は淡黄色～黄褐色を呈し，ルーペ視すると，淡褐色の毛を密生している。花は唇形で，5 本の雄しべがある。特異なにおいがあり，味は苦くてわずかに甘い。

必要に応じて，局外生規「キンギンカ」の確認試験を準用する。

乾燥減量 15%以下。

灰　　分 7%以下。

【448】　K236

成分及び分量又は本質	日本薬局方	マオウ	3.0g
	〃	ケイヒ	3.0g
	〃	トウキ	3.0g
	〃	ニンジン	3.0g
	〃	セッコウ	6.0g
	〃	カンキョウ	2.0g
	〃	カンゾウ	2.0g
	〃	センキュウ	2.0g
	〃	キョウニン	4.0g
		全　量	28.0g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1 包として製する。		
用法及び用量	本品 1 包に水約 400mL を加えて，160 mLぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を 4 回に分けて食間に服用する。上記は大人の 1 日量である。 15 才未満 7 才以上 大人の 2/3，7 才未満 4 才以上 大人の 1/2，4 才未満2 才以上　大人の 1/3，2 才未満　大人の 1/4 以下を服用する。		
効能又は効果	体力中等度以上のものの次の諸証：しびれ，筋力低下，高血圧に伴う症状（めまい，耳鳴り，肩こり，頭痛，頭重，頭部圧迫感），気管支炎，気管支ぜんそく，神経痛，関節のはれや痛み，頭痛，むくみ		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	続命湯		

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品 1 包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　マオウ　細い円柱状又はだ円柱を呈し，長さ 3～10mm，径 1～2mm，淡緑色～黄緑色である。表面に多数の平行する縦みぞがあり，節部には，長さ 2～4mm の 2 枚のりん片状の葉が対生し，その基部は合着して筒状になっている。りん片状の葉の色は淡褐色～褐色である。茎の横断面をルーペ視するとき，円形～だ円形で，周囲部は灰緑色～黄緑色を呈し，中心部には赤緑色の物質が充満しているか，又は中空のところがある。味は渋くてわずかに苦く，やや麻ひ性である。

必要に応じて，「マオウ」の確認試験を準用する。

（2）　ケイヒ　外面は暗赤褐色を呈し，内面は赤褐色を呈し，平滑である。横断面は赤褐色を呈し淡褐色の薄層が見られる。特異なにおいがあり，味は甘く，辛く，後にやや粘液性で，わずかに収れん性である。

横切片を鏡検するとき，一次皮部と二次皮部はほとんど連続した石細胞環で区分され，環の外辺にはほぼ円形に結集した繊維束を伴い，環の各石細胞の膜はしばしば U 字形に肥厚する。二次皮部中には石細胞を認めず，まばらに少数の厚膜繊維を認める。柔組織中には油細胞，粘液細胞及び微細なシュウ酸カルシウムの針晶を含む細胞があり，柔細胞中にはでんぷん粒を含む。

（3）　トウキ　外面は暗褐色～赤褐色で，縦じわがあり，切断面は淡黄色～黄褐色を呈する。特異なにおいがあり，味はわずかに甘く，後にやや辛い。

横切片を鏡検するとき，コルク層は 4～10　層からなり，その内側に数層の厚角組織が続いている。皮部には分泌細胞に囲まれた多数の樹脂道並びにしばしば大きなすき間がある。形成層は長方形に偏圧された数層の細胞からなり，明らかに皮部と木部とを区別する。木部では多数の道管と放射組織とが交互に放射状に配列し，その外方の道管は単独又は数個集まってやや密に配列してくさび状をなすが，中心部付近の道管は極めてまばらに存在する。でんぷん粒は径19μm 以下，まれに2～5 個の複粒があり，複粒の径は25μm に達し，しばしばのり化している。

（4）　ニンジン　外面は淡黄褐色～淡灰褐色を呈し，縦じわがあり，横断面は淡黄褐色を呈し，形成層の付近は褐色を呈する。特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後にやや苦い。

必要に応じて，「ニンジン」の確認試験を準用する。

（5）　セッコウ　光沢のある白色の重い繊維状結晶塊で，におい及び味はない。砕くとたやすく針状～微細結晶性の粉末となる。水に溶けにくい。

必要に応じて，「セッコウ」の確認試験を準用する。

（6）　カンキョウ　偏圧した不規則な塊状でしばしば分枝する。分枝した各部はやや湾曲した卵形又は長卵形を呈し，長さ 2～4cm，径 1～2cm である。外面は灰黄色～灰黄褐色で，しわ及び輪節がある。折面は褐色～暗褐色で透明感があり角質である。横切面をルーペ視するとき皮層と中心柱は区分され，全面に維管束が散在する。特異なにおいがあり，味は極めて辛い。

横切片を鏡検するとき，外側よりコルク層，皮層，内皮，中心柱が認められる。皮層と中心柱は一層の内皮によって区分される。皮層及び中心柱は柔組織からなり，繊維束で囲まれた維管束が散在する。柔組織中には黄色の油様物質を含む油細胞が散在し，柔細胞中にはシュウ酸カルシウムの単晶が含まれ，でんぷんは糊化している。

必要に応じて，「カンキョウ」の確認試験を準用する。

（7）　カンゾウ　外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現わす。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に 1～3 細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には 3～10 細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊

維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞中にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

（８）　センキュウ　外面は灰褐色～暗褐色で，切断面は灰白色～灰褐色，半透明で，ときにはうつろがある。質は密で堅い。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，皮部及び髄には油道が散在する。木部には厚膜で木化した木部繊維が大小不同の群をなして存在する。でんぷん粒は，通例，のり化していて，まれに径 5～25μm のでんぷん粒を認めることがある。シュウ酸カルシウム結晶は認めない。

（９）　キョウニン　種皮は褐色で，表面にはすれて落ちやすい石細胞となった表皮細胞があって，粉をふいたようである。切断面は類白色である。味は苦く，油ようである。

表皮の表面を鏡検するとき，数個ずつ集合する石細胞はおおむね円形で，その細胞膜は均等に著しく厚くなり，径 60～90μm，側面視では鈍三角形で，細胞膜は先端部で著しく厚い。

必要に応じて，「キョウニン」の確認試験を準用する。

乾燥減量　15%以下。

灰　　分　設定しない。

【449】　K237

成分及び分量又は本質	日本薬局方	ダイオウ	1.0g
	〃	ブシ	0.2～1.0g
	〃	サイシン	2.0g
		全　量	3.2～4.0g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1 包として製する。		
用法及び用量	本品 1 包に水約 500mL を加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を 3 回に分けて食間に服用する。上記は大人の 1 日量である。15 才未満 7 才以上 大人の 2/3，7 才未満 4 才以上 大人の 1/2，4 才未満2 才以上　大人の 1/3，2 才未満　大人の 1/4 以下を服用する。		
効能又は効果	体力中等度以下で、冷えて、ときに便秘するものの次の諸症：腹痛、神経痛、便秘		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	大黄附子湯		

規格及び試験方法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品 1 包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　ダイオウ　暗褐色～黄褐色～淡褐色を呈し，ルーペ視すると入り組んだ不規則な模様がある。質はおおむね粗で繊維性ではない。特異なにおいがあり，味はわずかに渋くて苦い。かめば細かい砂をかむような感じがあり，だ液を黄色に染める。

必要に応じて，「ダイオウ」の確認試験を準用する。

（2）　ブシ　本品はほぼ倒円錐形で，長さ 15～30mm，径 12～16mm，又は縦ときに横に切断され，長さ 20～60mm，幅 15～40mm，厚さ 200～700μm，又は径 12mm 以下の不整な多角形に破砕されている。外面は淡褐色～暗褐色又は黄褐色を呈する。質は堅く，通例，しわはなく，切面は平らで，淡褐色～暗褐色又は黄白色～淡黄褐色を呈し，通常角質，半透明で光沢がある。弱い特異なにおいがある。

横切片及び縦切片を鏡検するとき，外側から擬上皮，一次皮層，内皮，二次皮層，形成層，木部が認められる。一次皮層には楕円形～楕円状四角形，短径 30～75μm，長径 60～150μm の厚壁細胞がある。内皮は接線方向に長い 1 層の細胞からなっている。形成層輪は星形又は不整の多角形～円形であり，木部の道管群は V 字形を呈する。二次皮層及び髄中に独立した形成層輪が認められるものもある。道管は孔紋，階紋，網紋又はらせん紋道管である。柔細胞中のでんぷん粒は糊化している。

必要に応じて，「ブシ」の確認試験を準用する。

純度試験　本品 1 包中のアコニチン（$C_{34}H_{47}O_{11}N$：645.75）の残存量は 0.01mg 以下である。

本品 1 包を粉末とし，その重量を精密に量り，これにメタノール 50mL を加え一夜放置した後，1 時間振とうし，ろ紙を用いてろ過する。残渣に再びメタノール 30mL を加え1時間振とうした後，前記ろ紙を用いてろ過する。またこの残渣をメタノール 30mL で 2 回洗い，全量を合わせ減圧下でメタノールをほとんど留去する。残留物に希塩酸 10mL を加え水浴上で加温溶解する。冷後，分液ろう斗に脱脂綿を用いてろ過し，水 10mL で 2 回洗う。ろ液を合わせ，これにアンモニア水（28）を加えてアルカリ性とする。これにクロロホルム 50mL を加えて良く振り混ぜた後に下層を分取する。この操作を 2 回繰り返した後，クロロホルムを合わせ，これに水 10mL を加え洗った後，クロロホルム層を分取し，無水硫酸ナトリウムを加えて脱水する。これをろ過し，減圧下で蒸発乾固する。残留物をクロロホルム 1mL に正確に溶かして試料溶液とする。

別にアコニチン 20mg を精密に量り，クロロホルム 10mL に溶かし正確にメスアップする。この溶液 1mL を正確に量り，10mL に正確に希釈し標準溶液とする。

試料溶液及び標準溶液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。あらかじめ薄層クロマトグラフ用シリカゲルを用いて 0.25mm の厚さに調製し活性化した薄層板に試料溶液0.3mL，標準溶液10μL 及び15μL を正確に塗布する。次にブタノール・酢酸・水（4： 1：5）の混合溶液の上層を展開溶媒として，約 10cm 展開しこれを風乾した後，噴霧用ドラーゲンドルフ試液を均等に噴霧するとき，試料溶液から得られるアコニチンに対応するスポットの濃さは標準溶液の 10μL を塗布した方から得られるスポットより濃いことはあっても，標準溶液の15μL を塗布した方から得られるスポットより濃くない。

（３） サイシン　根の外面は淡褐色で，径約 1mm，切断面は黄白色である。根茎は不整に湾曲し外面は暗褐色を呈する。特異なにおいがあり，味は辛く舌をやや麻ひする。

乾燥減量　15%以下。

灰　　分　7%以下。

【450】　K238

成分及び分量又は本質	日本薬局方	ジオウ	3.0g
	〃	シャクヤク	3.0g
	〃	カンゾウ	1.2～1.5g
	〃	ボウフウ	3.0g
	〃	ビャクジュツ	3.0g
	〃	ブシ	0.5g
	〃	トチュウ	3.0g
	〃	キョウカツ	1.5g
	〃	センキュウ	2.0g
	〃	トウキ	3.0g
	〃	ゴシツ	1.5g
	〃	ショウキョウ	1.0g
	〃	オウギ	3.0g
	〃	ニンジン	1.5g
	〃	タイソウ	1.5g
		全　量	31.7～32.0g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1 包として製する。		
用法及び用量	本品 1 包に水約 500mL を加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を 3 回に分けて食間に服用する。上記は大人の 1 日量である。15 才未満 7 才以上 大人の 2/3，7 才未満 4 才以上 大人の 1/2，4 才未満2 才以上　大人の 1/3，2 才未満　大人の 1/4 以下を服用する。		
効能又は効果	体力虚弱あるいは体力が消耗し衰え、貧血気味なものの次の諸症：慢性関節炎、関節のはれや痛み、神経痛		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	大防風湯		

規格及び試験方法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品 1 包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　ジオウ　外面は黄褐色～黒褐色を呈し，深い縦みぞ及びくびれがある。質は柔らかく粘性である。横断面は黄褐色～黒褐色で，皮部は木部より色が濃く，ほとんど髄を認めない。特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後にやや苦い。

横切片を鏡検するとき，コルク層は 7～15 層で，皮部はすべて柔細胞からなり，外皮部に褐色の分泌物を含む細胞が散在する。木部はほとんど柔細胞で満たされ，放射状に並ぶ道管は側孔のある網紋があり，弱い木化反応を呈する。

（2）　シャクヤク　外面は褐色～淡灰褐色を呈し，横断面はち密で淡灰褐色を呈し，木部には淡褐色の放射状の線がある。わずかに特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後に渋くてわずかに苦い。

必要に応じて，「シャクヤク」の確認試験を準用する。

（3）　カンゾウ　外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現わす。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に 1～3 細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には 3～10 細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞中にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

（4）　ボウフウ　外面は淡褐色で，多数の縦じわがある。横断面の周辺は灰褐色で，空げきが多く，中央は円形に黄色を呈する。味はわずかに甘い。

（5）　ビャクジュツ　外面は淡灰黄色～淡黄白色で，ところどころ灰褐色を呈し，横切面には淡黄褐色～褐色の分泌物による細点がある。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，皮部の柔組織中にはしばしば師管の外側に接して繊維束があり，放射組織の末端部には淡褐色～褐色の内容物を含む油室がある。木部には大きい髄を囲んで放射状に配列した短径の道管とそれを囲む著しい繊維束がある。髄及び放射組織中には皮部と同様な油室があり，柔組織中にはイヌリンの小球晶及びシュウ酸カルシウムの針晶を含む。

必要に応じて，「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。

（6）　ブシ　本品はほぼ倒円錐形で，長さ 15～30mm，径 12～16mm，又は縦ときに横に切断され，長さ 20～60mm，幅 15～40mm，厚さ 200～700μm，又は径 12mm 以下の不整な多角形に破砕されている。外面は淡褐色～暗褐色又は黄褐色を呈する。質は堅く，通例，しわはなく，切面は平らで，淡褐色～暗褐色又は黄白色～淡黄褐色を呈し，通常角質，半透明で光沢がある。弱い特異なにおいがある。

横切片及び縦切片を鏡検するとき，外側から擬上皮，一次皮層，内皮，二次皮層，形成層，木部が認められる。一次皮層には楕円形～楕円状四角形，短径 30～75μm，長径 60～150μm の厚壁細胞がある。内皮は接線方向に長い 1 層の細胞からなっている。形成層輪は星形又は不整の多角形～円形であり，木部の道管群は V 字形を呈する。二次皮層及び

髄中に独立した形成層輪が認められるものもある。道管は孔紋，階紋，網紋又はらせん紋道管である。柔細胞中のでんぷん粒は糊化している。

必要に応じて，「ブシ」の確認試験を準用する。

純度試験　本品 1 包中のアコニチン（$C_{34}H_{47}O_{11}N$：645.75）の残存量は 0.01mg 以下である。

本品 1 包を粉末とし，その重量を精密に量り，これにメタノール 50mL を加え一夜放置した後，1 時間振とうし，ろ紙を用いてろ過する。残渣に再びメタノール 30mL を加え1時間振とうした後，前記ろ紙を用いてろ過する。またこの残渣をメタノール 30mL で 2 回洗い，全量を合わせ減圧下でメタノールをほとんど留去する。残留物に希塩酸 10mL を加え水浴上で加温溶解する。冷後，分液ろう斗に脱脂綿を用いてろ過し，水 10mL で 2 回洗う。ろ液を合わせ，これにアンモニア水（28）を加えてアルカリ性とする。これにクロロホルム 50mL を加えて良く振り混ぜた後に下層を分取する。この操作を 2 回繰り返した後，クロロホルムを合わせ，これに水 10mL を加え洗った後，クロロホルム層を分取し，無水硫酸ナトリウムを加えて脱水する。これをろ過し，減圧下で蒸発乾固する。残留物をクロロホルム 1mL に正確に溶かして試料溶液とする。

別にアコニチン 20mg を精密に量り，クロロホルム 10mL に溶かし正確にメスアップする。この溶液 1mL を正確に量り，10mL に正確に希釈し標準溶液とする。

試料溶液及び標準溶液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。あらかじめ薄層クロマトグラフ用シリカゲルを用いて 0.25mm の厚さに調製し活性化した薄層板に試料溶液0.3mL，標準溶液10μL 及び15μL を正確に塗布する。次にブタノール・酢酸・水（4： 1：5）の混合溶液の上層を展開溶媒として，約 10cm 展開しこれを風乾した後，噴霧用ドラーゲンドルフ試液を均等に噴霧するとき，試料溶液から得られるアコニチンに対応するスポットの濃さは標準溶液の 10μL を塗布した方から得られるスポットより濃いことはあっても，標準溶液の15μL を塗布した方から得られるスポットより濃くない。

（7）　トチュウ　厚さ2～6mmの粗皮を除いた半管状又は板状の皮片である。外面は淡灰褐色 ～灰褐色で粗雑であるが，ときにコルク層が剥離され赤褐色を呈することもある。内面は暗褐色 ～褐色を呈し，平滑で細かい縦線があり，折ると白絹ようのグッタペルカ（熱可塑性のゴムよう 物質）の糸が出る。わずかに特異なにおいがあり，味はわずかに甘い。

横切片を鏡検するとき，柔組織内にはグッタペルカを含む柔細胞があり，師部には石細胞層及 び繊維層を認め，放射組織は2～3細胞列からなり，シュウ酸カルシウムの結晶を含まない。

必要に応じて，「トチュウ」の確認試験を準用する。

（8）　キョウカツ　やや湾曲した円柱形～円錐形を呈し，長さ3～10cm，径5～20mm，ときに根茎は分枝する。外面は黄褐色～暗褐色である。根茎はその頂端にやや円形にくぼんだ茎の跡があり，ときには短い茎の残基を付け，外面には隆起した節があり，節間は，通例，短い。節にはいぼ状突起となった根の跡がある。根の外面には粗い縦じわ及びいぼ状突起となった側根の跡がある。質は軽くややもろくて折りやすい。横切面には多くの放射状の裂け目があり，皮部は黄褐色～褐色，木部は淡黄色～淡灰黄色，髄は灰白色～淡褐色を呈し，ルーペ視するとき，皮部及び髄には油道による褐色の細点を認める。特異なにおいがあり，味は初めわずかに酸味があり，後にやや辛く，わずかに麻痺性である。

横切片を鏡検するとき，最外層は数層～十数層のコルク層からなり，その内側に数層の厚角組織がある。皮層には多数の油道があり，大きいものでは径が 300μm に達する。また皮層には放射状に大きなすき間がある。髄にも油道があり，大きいものでは径が 500μm に達する。柔組織中には単粒及び 2～3 個の複粒のでんぷん粒を含む。

必要に応じて，「キョウカツ」の確認試験を準用する。

（９） センキュウ 外面は灰褐色～暗褐色で，切断面は灰白色～灰褐色，半透明で，ときにはうつろがある。質は密で堅い。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，皮部及び髄には油道が散在する。木部には厚膜で木化した木部繊維が大小不同の群をなして存在する。でんぷん粒は，通例，のり化していて，まれに径 5～25μm のでんぷん粒を認めることがある。シュウ酸カルシウム結晶は認めない。

（１０） トウキ 外面は暗褐色～赤褐色で，縦じわがあり，切断面は淡黄色～黄褐色を呈する。特異なにおいがあり，味はわずかに甘く，後にやや辛い。

横切片を鏡検するとき，コルク層は 4～10 層からなり，その内側に数層の厚角組織が続いている。皮部には分泌細胞に囲まれた多数の樹脂道並びにしばしば大きなすき間がある。形成層は長方形に偏圧された数層の細胞からなり，明らかに皮部と木部とを区別する。木部では多数の道管と放射組織とが交互に放射状に配列し，その外方の道管は単独又は数個集まってやや密に配列してくさび状をなすが，中心部付近の道管は極めてまばらに存在する。でんぷん粒は径 19μm 以下，まれに 2～5 個の複粒があり，複粒の径は 25μm に達し，しばしばのり化している。

（１１）ゴシツ 表面は灰黄色～黄褐色で，多数の縦じわがある。切断面は灰白色～淡褐色を呈 し，黄白色の木部を認める。味はわずかに甘く，粘液性である。

横切片を鏡検するとき，皮部はやや明らかな形成層によって木部と区別できる。木部の中心に は小さい原生木部があり，これを囲んで同心円状の環状維管束が外方に配列し，柔細胞の中には シュウ酸カルシウムの砂晶を含み，でんぷん粒は認めない。

必要に応じて，「ゴシツ」の確認試験を準用する。

（１２）ショウキョウ 淡灰黄色の周皮を付けたままか，又はその一部をはぎとってあり，表面は灰白色～淡灰褐色で，しばしば白粉を付けている。横断面は繊維性，粉性で，淡帯黄褐色を呈し，皮層と中心柱とに分かれる。横断面をルーペ視するとき，その全面に維管束及び分泌物が褐色の細点として散在している。特異なにおいがあり，味は極めて辛い。

（１３）オウギ 外面は淡灰黄色～淡褐黄色で，不規則なあらい縦じわがあり，折面は繊維性である。横断面をルーペ視するとき，最外層には周皮があり，皮部は淡黄白色，木部は淡黄色，形成層付近はやや褐色を帯びる。木部から皮部にわたって白色の放射組織が認められる。太いものではしばしば多数の放射状の裂け目となっている。わずかに特異なにおいがあり，味は甘い。

（１４）ニンジン 外面は淡黄褐色～淡灰褐色を呈し，縦じわがあり，横断面は淡黄褐色を呈し，形成層の付近は褐色を呈する。特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後にやや苦い。

必要に応じて，「ニンジン」の確認試験を準用する。

（１５）タイソウ 外面は赤褐色であらいしわがあるか，又は暗灰赤色で細かいしわがあり，いずれもつやがある。外果皮は薄く革質で，中果皮は暗灰褐色を呈し，海綿ようで柔

らかく粘着性があり，内果皮は極めて堅く，種子は偏平である。わずかに特異なにおいがあり，味は甘い。

乾燥減量　15%以下。

灰　　分　7%以下。

【451】　K238—①

成分及び分量又は本質	日本薬局方	ジオウ	3.0g
	〃	シャクヤク	3.0g
	〃	カンゾウ	1.2～1.5g
	〃	ボウフウ	3.0g
	〃	ソウジュツ	3.0g
	〃	ブシ	0.5g
	〃	トチュウ	3.0g
	〃	キョウカツ	1.5g
	〃	センキュウ	2.0g
	〃	トウキ	3.0g
	〃	ゴシツ	1.5g
	〃	ショウキョウ	1.0g
	〃	オウギ	3.0g
	〃	ニンジン	1.5g
	〃	タイソウ	1.5g
		全　量	31.7～32.0g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1 包として製する。		
用法及び用量	本品 1 包に水約 500mL を加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を 3 回に分けて食間に服用する。上記は大人の 1 日量である。15 才未満 7 才以上 大人の 2/3，7 才未満 4 才以上 大人の 1/2，4 才未満2 才以上　大人の 1/3，2 才未満　大人の 1/4 以下を服用する。		
効能又は効果	体力虚弱あるいは体力が消耗し衰え、貧血気味なものの次の諸症：慢性関節炎、関節のはれや痛み、神経痛		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	大防風湯		

規格及び試験方法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品 1 包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　ジオウ　外面は黄褐色～黒褐色を呈し，深い縦みぞ及びくびれがある。質は柔らかく粘性である。横断面は黄褐色～黒褐色で，皮部は木部より色が濃く，ほとんど髄を認めない。特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後にやや苦い。

横切片を鏡検するとき，コルク層は 7～15 層で，皮部はすべて柔細胞からなり，外皮部に褐色の分泌物を含む細胞が散在する。木部はほとんど柔細胞で満たされ，放射状に並ぶ道管は側孔のある網紋があり，弱い木化反応を呈する。

（2）　シャクヤク　外面は褐色～淡灰褐色を呈し，横断面はち密で淡灰褐色を呈し，木部には淡褐色の放射状の線がある。わずかに特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後に渋くてわずかに苦い。

必要に応じて，「シャクヤク」の確認試験を準用する。

（3）　カンゾウ　外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現わす。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に 1～3 細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には 3～10 細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞中にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

（4）　ボウフウ　外面は淡褐色で，多数の縦じわがある。横断面の周辺は灰褐色で，空げきが多く，中央は円形に黄色を呈する。味はわずかに甘い。

（5）　ソウジュツ　外面は暗灰褐色～暗黄褐色である。横断面は淡褐色～赤褐色の分泌物による細点を認める。しばしば白色綿状の結晶を析出する。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，皮部の柔組織中には，通例，繊維束を欠き，放射組織の末端部には淡褐色～黄褐色の内容物を含む油室がある。木部は形成層に接して道管を囲んだ繊維束が放射状に配列し，髄及び放射組織中には皮部と同様な油室がある。柔細胞中にはイヌリンの球晶及びシュウ酸カルシウムの針晶を含む。

（6）　ブシ　本品はほぼ倒円錐形で，長さ 15～30mm，径 12～16mm，又は縦ときに横に切断され，長さ 20～60mm，幅 15～40mm，厚さ 200～700μm，又は径 12mm 以下の不整な多角形に破砕されている。外面は淡褐色～暗褐色又は黄褐色を呈する。質は堅く，通例，しわはなく，切面は平らで，淡褐色～暗褐色又は黄白色～淡黄褐色を呈し，通常角質，半透明で光沢がある。弱い特異なにおいがある。

横切片及び縦切片を鏡検するとき，外側から擬上皮，一次皮層，内皮，二次皮層，形成層，木部が認められる。一次皮層には楕円形～楕円状四角形，短径 30～75μm，長径 60～150μm の厚壁細胞がある。内皮は接線方向に長い 1 層の細胞からなっている。形成層輪は星形又は不整の多角形～円形であり，木部の道管群は V 字形を呈する。二次皮層及び髄中に独立した形成層輪が認められるものもある。道管は孔紋，階紋，網紋又はらせん紋道管である。柔細胞中のでんぷん粒は糊化している。

必要に応じて，「ブシ」の確認試験を準用する。

純度試験　本品 1 包中のアコニチン（$C_{34}H_{47}O_{11}N$：645.75）の残存量は 0.01mg 以下である。

本品 1 包を粉末とし，その重量を精密に量り，これにメタノール 50mL を加え一夜放置した後，1 時間振とうし，ろ紙を用いてろ過する。残渣に再びメタノール 30mL を加え 1時間振とうした後，前記ろ紙を用いてろ過する。またこの残渣をメタノール 30mL で 2 回洗い，全量を合わせ減圧下でメタノールをほとんど留去する。残留物に希塩酸 10mL を加え水浴上で加温溶解する。冷後，分液ろう斗に脱脂綿を用いてろ過し，水 10mL で 2 回洗う。ろ液を合わせ，これにアンモニア水（28）を加えてアルカリ性とする。これにクロロホルム 50mL を加えて良く振り混ぜた後に下層を分取する。この操作を 2 回繰り返した後，クロロホルムを合わせ，これに水 10mL を加え洗った後，クロロホルム層を分取し，無水硫酸ナトリウムを加えて脱水する。これをろ過し，減圧下で蒸発乾固する。残留物をクロロホルム 1mL に正確に溶かして試料溶液とする。

別にアコニチン 20mg を精密に量り，クロロホルム 10mL に溶かし正確にメスアップする。この溶液 1mL を正確に量り，10mL に正確に希釈し標準溶液とする。

試料溶液及び標準溶液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。あらかじめ薄層クロマトグラフ用シリカゲルを用いて 0.25mm の厚さに調製し活性化した薄層板に試料溶液0.3mL，標準溶液10μL 及び15μL を正確に塗布する。次にブタノール・酢酸・水（4： 1：5）の混合溶液の上層を展開溶媒として，約 10cm 展開しこれを風乾した後，噴霧用ドラーゲンドルフ試液を均等に噴霧するとき，試料溶液から得られるアコニチンに対応するスポットの濃さは標準溶液の 10μL を塗布した方から得られるスポットより濃いことはあっても，標準溶液の15μL を塗布した方から得られるスポットより濃くない。

（7）　トチュウ　厚さ2～6mmの粗皮を除いた半管状又は板状の皮片である。外面は淡灰褐色 ～灰褐色で粗雑であるが，ときにコルク層が剥離され赤褐色を呈することもある。内面は暗褐色 ～褐色を呈し，平滑で細かい縦線があり，折ると白絹ようのグッタペルカ（熱可塑性のゴムよう 物質）の糸が出る。わずかに特異なにおいがあり，味はわずかに甘い。

横切片を鏡検するとき，柔組織内にはグッタペルカを含む柔細胞があり，師部には石細胞層及 び繊維層を認め，放射組織は2～3細胞列からなり，シュウ酸カルシウムの結晶を含まない。

必要に応じて，「トチュウ」の確認試験を準用する。

（8）　キョウカツ　やや湾曲した円柱形～円錐形を呈し，長さ3～10cm，径5～20mm，ときに根茎は分枝する。外面は黄褐色～暗褐色である。根茎はその頂端にやや円形にくぼんだ茎の跡があり，ときには短い茎の残基を付け，外面には隆起した節があり，節間は，通例，短い。節にはいぼ状突起となった根の跡がある。根の外面には粗い縦じわ及びいぼ状突起となった側根の跡がある。質は軽くややもろくて折りやすい。横切面には多くの放射状の裂け目があり，皮部は黄褐色～褐色，木部は淡黄色～淡灰黄色，髄は灰白色～淡褐色を呈し，ルーペ視するとき，皮部及び髄には油道による褐色の細点を認める。特異なにおいがあり，味は初めわずかに酸味があり，後にやや辛く，わずかに麻痺性である。

横切片を鏡検するとき，最外層は数層～十数層のコルク層からなり，その内側に数層の厚角組織がある。皮層には多数の油道があり，大きいものでは径が 300μm に達する。また皮層には放射状に大きなすき間がある。髄にも油道があり，大きいものでは径が 500μm に達する。柔組織中には単粒及び 2～3 個の複粒のでんぷん粒を含む。

必要に応じて，「キョウカツ」の確認試験を準用する。

（９）　センキュウ　外面は灰褐色～暗褐色で，切断面は灰白色～灰褐色，半透明で，ときにはうつろがある。質は密で堅い。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，皮部及び髄には油道が散在する。木部には厚膜で木化した木部繊維が大小不同の群をなして存在する。でんぷん粒は，通例，のり化していて，まれに径5～25μm のでんぷん粒を認めることがある。シュウ酸カルシウム結晶は認めない。

（１０）トウキ　外面は暗褐色～赤褐色で，縦じわがあり，切断面は淡黄色～黄褐色を呈する。特異なにおいがあり，味はわずかに甘く，後にやや辛い。

横切片を鏡検するとき，コルク層は 4～10 層からなり，その内側に数層の厚角組織が続いている。皮部には分泌細胞に囲まれた多数の樹脂道並びにしばしば大きなすき間がある。形成層は長方形に偏圧された数層の細胞からなり，明らかに皮部と木部とを区別する。木部では多数の道管と放射組織とが交互に放射状に配列し，その外方の道管は単独又は数個集まってやや密に配列してくさび状をなすが，中心部付近の道管は極めてまばらに存在する。でんぷん粒は径 19μm 以下，まれに 2～5 個の複粒があり，複粒の径は25μm に達し，しばしばのり化している。

（１１）ゴシツ　表面は灰黄色～黄褐色で，多数の縦じわがある。切断面は灰白色～淡褐色を呈 し，黄白色の木部を認める。味はわずかに甘く，粘液性である。

横切片を鏡検するとき，皮部はやや明らかな形成層によって木部と区別できる。木部の中心に は小さい原生木部があり，これを囲んで同心円状の環状維管束が外方に配列し，柔細胞の中には シュウ酸カルシウムの砂晶を含み，でんぷん粒は認めない。

必要に応じて，「ゴシツ」の確認試験を準用する。

（１２）ショウキョウ　淡灰黄色の周皮を付けたままか，又はその一部をはぎとってあり，表面は灰白色～淡灰褐色で，しばしば白粉を付けている。横断面は繊維性，粉性で，淡帯黄褐色を呈し，皮層と中心柱とに分かれる。横断面をルーペ視するとき，その全面に維管束及び分泌物が褐色の細点として散在している。特異なにおいがあり，味は極めて辛い。

（１３）オウギ　外面は淡灰黄色～淡褐黄色で，不規則なあらい縦じわがあり，折面は繊維性である。横断面をルーペ視するとき，最外層には周皮があり，皮部は淡黄白色，木部は淡黄色，形成層付近はやや褐色を帯びる。木部から皮部にわたって白色の放射組織が認められる。太いものではしばしば多数の放射状の裂け目となっている。わずかに特異なにおいがあり，味は甘い。

（１４）ニンジン　外面は淡黄褐色～淡灰褐色を呈し，縦じわがあり，横断面は淡黄褐色を呈し，形成層の付近は褐色を呈する。特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後にやや苦い。

必要に応じて，「ニンジン」の確認試験を準用する。

（１５）タイソウ　外面は赤褐色であらいしわがあるか，又は暗灰赤色で細かいしわがあり，いずれもつやがある。外果皮は薄く革質で，中果皮は暗灰褐色を呈し，海綿ようで柔らかく粘着性があり，内果皮は極めて堅く，種子は偏平である。わずかに特異なにおいがあり，味は甘い。

乾燥減量　15%以下。

灰　　分　7%以下。

【452】　K238—②

成分及び分量又は本質	日本薬局方	ジオウ	3.0g
	〃	シャクヤク	3.0g
	〃	カンゾウ	1.2～1.5g
	〃	ボウフウ	3.0g
	〃	ビャクジュツ	3.0g
	〃	ブシ	0.5g
	〃	トチュウ	3.0g
	〃	キョウカツ	1.5g
	〃	センキュウ	2.0g
	〃	トウキ	3.0g
	〃	ゴシツ	1.5g
	〃	カンキョウ	1.0g
	〃	オウギ	3.0g
	〃	ニンジン	1.5g
	〃	タイソウ	1.5g
		全　量	31.7～32.0g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1 包として製する。		
用法及び用量	本品 1 包に水約 500mL を加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を 3 回に分けて食間に服用する。上記は大人の 1 日量である。15 才未満 7 才以上 大人の 2/3，7 才未満 4 才以上 大人の 1/2，4 才未満2 才以上　大人の 1/3，2 才未満　大人の 1/4 以下を服用する。		
効能又は効果	体力虚弱あるいは体力が消耗し衰え、貧血気味なものの次の諸症：慢性関節炎、関節のはれや痛み、神経痛		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	大防風湯		

規格及び試験方法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品 1 包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　ジオウ　外面は黄褐色～黒褐色を呈し，深い縦みぞ及びくびれがある。質は柔らかく粘性である。横断面は黄褐色～黒褐色で，皮部は木部より色が濃く，ほとんど髄を認めない。特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後にやや苦い。

横切片を鏡検するとき，コルク層は 7～15 層で，皮部はすべて柔細胞からなり，外皮部に褐色の分泌物を含む細胞が散在する。木部はほとんど柔細胞で満たされ，放射状に並ぶ道管は側孔のある網紋があり，弱い木化反応を呈する。

（2）　シャクヤク　外面は褐色～淡灰褐色を呈し，横断面はち密で淡灰褐色を呈し，木部には淡褐色の放射状の線がある。わずかに特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後に渋くてわずかに苦い。

必要に応じて，「シャクヤク」の確認試験を準用する。

（3）　カンゾウ　外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現わす。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に 1～3 細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には 3～10 細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞中にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

（4）　ボウフウ　外面は淡褐色で，多数の縦じわがある。横断面の周辺は灰褐色で，空げきが多く，中央は円形に黄色を呈する。味はわずかに甘い。

（5）　ビャクジュツ　外面は淡灰黄色～淡黄白色で，ところどころ灰褐色を呈し，横切面には淡黄褐色～褐色の分泌物による細点がある。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，皮部の柔組織中にはしばしば師管の外側に接して繊維束があり，放射組織の末端部には淡褐色～褐色の内容物を含む油室がある。木部には大きい髄を囲んで放射状に配列した短径の道管とそれを囲む著しい繊維束がある。髄及び放射組織中には皮部と同様な油室があり，柔組織中にはイヌリンの小球晶及びシュウ酸カルシウムの針晶を含む。

必要に応じて，「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。

（6）　ブシ　本品はほぼ倒円錐形で，長さ 15～30mm，径 12～16mm，又は縦ときに横に切断され，長さ 20～60mm，幅 15～40mm，厚さ 200～700μm，又は径 12mm 以下の不整な多角形に破砕されている。外面は淡褐色～暗褐色又は黄褐色を呈する。質は堅く，通例，しわはなく，切面は平らで，淡褐色～暗褐色又は黄白色～淡黄褐色を呈し，通常角質，半透明で光沢がある。弱い特異なにおいがある。

横切片及び縦切片を鏡検するとき，外側から擬上皮，一次皮層，内皮，二次皮層，形成層，木部が認められる。一次皮層には楕円形～楕円状四角形，短径 30～75μm，長径 60～150μm の厚壁細胞がある。内皮は接線方向に長い 1 層の細胞からなっている。形成層輪は星形又は不整の多角形～円形であり，木部の道管群は V 字形を呈する。二次皮層及び

髄中に独立した形成層輪が認められるものもある。道管は孔紋，階紋，網紋又はらせん紋道管である。柔細胞中のでんぷん粒は糊化している。

必要に応じて，「ブシ」の確認試験を準用する。

純度試験　本品 1 包中のアコニチン（$C_{34}H_{47}O_{11}N$：645.75）の残存量は 0.01mg 以下である。

本品 1 包を粉末とし，その重量を精密に量り，これにメタノール 50mL を加え一夜放置した後，1 時間振とうし，ろ紙を用いてろ過する。残渣に再びメタノール 30mL を加え1時間振とうした後，前記ろ紙を用いてろ過する。またこの残渣をメタノール 30mL で 2 回洗い，全量を合わせ減圧下でメタノールをほとんど留去する。残留物に希塩酸 10mL を加え水浴上で加温溶解する。冷後，分液ろう斗に脱脂綿を用いてろ過し，水 10mL で 2 回洗う。ろ液を合わせ，これにアンモニア水（28）を加えてアルカリ性とする。これにクロロホルム 50mL を加えて良く振り混ぜた後に下層を分取する。この操作を 2 回繰り返した後，クロロホルムを合わせ，これに水 10mL を加え洗った後，クロロホルム層を分取し，無水硫酸ナトリウムを加えて脱水する。これをろ過し，減圧下で蒸発乾固する。残留物をクロロホルム 1mL に正確に溶かして試料溶液とする。

別にアコニチン 20mg を精密に量り，クロロホルム 10mL に溶かし正確にメスアップする。この溶液 1mL を正確に量り，10mL に正確に希釈し標準溶液とする。

試料溶液及び標準溶液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。あらかじめ薄層クロマトグラフ用シリカゲルを用いて 0.25mm の厚さに調製し活性化した薄層板に試料溶液0.3mL，標準溶液10μL 及び15μL を正確に塗布する。次にブタノール・酢酸・水（4： 1：5）の混合溶液の上層を展開溶媒として，約 10cm 展開しこれを風乾した後，噴霧用ドラーゲンドルフ試液を均等に噴霧するとき，試料溶液から得られるアコニチンに対応するスポットの濃さは標準溶液の 10μL を塗布した方から得られるスポットより濃いことはあっても，標準溶液の15μL を塗布した方から得られるスポットより濃くない。

（7）　トチュウ　厚さ2～6mmの粗皮を除いた半管状又は板状の皮片である。外面は淡灰褐色 ～灰褐色で粗雑であるが，ときにコルク層が剥離され赤褐色を呈することもある。内面は暗褐色 ～褐色を呈し，平滑で細かい縦線があり，折ると白絹ようのグッタペルカ（熱可塑性のゴムよう 物質）の糸が出る。わずかに特異なにおいがあり，味はわずかに甘い。

横切片を鏡検するとき，柔組織内にはグッタペルカを含む柔細胞があり，師部には石細胞層及 び繊維層を認め，放射組織は2～3細胞列からなり，シュウ酸カルシウムの結晶を含まない。

必要に応じて，「トチュウ」の確認試験を準用する。

（8）　キョウカツ　やや湾曲した円柱形～円錐形を呈し，長さ3～10cm，径5～20mm，ときに根茎は分枝する。外面は黄褐色～暗褐色である。根茎はその頂端にやや円形にくぼんだ茎の跡があり，ときには短い茎の残基を付け，外面には隆起した節があり，節間は，通例，短い。節にはいぼ状突起となった根の跡がある。根の外面には粗い縦じわ及びいぼ状突起となった側根の跡がある。質は軽くややもろくて折りやすい。横切面には多くの放射状の裂け目があり，皮部は黄褐色～褐色，木部は淡黄色～淡灰黄色，髄は灰白色～淡褐色を呈し，ルーペ視するとき，皮部及び髄には油道による褐色の細点を認める。特異なにおいがあり，味は初めわずかに酸味があり，後にやや辛く，わずかに麻痺性である。

横切片を鏡検するとき，最外層は数層～十数層のコルク層からなり，その内側に数層の厚角組織がある。皮層には多数の油道があり，大きいものでは径が 300μm に達する。また皮層には放射状に大きなすき間がある。髄にも油道があり，大きいものでは径が 500μm に達する。柔組織中には単粒及び 2～3 個の複粒のでんぷん粒を含む。

必要に応じて，「キョウカツ」の確認試験を準用する。

（９） センキュウ 外面は灰褐色～暗褐色で，切断面は灰白色～灰褐色，半透明で，ときにはうつろがある。質は密で堅い。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，皮部及び髄には油道が散在する。木部には厚膜で木化した木部繊維が大小不同の群をなして存在する。でんぷん粒は，通例，のり化していて，まれに径 5～25μm のでんぷん粒を認めることがある。シュウ酸カルシウム結晶は認めない。

（１０） トウキ 外面は暗褐色～赤褐色で，縦じわがあり，切断面は淡黄色～黄褐色を呈する。特異なにおいがあり，味はわずかに甘く，後にやや辛い。

横切片を鏡検するとき，コルク層は 4～10 層からなり，その内側に数層の厚角組織が続いている。皮部には分泌細胞に囲まれた多数の樹脂道並びにしばしば大きなすき間がある。形成層は長方形に偏圧された数層の細胞からなり，明らかに皮部と木部とを区別する。木部では多数の道管と放射組織とが交互に放射状に配列し，その外方の道管は単独又は数個集まってやや密に配列してくさび状をなすが，中心部付近の道管は極めてまばらに存在する。でんぷん粒は径 19μm 以下，まれに 2～5 個の複粒があり，複粒の径は 25μm に達し，しばしばのり化している。

（１１）ゴ シ ツ 表面は灰黄色～黄褐色で，多数の縦じわがある。切断面は灰白色～淡褐色を呈 し，黄白色の木部を認める。味はわずかに甘く，粘液性である。

横切片を鏡検するとき，皮部はやや明らかな形成層によって木部と区別できる。木部の中心に は小さい原生木部があり，これを囲んで同心円状の環状維管束が外方に配列し，柔細胞の中には シュウ酸カルシウムの砂晶を含み，でんぷん粒は認めない。

必要に応じて，「ゴシツ」の確認試験を準用する。

（１２）カンキョウ 偏圧した不規則な塊状でしばしば分枝する。分枝した各部はやや湾曲した卵形又は長卵形を呈し，長さ 2～4cm，径 1～2cm である。外面は灰黄色～灰黄褐色で，しわ及び輪節がある。折面は褐色～暗褐色で透明感があり角質である。横切面をルーペ視するとき皮層と中心柱は区分され，全面に維管束が散在する。特異なにおいがあり，味は極めて辛い。

横切片を鏡検するとき，外側よりコルク層，皮層，内皮，中心柱が認められる。皮層と中心柱は一層の内皮によって区分される。皮層及び中心柱は柔組織からなり，繊維束で囲まれた維管束が散在する。柔組織中には黄色の油様物質を含む油細胞が散在し，柔細胞中にはシュウ酸カルシウムの単晶が含まれ，でんぷんは糊化している。

必要に応じて，「カンキョウ」の確認試験を準用する。

（１３）オウギ 外面は淡灰黄色～淡褐黄色で，不規則なあらい縦じわがあり，折面は繊維性である。横断面をルーペ視するとき，最外層には周皮があり，皮部は淡黄白色，木部は淡黄色，形成層付近はやや褐色を帯びる。木部から皮部にわたって白色の放射組織が認められる。太いものではしばしば多数の放射状の裂け目となっている。わずかに特異なにおいがあり，味は甘い。

（１４）ニンジン　外面は淡黄褐色～淡灰褐色を呈し，縦じわがあり，横断面は淡黄褐色を呈し，形成層の付近は褐色を呈する。特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後にやや苦い。

必要に応じて，「ニンジン」の確認試験を準用する。

（１５）タイソウ　外面は赤褐色であらいしわがあるか，又は暗灰赤色で細かいしわがあり，いずれもつやがある。外果皮は薄く革質で，中果皮は暗灰褐色を呈し，海綿ようで柔らかく粘着性があり，内果皮は極めて堅く，種子は偏平である。わずかに特異なにおいがあり，味は甘い。

乾燥減量　15%以下。

灰　　分　7%以下。

【453】　K238—③

成分及び分量又は本質	日本薬局方	ジオウ	3.0g
	〃	シャクヤク	3.0g
	〃	カンゾウ	1.2～1.5g
	〃	ボウフウ	3.0g
	〃	ソウジュツ	3.0g
	〃	ブシ	0.5g
	〃	トチュウ	3.0g
	〃	キョウカツ	1.5g
	〃	センキュウ	2.0g
	〃	トウキ	3.0g
	〃	ゴシツ	1.5g
	〃	カンキョウ	1.0g
	〃	オウギ	3.0g
	〃	ニンジン	1.5g
	〃	タイソウ	1.5g
		全　量	31.7～32.0g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1 包として製する。		
用法及び用量	本品 1 包に水約 500mL を加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を 3 回に分けて食間に服用する。上記は大人の 1 日量である。15 才未満 7 才以上 大人の 2/3，7 才未満 4 才以上 大人の 1/2，4 才未満2 才以上　大人の 1/3，2 才未満　大人の 1/4 以下を服用する。		
効能又は効果	体力虚弱あるいは体力が消耗し衰え、貧血気味なものの次の諸症：慢性関節炎、関節のはれや痛み、神経痛		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	大防風湯		

規格及び試験方法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品 1 包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　ジオウ　外面は黄褐色～黒褐色を呈し，深い縦みぞ及びくびれがある。質は柔らかく粘性である。横断面は黄褐色～黒褐色で，皮部は木部より色が濃く，ほとんど髄を認めない。特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後にやや苦い。

横切片を鏡検するとき，コルク層は 7～15 層で，皮部はすべて柔細胞からなり，外皮部に褐色の分泌物を含む細胞が散在する。木部はほとんど柔細胞で満たされ，放射状に並ぶ道管は側孔のある網紋があり，弱い木化反応を呈する。

（2）　シャクヤク　外面は褐色～淡灰褐色を呈し，横断面はち密で淡灰褐色を呈し，木部には淡褐色の放射状の線がある。わずかに特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後に渋くてわずかに苦い。

必要に応じて，「シャクヤク」の確認試験を準用する。

（3）　カンゾウ　外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現わす。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に 1～3 細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には 3～10 細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞中にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

（4）　ボウフウ　外面は淡褐色で，多数の縦じわがある。横断面の周辺は灰褐色で，空げきが多く，中央は円形に黄色を呈する。味はわずかに甘い。

（5）　ソウジュツ　外面は暗灰褐色～暗黄褐色である。横断面は淡褐色～赤褐色の分泌物による細点を認める。しばしば白色綿状の結晶を析出する。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，皮部の柔組織中には，通例，繊維束を欠き，放射組織の末端部には淡褐色～黄褐色の内容物を含む油室がある。木部は形成層に接して道管を囲んだ繊維束が放射状に配列し，髄及び放射組織中には皮部と同様な油室がある。柔細胞中にはイヌリンの球晶及びシュウ酸カルシウムの針晶を含む。

（6）　ブシ　本品はほぼ倒円錐形で，長さ 15～30mm，径 12～16mm，又は縦ときに横に切断され，長さ 20～60mm，幅 15～40mm，厚さ 200～700μm，又は径 12mm 以下の不整な多角形に破砕されている。外面は淡褐色～暗褐色又は黄褐色を呈する。質は堅く，通例，しわはなく，切面は平らで，淡褐色～暗褐色又は黄白色～淡黄褐色を呈し，通常角質，半透明で光沢がある。弱い特異なにおいがある。

横切片及び縦切片を鏡検するとき，外側から擬上皮，一次皮層，内皮，二次皮層，形成層，木部が認められる。一次皮層には楕円形～楕円状四角形，短径 30～75μm，長径 60～150μm の厚壁細胞がある。内皮は接線方向に長い 1 層の細胞からなっている。形成層輪は星形又は不整の多角形～円形であり，木部の道管群は V 字形を呈する。二次皮層及び髄中に独立した形成層輪が認められるものもある。道管は孔紋，階紋，網紋又はらせん紋道管である。柔細胞中のでんぷん粒は糊化している。

必要に応じて，「ブシ」の確認試験を準用する。

純度試験　本品 1 包中のアコニチン（$C_{34}H_{47}O_{11}N$：645.75）の残存量は 0.01mg 以下である。

本品 1 包を粉末とし，その重量を精密に量り，これにメタノール 50mL を加え一夜放置した後，1 時間振とうし，ろ紙を用いてろ過する。残渣に再びメタノール 30mL を加え 1時間振とうした後，前記ろ紙を用いてろ過する。またこの残渣をメタノール 30mL で 2 回洗い，全量を合わせ減圧下でメタノールをほとんど留去する。残留物に希塩酸 10mL を加え水浴上で加温溶解する。冷後，分液ろう斗に脱脂綿を用いてろ過し，水 10mL で 2 回洗う。ろ液を合わせ，これにアンモニア水（28）を加えてアルカリ性とする。これにクロロホルム 50mL を加えて良く振り混ぜた後に下層を分取する。この操作を 2 回繰り返した後，クロロホルムを合わせ，これに水 10mL を加え洗った後，クロロホルム層を分取し，無水硫酸ナトリウムを加えて脱水する。これをろ過し，減圧下で蒸発乾固する。残留物をクロロホルム 1mL に正確に溶かして試料溶液とする。

別にアコニチン 20mg を精密に量り，クロロホルム 10mL に溶かし正確にメスアップする。この溶液 1mL を正確に量り，10mL に正確に希釈し標準溶液とする。

試料溶液及び標準溶液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。あらかじめ薄層クロマトグラフ用シリカゲルを用いて 0.25mm の厚さに調製し活性化した薄層板に試料溶液0.3mL，標準溶液10μL 及び15μL を正確に塗布する。次にブタノール・酢酸・水（4： 1：5）の混合溶液の上層を展開溶媒として，約 10cm 展開しこれを風乾した後，噴霧用ドラーゲンドルフ試液を均等に噴霧するとき，試料溶液から得られるアコニチンに対応するスポットの濃さは標準溶液の 10μL を塗布した方から得られるスポットより濃いことはあっても，標準溶液の15μL を塗布した方から得られるスポットより濃くない。

（7）　トチュウ　厚さ2～6mmの粗皮を除いた半管状又は板状の皮片である。外面は淡灰褐色 ～灰褐色で粗雑であるが，ときにコルク層が剥離され赤褐色を呈することもある。内面は暗褐色 ～褐色を呈し，平滑で細かい縦線があり，折ると白絹ようのグッタペルカ（熱可塑性のゴムよう 物質）の糸が出る。わずかに特異なにおいがあり，味はわずかに甘い。

横切片を鏡検するとき，柔組織内にはグッタペルカを含む柔細胞があり，師部には石細胞層及 び繊維層を認め，放射組織は2～3細胞列からなり，シュウ酸カルシウムの結晶を含まない。

必要に応じて，「トチュウ」の確認試験を準用する。

（8）　キョウカツ　やや湾曲した円柱形～円錐形を呈し，長さ3～10cm，径5～20mm，ときに根茎は分枝する。外面は黄褐色～暗褐色である。根茎はその頂端にやや円形にくぼんだ茎の跡があり，ときには短い茎の残基を付け，外面には隆起した節があり，節間は，通例，短い。節にはいぼ状突起となった根の跡がある。根の外面には粗い縦じわ及びいぼ状突起となった側根の跡がある。質は軽くややもろくて折りやすい。横切面には多くの放射状の裂け目があり，皮部は黄褐色～褐色，木部は淡黄色～淡灰黄色，髄は灰白色～淡褐色を呈し，ルーペ視するとき，皮部及び髄には油道による褐色の細点を認める。特異なにおいがあり，味は初めわずかに酸味があり，後にやや辛く，わずかに麻痺性である。

横切片を鏡検するとき，最外層は数層～十数層のコルク層からなり，その内側に数層の厚角組織がある。皮層には多数の油道があり，大きいものでは径が 300μm に達する。また皮層には放射状に大きなすき間がある。髄にも油道があり，大きいものでは径が 500μm に達する。柔組織中には単粒及び 2～3 個の複粒のでんぷん粒を含む。

必要に応じて，「キョウカツ」の確認試験を準用する。

（９）　センキュウ　外面は灰褐色～暗褐色で，切断面は灰白色～灰褐色，半透明で，ときにはうつろがある。質は密で堅い。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，皮部及び髄には油道が散在する。木部には厚膜で木化した木部繊維が大小不同の群をなして存在する。でんぷん粒は，通例，のり化していて，まれに径5～25μm のでんぷん粒を認めることがある。シュウ酸カルシウム結晶は認めない。

（１０）トウキ　外面は暗褐色～赤褐色で，縦じわがあり，切断面は淡黄色～黄褐色を呈する。特異なにおいがあり，味はわずかに甘く，後にやや辛い。

横切片を鏡検するとき，コルク層は 4～10 層からなり，その内側に数層の厚角組織が続いている。皮部には分泌細胞に囲まれた多数の樹脂道並びにしばしば大きなすき間がある。形成層は長方形に偏圧された数層の細胞からなり，明らかに皮部と木部とを区別する。木部では多数の道管と放射組織とが交互に放射状に配列し，その外方の道管は単独又は数個集まってやや密に配列してくさび状をなすが，中心部付近の道管は極めてまばらに存在する。でんぷん粒は径 19μm 以下，まれに 2～5 個の複粒があり，複粒の径は25μm に達し，しばしばのり化している。

（１１）ゴシツ　表面は灰黄色～黄褐色で，多数の縦じわがある。切断面は灰白色～淡褐色を呈 し，黄白色の木部を認める。味はわずかに甘く，粘液性である。

横切片を鏡検するとき，皮部はやや明らかな形成層によって木部と区別できる。木部の中心に は小さい原生木部があり，これを囲んで同心円状の環状維管束が外方に配列し，柔細胞の中には シュウ酸カルシウムの砂晶を含み，でんぷん粒は認めない。

必要に応じて，「ゴシツ」の確認試験を準用する。

（１２）カンキョウ　偏圧した不規則な塊状でしばしば分枝する。分枝した各部はやや湾曲した卵形又は長卵形を呈し，長さ 2～4cm，径 1～2cm である。外面は灰黄色～灰黄褐色で，しわ及び輪節がある。折面は褐色～暗褐色で透明感があり角質である。横切面をルーペ視するとき皮層と中心柱は区分され，全面に維管束が散在する。特異なにおいがあり，味は極めて辛い。

横切片を鏡検するとき，外側よりコルク層，皮層，内皮，中心柱が認められる。皮層と中心柱は一層の内皮によって区分される。皮層及び中心柱は柔組織からなり，繊維束で囲まれた維管束が散在する。柔組織中には黄色の油様物質を含む油細胞が散在し，柔細胞中にはシュウ酸カルシウムの単晶が含まれ，でんぷんは糊化している。

必要に応じて，「カンキョウ」の確認試験を準用する。

（１３）オウギ　外面は淡灰黄色～淡褐黄色で，不規則なあらい縦じわがあり，折面は繊維性である。横断面をルーペ視するとき，最外層には周皮があり，皮部は淡黄白色，木部は淡黄色，形成層付近はやや褐色を帯びる。木部から皮部にわたって白色の放射組織が認められる。太いものではしばしば多数の放射状の裂け目となっている。わずかに特異なにおいがあり，味は甘い。

（１４）ニンジン　外面は淡黄褐色～淡灰褐色を呈し，縦じわがあり，横断面は淡黄褐色を呈し，形成層の付近は褐色を呈する。特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後にやや苦い。

必要に応じて，「ニンジン」の確認試験を準用する。

（１５）タイソウ　外面は赤褐色であらいしわがあるか，又は暗灰赤色で細かいしわがあり，いずれもつやがある。外果皮は薄く革質で，中果皮は暗灰褐色を呈し，海綿ようで柔

らかく粘着性があり，内果皮は極めて堅く，種子は偏平である。わずかに特異なにおいがあり，味は甘い。

乾燥減量　15%以下。

灰　　分　7%以下。

【454】　K239

成分及び分量又は本質	日本薬局方	ハンゲ	3.0g
	〃	ケイヒ	3.0g
	〃	カンゾウ	2.0 ~ 3.0g
		全　量	8.0 ~ 9.0g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1 包として製する。		
用法及び用量	本品 1 包に水約 500mL を加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を 3 回に分けて食間に服用する。上記は大人の 1 日量である。15 才未満 7 才以上 大人の 2/3，7 才未満 4 才以上 大人の 1/2，4 才未満2 才以上　大人の 1/3，2 才未満　大人の 1/4 以下を服用する。		
効能又は効果	のどの痛み，扁桃炎，のどのあれ，声がれ		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	半夏散及湯		

規格及び試験方法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品 1 包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　ハンゲ　外面は白色～灰白黄色，上部には茎の跡がくぼみとなり，その周辺には根の跡がくぼんだ細点となっている。横断面は白色，粉性である。味は初めなく，やや粘液性で，後に強いえぐ味を残す。

横切片を鏡検するとき，主としてでんぷん粒を充満した柔組織からなり，わずかにシュウ酸カルシウムの束晶を含んだ粘液細胞がその間に認められる。でんぷん粒は主として 2～3 個の複粒で，通例，径10～15μm，単粒は通例径3～7μm である。束晶は長さ25～150μmである。

（2）　ケイヒ　外面は暗赤褐色を呈し，内面は赤褐色を呈し，平滑である。横断面は赤褐色を呈し淡褐色の薄層が見られる。特異なにおいがあり，味は甘く，辛く，後にやや粘液性で，わずかに収れん性である。

横切片を鏡検するとき，一次皮部と二次皮部はほとんど連続した石細胞環で区分され，環の外辺にはほぼ円形に結集した繊維束を伴い，環の各石細胞の膜はしばしば U 字形に肥厚する。二次皮部中には石細胞を認めず，まばらに少数の厚膜繊維を認める。柔組織中には油細胞，粘液細胞及び微細なシュウ酸カルシウムの針晶を含む細胞があり，柔細胞中にはでんぷん粒を含む。

（3）　カンゾウ　外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現わす。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に 1～3 細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には 3～10 細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞中にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

乾燥減量　15%以下。

灰　　分　6%以下。

【455】　K240

成分及び分量又は本質	日本薬局方	ビャクジュツ	4.0g
	〃	ブシ	0.3～1.0g
	〃	カンゾウ	1.0～2.0g
	〃	ショウキョウ	1.0g
	〃	タイソウ	3.0g
		全　量	9.3～11.0g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1 包として製する。		
用法及び用量	本品 1 包に水約 500mL を加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を 3 回に分けて食間に服用する。上記は大人の 1 日量である。15 才未満 7 才以上 大人の 2/3，7 才未満 4 才以上 大人の 1/2，4 才未満2 才以上　大人の 1/3，2 才未満　大人の 1/4 以下を服用する。		
効能又は効果	体力虚弱で、手足が冷え、ときに頻尿があるものの次の諸症：筋肉痛、関節のはれや痛み、神経痛、しびれ、めまい、感冒		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	白朮附子湯		

規格及び試験方法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品 1 包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　ビャクジュツ　外面は淡灰黄色～淡黄白色で，ところどころ灰褐色を呈し，横切面には淡黄褐色～褐色の分泌物による細点がある。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，皮部の柔組織中にはしばしば師管の外側に接して繊維束があり，放射組織の末端部には淡褐色～褐色の内容物を含む油室がある。木部には大きい髄を囲んで放射状に配列した短径の道管とそれを囲む著しい繊維束がある。髄及び放射組織中には皮部と同様な油室があり，柔組織中にはイヌリンの小球晶及びシュウ酸カルシウムの針晶を含む。

必要に応じて，「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。

（2）　ブシ　本品はほぼ倒円錐形で，長さ 15～30mm，径 12～16mm，又は縦ときに横に切断され，長さ 20～60mm，幅 15～40mm，厚さ 200～700μm，又は径 12mm 以下の

不整な多角形に破砕されている。外面は淡褐色～暗褐色又は黄褐色を呈する。質は堅く，通例，しわはなく，切面は平らで，淡褐色～暗褐色又は黄白色～淡黄褐色を呈し，通常角質，半透明で光沢がある。弱い特異なにおいがある。

横切片及び縦切片を鏡検するとき，外側から擬上皮，一次皮層，内皮，二次皮層，形成層，木部が認められる。一次皮層には楕円形～楕円状四角形，短径 30～75μm，長径 60～150μm の厚壁細胞がある。内皮は接線方向に長い 1 層の細胞からなっている。形成層輪は星形又は不整の多角形～円形であり，木部の道管群は V 字形を呈する。二次皮層及び髄中に独立した形成層輪が認められるものもある。道管は孔紋，階紋，網紋又はらせん紋道管である。柔細胞中のでんぷん粒は糊化している。

必要に応じて，「ブシ」の確認試験を準用する。

純度試験　本品 1 包中のアコニチン（$C_{34}H_{47}O_{11}N$：645.75）の残存量は 0.01mg 以下である。

本品 1 包を粉末とし，その重量を精密に量り，これにメタノール 50mL を加え一夜放置した後，1 時間振とうし，ろ紙を用いてろ過する。残渣に再びメタノール 30mL を加え1時間振とうした後，前記ろ紙を用いてろ過する。またこの残渣をメタノール 30mL で 2 回洗い，全量を合わせ減圧下でメタノールをほとんど留去する。残留物に希塩酸 10mL を加え水浴上で加温溶解する。冷後，分液ろう斗に脱脂綿を用いてろ過し，水 10mL で 2 回洗う。ろ液を合わせ，これにアンモニア水（28）を加えてアルカリ性とする。これにクロロホルム 50mL を加えて良く振り混ぜた後に下層を分取する。この操作を 2 回繰り返した後，クロロホルムを合わせ，これに水 10mL を加え洗った後，クロロホルム層を分取し，無水硫酸ナトリウムを加えて脱水する。これをろ過し，減圧下で蒸発乾固する。残留物をクロロホルム 1mL に正確に溶かして試料溶液とする。

別にアコニチン 20mg を精密に量り，クロロホルム 10mL に溶かし正確にメスアップする。この溶液 1mL を正確に量り，10mL に正確に希釈し標準溶液とする。

試料溶液及び標準溶液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。あらかじめ薄層クロマトグラフ用シリカゲルを用いて 0.25mm の厚さに調製し活性化した薄層板に試料溶液0.3mL，標準溶液10μL 及び15μL を正確に塗布する。次にブタノール・酢酸・水（4： 1：5）の混合溶液の上層を展開溶媒として，約 10cm 展開しこれを風乾した後，噴霧用ドラーゲンドルフ試液を均等に噴霧するとき，試料溶液から得られるアコニチンに対応するスポットの濃さは標準溶液の 10μL を塗布した方から得られるスポットより濃いことはあっても，標準溶液の15μL を塗布した方から得られるスポットより濃くない。

（３） カンゾウ　外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現わす。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に 1～3 細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には 3～10 細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞中にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

（４） ショウキョウ　淡灰黄色の周皮を付けたままか，又はその一部をはぎとってあり，表面は灰白色～淡灰褐色で，しばしば白粉を付けている。横断面は繊維性，粉性で，淡帯黄褐色を呈し，皮層と中心柱とに分かれる。横断面をルーペ視するとき，その全面に維管束及び分泌物が褐色の細点として散在している。特異なにおいがあり，味は極めて辛い。

（５） タイソウ　外面は赤褐色であらいしわがあるか，又は暗灰赤色で細かいしわがあり，いずれもつやがある。外果皮は薄く革質で，中果皮は暗灰褐色を呈し，海綿ようで柔らかく粘着性があり，内果皮は極めて堅く，種子は偏平である。わずかに特異なにおいがあり，味は甘い。

乾燥減量　15％以下。

灰　　分　7％以下。

【456】　K241

成分及び分量 又は本質	日本薬局方	ブクリョウ	6.0g
	〃	キョウニン	4.0g
	〃	カンゾウ	1.0g
		全　量	11.0g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1 包として製する。		
用法及び用量	本品 1 包に水約 500mL を加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を 3 回に分けて食間に服用する。上記は大人の 1 日量である。15 才未満 7 才以上 大人の 2/3，7 才未満 4 才以上 大人の 1/2，4 才未満2 才以上　大人の 1/3，2 才未満　大人の 1/4 以下を服用する。		
効能又は効果	体力中等度以下で，胸につかえがあるものの次の諸証：息切れ，胸の痛み，気管支ぜんそく，せき，動悸		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	茯苓杏仁甘草湯		

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品 1 包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　ブクリョウ　白色又はわずかに淡赤色を帯びた白色で，質は堅いが砕きやすい。味はないがやや粘液ようである。

必要に応じて，「ブクリョウ」の確認試験を準用する。

（2）　キョウニン　種皮は褐色で，表面にはすれて落ちやすい石細胞となった表皮細胞があって，粉をふいたようである。切断面は類白色である。味は苦く，油ようである。

表皮の表面を鏡検するとき，数個ずつ集合する石細胞はおおむね円形で，その細胞膜は均等に著しく厚くなり，径 60～90μm，側面視では鈍三角形で，細胞膜は先端部で著しく厚い。

必要に応じて，「キョウニン」の確認試験を準用する。

（3）　カンゾウ　外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現わす。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に 1～3 細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部に

は結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には 3～10 細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞中にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

乾燥減量　15%以下。

灰　　分　4%以下。

【457】　K242

成分及び分量又は本質	日本薬局方	ブクリョウ	4.0g
	〃	カンゾウ	2.0g
	〃	カンキョウ	2.0g
	〃	ニンジン	2.0g
	〃	ブシ	0.3～1.0g
		全　量	10.3～11.0g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1 包として製する。		
用法及び用量	本品 1 包に水約 500mL を加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を 3 回に分けて食間に服用する。上記は大人の 1 日量である。15 才未満 7 才以上 大人の 2/3，7 才未満 4 才以上 大人の 1/2，4 才未満2 才以上　大人の 1/3，2 才未満　大人の 1/4 以下を服用する。		
効能又は効果	体力虚弱あるいは体力が消耗し、手足が冷えるものの次の諸症：倦怠感、急・慢性胃腸炎、下痢、はきけ、尿量減少		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	茯苓四逆湯		

規格及び試験方法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品 1 包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　ブクリョウ　白色又はわずかに淡赤色を帯びた白色で，質は堅いが砕きやすい。味はないがやや粘液ようである。

必要に応じて，「ブクリョウ」の確認試験を準用する。

（2）　カンゾウ　外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現わす。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に 1～3 細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には 3～10 細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞中にはで

んぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

（３） カンキョウ 偏圧した不規則な塊状でしばしば分枝する。分枝した各部はやや湾曲した卵形又は長卵形を呈し，長さ 2～4cm，径 1～2cm である。外面は灰黄色～灰黄褐色で，しわ及び輪節がある。折面は褐色～暗褐色で透明感があり角質である。横切面をルーペ視するとき皮層と中心柱は区分され，全面に維管束が散在する。特異なにおいがあり，味は極めて辛い。

横切片を鏡検するとき，外側よりコルク層，皮層，内皮，中心柱が認められる。皮層と中心柱は一層の内皮によって区分される。皮層及び中心柱は柔組織からなり，繊維束で囲まれた維管束が散在する。柔組織中には黄色の油様物質を含む油細胞が散在し，柔細胞中にはシュウ酸カルシウムの単晶が含まれ，でんぷんは糊化している。

必要に応じて，「カンキョウ」の確認試験を準用する。

（４） ニンジン 外面は淡黄褐色～淡灰褐色を呈し，縦じわがあり，横断面は淡黄褐色を呈し，形成層の付近は褐色を呈する。特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後にやや苦い。

必要に応じて，「ニンジン」の確認試験を準用する。

（５） ブシ 本品はほぼ倒円錐形で，長さ 15～30mm，径 12～16mm，又は縦ときに横に切断され，長さ 20～60mm，幅 15～40mm，厚さ 200～700μm，又は径 12mm 以下の不整な多角形に破砕されている。外面は淡褐色～暗褐色又は黄褐色を呈する。質は堅く，通例，しわはなく，切面は平らで，淡褐色～暗褐色又は黄白色～淡黄褐色を呈し，通常角質，半透明で光沢がある。弱い特異なにおいがある。

横切片及び縦切片を鏡検するとき，外側から擬上皮，一次皮層，内皮，二次皮層，形成層，木部が認められる。一次皮層には楕円形～楕円状四角形，短径 30～75μm，長径 60～150μm の厚壁細胞がある。内皮は接線方向に長い 1 層の細胞からなっている。形成層輪は星形又は不整の多角形～円形であり，木部の道管群は V 字形を呈する。二次皮層及び髄中に独立した形成層輪が認められるものもある。道管は孔紋，階紋，網紋又はらせん紋道管である。柔細胞中のでんぷん粒は糊化している。

必要に応じて，「ブシ」の確認試験を準用する。

純度試験 本品 1 包中のアコニチン（$C_{34}H_{47}O_{11}N$：645.75）の残存量は 0.01mg 以下である。

本品 1 包を粉末とし，その重量を精密に量り，これにメタノール 50mL を加え一夜放置した後，1 時間振とうし，ろ紙を用いてろ過する。残渣に再びメタノール 30mL を加え1時間振とうした後，前記ろ紙を用いてろ過する。またこの残渣をメタノール 30mL で 2 回洗い，全量を合わせ減圧下でメタノールをほとんど留去する。残留物に希塩酸 10mL を加え水浴上で加温溶解する。冷後，分液ろう斗に脱脂綿を用いてろ過し，水 10mL で 2 回洗う。ろ液を合わせ，これにアンモニア水（28）を加えてアルカリ性とする。これにクロロホルム 50mL を加えて良く振り混ぜた後に下層を分取する。この操作を 2 回繰り返した後，クロロホルムを合わせ，これに水 10mL を加え洗った後，クロロホルム層を分取し，無水硫酸ナトリウムを加えて脱水する。これをろ過し，減圧下で蒸発乾固する。残留物をクロロホルム 1mL に正確に溶かして試料溶液とする。

別にアコニチン 20mg を精密に量り，クロロホルム 10mL に溶かし正確にメスアップする。この溶液 1mL を正確に量り，10mL に正確に希釈し標準溶液とする。

試料溶液及び標準溶液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。あらかじめ薄層クロマトグラフ用シリカゲルを用いて 0.25mm の厚さに調製し活性化した薄層板に試料溶液0.3mL，標準溶液10μL 及び15μL を正確に塗布する。次にブタノール・酢酸・水（4： 1：5）の混合溶液の上層を展開溶媒として，約 10cm 展開しこれを風乾した後，噴霧用ドラーゲンドルフ試液を均等に噴霧するとき，試料溶液から得られるアコニチンに対応するスポットの濃さは標準溶液の 10μL を塗布した方から得られるスポットより濃いことはあっても，標準溶液の15μL を塗布した方から得られるスポットより濃くない。

乾燥減量　15%以下。

灰　　分　5%以下。

【458】　K243

成分及び分量又は本質	日本薬局方	ブシ	0.3～1.0g
	〃	ハンゲ	5.0g
	〃	タイソウ	3.0g
	〃	カンゾウ	1.0～1.5g
	〃	コウベイ	7.0g
		全　量	15.3～16.5g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1 包として製する。		
用法及び用量	本品 1 包に水約 500mL を加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を 3 回に分けて食間に服用する。上記は大人の 1 日量である。15 才未満 7 才以上 大人の 2/3，7 才未満 4 才以上 大人の 1/2，4 才未満2 才以上　大人の 1/3，2 才未満　大人の 1/4 以下を服用する。		
効能又は効果	体力虚弱で、腹部が冷えて痛み、腹が鳴るものの次の諸症：胃痛、腹痛、嘔吐、急性胃腸炎		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	附子粳米湯		

規格及び試験方法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品 1 包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　ブシ　本品はほぼ倒円錐形で，長さ 15～30mm，径 12～16mm，又は縦ときに横に切断され，長さ 20～60mm，幅 15～40mm，厚さ 200～700μm，又は径 12mm 以下の不整な多角形に破砕されている。外面は淡褐色～暗褐色又は黄褐色を呈する。質は堅く，通例，しわはなく，切面は平らで，淡褐色～暗褐色又は黄白色～淡黄褐色を呈し，通常角質，半透明で光沢がある。弱い特異なにおいがある。

横切片及び縦切片を鏡検するとき，外側から擬上皮，一次皮層，内皮，二次皮層，形成層，木部が認められる。一次皮層には楕円形～楕円状四角形，短径 30～75μm，長径 60～150μm の厚壁細胞がある。内皮は接線方向に長い 1 層の細胞からなっている。形成層輪は星形又は不整の多角形～円形であり，木部の道管群は V 字形を呈する。二次皮層及び髄中に独立した形成層輪が認められるものもある。道管は孔紋，階紋，網紋又はらせん紋道管である。柔細胞中のでんぷん粒は糊化している。

必要に応じて，「ブシ」の確認試験を準用する。

純度試験　本品 1 包中のアコニチン（$C_{34}H_{47}O_{11}N$：645.75）の残存量は 0.01mg 以下である。

本品 1 包を粉末とし，その重量を精密に量り，これにメタノール 50mL を加え一夜放置した後，1 時間振とうし，ろ紙を用いてろ過する。残渣に再びメタノール 30mL を加え1時間振とうした後，前記ろ紙を用いてろ過する。またこの残渣をメタノール 30mL で 2 回洗い，全量を合わせ減圧下でメタノールをほとんど留去する。残留物に希塩酸 10mL を加え水浴上で加温溶解する。冷後，分液ろう斗に脱脂綿を用いてろ過し，水 10mL で 2 回洗う。ろ液を合わせ，これにアンモニア水（28）を加えてアルカリ性とする。これにクロロホルム 50mL を加えて良く振り混ぜた後に下層を分取する。この操作を 2 回繰り返した後，クロロホルムを合わせ，これに水 10mL を加え洗った後，クロロホルム層を分取し，無水硫酸ナトリウムを加えて脱水する。これをろ過し，減圧下で蒸発乾固する。残留物をクロロホルム 1mL に正確に溶かして試料溶液とする。

別にアコニチン 20mg を精密に量り，クロロホルム 10mL に溶かし正確にメスアップする。この溶液 1mL を正確に量り，10mL に正確に希釈し標準溶液とする。

試料溶液及び標準溶液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。あらかじめ薄層クロマトグラフ用シリカゲルを用いて 0.25mm の厚さに調製し活性化した薄層板に試料溶液0.3mL，標準溶液10μL 及び15μL を正確に塗布する。次にブタノール・酢酸・水（4： 1：5）の混合溶液の上層を展開溶媒として，約 10cm 展開しこれを風乾した後，噴霧用ドラーゲンドルフ試液を均等に噴霧するとき，試料溶液から得られるアコニチンに対応するスポットの濃さは標準溶液の 10μL を塗布した方から得られるスポットより濃いことはあっても，標準溶液の15μL を塗布した方から得られるスポットより濃くない。

（2） ハンゲ　外面は白色～灰白黄色，上部には茎の跡がくぼみとなり，その周辺には根の跡がくぼんだ細点となっている。横断面は白色，粉性である。味は初めなく，やや粘液性で，後に強いえぐ味を残す。

横切片を鏡検するとき，主としてでんぷん粒を充満した柔組織からなり，わずかにシュウ酸カルシウムの束晶を含んだ粘液細胞がその間に認められる。でんぷん粒は主として 2～3 個の複粒で，通例，径10～15μm，単粒は通例径3～7μm である。束晶は長さ25～150μmである。

（３） タイソウ　外面は赤褐色であらいしわがあるか，又は暗灰赤色で細かいしわがあり，いずれもつやがある。外果皮は薄く革質で，中果皮は暗灰褐色を呈し，海綿ようで柔らかく粘着性があり，内果皮は極めて堅く，種子は偏平である。わずかに特異なにおいがあり，味は甘い。

（4） カンゾウ　外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現わす。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に 1～3 細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には 3～10 細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞中にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

（５）　コウベイ　楕円形を呈し，やや扁平で，長さ 4～6mm である。外面は半透明で，淡黄白色～淡褐色を呈する。一端はわずかにくぼみ，白色の胚が認められる。他端には花柱の跡に由来する褐色の小点が認められる。表面には数本の長軸方向に走るみぞがある。弱いにおいがあり，味はわずかに甘い。

横切片を鏡検するとき，最外層は果皮で，果皮中に維管束を認める。種皮は果皮と癒着し，その内側に 1～2 層のアリューロン層を認める。内胚乳の柔細胞中に単粒又は複粒のでんぷん粒を認める。

必要に応じて，「コウベイ」の確認試験を準用する。

乾燥減量　15%以下。

灰　　分　4%以下。

【459】　K244

成分及び分量又は本質	日本薬局方	ニンジン	2.0g
	〃	トウキ	4.0g
	〃	シャクヤク	3.0g
	局外生規	シオン	2.0g
	日本薬局方	オウギ	2.0g
	〃	バクモンドウ	6.0g
	〃	ゴミシ	1.5g
	〃	カンゾウ	1.5g
		全　量	22.0g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1 包として製する。		
用法及び用量	本品 1 包に水約 500mL を加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を 3 回に分けて食間に服用する。上記は大人の 1 日量である。15 才未満 7 才以上 大人の 2/3，7 才未満 4 才以上 大人の 1/2，4 才未満2 才以上　大人の 1/3，2 才未満　大人の 1/4 以下を服用する。		
効能又は効果	体力中等度以下で，出血傾向があり，せき，息切れがあるものの次の諸症：鼻血，歯肉からの出血，痔出血，気管支炎		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	扶脾生脈散料		

規格及び試験方法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品 1 包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　ニンジン　外面は淡黄褐色～淡灰褐色を呈し，縦じわがあり，横断面は淡黄褐色を呈し，形成層の付近は褐色を呈する。特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後にやや苦い。

必要に応じて，「ニンジン」の確認試験を準用する。

（2）　トウキ　外面は暗褐色～赤褐色で，縦じわがあり，切断面は淡黄色～黄褐色を呈する。特異なにおいがあり，味はわずかに甘く，後にやや辛い。

横切片を鏡検するとき，コルク層は 4～10 層からなり，その内側に数層の厚角組織が続いている。皮部には分泌細胞に囲まれた多数の樹脂道並びにしばしば大きなすき間がある。形成層は長方形に偏圧された数層の細胞からなり，明らかに皮部と木部とを区別する。木部では多数の道管と放射組織とが交互に放射状に配列し，その外方の道管は単独又は数個集まってやや密に配列してくさび状をなすが，中心部付近の道管は極めてまばらに存在する。でんぷん粒は径19μm 以下，まれに2～5 個の複粒があり，複粒の径は25μm に達し，しばしばのり化している。

（3） シャクヤク 外面は褐色～淡灰褐色を呈し，横断面はち密で淡灰褐色を呈し，木部には淡褐色の放射状の線がある。わずかに特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後に渋くてわずかに苦い。

必要に応じて，「シャクヤク」の確認試験を準用する。

（4） シオン 外面は淡褐色～帯紫褐色を呈し，切断面は褐色～淡褐色である。根の径は 1～2mm で，根には細かい縦じわがあり，質はやや柔軟である。特異なにおいがあり，味はわずかに苦くてややえぐい。

必要に応じて，局外生規「シオン」の確認試験を準用する。

（5） オウギ 外面は淡灰黄色～淡褐黄色で，不規則なあらい縦じわがあり，折面は繊維性である。横断面をルーペ視するとき，最外層には周皮があり，皮部は淡黄白色，木部は淡黄色，形成層付近はやや褐色を帯びる。木部から皮部にわたって白色の放射組織が認められる。太いものではしばしば多数の放射状の裂け目となっている。わずかに特異なにおいがあり，味は甘い。

（6） バクモンドウ 紡錘形を呈し，長さ 10～25mm，径 3～5mm，一端はややとがり，他端はやや丸みをもち，外面は淡黄色～淡黄褐色で，大小の縦じわがある。皮層は柔軟性でもろく，中心柱は強じんで折りにくい。皮層の折面は淡黄褐色を呈し，やや半透明で粘着性がある。味はわずかに甘く，粘着性である。

（7） ゴミシ 暗赤色～黒褐色を呈し，表面にはしわがあり，またしばしば白い粉を付ける。果肉を除くとじん臓形の種子 1～2 個を認め，その外種皮は黄褐色～暗赤褐色を呈し，つやがあり，堅くてもろい。外種皮はたやすくはがれるが，内種皮は胚乳に密着し，背面に明らかな縫線を認める。酸味があり，後に渋くて苦い。

（8） カンゾウ 外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現わす。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に 1～3 細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には 3～10 細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞中にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

乾燥減量 15%以下。

灰　　分 6%以下。

【460】　K245

成分及び分量又は本質	日本薬局方	カンゾウ	2.0g
	〃	ニンジン	2.0g
	〃	ケイヒ	4.0g
	〃	ゴシュユ	2.0g
	〃	ショウキョウ	1.0g
	〃	ハ ン ゲ	4.0g
		全　量	15.0g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1 包として製する。		
用法及び用量	本品 1 包に水約 500mL を加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を 3 回に分けて食間に服用する。上記は大人の 1 日量である。15 才未満 7 才以上 大人の 2/3，7 才未満 4 才以上 大人の 1/2，4 才未満2 才以上　大人の 1/3，2 才未満　大人の 1/4 以下を服用する。		
効能又は効果	体力中等度以下で，下腹部から動悸が胸やのどに突き上げる感じがするものの次の諸症：発作性の動悸，不安神経症		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	奔豚湯（肘後方）		

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品 1 包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　カンゾウ　外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現わす。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に 1～3 細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には 3～10 細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞中にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

（２）　ニンジン　外面は淡黄褐色～淡灰褐色を呈し，縦じわがあり，横断面は淡黄褐色を呈し，形成層の付近は褐色を呈する。特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後にやや苦い。

必要に応じて，「ニンジン」の確認試験を準用する。

（３）　ケイヒ　外面は暗赤褐色を呈し，内面は赤褐色を呈し，平滑である。横断面は赤褐色を呈し淡褐色の薄層が見られる。特異なにおいがあり，味は甘く，辛く，後にやや粘液性で，わずかに収れん性である。

横切片を鏡検するとき，一次皮部と二次皮部はほとんど連続した石細胞環で区分され，環の外辺にはほぼ円形に結集した繊維束を伴い，環の各石細胞の膜はしばしば U 字形に肥厚する。二次皮部中には石細胞を認めず，まばらに少数の厚膜繊維を認める。柔組織中には油細胞，粘液細胞及び微細なシュウ酸カルシウムの針晶を含む細胞があり，柔細胞中にはでんぷん粒を含む。

（４）　ゴシュユ　偏球形又は球形を呈し，外面は暗褐色～灰褐色，多くの油室がくぼんだ小点として認められ，その中心には花柱の残基があるが，しばしばこれは脱落している。果柄は長さ 2～5mm で，灰緑色の毛を密生している。果皮は，通例，開裂し，予房は 5 室に分かれ，各室中には倒卵球形又は球形の褐色～黒褐色又は帯青黒色のつやのある種子がある。特異なにおいがあり，味は辛く，後に残留性の苦味がある。

必要に応じて，「ゴシュユ」の確認試験を準用する。

（５）　ショウキョウ　淡灰黄色の周皮を付けたままか，又はその一部をはぎとってあり，表面は灰白色～淡灰褐色で，しばしば白粉を付けている。横断面は繊維性，粉性で，淡帯黄褐色を呈し，皮層と中心柱とに分かれる。横断面をルーペ視するとき，その全面に維管束及び分泌物が褐色の細点として散在している。特異なにおいがあり，味は極めて辛い。

（６）　ハンゲ　外面は白色～灰白黄色，上部には茎の跡がくぼみとなり，その周辺には根の跡がくぼんだ細点となっている。横断面は白色，粉性である。味は初めなく，やや粘液性で，後に強いえぐ味を残す。

横切片を鏡検するとき，主としてでんぷん粒を充満した柔組織からなり，わずかにシュウ酸カルシウムの束晶を含んだ粘液細胞がその間に認められる。でんぷん粒は主として 2～3 個の複粒で，通例，径10～15μm，単粒は通例径3～7μm である。束晶は長さ25～150μmである。

乾燥減量　15%以下。

灰　　分　6%以下。

【461】　K246

成分及び分又は本質	日本薬局方	マオウ	2.0 ~ 4.0g
	〃	サイシン	3.0g
	〃	ブシ	0.3 ~ 1.0g
		全　量	5.3 ~ 8.0g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1 包として製する。		
用法及び用量	本品 1 包に水約 500mL を加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を 3 回に分けて食間に服用する。上記は大人の 1 日量である。15 才未満 7 才以上 大人の 2/3，7 才未満 4 才以上 大人の 1/2，4 才未満2 才以上　大人の 1/3，2 才未満　大人の 1/4 以下を服用する。		
効能又は効果	体力虚弱で，手足に冷えがあり，ときに悪寒があるものの次の諸症：感冒，アレルギー性鼻炎，気管支炎，気管支ぜんそく，神経痛		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	麻黄附子細辛湯		

規格及び試験方法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品 1 包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　マオウ　細い円柱状又はだ円柱を呈し，長さ 3～10mm，径 1～2mm，淡緑色～黄緑色である。表面に多数の平行する縦みぞがあり，節部には，長さ 2～4mm の 2 枚のりん片状の葉が対生し，その基部は合着して筒状になっている。りん片状の葉の色は淡褐色～褐色である。茎の横断面をルーペ視するとき，円形～だ円形で，周囲部は灰緑色～黄緑色を呈し，中心部には赤緑色の物質が充満しているか，又は中空のところがある。味は渋くてわずかに苦く，やや麻ひ性である。

必要に応じて，「マオウ」の確認試験を準用する。

（2）　サイシン　根の外面は淡褐色で，径約 1mm，切断面は黄白色である。根茎は不整に湾曲し外面は暗褐色を呈する。特異なにおいがあり，味は辛く舌をやや麻ひする。

（3）　ブシ　本品はほぼ倒円錐形で，長さ 15～30mm，径 12～16mm，又は縦ときに横に切断され，長さ 20～60mm，幅 15～40mm，厚さ 200～700μm，又は径 12mm 以下の不整な多角形に破砕されている。外面は淡褐色～暗褐色又は黄褐色を呈する。質は堅く，通例，しわはなく，切面は平らで，淡褐色～暗褐色又は黄白色～淡黄褐色を呈し，通常角質，半透明で光沢がある。弱い特異なにおいがある。

横切片及び縦切片を鏡検するとき，外側から擬上皮，一次皮層，内皮，二次皮層，形成層，木部が認められる。一次皮層には楕円形～楕円状四角形，短径 30～75μm，長径 60～150μm の厚壁細胞がある。内皮は接線方向に長い 1 層の細胞からなっている。形成層輪は星形又は不整の多角形～円形であり，木部の道管群は V 字形を呈する。二次皮層及び髄中に独立した形成層輪が認められるものもある。道管は孔紋，階紋，網紋又はらせん紋道管である。柔細胞中のでんぷん粒は糊化している。

必要に応じて，「ブシ」の確認試験を準用する。

純度試験　本品 1 包中のアコニチン（C34H47O11N：645.75）の残存量は 0.01mg 以下である。

本品 1 包を粉末とし，その重量を精密に量り，これにメタノール 50mL を加え一夜放置したのち，1 時間振とうし，ろ紙を用いてろ過する。残渣に再びメタノール 30mL を加え 1 時間振とうした後，前記ろ紙を用いてろ過する。また，この残渣をメタノール 30mL で 2 回洗い，全量を合わせ減圧下でメタノールをほとんど留去する。残留物に希塩酸 10mL を加え水浴上で加温溶解する。冷後，分液漏斗に脱脂綿を用いてろ過し，水 10mL で 2 回洗う。ろ液を合わせ，これにアンモニア水（28）を加えてアルカリ性とする。これにクロロホルム 50mL を加えてよく振り混ぜた後に下層を分取する。この操作を 2 回繰り返した後，クロロホルムを合わせ，これに水 10mL を加え洗った後，クロロホルム層を分取し，無水硫酸ナトリウムを加えて脱水する。これをろ過し，減圧下で蒸発乾固する。残留物をクロロホルム 1mL に正確に溶かして試料溶液とする。

別にアコニチン 20mg を精密に量り，クロロホルム 10mL に溶かし正確にメスアップする。この溶液 1mL を正確に量り，10mL に正確に希釈し標準溶液とする。

試料溶液及び標準溶液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。あらかじめ薄層クロマトグラフ用シリカゲルを用いて 0.25mm の厚さに調製し活性化した薄層板に試料溶液0.3mL，標準溶液10μL 及び15μL を正確に塗布する。次にブタノール・酢酸・水（4： 1： 5）の混合溶液の上層を展開溶媒として，約 10cm 展開しこれを風乾した後，噴霧用ドラーゲンドルフ試液を均等に噴霧するとき，試料溶液から得られるアコニチンに対応するスポットの濃さは標準溶液の 10μL を塗布した方から得られるスポットより濃いことはあっても，標準溶液の15μL を塗布した方から得られるスポットより濃くない。

乾燥減量　15%以下。

灰　　分　10%以下。

【462】　K247

成分及び分量又は本質	日本薬局方	ボウイ	4.0g
	〃	セッコウ	10.0g
	〃	ケイヒ	3.0g
	〃	ニンジン	3.0g
		全量	20.0g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1 包として製する。		
用法及び用量	本品 1 包に水約 500mL を加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を 3 回に分けて食間に服用する。上記は大人の 1 日量である。15 才未満 7 才以上 大人の 2/3，7 才未満 4 才以上 大人の 1/2，4 才未満2 才以上　大人の 1/3，2 才未満　大人の 1/4 以下を服用する。		
効能又は効果	体力中等度以上で，みぞおちがつかえ，血色すぐれないものの次の諸症：動悸，息切れ，気管支ぜんそく，むくみ		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	木防已湯		

規格及び試験方法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品 1 包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　ボウイ　外面は暗灰褐色を呈し，縦みぞがあり，横断面の外部は暗灰褐色のコルク層でおおわれ，内部には灰褐色の道管部と暗褐色の放射組織とが交互に放射状に配列する。味は苦い。

横切片を鏡検するとき，一次皮部にはシュウ酸カルシウムの針晶を含み，一次皮部及び内しょうには著しく膜の厚い石細胞が認められ，道管部では大小の道管がほぼ階段状に配列する。放射組織の細胞の大部分は木化せず，径 3～10μm のでんぷん粒及びシュウ酸カルシウムの小針晶を含み，ところどころに極めて厚膜の大きな石細胞が散在する。

必要に応じて，「ボウイ」の確認試験を準用する。

（2）　セッコウ　光沢のある白色の重い繊維状結晶塊で，におい及び味はない。砕くとたやすく針状～微細結晶性の粉末となる。水に溶けにくい。

必要に応じて，「セッコウ」の確認試験を準用する。

（3）　ケイヒ　外面は暗赤褐色を呈し，内面は赤褐色を呈し，平滑である。横断面は赤褐色を呈し淡褐色の薄層が見られる。特異なにおいがあり，味は甘く，辛く，後にやや粘液性で，わずかに収れん性である。

横切片を鏡検するとき，一次皮部と二次皮部はほとんど連続した石細胞環で区分され，環の外辺にはほぼ円形に結集した繊維束を伴い，環の各石細胞の膜はしばしば U 字形に肥厚する。二次皮部中には石細胞を認めず，まばらに少数の厚膜繊維を認める。柔組織中には油細胞，粘液細胞及び微細なシュウ酸カルシウムの針晶を含む細胞があり，柔細胞中にはでんぷん粒を含む。

（4）　ニンジン　外面は淡黄褐色～淡灰褐色を呈し，縦じわがあり，横断面は淡黄褐色を呈し，形成層の付近は褐色を呈する。特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後にやや苦い。

必要に応じて，「ニンジン」の確認試験を準用する。

乾燥減量　20%以下。

灰　　分　設定しない

【463】　K247—①

成分及び分量又は本質	日本薬局方　ボウイ　4.0g 〃　セッコウ　10.0g 〃　ケイヒ　3.0g 〃　チクセツニンジン　4.0g 全量　21.0g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1 包として製する。
用法及び用量	本品 1 包に水約 500mL を加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を 3 回に分けて食間に服用する。上記は大人の 1 日量である。15 才未満 7 才以上 大人の 2/3，7 才未満 4 才以上 大人の 1/2，4 才未満2 才以上　大人の 1/3，2 才未満　大人の 1/4 以下を服用する。
効能又は効果	体力中等度以上で，みぞおちがつかえ，血色すぐれないものの次の諸症：動悸，息切れ，気管支ぜんそく，むくみ
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器
規格及び試験方法	別記のとおり。
備考	木防已湯（竹参）

規格及び試験方法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品 1 包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　ボウイ　外面は暗灰褐色を呈し，縦みぞがあり，横断面の外部は暗灰褐色のコルク層でおおわれ，内部には灰褐色の道管部と暗褐色の放射組織とが交互に放射状に配列する。味は苦い。

横切片を鏡検するとき，一次皮部にはシュウ酸カルシウムの針晶を含み，一次皮部及び内しょうには著しく膜の厚い石細胞が認められ，道管部では大小の道管がほぼ階段状に配列する。放射組織の細胞の大部分は木化せず，径 3～10μm のでんぷん粒及びシュウ酸カルシウムの小針晶を含み，ところどころに極めて厚膜の大きな石細胞が散在する。

必要に応じて，「ボウイ」の確認試験を準用する。

（2）　セッコウ　光沢のある白色の重い繊維状結晶塊で，におい及び味はない。砕くとたやすく針状～微細結晶性の粉末となる。水に溶けにくい。

必要に応じて，「セッコウ」の確認試験を準用する。

（3）　ケイヒ　外面は暗赤褐色を呈し，内面は赤褐色を呈し，平滑である。横断面は赤褐色を呈し淡褐色の薄層が見られる。特異なにおいがあり，味は甘く，辛く，後にやや粘液性で，わずかに収れん性である。

横切片を鏡検するとき，一次皮部と二次皮部はほとんど連続した石細胞環で区分され，環の外辺にはほぼ円形に結集した繊維束を伴い，環の各石細胞の膜はしばしば U 字形に肥厚する。二次皮部中には石細胞を認めず，まばらに少数の厚膜繊維を認める。柔組織中には油細胞，粘液細胞及び微細なシュウ酸カルシウムの針晶を含む細胞があり，柔細胞中にはでんぷん粒を含む。

（4）　チクセツニンジン　外面は淡黄褐色で，質は堅く，横断面はほぼ平らで淡黄褐色を呈し，角質ようである。弱いにおいがあり，味はわずかに苦い。

必要に応じて，「チクセツニンジン」の確認試験を準用する。

乾燥減量　20%以下。

灰　　分　設定しない

【464】　K248

成分及び分量又は本質	日本薬局方	ブクリョウ	4.0g
	〃	カンゾウ	1.2～2.0g
	〃	ハンゲ	4.0g
	〃	カンキョウ	2.0g
	〃	キョウニン	4.0g
	〃	ゴミシ	3.0g
	〃	サイシン	2.0g
		全量	20.2～21.0g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1 包として製する。		
用法及び用量	本品 1 包に水約 500mL を加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を 3 回に分けて食間に服用する。上記は大人の 1 日量である。15 才未満 7 才以上 大人の 2/3，7 才未満 4 才以上 大人の 1/2，4 才未満2 才以上　大人の 1/3，2 才未満　大人の 1/4 以下を服用する。		
効能又は効果	体力中等度又はやや虚弱で，胃腸が弱り，冷え症で薄い水様のたんが多いものの次の諸症：気管支炎，気管支ぜんそく，動悸，息切れ，むくみ		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	苓甘姜味辛夏仁湯		

規格及び試験方法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品 1 包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　ブクリョウ　白色又はわずかに淡赤色を帯びた白色で，質は堅いが砕きやすい。味はないがやや粘液ようである。

必要に応じて，「ブクリョウ」の確認試験を準用する。

（2）　カンゾウ　外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現わす。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に 1～3 細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には 3～10 細胞列の

放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞中にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

（3） ハンゲ　外面は白色～灰白黄色，上部には茎の跡がくぼみとなり，その周辺には根の跡がくぼんだ細点となっている。横断面は白色，粉性である。味は初めなく，やや粘液性で，後に強いえぐ味を残す。

横切片を鏡検するとき，主としてでんぷん粒を充満した柔組織からなり，わずかにシュウ酸カルシウムの束晶を含んだ粘液細胞がその間に認められる。でんぷん粒は主として 2～3 個の複粒で，通例，径10～15μm，単粒は通例径3～7μm である。束晶は長さ25～150μmである。

（4） カンキョウ　偏圧した不規則な塊状でしばしば分枝する。分枝した各部はやや湾曲した卵形又は長卵形を呈し，長さ 2～4cm，径 1～2cm である。外面は灰黄色～灰黄褐色で，しわ及び輪節がある。折面は褐色～暗褐色で透明感があり角質である。横切面をルーペ視するとき皮層と中心柱は区分され，全面に維管束が散在する。特異なにおいがあり，味は極めて辛い。

横切片を鏡検するとき，外側よりコルク層，皮層，内皮，中心柱が認められる。皮層と中心柱は一層の内皮によって区分される。皮層及び中心柱は柔組織からなり，繊維束で囲まれた維管束が散在する。柔組織中には黄色の油様物質を含む油細胞が散在し，柔細胞中にはシュウ酸カルシウムの単晶が含まれ，でんぷんは糊化している。

必要に応じて，「カンキョウ」の確認試験を準用する。

（5） キョウニン　種皮は褐色で，表面にはすれて落ちやすい石細胞となった表皮細胞があって，粉をふいたようである。切断面は類白色である。味は苦く，油ようである。

表皮の表面を鏡検するとき，数個ずつ集合する石細胞はおおむね円形で，その細胞膜は均等に著しく厚くなり，径 60～90μm，側面視では鈍三角形で，細胞膜は先端部で著しく厚い。

必要に応じて，「キョウニン」の確認試験を準用する。

（6） ゴミシ　暗赤色～黒褐色を呈し，表面にはしわがあり，またしばしば白い粉を付ける。果肉を除くとじん臓形の種子 1～2 個を認め，その外種皮は黄褐色～暗赤褐色を呈し，つやがあり，堅くてもろい。外種皮はたやすくはがれるが，内種皮は胚乳に密着し，背面に明らかな縫線を認める。酸味があり，後に渋くて苦い。

（7） サイシン　根の外面は淡褐色で，径約 1mm，切断面は黄白色である。根茎は不整に湾曲し外面は暗褐色を呈する。特異なにおいがあり，味は辛く舌をやや麻ひする。

乾燥減量　15%以下。

灰　　分　5%以下。

【465】　K249

成分及び分量又は本質	日本薬局方	ブクリョウ	6.0g
	〃	カンゾウ	2.0g
	〃	ケイヒ	4.0g
	〃	ゴミシ	3.0g
		全量	15.0g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1 包として製する。		
用法及び用量	本品 1 包に水約 500mL を加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を 3 回に分けて食間に服用する。上記は大人の 1 日量である。15 才未満 7 才以上 大人の 2/3，7 才未満 4 才以上 大人の 1/2，4 才未満2 才以上　大人の 1/3，2 才未満　大人の 1/4 以下を服用する。		
効能又は効果	体力中等度以下で，手足が冷えて顔が赤くなるものの次の諸症：のぼせ，動悸，からぜき，のどのふさがり感，耳のふさがり感		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	苓桂味甘湯		

規格及び試験方法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品 1 包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　ブクリョウ　白色又はわずかに淡赤色を帯びた白色で，質は堅いが砕きやすい。味はないがやや粘液ようである。

必要に応じて，「ブクリョウ」の確認試験を準用する。

（2）　カンゾウ　外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現わす。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に 1～3細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には 3～10 細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞中にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

（3） ケイヒ　外面は暗赤褐色を呈し，内面は赤褐色を呈し，平滑である。横断面は赤褐色を呈し淡褐色の薄層が見られる。特異なにおいがあり，味は甘く，辛く，後にやや粘液性で，わずかに収れん性である。

横切片を鏡検するとき，一次皮部と二次皮部はほとんど連続した石細胞環で区分され，環の外辺にはほぼ円形に結集した繊維束を伴い，環の各石細胞の膜はしばしば U 字形に肥厚する。二次皮部中には石細胞を認めず，まばらに少数の厚膜繊維を認める。柔組織中には油細胞，粘液細胞及び微細なシュウ酸カルシウムの針晶を含む細胞があり，柔細胞中にはでんぷん粒を含む。

（6） ゴミシ　暗赤色～黒褐色を呈し，表面にはしわがあり，またしばしば白い粉を付ける。果肉を除くとじん臓形の種子 1～2 個を認め，その外種皮は黄褐色～暗赤褐色を呈し，つやがあり，堅くてもろい。外種皮はたやすくはがれるが，内種皮は胚乳に密着し，背面に明らかな縫線を認める。酸味があり，後に渋くて苦い。

乾燥減量　20%以下。

灰　　分　4%以下。

【466】　K250

成分及び分量又は本質	日本薬局方	マオウ	4.0 ~ 6.0g
	〃	セッコウ	8.0g
	〃	ビャクジュツ	4.0g
	〃	ブシ	0.3 ~ 1.0g
	〃	ショウキョウ	1.0g
	〃	カンゾウ	1.5 ~ 2.0g
	〃	タイソウ	3.0g
		全　量	21.8 ~ 25.0g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1 包として製する。		
用法及び用量	本品 1 包に水約 500mL を加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を 3 回に分けて食間に服用する。上記は大人の 1 日量である。15 才未満 7 才以上 大人の 2/3，7 才未満 4 才以上 大人の 1/2，4 才未満2 才以上　大人の 1/3，2 才未満　大人の 1/4 以下を服用する。		
効能又は効果	体力中等度以上で、冷えがあって、むくみがあり、のどが渇き、汗が出て、ときに尿量が減少するものの次の諸症：むくみ、関節のはれや痛み、筋肉痛、湿疹・皮膚炎、夜尿症、目のかゆみ・痛み		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	越婢加朮附湯		

規格及び試験方法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品 1 包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　マオウ　細い円柱状又はだ円柱を呈し，長さ 3～10mm，径 1～2mm，淡緑色～黄緑色である。表面に多数の平行する縦みぞがあり，節部には，長さ 2～4mm の 2 枚のりん片状の葉が対生し，その基部は合着して筒状になっている。りん片状の葉の色は淡褐色～褐色である。茎の横断面をルーペ視するとき，円形～だ円形で，周囲部は灰緑色～黄緑色を呈し，中心部には赤緑色の物質が充満しているか，又は中空のところがある。味は渋くてわずかに苦く，やや麻ひ性である。

必要に応じて，「マオウ」の確認試験を準用する。

（２）　セッコウ　光沢のある白色の重い繊維状結晶塊で，におい及び味はない。砕くとたやすく針状～微細結晶性の粉末となる。水に溶けにくい。

必要に応じて，「セッコウ」の確認試験を準用する。

（３）　ビャクジュツ　外面は淡灰黄色～淡黄白色で，ところどころ灰褐色を呈し，横切面には淡黄褐色～褐色の分泌物による細点がある。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，皮部の柔組織中にはしばしば師管の外側に接して繊維束があり，放射組織の末端部には淡褐色～褐色の内容物を含む油室がある。木部には大きい髄を囲んで放射状に配列した短径の道管とそれを囲む著しい繊維束がある。髄及び放射組織中には皮部と同様な油室があり，柔組織中にはイヌリンの小球晶及びシュウ酸カルシウムの針晶を含む。

必要に応じて，「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。

（４）　ブシ　本品はほぼ倒円錐形で，長さ 15～30mm，径 12～16mm，又は縦ときに横に切断され，長さ 20～60mm，幅 15～40mm，厚さ 200～700μm，又は径 12mm 以下の不整な多角形に破砕されている。外面は淡褐色～暗褐色又は黄褐色を呈する。質は堅く，通例，しわはなく，切面は平らで，淡褐色～暗褐色又は黄白色～淡黄褐色を呈し，通常角質，半透明で光沢がある。弱い特異なにおいがある。

横切片及び縦切片を鏡検するとき，外側から擬上皮，一次皮層，内皮，二次皮層，形成層，木部が認められる。一次皮層には楕円形～楕円状四角形，短径 30～75μm，長径 60～150μm の厚壁細胞がある。内皮は接線方向に長い 1 層の細胞からなっている。形成層輪は星形又は不整の多角形～円形であり，木部の道管群は V 字形を呈する。二次皮層及び髄中に独立した形成層輪が認められるものもある。道管は孔紋，階紋，網紋又はらせん紋道管である。柔細胞中のでんぷん粒は糊化している。

必要に応じて，「ブシ」の確認試験を準用する。

純度試験　本品 1 包中のアコニチン（$C_{34}H_{47}O_{11}N$：645.75）の残存量は 0.01mg 以下である。

本品 1 包を粉末とし，その重量を精密に量り，これにメタノール 50mL を加え一夜放置した後，1 時間振とうし，ろ紙を用いてろ過する。残渣に再びメタノール 30mL を加え1時間振とうした後，前記ろ紙を用いてろ過する。またこの残渣をメタノール 30mL で 2 回洗い，全量を合わせ減圧下でメタノールをほとんど留去する。残留物に希塩酸 10mL を加え水浴上で加温溶解する。冷後，分液ろう斗に脱脂綿を用いてろ過し，水 10mL で 2 回洗う。ろ液を合わせ，これにアンモニア水（28）を加えてアルカリ性とする。これにクロロホルム 50mL を加えて良く振り混ぜた後に下層を分取する。この操作を 2 回繰り返した後，クロロホルムを合わせ，これに水 10mL を加え洗った後，クロロホルム層を分取し，無水硫酸ナトリウムを加えて脱水する。これをろ過し，減圧下で蒸発乾固する。残留物をクロロホルム 1mL に正確に溶かして試料溶液とする。

別にアコニチン 20mg を精密に量り，クロロホルム 10mL に溶かし正確にメスアップする。この溶液 1mL を正確に量り，10mL に正確に希釈し標準溶液とする。

試料溶液及び標準溶液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。あらかじめ薄層クロマトグラフ用シリカゲルを用いて 0.25mm の厚さに調製し活性化した薄層板に試料溶液0.3mL，標準溶液10μL 及び15μL を正確に塗布する。次にブタノール・酢酸・水（4： 1：5）の混合溶液の上層を展開溶媒として，約 10cm 展開しこれを風乾した後，噴霧用ドラーゲンドルフ試液を均等に噴霧するとき，試料溶液から得られるアコ

ニチンに対応するスポットの濃さは標準溶液の 10μL を塗布した方から得られるスポットより濃いことはあっても，標準溶液の15μL を塗布した方から得られるスポットより濃くない。

（５） ショウキョウ 淡灰黄色の周皮を付けたままか，又はその一部をはぎとってあり，表面は灰白色～淡灰褐色で，しばしば白粉を付けている。横断面は繊維性，粉性で，淡帯黄褐色を呈し，皮層と中心柱とに分かれる。横断面をルーペ視するとき，その全面に維管束及び分泌物が褐色の細点として散在している。特異なにおいがあり，味は極めて辛い。

（６） カンゾウ 外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現わす。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に 1～3 細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には 3～10 細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞中にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

（７） タイソウ 外面は赤褐色であらいしわがあるか，又は暗灰赤色で細かいしわがあり，いずれもつやがある。外果皮は薄く革質で，中果皮は暗灰褐色を呈し，海綿ようで柔らかく粘着性があり，内果皮は極めて堅く，種子は偏平である。わずかに特異なにおいがあり，味は甘い。

乾燥減量 20%以下。

灰　　分 設定しない

【467】　K250—①

成分及び分量又は本質	日本薬局方	マオウ	6.0g
	〃	セッコウ	8.0g
	〃	ソウジュツ	4.0g
	〃	ブシ	0.3～1.0g
	〃	ショウキョウ	1.0g
	〃	カンゾウ	1.5～2.0g
	〃	タイソウ	3.0g
		全　量	21.8～25.0g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1 包として製する。		
用法及び用量	本品 1 包に水約 500mL を加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を 3 回に分けて食間に服用する。上記は大人の 1 日量である。15 才未満 7 才以上 大人の 2/3，7 才未満 4 才以上 大人の 1/2，4 才未満2 才以上　大人の 1/3，2 才未満　大人の 1/4 以下を服用する。		
効能又は効果	体力中等度以上で、冷えがあって、むくみがあり、のどが渇き、汗が出て、ときに尿量が減少するものの次の諸症：むくみ、関節のはれや痛み、筋肉痛、湿疹・皮膚炎、夜尿症、目のかゆみ・痛み		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	越婢加朮附湯		

規格及び試験方法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品 1 包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　マオウ　細い円柱状又はだ円柱を呈し，長さ 3～10mm，径 1～2mm，淡緑色～黄緑色である。表面に多数の平行する縦みぞがあり，節部には，長さ 2～4mm の 2 枚のりん片状の葉が対生し，その基部は合着して筒状になっている。りん片状の葉の色は淡褐色～褐色である。茎の横断面をルーペ視するとき，円形～だ円形で，周囲部は灰緑色～黄緑色を呈し，中心部には赤緑色の物質が充満しているか，又は中空のところがある。味は渋くてわずかに苦く，やや麻ひ性である。

必要に応じて，「マオウ」の確認試験を準用する。

（２）　セッコウ　光沢のある白色の重い繊維状結晶塊で，におい及び味はない。砕くとたやすく針状～微細結晶性の粉末となる。水に溶けにくい。

必要に応じて，「セッコウ」の確認試験を準用する。

（３）　ソウジュツ　外面は暗灰褐色～暗黄褐色である。横断面は淡褐色～赤褐色の分泌物による細点を認める。しばしば白色綿状の結晶を析出する。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，皮部の柔組織中には，通例，繊維束を欠き，放射組織の末端部には淡褐色～黄褐色の内容物を含む油室がある。木部は形成層に接して道管を囲んだ繊維束が放射状に配列し，髄及び放射組織中には皮部と同様な油室がある。柔細胞中にはイヌリンの球晶及びシュウ酸カルシウムの針晶を含む。

（４）　ブシ　本品はほぼ倒円錐形で，長さ 15～30mm，径 12～16mm，又は縦ときに横に切断され，長さ 20～60mm，幅 15～40mm，厚さ 200～700μm，又は径 12mm 以下の不整な多角形に破砕されている。外面は淡褐色～暗褐色又は黄褐色を呈する。質は堅く，通例，しわはなく，切面は平らで，淡褐色～暗褐色又は黄白色～淡黄褐色を呈し，通常角質，半透明で光沢がある。弱い特異なにおいがある。

横切片及び縦切片を鏡検するとき，外側から擬上皮，一次皮層，内皮，二次皮層，形成層，木部が認められる。一次皮層には楕円形～楕円状四角形，短径 30～75μm，長径 60～150μm の厚壁細胞がある。内皮は接線方向に長い 1 層の細胞からなっている。形成層輪は星形又は不整の多角形～円形であり，木部の道管群は V 字形を呈する。二次皮層及び髄中に独立した形成層輪が認められるものもある。道管は孔紋，階紋，網紋又はらせん紋道管である。柔細胞中のでんぷん粒は糊化している。

必要に応じて，「ブシ」の確認試験を準用する。

純度試験　本品 1 包中のアコニチン（$C_{34}H_{47}O_{11}N$：645.75）の残存量は 0.01mg 以下である。

本品 1 包を粉末とし，その重量を精密に量り，これにメタノール 50mL を加え一夜放置した後，1 時間振とうし，ろ紙を用いてろ過する。残渣に再びメタノール 30mL を加え1時間振とうした後，前記ろ紙を用いてろ過する。またこの残渣をメタノール 30mL で 2 回洗い，全量を合わせ減圧下でメタノールをほとんど留去する。残留物に希塩酸 10mL を加え水浴上で加温溶解する。冷後，分液ろう斗に脱脂綿を用いてろ過し，水 10mL で 2 回洗う。ろ液を合わせ，これにアンモニア水（28）を加えてアルカリ性とする。これにクロロホルム 50mL を加えて良く振り混ぜた後に下層を分取する。この操作を 2 回繰り返した後，クロロホルムを合わせ，これに水 10mL を加え洗った後，クロロホルム層を分取し，無水硫酸ナトリウムを加えて脱水する。これをろ過し，減圧下で蒸発乾固する。残留物をクロロホルム 1mL に正確に溶かして試料溶液とする。

別にアコニチン 20mg を精密に量り，クロロホルム 10mL に溶かし正確にメスアップする。この溶液 1mL を正確に量り，10mL に正確に希釈し標準溶液とする。

試料溶液及び標準溶液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。あらかじめ薄層クロマトグラフ用シリカゲルを用いて 0.25mm の厚さに調製し活性化した薄層板に試料溶液0.3mL，標準溶液10μL 及び15μL を正確に塗布する。次にブタノール・酢酸・水（4： 1：5）の混合溶液の上層を展開溶媒として，約 10cm 展開しこれを風乾した後，噴霧用ドラーゲンドルフ試液を均等に噴霧するとき，試料溶液から得られるアコニチンに対応するスポットの濃さは標準溶液の 10μL を塗布した方から得られるスポ

ットより濃いことはあっても，標準溶液の15μL を塗布した方から得られるスポットより濃くない。

（５）　ショウキョウ　淡灰黄色の周皮を付けたままか，又はその一部をはぎとってあり，表面は灰白色～淡灰褐色で，しばしば白粉を付けている。横断面は繊維性，粉性で，淡帯黄褐色を呈し，皮層と中心柱とに分かれる。横断面をルーペ視するとき，その全面に維管束及び分泌物が褐色の細点として散在している。特異なにおいがあり，味は極めて辛い。

（６）　カンゾウ　外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現わす。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に 1～3 細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には 3～10 細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞中にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

（７）　タイソウ　外面は赤褐色であらいしわがあるか，又は暗灰赤色で細かいしわがあり，いずれもつやがある。外果皮は薄く革質で，中果皮は暗灰褐色を呈し，海綿ようで柔らかく粘着性があり，内果皮は極めて堅く，種子は偏平である。わずかに特異なにおいがあり，味は甘い。

乾燥減量　20%以下。

灰　　分　設定しない

【468】　K251

成分及び分量又は本質	日本薬局方	ケイヒ	4.0g
	〃	シャクヤク	4.0g
	〃	カンゾウ	2.0g
	〃	マオウ	5.0g
	〃	ショウキョウ	1.0g
	〃	タイソウ	3.0g
	〃	セッコウ	8.0g
	〃	ソウジュツ	4.0g
	〃	ブシ	1.0g
		全　量	32.0g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1 包として製する。		
用法及び用量	本品 1 包に水約 500mL を加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を 3 回に分けて食間に服用する。上記は大人の 1 日量である。15 才未満 7 才以上 大人の 2/3，7 才未満 4 才以上 大人の 1/2，4 才未満2 才以上　大人の 1/3，2 才未満　大人の 1/4 以下を服用する。		
効能又は効果	体力中等度以下のものの次の諸症：関節のはれや痛み		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	桂枝越婢湯		

規格及び試験方法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品 1 包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　ケイヒ　外面は暗赤褐色を呈し，内面は赤褐色を呈し，平滑である。横断面は赤褐色を呈し淡褐色の薄層が見られる。特異なにおいがあり，味は甘く，辛く，後にやや粘液性で，わずかに収れん性である。

横切片を鏡検するとき，一次皮部と二次皮部はほとんど連続した石細胞環で区分され，環の外辺にはほぼ円形に結集した繊維束を伴い，環の各石細胞の膜はしばしば U 字形に肥厚する。二次皮部中には石細胞を認めず，まばらに少数の厚膜繊維を認める。柔組織中

には油細胞，粘液細胞及び微細なシュウ酸カルシウムの針晶を含む細胞があり，柔細胞中にはでんぷん粒を含む。

（２）　シャクヤク　外面は褐色～淡灰褐色を呈し，横断面はち密で淡灰褐色を呈し，木部には淡褐色の放射状の線がある。わずかに特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後に渋くてわずかに苦い。

必要に応じて，「シャクヤク」の確認試験を準用する。

（３）　カンゾウ　外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現わす。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に 1～3 細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には 3～10 細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞中にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

（４）　マオウ　細い円柱状又はだ円柱を呈し，長さ 3～10mm，径 1～2mm，淡緑色～黄緑色である。表面に多数の平行する縦みぞがあり，節部には，長さ 2～4mm の 2 枚のりん片状の葉が対生し，その基部は合着して筒状になっている。りん片状の葉の色は淡褐色～褐色である。茎の横断面をルーペ視するとき，円形～だ円形で，周囲部は灰緑色～黄緑色を呈し，中心部には赤緑色の物質が充満しているか，又は中空のところがある。味は渋くてわずかに苦く，やや麻ひ性である。

必要に応じて，「マオウ」の確認試験を準用する。

（５）　ショウキョウ　淡灰黄色の周皮を付けたままか，又はその一部をはぎとってあり，表面は灰白色～淡灰褐色で，しばしば白粉を付けている。横断面は繊維性，粉性で，淡帯黄褐色を呈し，皮層と中心柱とに分かれる。横断面をルーペ視するとき，その全面に維管束及び分泌物が褐色の細点として散在している。特異なにおいがあり，味は極めて辛い。

（６）　タイソウ　外面は赤褐色であらいしわがあるか，又は暗灰赤色で細かいしわがあり，いずれもつやがある。外果皮は薄く革質で，中果皮は暗灰褐色を呈し，海綿ようで柔らかく粘着性があり，内果皮は極めて堅く，種子は偏平である。わずかに特異なにおいがあり，味は甘い。

（７）　セッコウ　光沢のある白色の重い繊維状結晶塊で，におい及び味はない。砕くとたやすく針状～微細結晶性の粉末となる。水に溶けにくい。

必要に応じて，「セッコウ」の確認試験を準用する。

（８）　ソウジュツ　外面は暗灰褐色～暗黄褐色である。横断面は淡褐色～赤褐色の分泌物による細点を認める。しばしば白色綿状の結晶を析出する。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，皮部の柔組織中には，通例，繊維束を欠き，放射組織の末端部には淡褐色～黄褐色の内容物を含む油室がある。木部は形成層に接して道管を囲んだ繊維束が放射状に配列し，髄及び放射組織中には皮部と同様な油室がある。柔細胞中にはイヌリンの球晶及びシュウ酸カルシウムの針晶を含む。

（９） ブシ　本品はほぼ倒円錐形で，長さ 15～30mm，径 12～16mm，又は縦ときに横に切断され，長さ 20～60mm，幅 15～40mm，厚さ 200～700μm，又は径 12mm 以下の不整な多角形に破砕されている。外面は淡褐色～暗褐色又は黄褐色を呈する。質は堅く，通例，しわはなく，切面は平らで，淡褐色～暗褐色又は黄白色～淡黄褐色を呈し，通常角質，半透明で光沢がある。弱い特異なにおいがある。

横切片及び縦切片を鏡検するとき，外側から擬上皮，一次皮層，内皮，二次皮層，形成層，木部が認められる。一次皮層には楕円形～楕円状四角形，短径 30～75μm，長径 60～150μm の厚壁細胞がある。内皮は接線方向に長い 1 層の細胞からなっている。形成層輪は星形又は不整の多角形～円形であり，木部の道管群は V 字形を呈する。二次皮層及び髄中に独立した形成層輪が認められるものもある。道管は孔紋，階紋，網紋又はらせん紋道管である。柔細胞中のでんぷん粒は糊化している。

必要に応じて，「ブシ」の確認試験を準用する。

純度試験　本品 1 包中のアコニチン（$C_{34}H_{47}O_{11}N$：645.75）の残存量は 0.01mg 以下である。

本品 1 包を粉末とし，その重量を精密に量り，これにメタノール 50mL を加え一夜放置した後，1 時間振とうし，ろ紙を用いてろ過する。残渣に再びメタノール 30mL を加え1時間振とうした後，前記ろ紙を用いてろ過する。またこの残渣をメタノール 30mL で 2 回洗い，全量を合わせ減圧下でメタノールをほとんど留去する。残留物に希塩酸 10mL を加え水浴上で加温溶解する。冷後，分液ろう斗に脱脂綿を用いてろ過し，水 10mL で 2 回洗う。ろ液を合わせ，これにアンモニア水（28）を加えてアルカリ性とする。これにクロロホルム 50mL を加えて良く振り混ぜた後に下層を分取する。この操作を 2 回繰り返した後，クロロホルムを合わせ，これに水 10mL を加え洗った後，クロロホルム層を分取し，無水硫酸ナトリウムを加えて脱水する。これをろ過し，減圧下で蒸発乾固する。残留物をクロロホルム 1mL に正確に溶かして試料溶液とする。

別にアコニチン 20mg を精密に量り，クロロホルム 10mL に溶かし正確にメスアップする。この溶液 1mL を正確に量り，10mL に正確に希釈し標準溶液とする。

試料溶液及び標準溶液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。あらかじめ薄層クロマトグラフ用シリカゲルを用いて 0.25mm の厚さに調製し活性化した薄層板に試料溶液0.3mL，標準溶液10μL 及び15μL を正確に塗布する。次にブタノール・酢酸・水（4： 1：5）の混合溶液の上層を展開溶媒として，約 10cm 展開しこれを風乾した後，噴霧用ドラーゲンドルフ試液を均等に噴霧するとき，試料溶液から得られるアコニチンに対応するスポットの濃さは標準溶液の 10μL を塗布した方から得られるスポットより濃いことはあっても，標準溶液の15μL を塗布した方から得られるスポットより濃くない。

乾燥減量　20%以下。

灰　　分　設定しない

【469】　K252

成分及び分量又は本質	日本薬局方	ケイヒ	2.5g
	〃	シャクヤク	2.5g
	〃	マオウ	2.5g
	〃	カンゾウ	2.5g
	〃	タイソウ	3.0g
	〃	セッコウ	3.0g
	〃	ショウキョウ	1.0g
		全量	17.0g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1 包として製する。		
用法及び用量	本品 1 包に水約 500mL を加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を 3 回に分けて食間に服用する。上記は大人の 1 日量である。15 才未満 7 才以上 大人の 2/3，7 才未満 4 才以上 大人の 1/2，4 才未満2 才以上　大人の 1/3，2 才未満　大人の 1/4 以下を服用する。		
効能又は効果	体力中等度で，のどが渇き，汗が出るものの次の諸症：感冒，頭痛，腰痛，筋肉痛，関節のはれや痛み		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	桂枝二越婢一湯		

規格及び試験方法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品 1 包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　ケイヒ　外面は暗赤褐色を呈し，内面は赤褐色を呈し，平滑である。横断面は赤褐色を呈し淡褐色の薄層が見られる。特異なにおいがあり，味は甘く，辛く，後にやや粘液性で，わずかに収れん性である。

横切片を鏡検するとき，一次皮部と二次皮部はほとんど連続した石細胞環で区分され，環の外辺にはほぼ円形に結集した繊維束を伴い，環の各石細胞の膜はしばしば U 字形に肥厚する。二次皮部中には石細胞を認めず，まばらに少数の厚膜繊維を認める。柔組織中には油細胞，粘液細胞及び微細なシュウ酸カルシウムの針晶を含む細胞があり，柔細胞中にはでんぷん粒を含む。

（２） シャクヤク　外面は褐色～淡灰褐色を呈し，横断面はち密で淡灰褐色を呈し，木部には淡褐色の放射状の線がある。わずかに特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後に渋くてわずかに苦い。

必要に応じて，「シャクヤク」の確認試験を準用する。

（３） マオウ　細い円柱状又はだ円柱を呈し，長さ 3～10mm，径 1～2mm，淡緑色～黄緑色である。表面に多数の平行する縦みぞがあり，節部には，長さ 2～4mm の 2 枚のりん片状の葉が対生し，その基部は合着して筒状になっている。りん片状の葉の色は淡褐色～褐色である。茎の横断面をルーペ視するとき，円形～だ円形で，周囲部は灰緑色～黄緑色を呈し，中心部には赤緑色の物質が充満しているか，又は中空のところがある。味は渋くてわずかに苦く，やや麻ひ性である。

必要に応じて，「マオウ」の確認試験を準用する。

（４） カンゾウ　外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現わす。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に 1～3 細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には 3～10 細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞中にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

（５） タイソウ　外面は赤褐色であらいしわがあるか，又は暗灰赤色で細かいしわがあり，いずれもつやがある。外果皮は薄く革質で，中果皮は暗灰褐色を呈し，海綿ようで柔らかく粘着性があり，内果皮は極めて堅く，種子は偏平である。わずかに特異なにおいがあり，味は甘い。

（６） セッコウ　光沢のある白色の重い繊維状結晶塊で，におい及び味はない。砕くとたやすく針状～微細結晶性の粉末となる。水に溶けにくい。

必要に応じて，「セッコウ」の確認試験を準用する。

（７） ショウキョウ　淡灰黄色の周皮を付けたままか，又はその一部をはぎとってあり，表面は灰白色～淡灰褐色で，しばしば白粉を付けている。横断面は繊維性，粉性で，淡帯黄褐色を呈し，皮層と中心柱とに分かれる。横断面をルーペ視するとき，その全面に維管束及び分泌物が褐色の細点として散在している。特異なにおいがあり，味は極めて辛い。

乾燥減量　20%以下。

灰　　分　設定しない

【470】　K253

成分及び分量又は本質	日本薬局方	ケイヒ	2.5g
	〃	シャクヤク	2.5g
	〃	カンゾウ	2.5g
	〃	マオウ	2.5g
	〃	ショウキョウ	1.0g
	〃	タイソウ	3.0g
	〃	セッコウ	3.0g
	〃	ビャクジュツ	3.0g
	〃	ブシ	0.5～1.0g
		全量	20.5～21.0g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1 包として製する。		
用法及び用量	本品 1 包に水約 500mL を加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を 3 回に分けて食間に服用する。上記は大人の 1 日量である。15 才未満 7 才以上 大人の 2/3，7 才未満 4 才以上 大人の 1/2，4 才未満2 才以上　大人の 1/3，2 才未満　大人の 1/4 以下を服用する。		
効能又は効果	体力中等度以下で，冷えがあって，のどが渇き，汗が出て，ときに尿量が減少するものの次の諸症：関節のはれや痛み，筋肉痛，腰痛，頭痛		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	桂枝二越婢一湯加朮附		

規格及び試験方法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品 1 包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　ケイヒ　外面は暗赤褐色を呈し，内面は赤褐色を呈し，平滑である。横断面は赤褐色を呈し淡褐色の薄層が見られる。特異なにおいがあり，味は甘く，辛く，後にやや粘液性で，わずかに収れん性である。

横切片を鏡検するとき，一次皮部と二次皮部はほとんど連続した石細胞環で区分され，環の外辺にはほぼ円形に結集した繊維束を伴い，環の各石細胞の膜はしばしば U 字形に肥厚する。二次皮部中には石細胞を認めず，まばらに少数の厚膜繊維を認める。柔組織中には油

細胞，粘液細胞及び微細なシュウ酸カルシウムの針晶を含む細胞があり，柔細胞中にはでんぷん粒を含む。

（2） シャクヤク 外面は褐色～淡灰褐色を呈し，横断面はち密で淡灰褐色を呈し，木部には淡褐色の放射状の線がある。わずかに特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後に渋くてわずかに苦い。

必要に応じて，「シャクヤク」の確認試験を準用する。

（3） カンゾウ 外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現わす。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に 1～3 細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には 3～10 細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞中にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

（4） マオウ 細い円柱状又はだ円柱を呈し，長さ 3～10mm，径 1～2mm，淡緑色～黄緑色である。表面に多数の平行する縦みぞがあり，節部には，長さ 2～4mm の 2 枚のりん片状の葉が対生し，その基部は合着して筒状になっている。りん片状の葉の色は淡褐色～褐色である。茎の横断面をルーペ視するとき，円形～だ円形で，周囲部は灰緑色～黄緑色を呈し，中心部には赤緑色の物質が充満しているか，又は中空のところがある。味は渋くてわずかに苦く，やや麻ひ性である。

必要に応じて，「マオウ」の確認試験を準用する。

（5） ショウキョウ 淡灰黄色の周皮を付けたままか，又はその一部をはぎとってあり，表面は灰白色～淡灰褐色で，しばしば白粉を付けている。横断面は繊維性，粉性で，淡帯黄褐色を呈し，皮層と中心柱とに分かれる。横断面をルーペ視するとき，その全面に維管束及び分泌物が褐色の細点として散在している。特異なにおいがあり，味は極めて辛い。

（6） タイソウ 外面は赤褐色であらいしわがあるか，又は暗灰赤色で細かいしわがあり，いずれもつやがある。外果皮は薄く革質で，中果皮は暗灰褐色を呈し，海綿ようで柔らかく粘着性があり，内果皮は極めて堅く，種子は偏平である。わずかに特異なにおいがあり，味は甘い。

（7） セッコウ 光沢のある白色の重い繊維状結晶塊で，におい及び味はない。砕くとたやすく針状～微細結晶性の粉末となる。水に溶けにくい。

必要に応じて，「セッコウ」の確認試験を準用する。

（8） ビャクジュツ 外面は淡灰黄色～淡黄白色で，ところどころ灰褐色を呈し，横切面には淡黄褐色～褐色の分泌物による細点がある。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，皮部の柔組織中にはしばしば師管の外側に接して繊維束があり，放射組織の末端部には淡褐色～褐色の内容物を含む油室がある。木部には大きい髄を囲んで放射状に配列した短径の道管とそれを囲む著しい繊維束がある。髄及び放射組織中には皮部と同様な油室があり，柔組織中にはイヌリンの小球晶及びシュウ酸カルシウムの針晶を含む。

必要に応じて，「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。

（９）ブシ　本品はほぼ倒円錐形で，長さ 15～30mm，径 12～16mm，又は縦ときに横に切断され，長さ 20～60mm，幅 15～40mm，厚さ 200～700μm，又は径 12mm 以下の不整な多角形に破砕されている。外面は淡褐色～暗褐色又は黄褐色を呈する。質は堅く，通例，しわはなく，切面は平らで，淡褐色～暗褐色又は黄白色～淡黄褐色を呈し，通常角質，半透明で光沢がある。弱い特異なにおいがある。

横切片及び縦切片を鏡検するとき，外側から擬上皮，一次皮層，内皮，二次皮層，形成層，木部が認められる。一次皮層には楕円形～楕円状四角形，短径 30～75μm，長径 60～150μm の厚壁細胞がある。内皮は接線方向に長い 1 層の細胞からなっている。形成層輪は星形又は不整の多角形～円形であり，木部の道管群は V 字形を呈する。二次皮層及び髄中に独立した形成層輪が認められるものもある。道管は孔紋，階紋，網紋又はらせん紋道管である。柔細胞中のでんぷん粒は糊化している。

必要に応じて，「ブシ」の確認試験を準用する。

純度試験　本品 1 包中のアコニチン（$C_{34}H_{47}O_{11}N$：645.75）の残存量は 0.01mg 以下である。

本品 1 包を粉末とし，その重量を精密に量り，これにメタノール 50mL を加え一夜放置したのち，1 時間振とうし，ろ紙を用いてろ過する。残渣に再びメタノール 30mL を加え 1 時間振とうした後，前記ろ紙を用いてろ過する。また，この残渣をメタノール 30mL で 2 回洗い，全量を合わせ減圧下でメタノールをほとんど留去する。残留物に希塩酸 10mL を加え水浴上で加温溶解する。冷後，分液漏斗に脱脂綿を用いてろ過し，水 10mL で 2 回洗う。ろ液を合わせ，これにアンモニア水（28）を加えてアルカリ性とする。これにクロロホルム 50mL を加えてよく振り混ぜた後に下層を分取する。この操作を 2 回繰り返した後，クロロホルムを合わせ，これに水 10mL を加え洗った後，クロロホルム層を分取し，無水硫酸ナトリウムを加えて脱水する。これをろ過し，減圧下で蒸発乾固する。残留物をクロロホルム 1mL に正確に溶かして試料溶液とする。

別にアコニチン 20mg を精密に量り，クロロホルム 10mL に溶かし正確にメスアップする。この溶液 1mL を正確に量り，10mL に正確に希釈し標準溶液とする。

試料溶液及び標準溶液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。あらかじめ薄層クロマトグラフ用シリカゲルを用いて 0.25mm の厚さに調製し活性化した薄層板に試料溶液0.3mL，標準溶液10μL 及び15μL を正確に塗布する。次にブタノール・酢酸・水（4： 1： 5）の混合溶液の上層を展開溶媒として，約 10cm 展開しこれを風乾した後，噴霧用ドラーゲンドルフ試液を均等に噴霧するとき，試料溶液から得られるアコニチンに対応するスポットの濃さは標準溶液の 10μL を塗布した方から得られるスポットより濃いことはあっても，標準溶液の15μL を塗布した方から得られるスポットより濃くない。

乾燥減量　15%以下。

灰　　分　設定しない

【471】　K253—①

成分及び分量又は本質	日本薬局方	ケイヒ	2.5g
	〃	シャクヤク	2.5g
	〃	カンゾウ	2.5g
	〃	マオウ	2.5g
	〃	ショウキョウ	1.0g
	〃	タイソウ	3.0g
	〃	セッコウ	3.0g
	〃	ソウジュツ	3.0g
	〃	ブシ	0.5～1.0g
		全量	20.5～21.0g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1 包として製する。		
用法及び用量	本品 1 包に水約 500mL を加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を 3 回に分けて食間に服用する。上記は大人の 1 日量である。15 才未満 7 才以上 大人の 2/3，7 才未満 4 才以上 大人の 1/2，4 才未満2 才以上　大人の 1/3，2 才未満　大人の 1/4 以下を服用する。		
効能又は効果	体力中等度以下で，冷えがあって，のどが渇き，汗が出て，ときに尿量が減少するものの次の諸症：関節のはれや痛み，筋肉痛，腰痛，頭痛		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	桂枝二越婢一湯加朮附		

規格及び試験方法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品 1 包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　ケイヒ　外面は暗赤褐色を呈し，内面は赤褐色を呈し，平滑である。横断面は赤褐色を呈し淡褐色の薄層が見られる。特異なにおいがあり，味は甘く，辛く，後にやや粘液性で，わずかに収れん性である。

横切片を鏡検するとき，一次皮部と二次皮部はほとんど連続した石細胞環で区分され，環の外辺にはほぼ円形に結集した繊維束を伴い，環の各石細胞の膜はしばしば U 字形に肥厚する。二次皮部中には石細胞を認めず，まばらに少数の厚膜繊維を認める。柔組織中には油

細胞，粘液細胞及び微細なシュウ酸カルシウムの針晶を含む細胞があり，柔細胞中にはでんぷん粒を含む。

（2） シャクヤク 外面は褐色～淡灰褐色を呈し，横断面はち密で淡灰褐色を呈し，木部には淡褐色の放射状の線がある。わずかに特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後に渋くてわずかに苦い。

必要に応じて，「シャクヤク」の確認試験を準用する。

（3） カンゾウ 外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現わす。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に 1～3 細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には 3～10 細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞中にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

（4） マオウ 細い円柱状又はだ円柱を呈し，長さ 3～10mm，径 1～2mm，淡緑色～黄緑色である。表面に多数の平行する縦みぞがあり，節部には，長さ 2～4mm の 2 枚のりん片状の葉が対生し，その基部は合着して筒状になっている。りん片状の葉の色は淡褐色～褐色である。茎の横断面をルーペ視するとき，円形～だ円形で，周囲部は灰緑色～黄緑色を呈し，中心部には赤緑色の物質が充満しているか，又は中空のところがある。味は渋くてわずかに苦く，やや麻ひ性である。

必要に応じて，「マオウ」の確認試験を準用する。

（5） ショウキョウ 淡灰黄色の周皮を付けたままか，又はその一部をはぎとってあり，表面は灰白色～淡灰褐色で，しばしば白粉を付けている。横断面は繊維性，粉性で，淡帯黄褐色を呈し，皮層と中心柱とに分かれる。横断面をルーペ視するとき，その全面に維管束及び分泌物が褐色の細点として散在している。特異なにおいがあり，味は極めて辛い。

（6） タイソウ 外面は赤褐色であらいしわがあるか，又は暗灰赤色で細かいしわがあり，いずれもつやがある。外果皮は薄く革質で，中果皮は暗灰褐色を呈し，海綿ようで柔らかく粘着性があり，内果皮は極めて堅く，種子は偏平である。わずかに特異なにおいがあり，味は甘い。

（7） セッコウ 光沢のある白色の重い繊維状結晶塊で，におい及び味はない。砕くとたやすく針状～微細結晶性の粉末となる。水に溶けにくい。

必要に応じて，「セッコウ」の確認試験を準用する。

（8） ソウジュツ 外面は暗灰褐色～暗黄褐色である。横断面は淡褐色～赤褐色の分泌物による細点を認める。しばしば白色綿状の結晶を析出する。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，皮部の柔組織中には，通例，繊維束を欠き，放射組織の末端部には淡褐色～黄褐色の内容物を含む油室がある。木部は形成層に接して道管を囲んだ繊維束が放射状に配列し，髄及び放射組織中には皮部と同様な油室がある。柔細胞中にはイヌリンの球晶及びシュウ酸カルシウムの針晶を含む。

（９）ブシ　本品はほぼ倒円錐形で，長さ 15～30mm，径 12～16mm，又は縦ときに横に切断され，長さ 20～60mm，幅 15～40mm，厚さ 200～700μm，又は径 12mm 以下の不整な多角形に破砕されている。外面は淡褐色～暗褐色又は黄褐色を呈する。質は堅く，通例，しわはなく，切面は平らで，淡褐色～暗褐色又は黄白色～淡黄褐色を呈し，通常角質，半透明で光沢がある。弱い特異なにおいがある。

横切片及び縦切片を鏡検するとき，外側から擬上皮，一次皮層，内皮，二次皮層，形成層，木部が認められる。一次皮層には楕円形～楕円状四角形，短径 30～75μm，長径 60～150μm の厚壁細胞がある。内皮は接線方向に長い 1 層の細胞からなっている。形成層輪は星形又は不整の多角形～円形であり，木部の道管群は V 字形を呈する。二次皮層及び髄中に独立した形成層輪が認められるものもある。道管は孔紋，階紋，網紋又はらせん紋道管である。柔細胞中のでんぷん粒は糊化している。

必要に応じて，「ブシ」の確認試験を準用する。

純度試験　本品 1 包中のアコニチン（C34H47O11N：645.75）の残存量は 0.01mg 以下である。

本品 1 包を粉末とし，その重量を精密に量り，これにメタノール 50mL を加え一夜放置したのち，1 時間振とうし，ろ紙を用いてろ過する。残渣に再びメタノール 30mL を加え 1 時間振とうした後，前記ろ紙を用いてろ過する。また，この残渣をメタノール 30mL で 2 回洗い，全量を合わせ減圧下でメタノールをほとんど留去する。残留物に希塩酸 10mL を加え水浴上で加温溶解する。冷後，分液漏斗に脱脂綿を用いてろ過し，水 10mL で 2 回洗う。ろ液を合わせ，これにアンモニア水（28）を加えてアルカリ性とする。これにクロロホルム 50mL を加えてよく振り混ぜた後に下層を分取する。この操作を 2 回繰り返した後，クロロホルムを合わせ，これに水 10mL を加え洗った後，クロロホルム層を分取し，無水硫酸ナトリウムを加えて脱水する。これをろ過し，減圧下で蒸発乾固する。残留物をクロロホルム 1mL に正確に溶かして試料溶液とする。

別にアコニチン 20mg を精密に量り，クロロホルム 10mL に溶かし正確にメスアップする。この溶液 1mL を正確に量り，10mL に正確に希釈し標準溶液とする。

試料溶液及び標準溶液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。あらかじめ薄層クロマトグラフ用シリカゲルを用いて 0.25mm の厚さに調製し活性化した薄層板に試料溶液0.3mL，標準溶液10μL 及び15μL を正確に塗布する。次にブタノール・酢酸・水（4： 1： 5）の混合溶液の上層を展開溶媒として，約 10cm 展開しこれを風乾した後，噴霧用ドラーゲンドルフ試液を均等に噴霧するとき，試料溶液から得られるアコニチンに対応するスポットの濃さは標準溶液の 10μL を塗布した方から得られるスポットより濃いことはあっても，標準溶液の15μL を塗布した方から得られるスポットより濃くない。

乾燥減量　15%以下。

灰　　分　設定しない

【472】　K254

成分及び分量又は本質	日本薬局方	マオウ	2.0 ~ 3.0g
	〃	ボウイ	2.0g
	〃	ニンジン	2.0g
	〃	オウゴン	2.0g
	〃	ケイヒ	3.0g
	〃	カンゾウ	1.0 ~ 3.0g
	〃	シャクヤク	2.0g
	〃	センキュウ	2.0g
	〃	キョウニン	3.0g
	〃	ブシ	0.3 ~ 0.6g
	〃	ボウフウ	2.0g
	〃	ショウキョウ	2.0g
		全　量	23.3 ~ 26.6g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1 包として製する。		
用法及び用量	本品 1 包に水約 500mL を加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を 3 回に分けて食間に服用する。上記は大人の 1 日量である。15 才未満 7 才以上　大人の 2/3，7 才未満 4 才以上　大人の 1/2，4 才未満2 才以上　大人の 1/3，2 才未満　大人の 1/4 以下を服用する。		
効能又は効果	体力中等度以下のものの次の諸症：しびれ、筋力低下、気管支ぜんそく、気管支炎		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	小続命湯		

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品 1 包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　マオウ　細い円柱状又はだ円柱を呈し，長さ 3～10mm，径 1～2mm，淡緑色～黄緑色である。表面に多数の平行する縦みぞがあり，節部には，長さ 2～4mm の 2 枚のりん片状の葉が対生し，その基部は合着して筒状になっている。りん片状の葉の色は淡褐色～褐色である。茎の横断面をルーペ視するとき，円形～だ円形で，周囲部は灰緑色～黄緑

色を呈し，中心部には赤緑色の物質が充満しているか，又は中空のところがある。味は渋くてわずかに苦く，やや麻ひ性である。

必要に応じて，「マオウ」の確認試験を準用する。

（２）　ボウイ　外面は暗灰褐色を呈し，縦みぞがあり，横断面の外部は暗灰褐色のコルク層でおおわれ，内部には灰褐色の道管部と暗褐色の放射組織とが交互に放射状に配列する。味は苦い。

横切片を鏡検するとき，一次皮部にはシュウ酸カルシウムの針晶を含み，一次皮部及び内しょうには著しく膜の厚い石細胞が認められ，道管部では大小の道管がほぼ階段状に配列する。放射組織の細胞の大部分は木化せず，径 3～10μm のでんぷん粒及びシュウ酸カルシウムの小針晶を含み，ところどころに極めて厚膜の大きな石細胞が散在する。

必要に応じて，「ボウイ」の確認試験を準用する。

（３）　ニンジン　外面は淡黄褐色～淡灰褐色を呈し，縦じわがあり，横断面は淡黄褐色を呈し，形成層の付近は褐色を呈する。特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後にやや苦い。

必要に応じて，「ニンジン」の確認試験を準用する。

（４）　オウゴン　外面は黄褐色～暗褐色を呈し，切断面は黄色～帯褐黄色を呈し，縦に繊維性のすじが見られる。味はわずかに苦い。

必要に応じて，「オウゴン」の確認試験を準用する。

（５）　ケイヒ　外面は暗赤褐色を呈し，内面は赤褐色を呈し，平滑である。横断面は赤褐色を呈し淡褐色の薄層が見られる。特異なにおいがあり，味は甘く，辛く，後にやや粘液性で，わずかに収れん性である。

横切片を鏡検するとき，一次皮部と二次皮部はほとんど連続した石細胞環で区分され，環の外辺にはほぼ円形に結集した繊維束を伴い，環の各石細胞の膜はしばしば U 字形に肥厚する。二次皮部中には石細胞を認めず，まばらに少数の厚膜繊維を認める。柔組織中には油細胞，粘液細胞及び微細なシュウ酸カルシウムの針晶を含む細胞があり，柔細胞中にはでんぷん粒を含む。

（６）　カンゾウ　外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現わす。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に 1～3 細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には 3～10 細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞中にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

（７）　シャクヤク　外面は褐色～淡灰褐色を呈し，横断面はち密で淡灰褐色を呈し，木部には淡褐色の放射状の線がある。わずかに特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後に渋くてわずかに苦い。

必要に応じて，「シャクヤク」の確認試験を準用する。

（８） センキュウ　外面は灰褐色～暗褐色で，切断面は灰白色～灰褐色，半透明で，ときにはうつろがある。質は密で堅い。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，皮部及び髄には油道が散在する。木部には厚膜で木化した木部繊維が大小不同の群をなして存在する。でんぷん粒は，通例，のり化していて，まれに径5～25μm のでんぷん粒を認めることがある。シュウ酸カルシウム結晶は認めない。

（９） キョウニン　種皮は褐色で，表面にはすれて落ちやすい石細胞となった表皮細胞があって，粉をふいたようである。切断面は類白色である。味は苦く，油ようである。

表皮の表面を鏡検するとき，数個ずつ集合する石細胞はおおむね円形で，その細胞膜は均等に著しく厚くなり，径 60～90μm，側面視では鈍三角形で，細胞膜は先端部で著しく厚い。

必要に応じて，「キョウニン」の確認試験を準用する。

（１０）ブシ　本品はほぼ倒円錐形で，長さ 15～30mm，径 12～16mm，又は縦ときに横に切断され，長さ 20～60mm，幅 15～40mm，厚さ 200～700μm，又は径 12mm 以下の不整な多角形に破砕されている。外面は淡褐色～暗褐色又は黄褐色を呈する。質は堅く，通例，しわはなく，切面は平らで，淡褐色～暗褐色又は黄白色～淡黄褐色を呈し，通常角質，半透明で光沢がある。弱い特異なにおいがある。

横切片及び縦切片を鏡検するとき，外側から擬上皮，一次皮層，内皮，二次皮層，形成層，木部が認められる。一次皮層には楕円形～楕円状四角形，短径 30～75μm，長径 60～150μm の厚壁細胞がある。内皮は接線方向に長い 1 層の細胞からなっている。形成層輪は星形又は不整の多角形～円形であり，木部の道管群は V 字形を呈する。二次皮層及び髄中に独立した形成層輪が認められるものもある。道管は孔紋，階紋，網紋又はらせん紋道管である。柔細胞中のでんぷん粒は糊化している。

必要に応じて，「ブシ」の確認試験を準用する。

純度試験　本品 1 包中のアコニチン（$C_{34}H_{47}O_{11}N$：645.75）の残存量は 0.01mg 以下である。

本品 1 包を粉末とし，その重量を精密に量り，これにメタノール 50mL を加え一夜放置した後，1 時間振とうし，ろ紙を用いてろ過する。残渣に再びメタノール 30mL を加え1時間振とうした後，前記ろ紙を用いてろ過する。またこの残渣をメタノール 30mL で 2 回洗い，全量を合わせ減圧下でメタノールをほとんど留去する。残留物に希塩酸 10mL を加え水浴上で加温溶解する。冷後，分液ろう斗に脱脂綿を用いてろ過し，水 10mL で 2 回洗う。ろ液を合わせ，これにアンモニア水（28）を加えてアルカリ性とする。これにクロロホルム 50mL を加えて良く振り混ぜた後に下層を分取する。この操作を 2 回繰り返した後，クロロホルムを合わせ，これに水 10mL を加え洗った後，クロロホルム層を分取し，無水硫酸ナトリウムを加えて脱水する。これをろ過し，減圧下で蒸発乾固する。残留物をクロロホルム 1mL に正確に溶かして試料溶液とする。

別にアコニチン 20mg を精密に量り，クロロホルム 10mL に溶かし正確にメスアップする。この溶液 1mL を正確に量り，10mL に正確に希釈し標準溶液とする。

試料溶液及び標準溶液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。あらかじめ薄層クロマトグラフ用シリカゲルを用いて 0.25mm の厚さに調製し活性化した薄層板に試料溶液0.3mL，標準溶液10μL 及び15μL を正確に塗布する。次にブタノール・酢酸・水（4： 1：5）の混合溶液の上層を展開溶媒として，約 10cm 展開しこれを風乾した後，噴霧用ドラーゲンドルフ試液を均等に噴霧するとき，試料溶液から得られるアコニチンに対応するスポットの濃さは標準溶液の 10μL を塗布した方から得られるスポ

ットより濃いことはあっても，標準溶液の15μL を塗布した方から得られるスポットより濃くない。

（１１）ボウフウ　外面は淡褐色で，多数の縦じわがある。横断面の周辺は灰褐色で，空げきが多く，中央は円形に黄色を呈する。味はわずかに甘い。

（１２）ショウキョウ　淡灰黄色の周皮を付けたままか，又はその一部をはぎとってあり，表面は灰白色～淡灰褐色で，しばしば白粉を付けている。横断面は繊維性，粉性で，淡帯黄褐色を呈し，皮層と中心柱とに分かれる。横断面をルーペ視するとき，その全面に維管束及び分泌物が褐色の細点として散在している。特異なにおいがあり，味は極めて辛い。

乾燥減量　15%以下。

灰　　分　6%以下。

【473】　K255

成分及び分量又は本質	日本薬局方	サイコ	6.0g
	〃	ハンゲ	4.0g
	〃	ショウキョウ	1.0g
	〃	オウゴン	3.0g
	〃	シャクヤク	3.0g
	〃	タイソウ	3.0g
	〃	キジツ	2.0g
		全　　量	22.0g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1 包として製する。		
用法及び用量	本品 1 包に水約 500mL を加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を 3 回に分けて食間に服用する。上記は大人の 1 日量である。15 才未満 7 才以上 大人の 2/3，7 才未満 4 才以上 大人の 1/2，4 才未満2 才以上　大人の 1/3，2 才未満　大人の 1/4 以下を服用する。		
効能又は効果	体力中等度以上で，脇腹からみぞおちあたりにかけて苦しいものの次の諸症：胃炎，高血圧や肥満に伴う肩こり・頭痛，神経症		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	大柴胡湯去大黄		

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品 1 包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　サ イ コ　外面は灰褐色～褐色で，深いしわがあるものがあり，横断面では，皮部は褐色，木部は淡褐色を呈する。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，皮部にはしばしば接線方向に長い裂け目があり，皮部の厚さは半径の 1/3～1/2 で，径 15～35μm の胞間性離生油道がやや多数散在し，木部には道管が放射状若しくはほぼ階段状に配列し，ところどころに繊維群があり，根頭部の髄には皮部と同様の油道がある。柔細胞中にはでんぷん粒を満たし，また油滴を認める。

必要に応じて，「サイコ」の確認試験を準用する。

（２）　ハンゲ　外面は白色～灰白黄色，上部には茎の跡がくぼみとなり，その周辺には根の跡がくぼんだ細点となっている。横断面は白色，粉性である。味は初めなく，やや粘液性で，後に強いえぐ味を残す。

横切片を鏡検するとき，主としてでんぷん粒を充満した柔組織からなり，わずかにシュウ酸カルシウムの束晶を含んだ粘液細胞がその間に認められる。でんぷん粒は主として 2～3 個の複粒で，通例 径10～15μm，単粒は通例径3～7μm である。束晶は長さ25～150μmである。

（３）　ショウキョウ　淡灰黄色の周皮を付けたままか，又はその一部をはぎとってあり，表面は灰白色～淡灰褐色で，しばしば白粉を付けている。横断面は繊維性，粉性で，淡帯黄褐色を呈し，皮層と中心柱とに分かれる。横断面をルーペ視するとき，その全面に維管束及び分泌物が褐色の細点として散在している。特異なにおいがあり，味は極めて辛い。

（４）　オウゴン　外面は黄褐色～暗褐色を呈し，切断面は黄色～帯褐黄色を呈し，縦に繊維性のすじが見られる。味はわずかに苦い。

必要に応じて，「オウゴン」の確認試験を準用する。

（５）　シャクヤク　外面は褐色～淡灰褐色を呈し，横断面はち密で淡灰褐色を呈し，木部には淡褐色の放射状の線がある。わずかに特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後に渋くてわずかに苦い。

必要に応じて，「シャクヤク」の確認試験を準用する。

（６）　タイソウ　外面は赤褐色であらいしわがあるか，又は暗灰赤色で細かいしわがあり，いずれもつやがある。外果皮は薄く革質で，中果皮は暗灰褐色を呈し，海綿ようで柔らかく粘着性があり，内果皮は極めて堅く，種子は偏平である。わずかに特異なにおいがあり，味は甘い。

（７）　キジツ　外面は濃緑褐色～褐色で，つやがなく，油室による多数のくぼんだ細点がある。切断面は淡灰褐色を呈し，内果皮を付ける部分は褐色を呈する。特異なにおいがあり，味は苦い。

必要に応じて，「キジツ」の確認試験を準用する。

乾燥減量　15％以下。

灰　　分　6％以下。

【474】　K256

成分及び分量又は本質	日本薬局方　レンギョウ　3.0g 〃　ソウジュツ　3.0g 〃　センキュウ　3.0g 〃　ボウフウ　2.0g 〃　ニンドウ　2.0g 〃　ケイガイ　1.0g 〃　カンゾウ　1.0g 〃　コウカ　1.0g 全量　16.0g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1 包として製する。
用法及び用量	本品 1 包に水約 500mL を加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を 3 回に分けて食間に服用する。上記は大人の 1 日量である。15 才未満 7 才以上 大人の 2/3，7 才未満 4 才以上 大人の 1/2，4 才未満2 才以上　大人の 1/3，2 才未満　大人の 1/4 以下を服用する。
効能又は効果	体力中等度以下で，下痢傾向があるものの顔面，頭部などの皮膚疾患で，ときにかゆみ，分泌物などがあるものの次の諸症：湿疹・皮膚炎，乳幼児の湿疹・皮膚炎
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器
規格及び試験方法	別記のとおり。
備考	治頭瘡一方去大黄

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品 1 包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　レンギョウ　外面は淡褐色～暗褐色を呈し，淡灰色の小隆起点が散在し，内面は黄褐色である。特異な芳香があり，味はわずかに収れん性である。

必要に応じて，「レンギョウ」の確認試験を準用する。

（2）　ソウジュツ　外面は暗灰褐色～暗黄褐色である。横断面は淡褐色～赤褐色の分泌物による細点を認める。しばしば白色綿状の結晶を析出する。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，皮部の柔組織中には，通例，繊維束を欠き，放射組織の末端部には淡褐色～黄褐色の内容物を含む油室がある。木部は形成層に接して道管を囲んだ繊維束が放射状に配列し，髄及び放射組織中には皮部と同様な油室がある。柔細胞中にはイヌリンの球晶及びシュウ酸カルシウムの針晶を含む。

（3）　センキュウ　外面は灰褐色～暗褐色で，切断面は灰白色～灰褐色，半透明で，ときにはうつろがある。質は密で堅い。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，皮部及び髄には油道が散在する。木部には厚膜で木化した木部繊維が大小不同の群をなして存在する。でんぷん粒は，通例，のり化していて，まれに径 5～25μm のでんぷん粒を認めることがある。シュウ酸カルシウム結晶は認めない。

（4）　ボウフウ　外面は淡褐色で，多数の縦じわがある。横断面の周辺は灰褐色で，空げきが多く，中央は円形に黄色を呈する。味はわずかに甘い。

（5）　ニンドウ　葉及び短い茎に対生する葉からなる。葉は短い葉柄を付け，楕円形で全縁，長さ 3～7cm，幅 1～3cm，上面は緑褐色，下面は淡灰緑色を呈し，ルーペ視するとき，両面に軟毛をまばらに認める。茎は径 1～4mm，外面は灰黄褐色～帯紫褐色で，横切面は円形，中空である。ほとんどにおいがなく，味は収れん性で，後わずかに苦い。

葉の横切片を鏡検するとき，最外層は上下面とも 1 層の表皮からなり，表皮には単細胞性の非腺毛と多細胞性の腺毛が認められる。主脈部では，表皮の内側数層は厚角組織からなり，中央部には維管束がある。葉肉部では上面表皮に接してさく状組織があり，下面表皮に

接して海綿状組織がある。腺毛には褐色の分泌物が含まれ，柔細胞中にはシュウ酸カルシウムの集晶を含み，でんぷん粒が認められることがある。

必要に応じて，「ニンドウ」の確認試験を準用する。

（６）　ケイガイ　茎，輪散花序に集合したがく筒，これら及びときには葉の砕片，種子ようの微粒の分果からなる。茎は方形で外面はおおむね紫褐色，径約1mm である。がく筒は淡褐色～黄緑色で長さ 2～3mm，ルーペ視するとき，先端はきょ歯辺，筒部には数条の線があり，唇形花又は果実を含み，茎とともに類白色の短毛を認める。分果は黄褐色～黒色，両端の細いだ円体で長さ1～1.5mm，径は長さのほぼ1/2 である。特異な芳香があり，口に含むとわずかに清涼感がある。

必要に応じて，「ケイガイ」の確認試験を準用する。

（７）　カンゾウ　外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現わす。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に 1～3 細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には 3～10 細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞中にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

（８）　コウカ　赤色～赤褐色の花冠，花柄，黄色の花柱及び雄しべからなり，全長は約 1cm，花冠は筒状で 5 裂し，雄しべは 5 本で，長い柱頭をもつ雌しべを囲んでいる。花粉はほぼ球形で，径約 50μm，黄色で表面に細かい突起がある。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

必要に応じて，「コウカ」の確認試験を準用する。

乾燥減量　15%以下。

灰　　分　7%以下。

【475】　K257

成分及び分量又は本質	日本薬局方	トウキ	3.0g
	〃	タクシャ	4.0g
	〃	センキュウ	3.0g
	〃	ブシ	0.4g
	〃	シャクヤク	4.0g
	〃	ブクリョウ	4.0g
	〃	ビャクジュツ	4.0g
		全　　量	22.4g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1 包として製する。		
用法及び用量	本品 1 包に水約 500mL を加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を 3 回に分けて食間に服用する。上記は大人の 1 日量である。15 才未満 7 才以上 大人の 2/3，7 才未満 4 才以上 大人の 1/2，4 才未満2 才以上　大人の 1/3，2 才未満　大人の 1/4 以下を服用する。		
効能又は効果	体力虚弱で，冷えが強く，貧血の傾向があり疲労しやすく，ときに下腹部痛，頭重，めまい，肩こり，耳鳴り，動悸などがあるものの次の諸症：月経不順，月経異常，月経痛，更年期障害，産前産後あるいは流産による障害（貧血，疲労倦怠，めまい，むくみ），めまい・立ちくらみ，頭重，肩こり，腰痛，足腰の冷え症，しもやけ，むくみ，しみ，耳鳴り		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	当帰芍薬散料加附子		

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験（Ｉ）　本品 1 包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　トウキ　外面は暗褐色～赤褐色で，縦じわがあり，切断面は淡黄色～黄褐色を呈する。特異なにおいがあり，味はわずかに甘く，後にやや辛い。

横切片を鏡検するとき，コルク層は 4～10 層からなり，その内側に数層の厚角組織が続いている。皮部には分泌細胞に囲まれた多数の樹脂道並びにしばしば大きなすき間がある。形成層は長方形に偏圧された数層の細胞からなり，明らかに皮部と木部とを区別する。木部では多数の道管と放射組織とが交互に放射状に配列し，その外方の道管は単独又は数個集まってやや密に配列してくさび状をなすが，中心部付近の道管は極めてまばらに存在する。でんぷん粒は径 19μm 以下，まれに 2～5 個の複粒があり，複粒の径は 25μm に達し，しばしばのり化している。

（2）　タクシャ　淡黄褐色～淡褐色でコルク層をつける部位はやや暗色を呈する。ルーペ視するとき，褐色～淡褐色のはん点が散在する。切面は粒状で，繊維性ではない。わずかににおい及び味がある。

（3）　センキュウ　外面は灰褐色～暗褐色で，切断面は灰白色～灰褐色，半透明で，ときにはうつろがある。質は密で堅い。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，皮部及び髄には油道が散在する。木部には厚膜で木化した木部繊維が大小不同の群をなして存在する。でんぷん粒は，通例，のり化していて，まれに径 5～25μm のでんぷん粒を認めることがある。シュウ酸カルシウム結晶は認めない。

（4）　ブシ　本品はほぼ倒円錐形で，長さ 15～30mm，径 12～16mm，又は縦ときに横に切断され，長さ 20～60mm，幅 15～40mm，厚さ 200～700μm，又は径 12mm 以下の不整な多角形に破砕されている。外面は淡褐色～暗褐色又は黄褐色を呈する。質は堅く，通例，しわはなく，切面は平らで，淡褐色～暗褐色又は黄白色～淡黄褐色を呈し，通常角質，半透明で光沢がある。弱い特異なにおいがある。

横切片及び縦切片を鏡検するとき，外側から擬上皮，一次皮層，内皮，二次皮層，形成層，木部が認められる。一次皮層には楕円形～楕円状四角形，短径 30～75μm，長径 60～150μm の厚壁細胞がある。内皮は接線方向に長い 1 層の細胞からなっている。形成層輪は星形又は不整の多角形～円形であり，木部の道管群は V 字形を呈する。二次皮層及び髄中

に独立した形成層輪が認められるものもある。道管は孔紋，階紋，網紋又はらせん紋道管である。柔細胞中のでんぷん粒は糊化している。

必要に応じて，「ブシ」の確認試験を準用する。

純度試験　本品 1 包中のアコニチン（$C_{34}H_{47}O_{11}N$：645.75）の残存量は 0.01mg 以下である。

本品 1 包を粉末とし，その重量を精密に量り，これにメタノール 50mL を加え一夜放置した後，1 時間振とうし，ろ紙を用いてろ過する。残渣に再びメタノール 30mL を加え1時間振とうした後，前記ろ紙を用いてろ過する。またこの残渣をメタノール 30mL で 2 回洗い，全量を合わせ減圧下でメタノールをほとんど留去する。残留物に希塩酸 10mL を加え水浴上で加温溶解する。冷後，分液ろう斗に脱脂綿を用いてろ過し，水 10mL で 2 回洗う。ろ液を合わせ，これにアンモニア水（28）を加えてアルカリ性とする。これにクロロホルム 50mL を加えて良く振り混ぜた後に下層を分取する。この操作を 2 回繰り返した後，クロロホルムを合わせ，これに水 10mL を加え洗った後，クロロホルム層を分取し，無水硫酸ナトリウムを加えて脱水する。これをろ過し，減圧下で蒸発乾固する。残留物をクロロホルム 1mL に正確に溶かして試料溶液とする。

別にアコニチン 20mg を精密に量り，クロロホルム 10mL に溶かし正確にメスアップする。この溶液 1mL を正確に量り，10mL に正確に希釈し標準溶液とする。

試料溶液及び標準溶液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。あらかじめ薄層クロマトグラフ用シリカゲルを用いて 0.25mm の厚さに調製し活性化した薄層板に試料溶液0.3mL，標準溶液10μL 及び15μL を正確に塗布する。次にブタノール・酢酸・水（4： 1： 5）の混合溶液の上層を展開溶媒として，約 10cm 展開しこれを風乾した後，噴霧用ドラーゲンドルフ試液を均等に噴霧するとき，試料溶液から得られるアコニチンに対応するスポットの濃さは標準溶液の 10μL を塗布した方から得られるスポットより濃いことはあっても，標準溶液の15μL を塗布した方から得られるスポットより濃くない。

（5） シャクヤク　外面は褐色～淡灰褐色を呈し，横断面はち密で淡灰褐色を呈し，木部には淡褐色の放射状の線がある。わずかに特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後に渋くてわずかに苦い。

必要に応じて，「シャクヤク」の確認試験を準用する。

（6） ブクリョウ　白色又はわずかに淡赤色を帯びた白色で，質は堅いが砕きやすい。味はないがやや粘液ようである。

必要に応じて，「ブクリョウ」の確認試験を準用する。

（7）　ビャクジュツ　外面は淡灰黄色～淡黄白色で，ところどころ灰褐色を呈し，横切面には淡黄褐色～褐色の分泌物による細点がある。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，皮部の柔組織中にはしばしば師部の外側に接して繊維束があり，放射組織の末端部には淡褐色～褐色の内容物を含む油室がある。木部には大きい髄を囲んで放射状に配列した短径の道管とそれを囲む著しい繊維束がある。髄及び放射組織中には皮部と同様な油室があり，柔組織中にはイヌリンの小球晶及びシュウ酸カルシウムの針晶を含む。

必要に応じて，「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。

確認試験（Ⅱ）

（1）　トウキ　本品の粉末 2g にジエチルエーテル 10mL を加え，還流冷却器を付け，水浴上で 10 分間加熱し，冷後，ろ過し，ろ液を試料溶液とする。

別に「トウキ」の粉末 1g をとり，試料溶液と同様に操作して対照溶液とする。

これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び対照溶液 10mL ずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲル（螢光剤入り）を用いて調製した薄層板にスポットする。次にクロロホルム・アセトン混液（4：2）を展開溶媒として約 10cm 展開した後，薄層板を風乾する。

これに紫外線（主波長 365nm）照射をするとき，*Rf* 値約 0.76 付近に紫色螢光のスポットを認める。

（2）　シャクヤク　本品の粉末 2g にメタノール 10mL を加え，還流冷却器を付け，水浴上で 10 分間加熱し，冷後，ろ過し，ろ液を試料溶液とする。

別に「シャクヤク」の粉末 1g をとり，試料溶液と同様に操作して対照溶液とする。

これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び対照溶液 10μL ずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲルを用いて調製した薄層板にスポットする。次にトルエン・ギ酸・ギ酸エチル混液（3：1：6）を展開溶媒として約 10cm 展開した後，薄層板を風乾する。

これに塩化鉄（Ⅲ）試液を均等に噴霧するとき，*Rf* 値約 0.59 付近に暗紫色のスポットを認める。

（3）　センキュウ　本品の粉末2g にジエチルエーテル10mL を加え，還流冷却器を付け，水浴上で 10 分間加熱し，冷後，ろ過し，ろ液を試料溶液とする。

別に「センキュウ」の粉末 1g をとり，試料溶液と同様に操作して対照溶液とする。

これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び対照溶液 10μL ずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲル（螢光剤入り）を用いて調製した薄層板にスポットする。次にクロロホルム・アセトン・ギ酸混液（4：2：0.5）を展開溶媒として約 10cm展開した後，薄層板を風乾する。

これに紫外線（主波長 365nm）照射をするとき，*Rf* 値約 0.59 付近に紫色のスポットを認める。

（4）　ビャクジュツ　本品の粉末 2g にヘキサン 10mL を加え，還流冷却器を付け，水浴上で 10 分間加熱し，冷後，ろ過し，ろ液を試料溶液とする。

別に「ビャクジュツ」の粉末 1g　をとり，試料溶液と同様に操作して対照溶液とする。これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び対照溶液10μL ずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲルを用いて調製した薄層板にスポットする。次にヘキサン・ベンゼン・酢酸エチル混液（14：3：3）を展開溶媒として約 10cm 展開した後，薄層板を風乾する。

これに *p*－ジメチルアミノベンズアルデヒド試液を均等に噴霧し，105℃で 5 分間加熱するとき，*Rf* 値約 0.66 付近に紅色のスポットを認める。

乾燥減量　15%以下。

灰　　分　6%以下。

【476】　K257—①

成分及び分量又は本質	日本薬局方	トウキ	3.0g
	〃	タクシャ	4.0g
	〃	センキュウ	3.0g
	〃	ブシ	0.4g
	〃	シャクヤク	4.0g
	〃	ブクリョウ	4.0g
	〃	ソウジュツ	4.0g
		全　　量	22.4g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1 包として製する。		
用法及び用量	本品 1 包に水約 500mL を加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を 3 回に分けて食間に服用する。上記は大人の 1 日量である。15 才未満 7 才以上 大人の 2/3，7 才未満 4 才以上 大人の 1/2，4 才未満2 才以上　大人の 1/3，2 才未満　大人の 1/4 以下を服用する。		
効能又は効果	体力虚弱で，冷えが強く，貧血の傾向があり疲労しやすく，ときに下腹部痛，頭重，めまい，肩こり，耳鳴り，動悸などがあるものの次の諸症：月経不順，月経異常，月経痛，更年期障害，産前産後あるいは流産による障害（貧血，疲労倦怠，めまい，むくみ），めまい・立ちくらみ，頭重，肩こり，腰痛，足腰の冷え症，しもやけ，むくみ，しみ，耳鳴り		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	当帰芍薬散料加附子		

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験（Ⅰ）　本品 1 包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　トウキ　外面は暗褐色～赤褐色で，縦じわがあり，切断面は淡黄色～黄褐色を呈する。特異なにおいがあり，味はわずかに甘く，後にやや辛い。

横切片を鏡検するとき，コルク層は 4～10 層からなり，その内側に数層の厚角組織が続いている。皮部には分泌細胞に囲まれた多数の樹脂道並びにしばしば大きなすき間がある。形成層は長方形に偏圧された数層の細胞からなり，明らかに皮部と木部とを区別する。木部では多数の道管と放射組織とが交互に放射状に配列し，その外方の道管は単独又は数個集まってやや密に配列してくさび状をなすが，中心部付近の道管は極めてまばらに存在する。でんぷん粒は径 19μm 以下，まれに 2～5 個の複粒があり，複粒の径は 25μm に達し，しばしばのり化している。

（2）　タクシャ　淡黄褐色～淡褐色でコルク層をつける部位はやや暗色を呈する。ルーペ視するとき，褐色～淡褐色のはん点が散在する。切面は粒状で，繊維性ではない。わずかににおい及び味がある。

（3）　センキュウ　外面は灰褐色～暗褐色で，切断面は灰白色～灰褐色，半透明で，ときにはうつろがある。質は密で堅い。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，皮部及び髄には油道が散在する。木部には厚膜で木化した木部繊維が大小不同の群をなして存在する。でんぷん粒は，通例，のり化していて，まれに径 5～25μm のでんぷん粒を認めることがある。シュウ酸カルシウム結晶は認めない。

（7）　ブシ　本品はほぼ倒円錐形で，長さ 15～30mm，径 12～16mm，又は縦ときに横に切断され，長さ 20～60mm，幅 15～40mm，厚さ 200～700μm，又は径 12mm 以下の不整な多角形に破砕されている。外面は淡褐色～暗褐色又は黄褐色を呈する。質は堅く，通例，しわはなく，切面は平らで，淡褐色～暗褐色又は黄白色～淡黄褐色を呈し，通常角質，半透明で光沢がある。弱い特異なにおいがある。

横切片及び縦切片を鏡検するとき，外側から擬上皮，一次皮層，内皮，二次皮層，形成層，木部が認められる。一次皮層には楕円形～楕円状四角形，短径 30～75μm，長径 60～150μm の厚壁細胞がある。内皮は接線方向に長い 1 層の細胞からなっている。形成層輪は星形又は不整の多角形～円形であり，木部の道管群は V 字形を呈する。二次皮層及び髄中

に独立した形成層輪が認められるものもある。道管は孔紋，階紋，網紋又はらせん紋道管である。柔細胞中のでんぷん粒は糊化している。

必要に応じて，「ブシ」の確認試験を準用する。

純度試験　本品 1 包中のアコニチン（$C_{34}H_{47}O_{11}N$：645.75）の残存量は 0.01mg 以下である。

本品 1 包を粉末とし，その重量を精密に量り，これにメタノール 50mL を加え一夜放置した後，1 時間振とうし，ろ紙を用いてろ過する。残渣に再びメタノール 30mL を加え1時間振とうした後，前記ろ紙を用いてろ過する。またこの残渣をメタノール 30mL で 2 回洗い，全量を合わせ減圧下でメタノールをほとんど留去する。残留物に希塩酸 10mL を加え水浴上で加温溶解する。冷後，分液ろう斗に脱脂綿を用いてろ過し，水 10mL で 2 回洗う。ろ液を合わせ，これにアンモニア水（28）を加えてアルカリ性とする。これにクロロホルム 50mL を加えて良く振り混ぜた後に下層を分取する。この操作を 2 回繰り返した後，クロロホルムを合わせ，これに水 10mL を加え洗った後，クロロホルム層を分取し，無水硫酸ナトリウムを加えて脱水する。これをろ過し，減圧下で蒸発乾固する。残留物をクロロホルム 1mL に正確に溶かして試料溶液とする。

別にアコニチン 20mg を精密に量り，クロロホルム 10mL に溶かし正確にメスアップする。この溶液 1mL を正確に量り，10mL に正確に希釈し標準溶液とする。

試料溶液及び標準溶液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。あらかじめ薄層クロマトグラフ用シリカゲルを用いて 0.25mm の厚さに調製し活性化した薄層板に試料溶液0.3mL，標準溶液10μL 及び15μL を正確に塗布する。次にブタノール・酢酸・水（4： 1： 5）の混合溶液の上層を展開溶媒として，約 10cm 展開しこれを風乾した後，噴霧用ドラーゲンドルフ試液を均等に噴霧するとき，試料溶液から得られるアコニチンに対応するスポットの濃さは標準溶液の 10μL を塗布した方から得られるスポットより濃いことはあっても，標準溶液の15μL を塗布した方から得られるスポットより濃くない。

（5） シャクヤク　外面は褐色～淡灰褐色を呈し，横断面はち密で淡灰褐色を呈し，木部には淡褐色の放射状の線がある。わずかに特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後に渋くてわずかに苦い。

必要に応じて，「シャクヤク」の確認試験を準用する。

（6） ブクリョウ　白色又はわずかに淡赤色を帯びた白色で，質は堅いが砕きやすい。味はないがやや粘液ようである。

必要に応じて，「ブクリョウ」の確認試験を準用する。

（７）　ソウジュツ　外面は暗灰褐色～暗黄褐色である。横断面は淡褐色～赤褐色の分泌物による細点を認める。しばしば白色綿状の結晶を析出する。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，皮部の柔組織中には，通例，繊維束を欠き，放射組織の末端部には淡褐色～黄褐色の内容物を含む油室がある。木部は形成層に接して道管を囲んだ繊維束が放射状に配列し，髄及び放射組織中には皮部と同様な油室がある。柔細胞中にはイヌリンの球晶及びシュウ酸カルシウムの針晶を含む。

確認試験（Ⅱ）

（１）　トウキ　本品の粉末 2g にジエチルエーテル 10mL を加え，還流冷却器を付け，水浴上で 10 分間加熱し，冷後，ろ過し，ろ液を試料溶液とする。

別に「トウキ」の粉末 1g をとり，試料溶液と同様に操作して対照溶液とする。

これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び対照溶液 10mL ずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲル（螢光剤入り）を用いて調製した薄層板にスポットする。次にクロロホルム・アセトン混液（4：2）を展開溶媒として約 10cm 展開した後，薄層板を風乾する。

これに紫外線（主波長 365nm）照射をするとき，*Rf* 値約 0.76 付近に紫色螢光のスポットを認める。

（２）　シャクヤク　本品の粉末 2g にメタノール 10mL を加え，還流冷却器を付け，水浴上で 10 分間加熱し，冷後，ろ過し，ろ液を試料溶液とする。

別に「シャクヤク」の粉末 1g をとり，試料溶液と同様に操作して対照溶液とする。

これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び対照溶液 10μL ずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲルを用いて調製した薄層板にスポットする。次にトルエン・ギ酸・ギ酸エチル混液（3：1：6）を展開溶媒として約 10cm 展開した後，薄層板を風乾する。

これに塩化鉄（Ⅲ）試液を均等に噴霧するとき，*Rf* 値約 0.59 付近に暗紫色のスポットを認める。

（３）　センキュウ　本品の粉末2g にジエチルエーテル10mL を加え，還流冷却器を付け，水浴上で 10 分間加熱し，冷後，ろ過し，ろ液を試料溶液とする。

別に「センキュウ」の粉末 1g をとり，試料溶液と同様に操作して対照溶液とする。

これらの液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び対照溶液 10μL ずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲル（螢光剤入り）を用いて調製した薄層板にスポットする。次にクロロホルム・アセトン・ギ酸混液（4：2：0.5）を展開溶媒として約 10cm展開した後，薄層板を風乾する。

これに紫外線（主波長 365nm）照射をするとき，*Rf* 値約 0.59 付近に紫色のスポットを認める。

乾燥減量　15%以下。

灰　　分　6%以下。

【477】　K258

成分及び分量又は本質	日本薬局方	ニンジン	3.0g
	〃	ブシ	0.5～1.0g
	〃	カンキョウ	3.0g
	〃	カンゾウ	2.0～3.0g
	〃	ビャクジュツ	3.0g
		全　量	11.5～13.0g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1 包として製する。		
用法及び用量	本品 1 包に水約 500mL を加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を 3 回に分けて食間に服用する。上記は大人の 1 日量である。15 才未満 7 才以上 大人の 2/3，7 才未満 4 才以上 大人の 1/2，4 才未満2 才以上　大人の 1/3，2 才未満　大人の 1/4 以下を服用する。		
効能又は効果	体力虚弱で、手足の冷えが強く、疲れやすいものの次の諸症：胃腸虚弱、下痢、嘔吐、胃痛、腹痛、急・慢性胃炎		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	附子理中湯		

規格及び試験方法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品 1 包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　ニンジン　外面は淡黄褐色～淡灰褐色を呈し，縦じわがあり，横断面は淡黄褐色を呈し，形成層の付近は褐色を呈する。特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後にやや苦い。

必要に応じて，「ニンジン」の確認試験を準用する。

（2）　ブシ　本品はほぼ倒円錐形で，長さ 15～30mm，径 12～16mm，又は縦ときに横に切断され，長さ 20～60mm，幅 15～40mm，厚さ 200～700μm，又は径 12mm 以下の不整な多角形に破砕されている。外面は淡褐色～暗褐色又は黄褐色を呈する。質は堅く，通例，しわはなく，切面は平らで，淡褐色～暗褐色又は黄白色～淡黄褐色を呈し，通常角質，半透明で光沢がある。弱い特異なにおいがある。

横切片及び縦切片を鏡検するとき，外側から擬上皮，一次皮層，内皮，二次皮層，形成層，木部が認められる。一次皮層には楕円形～楕円状四角形，短径 30～75μm，長径 60～150μm の厚壁細胞がある。内皮は接線方向に長い 1 層の細胞からなっている。形成層輪は星形又は不整の多角形～円形であり，木部の道管群は V 字形を呈する。二次皮層及び髄中に独立した形成層輪が認められるものもある。道管は孔紋，階紋，網紋又はらせん紋道管である。柔細胞中のでんぷん粒は糊化している。

必要に応じて，「ブシ」の確認試験を準用する。

純度試験　本品 1 包中のアコニチン（$C_{34}H_{47}O_{11}N$：645.75）の残存量は 0.01mg 以下である。

本品 1 包を粉末とし，その重量を精密に量り，これにメタノール 50mL を加え一夜放置した後，1 時間振とうし，ろ紙を用いてろ過する。残渣に再びメタノール 30mL を加え1時間振とうした後，前記ろ紙を用いてろ過する。またこの残渣をメタノール 30mL で 2 回洗い，全量を合わせ減圧下でメタノールをほとんど留去する。残留物に希塩酸 10mL を加え水浴上で加温溶解する。冷後，分液ろう斗に脱脂綿を用いてろ過し，水 10mL で 2 回洗う。ろ液を合わせ，これにアンモニア水（28）を加えてアルカリ性とする。これにクロロホルム 50mL を加えて良く振り混ぜた後に下層を分取する。この操作を 2 回繰り返した後，クロロホルムを合わせ，これに水 10mL を加え洗った後，クロロホルム層を分取し，無水硫酸ナトリウムを加えて脱水する。これをろ過し，減圧下で蒸発乾固する。残留物をクロロホルム 1mL に正確に溶かして試料溶液とする。

別にアコニチン 20mg を精密に量り，クロロホルム 10mL に溶かし正確にメスアップする。この溶液 1mL を正確に量り，10mL に正確に希釈し標準溶液とする。

試料溶液及び標準溶液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。あらかじめ薄層クロマトグラフ用シリカゲルを用いて 0.25mm の厚さに調製し活性化した薄層板に試料溶液0.3mL，標準溶液10μL 及び15μL を正確に塗布する。次にブタノール・酢酸・水（4： 1：5）の混合溶液の上層を展開溶媒として，約 10cm 展開しこれを風乾した後，噴霧用ドラーゲンドルフ試液を均等に噴霧するとき，試料溶液から得られるアコニチンに対応するスポットの濃さは標準溶液の 10μL を塗布した方から得られるスポットより濃いことはあっても，標準溶液の15μL を塗布した方から得られるスポットより濃くない。

（３） カンキョウ 偏圧した不規則な塊状でしばしば分枝する。分枝した各部はやや湾曲した卵形又は長卵形を呈し，長さ 2～4cm，径 1～2cm である。外面は灰黄色～灰黄褐色で，しわ及び輪節がある。折面は褐色～暗褐色で透明感があり角質である。横切面をルーペ視するとき皮層と中心柱は区分され，全面に維管束が散在する。特異なにおいがあり，味は極めて辛い。

横切片を鏡検するとき，外側よりコルク層，皮層，内皮，中心柱が認められる。皮層と中心柱は一層の内皮によって区分される。皮層及び中心柱は柔組織からなり，繊維束で囲まれた維管束が散在する。柔組織中には黄色の油様物質を含む油細胞が散在し，柔細胞中にはシュウ酸カルシウムの単晶が含まれ，でんぷんは糊化している。

必要に応じて，「カンキョウ」の確認試験を準用する。

（４） カンゾウ 外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現わす。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に 1～3 細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には 3～10 細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞中にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

（５） ビャクジュツ 外面は淡灰黄色～淡黄白色で，ところどころ灰褐色を呈し，横切面には淡黄褐色～褐色の分泌物による細点がある。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，皮部の柔組織中にはしばしば師管の外側に接して繊維束があり，放射組織の末端部には淡褐色～褐色の内容物を含む油室がある。木部には大きい髄を囲んで放射状に配列した短径の道管とそれを囲む著しい繊維束がある。髄及び放射組織中には皮部と同様な油室があり，柔組織中にはイヌリンの小球晶及びシュウ酸カルシウムの針晶を含む。

必要に応じて，「ビャクジュツ」の確認試験を準用する。

乾燥減量　15%以下。

灰　　分　7%以下。

【478】　K258—①

成分及び分量又は本質	日本薬局方　ニンジン　3.0g 〃　ブシ　0.5 ~ 1.0g 〃　カンキョウ　2.0g 〃　カンゾウ　2.0 ~ 3.0g 〃　ソウジュツ　3.0g 全　量　10.5 ~ 12.0g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1 包として製する。
用法及び用量	本品 1 包に水約 500mL を加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を 3 回に分けて食間に服用する。上記は大人の 1 日量である。15 才未満 7 才以上 大人の 2/3，7 才未満 4 才以上 大人の 1/2，4 才未満2 才以上　大人の 1/3，2 才未満　大人の 1/4 以下を服用する。
効能又は効果	体力虚弱で、手足の冷えが強く、疲れやすいものの次の諸症 : 胃腸虚弱、下痢、嘔吐、胃痛、腹痛、急・慢性胃炎
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器
規格及び試験方法	別記のとおり。
備考	附子理中湯

規格及び試験方法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品 1 包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　ニンジン　外面は淡黄褐色～淡灰褐色を呈し，縦じわがあり，横断面は淡黄褐色を呈し，形成層の付近は褐色を呈する。特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後にやや苦い。

必要に応じて，「ニンジン」の確認試験を準用する。

（2）　ブシ　本品はほぼ倒円錐形で，長さ 15～30mm，径 12～16mm，又は縦ときに横に切断され，長さ 20～60mm，幅 15～40mm，厚さ 200～700μm，又は径 12mm 以下の不整な多角形に破砕されている。外面は淡褐色～暗褐色又は黄褐色を呈する。質は堅く，通例，しわはなく，切面は平らで，淡褐色～暗褐色又は黄白色～淡黄褐色を呈し，通常角質，半透明で光沢がある。弱い特異なにおいがある。

横切片及び縦切片を鏡検するとき，外側から擬上皮，一次皮層，内皮，二次皮層，形成層，木部が認められる。一次皮層には楕円形～楕円状四角形，短径 30～75μm，長径 60～150μm の厚壁細胞がある。内皮は接線方向に長い 1 層の細胞からなっている。形成層輪は星形又は不整の多角形～円形であり，木部の道管群は V 字形を呈する。二次皮層及び髄中に独立した形成層輪が認められるものもある。道管は孔紋，階紋，網紋又はらせん紋道管である。柔細胞中のでんぷん粒は糊化している。

必要に応じて，「ブシ」の確認試験を準用する。

純度試験　本品 1 包中のアコニチン（$C_{34}H_{47}O_{11}N$：645.75）の残存量は 0.01mg 以下である。

本品 1 包を粉末とし，その重量を精密に量り，これにメタノール 50mL を加え一夜放置した後，1 時間振とうし，ろ紙を用いてろ過する。残渣に再びメタノール 30mL を加え1時間振とうした後，前記ろ紙を用いてろ過する。またこの残渣をメタノール 30mL で 2 回洗い，全量を合わせ減圧下でメタノールをほとんど留去する。残留物に希塩酸 10mL を加え水浴上で加温溶解する。冷後，分液ろう斗に脱脂綿を用いてろ過し，水 10mL で 2 回洗う。ろ液を合わせ，これにアンモニア水（28）を加えてアルカリ性とする。これにクロロホルム 50mL を加えて良く振り混ぜた後に下層を分取する。この操作を 2 回繰り返した後，クロロホルムを合わせ，これに水 10mL を加え洗った後，クロロホルム層を分取し，無水硫酸ナトリウムを加えて脱水する。これをろ過し，減圧下で蒸発乾固する。残留物をクロロホルム 1mL に正確に溶かして試料溶液とする。

別にアコニチン 20mg を精密に量り，クロロホルム 10mL に溶かし正確にメスアップする。この溶液 1mL を正確に量り，10mL に正確に希釈し標準溶液とする。

試料溶液及び標準溶液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。あらかじめ薄層クロマトグラフ用シリカゲルを用いて 0.25mm の厚さに調製し活性化した薄層板に試料溶液0.3mL，標準溶液10μL 及び15μL を正確に塗布する。次にブタノール・酢酸・水（4： 1：5）の混合溶液の上層を展開溶媒として，約 10cm 展開しこれを風乾した後，噴霧用ドラーゲンドルフ試液を均等に噴霧するとき，試料溶液から得られるアコニチンに対応するスポットの濃さは標準溶液の 10μL を塗布した方から得られるスポットより濃いことはあっても，標準溶液の15μL を塗布した方から得られるスポットより濃くない。

（３） カンキョウ 偏圧した不規則な塊状でしばしば分枝する。分枝した各部はやや湾曲した卵形又は長卵形を呈し，長さ 2～4cm，径 1～2cm である。外面は灰黄色～灰黄褐色で，しわ及び輪節がある。折面は褐色～暗褐色で透明感があり角質である。横切面をルーペ視するとき皮層と中心柱は区分され，全面に維管束が散在する。特異なにおいがあり，味は極めて辛い。

横切片を鏡検するとき，外側よりコルク層，皮層，内皮，中心柱が認められる。皮層と中心柱は一層の内皮によって区分される。皮層及び中心柱は柔組織からなり，繊維束で囲まれた維管束が散在する。柔組織中には黄色の油様物質を含む油細胞が散在し，柔細胞中にはシュウ酸カルシウムの単晶が含まれ，でんぷんは糊化している。

必要に応じて，「カンキョウ」の確認試験を準用する。

（４） カンゾウ 外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現わす。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に 1～3 細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には 3～10 細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞中にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

（５） ソウジュツ 外面は暗灰褐色～暗黄褐色である。横断面は淡褐色～赤褐色の分泌物による細点を認める。しばしば白色綿状の結晶を析出する。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，皮部の柔組織中には，通例，繊維束を欠き，放射組織の末端部には淡褐色～黄褐色の内容物を含む油室がある。木部は形成層に接して道管を囲んだ繊維束が放射状に配列し，髄及び放射組織中には皮部と同様な油室がある。柔細胞中にはイヌリンの球晶及びシュウ酸カルシウムの針晶を含む。

乾燥減量　15%以下。

灰　　分　7%以下。

【479】　K259

成分及び分量又は本質	日本薬局方	トウキ	6.0g
	〃	サイコ	5.0g
	〃	オウゴン	3.0g
	〃	カンゾウ	1.5～2.0g
	〃	ショウマ	1.5g
		全　　量	17.0～17.5g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1 包として製する。		
用法及び用量	本品 1 包に水約 500mL を加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を 3 回に分けて食間に服用する。上記は大人の 1 日量である。15 才未満 7 才以上 大人の 2/3，7 才未満 4 才以上 大人の 1/2，4 才未満2 才以上　大人の 1/3，2 才未満　大人の 1/4 以下を服用する。		
効能又は効果	体力中等度又はやや虚弱なものの次の諸症：痔核（いぼ痔），きれ痔，軽度の脱肛		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	乙字湯去大黄		

規格及び試験方法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品 1 包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　トウキ　外面は暗褐色～赤褐色で，縦じわがあり，切断面は淡黄色～黄褐色を呈する。特異なにおいがあり，味はわずかに甘く，後にやや辛い。

横切片を鏡検するとき，コルク層は 4～10 層からなり，その内側に数層の厚角組織が続いている。皮部には分泌細胞に囲まれた多数の樹脂道並びにしばしば大きなすき間がある。形成層は長方形に偏圧された数層の細胞からなり，明らかに皮部と木部とを区別する。木部では多数の道管と放射組織とが交互に放射状に配列し，その外方の道管は単独又は数個集まってやや密に配列してくさび状をなすが，中心部付近の道管は極めてまばらに存在する。でんぷん粒は径 19μm 以下，まれに 2～5 個の複粒があり，複粒の径は 25μm に達し，しばしばのり化している。

（2）　サイコ　外面は灰褐色～褐色で，深いしわがあるものがあり，横断面では，皮部は褐色，木部は淡褐色を呈する。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，皮部にはしばしば接線方向に長い裂け目があり，皮部の厚さは半径の 1/3～1/2 で，径 15～35μm の胞間性離生油道がやや多数散在し，木部には道管が放射状若しくはほぼ階段状に配列し，ところどころに繊維群があり，根頭部の髄には皮部と同様の油道がある。柔細胞中にはでんぷん粒を満たし，また油滴を認める。

必要に応じて，「サイコ」の確認試験を準用する。

（3）　オウゴン　外面は黄褐色～暗褐色を呈し，切断面は黄色～帯褐黄色を呈し，縦に繊維性のすじが見られる。味はわずかに苦い。

必要に応じて，「オウゴン」の確認試験を準用する。

（4）　カンゾウ　外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現わす。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に 1～3 細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には 3～10 細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞中にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

（５）　ショウマ　外面は暗褐色を呈し，切断面では木部は淡褐色～灰褐色繊維性で，網目状を呈する。質は軽い。味は苦くてわずかに渋い。

乾燥減量　15%以下。

灰　　分　7%以下。

【480】　K260

成分及び分量又は本質	日本薬局方	ケイヒ	5.0g
	〃	エンゴサク	4.0g
	〃	ボレイ	4.0g
	〃	ウイキョウ	2.0g
	〃	シュクシャ	1.5g
	〃	カンゾウ	1.0～1.5g
	〃	リョウキョウ	0.7g
	〃	ブクリョウ	5.0g
		全量	23.2～23.7g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1 包として製する。		
用法及び用量	本品 1 包に水約 500mL を加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を 3 回に分けて食間に服用する。上記は大人の 1 日量である。15 才未満 7 才以上 大人の 2/3，7 才未満 4 才以上 大人の 1/2，4 才未満2 才以上　大人の 1/3，2 才未満　大人の 1/4 以下を服用する。		
効能又は効果	体力中等度以下で，腹部は力がなくて，神経過敏で胃痛又は腹痛があって，ときに胸やけや，げっぷ，胃もたれ，食欲不振，はきけ，嘔吐などを伴うものの次の諸症：神経性胃炎，慢性胃炎，胃腸虚弱		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	安中散料加茯苓		

規 格 及 び 試 験 方 法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品 1 包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　ケイヒ　外面は暗赤褐色を呈し，内面は赤褐色を呈し，平滑である。横断面はやや繊維性で赤褐色を呈し淡褐色の薄層が見られる。特異なにおいがあり，味は甘く，辛く，後にやや粘液性で，わずかに収れん性である。

横切片を鏡検するとき，一次皮部と二次皮部はほとんど連続した石細胞環で区分され，環の外辺にはほぼ円形に結集した繊維束を伴い，環の各石細胞の壁はしばしばU字形に肥厚する。二次皮部中には石細胞を認めず，まばらに少数の厚膜繊維を認める。柔組織中には油細胞，粘液細胞及びでんぷん粒を含む。放射組織中には微細なシュウ酸カルシウムの針晶を含む細胞がある。

（2）　ボレイ　薄い小片に砕いた貝がらで，外面は淡緑灰褐色，内面は乳白色を呈する。ほとんどにおい及び味はない。

必要に応じて，「ボレイ」の確認試験を準用する。

（3）　シュクシャ　ほぼ球形又はだ円形を呈し，長さ 1～1.5cm，径 0.8～1cm，外面は灰褐色～暗褐色を呈し，石灰を散布して乾燥したものは白粉を付けている。種子塊は薄い膜で三部に分かれ，各部には仮種皮によって接合する 10～20 粒の種子がある。種子は多角形の粒状で，長さ 0.3～0.5cm，径約 0.3cm，外面には暗褐色で多数の細かい突起があり，質は堅い。種子を縫線に沿って縦断し，ルーペ視するとき，切面は細長く，へそは深くくぼみ，合点はややくぼんでいる。外乳は白色で，淡黄色の内乳及び胚を包み，胚は細長い。かめば特異な芳香があり，味は辛い。

（4）　エンゴサク　ほぼ偏球形又はこぶ状突起のある多角形を呈し，径 1～2cm で，一端に茎の跡がある。外面は灰黄色又は灰褐色で質は堅く，切断面は黄色で平滑又は灰黄緑色で粒状である。味は苦い。

必要に応じて，「エンゴサク」の確認試験を準用する。

（5）　ウイキョウ　双懸果で長円柱形を呈し，長さ 3.5～8mm，幅 1～2.5mm である。外面は灰黄緑色～灰黄色で，互いに密接する 2 個の分果の各々には 5 本の隆起線がある。双懸果はしばしば長さ 2～10mm の果柄を付ける。特異なにおい及び味がある。

横切片を鏡検するとき，腹面に近い隆起線は背面のものより著しく隆起し，各隆起線間に 1 個の大きな油道があり，腹面には 2 個の油道がある。

（6） カンゾウ 外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現わす。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に 1～3 細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には 3～10 細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞中にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

（7） リョウキョウ やや湾曲した円柱形を呈し，しばしば分枝する。長さ 2～8cm，径 6～15mm である。外面は赤褐色～暗褐色を呈し，細かい縦じわ及び灰白色の輪節があり，ところどころに細根の跡がある。質は堅くて折りにくい。折面は淡褐色を呈し，繊維性で，皮層部の厚さは中心柱の径とほぼ等しい。特異なにおいがあり，味は極めて辛い。

横切片を鏡検するとき，最外層は表皮からなり，表皮細胞にはしばしば樹脂様物質を含む。表皮につづき，皮層，内皮，中心柱が認められる。皮層と中心柱は 1 層の内皮によって区分される。皮層及び中心柱は柔組織からなり，繊維で囲まれた維管束が散在する。柔組織中には褐色の油様物質を含む油細胞が散在し，柔細胞中にはシュウ酸カルシウムの単晶を含み，単粒のでんぷん粒は，卵円形，楕円形，又は長卵形で，ときに偏在し，径 10～40μm である。2～8 粒からなる複粒も含まれる。

必要に応じて，「リョウキョウ」の確認試験を準用する。

（8） ブクリョウ 白色又はわずかに淡赤色を帯びた白色である。外層が残存するものは暗褐色～暗赤褐色で，きめがあらく，裂け目がある。質は堅いが砕きやすい。味はないがやや粘液ようである。

必要に応じて，「ブクリョウ」の確認試験を準用する。

乾燥減量 設定しない

灰　　分 設定しない

【481】　K261

成分及び分量又は本質	日本薬局方	サイコ	6.0g
	〃	ハンゲ	3.5g
	〃	オウゴン	3.0g
	〃	ケイヒ	5.0g
	〃	シャクヤク	3.0g
	〃	カッコン	6.0g
	〃	マオウ	2.0g
	〃	チクセツニンジン	2.0g
	〃	カンゾウ	1.0g
	〃	タイソウ	1.2g
	〃	ショウキョウ	2.5g
	〃	センキュウ	3.0g
	〃	シンイ	2.0g
		全　　量	40.2g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1 包として製する。		
用法及び用量	本品 1 包に水約 500mL を加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を 3 回に分けて食間に服用する。上記は大人の 1 日量である。15 才未満 7 才以上 大人の 2/3，7 才未満 4 才以上 大人の 1/2，4 才未満2 才以上　大人の 1/3，2 才未満　大人の 1/4 以下を服用する。		
効能又は効果	体力中等度以上のものの次の諸症：慢性に経過した鼻炎，蓄膿症（副鼻腔炎）		

貯蔵方法及び 有効期間	密閉容器
規格及び試験方法	別記のとおり。
備考	柴葛湯加川芎辛夷

規格及び試験方法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品 1 包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　サイコ　外面は淡褐色～褐色で，深いしわがあるものがあり，横断面では，皮部は褐色，木部は淡褐色を呈する。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，皮部にはしばしば接線方向に長い裂け目があり，皮部の厚さは半径の 1/3～1/2 で，径 15～35μm の胞間性離生油道がやや多数散在する。木部には道管が放射状若しくはほぼ階段状に配列し，ところどころに繊維群があり，根頭部の髄には皮部と同様の油道がある。柔細胞中にはでんぷん粒及び油滴を認める。

必要に応じて，「サイコ」の確認試験を準用する。

（2）　ハンゲ　外面は白色～灰白黄色，上部には茎の跡がくぼみとなり，その周辺には根の跡がくぼんだ細点となっている。横断面は白色，粉性である。味は初めなく，やや粘液性で，後に強いえぐ味を残す。

横切片を鏡検するとき，主としてでんぷん粒を充満した柔組織からなり，わずかにシュウ酸カルシウムの束晶を含んだ粘液細胞がその間に認められる。でんぷん粒は主として 2～3 個の複粒で，通例，径10～15μm，単粒は通例径3～7μm である。束晶は長さ25～150μmである。

（3）　オウゴン　外面は黄褐色を呈し，切断面は黄色～黄褐色を呈し，縦に繊維性のすじが見られる。味はわずかに苦い。

必要に応じて，「オウゴン」の確認試験を準用する。

（4） ケイヒ 外面は暗赤褐色を呈し，内面は赤褐色を呈し，平滑である。横断面は赤褐色を呈し淡褐色の薄層が見られる。特異なにおいがあり，味は甘く，辛く，後にやや粘液性で，わずかに収れん性である。

横切片を鏡検するとき，一次皮部と二次皮部はほとんど連続した石細胞環で区分され，環の外辺にはほぼ円形に結集した繊維束を伴い，環の各石細胞の膜はしばしばU字形に肥厚する。二次皮部中には石細胞を認めず，まばらに少数の厚膜繊維を認める。柔組織中には油細胞，粘液細胞及び微細なシュウ酸カルシウムの針晶を含む細胞があり，柔細胞中にはでんぷん粒を含む。

（5） シャクヤク 外面は褐色～淡灰褐色を呈し，横断面はち密で淡灰褐色を呈し，木部には淡褐色の放射状の線がある。わずかに特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後に渋くてわずかに苦い。

必要に応じて，「シャクヤク」の確認試験を準用する。

（6） カッコン 淡灰黄色～灰白色を呈し，繊維性でやや粉性である。味はわずかに甘い。横切片を鏡検するとき，師部には結晶細胞列を伴った繊維束，木部には道管及び木部繊維が著しく，柔組織を満たすでんぷん粒は長径 2～18μm，多くは 8～12μm の数面からなる多面体の単粒，まれに 2～3 個からなる複粒で，中央にへそ又は欠裂を認め，層紋がある。

（7） マオウ 細い円柱状又はだ円柱を呈し，長さ 3～10mm，径 1～2mm，淡緑色～黄緑色である。表面に多数の平行する縦みぞがあり，節部には，長さ 2～4mm の2 枚のりん片状の葉が対生し，その基部は合着して筒状になっている。りん片状の葉の色は淡褐色～褐色である。茎の横断面をルーペ視するとき，円形～だ円形で，周囲部は灰緑色～黄緑色を呈し，中心部には赤緑色の物質が充満しているか，又は中空のところがある。味は渋くてわずかに苦く，やや麻ひ性である。

必要に応じて，「マオウ」の確認試験を準用する。

（8） チクセツニンジン 外面は淡黄褐色で，質は堅く，横断面はほぼ平らで淡黄褐色を呈し，角質ようである。弱いにおいがあり，味はわずかに苦い。

必要に応じて，「チクセツニンジン」の確認試験を準用する。

（9） カンゾウ 外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現わす。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に 1～3 細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には 3～10 細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞中にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

（１０） タ イ ソ ウ 外面は赤褐色であらいしわがあるか，又は暗灰赤色で細かいしわがあり，いずれもつやがある。外果皮は薄く革質で，中果皮は暗灰褐色を呈し，海綿ようで柔らかく粘着性があり，内果皮は極めて堅く，種子は偏平である。わずかに特異なにおいがあり，味は甘い。

（１１） ショウキョウ 淡灰黄色の周皮を付けたままか，又はその一部をはぎとってあり，表面は灰白色～淡灰褐色で，しばしば白粉を付けている。横断面は繊維性，粉性で，淡帯黄褐色を呈し，皮層と中心柱とに分かれる。横断面をルーペ視するとき，その全面に維管束及び分泌物が褐色の細点として散在している。特異なにおいがあり，味は極めて辛い。

（１２） センキュウ 外面は灰褐色～暗褐色で，切断面は灰白色～灰褐色，半透明で，ときにはうつろがある。質は密で堅い。特異なにおいがあり，味はわずかに苦い。

横切片を鏡検するとき，皮部及び髄には油道が散在する。木部には厚膜で木化した木部繊維が大小不同の群をなして存在する。でんぷん粒は，通例，のり化していて，まれに径 5～25μm のでんぷん粒を認めることがある。シュウ酸カルシウム結晶は認めない。

（１３） シンイ 紡錘形を呈し，長さ 15～45mm，中央の径 6～20mm，基部にしばしば木質の花柄を付ける。ほう葉は，通例，3 枚で，外面には毛がまばらにあって褐色～暗褐色を呈するか，又は密毛があって灰白色～淡黄褐色を呈し，内面は平滑で暗褐色を呈する。内部に 9 枚又は 12 枚の花被片があり，花被片は同形又は外側の 3 枚が小さい。雄ずいは 50～100 本あり，雌ずいも多数ある。質はもろい。特有のにおいがあり，味は辛くて，やや苦い。

必要に応じて，「シンイ」の確認試験を準用する。

乾燥減量 15%以下。

灰　　分 7%以下。

【482】　K262

成分及び分量又は本質	日本薬局方　カンゾウ　2.0～3.0g 〃　カンキョウ　2.0g 〃　ブシ　0.5～1.0g 〃　ニンジン　2.0g 全　量　6.5～8.0g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1 包として製する。
用法及び用量	本品 1 包に水約 500mL を加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を 3 回に分けて食間に服用する。上記は大人の 1 日量である。15 才未満 7 才以上 大人の 2/3，7 才未満 4 才以上 大人の 1/2，4 才未満2 才以上　大人の 1/3，2 才未満　大人の 1/4 以下を服用する。
効能又は効果	体力虚弱あるいは体力が消耗し、貧血気味で手足が冷えるもの の次の諸症：感冒、急・慢性胃腸炎、下痢、はきけ、貧血
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器
規格及び試験方法	別記のとおり。
備考	四逆加人参湯

規格及び試験方法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品 1 包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　カンゾウ　外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現わす。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に 1～3 細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には 3～10 細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞中にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

（2）　カンキョウ　偏圧した不規則な塊状でしばしば分枝する。分枝した各部はやや湾曲した卵形又は長卵形を呈し，長さ 2～4cm，径 1～2cm である。外面は灰黄色～灰黄褐色で，しわ及び輪節がある。折面は褐色～暗褐色で透明感があり角質である。横切面をルーペ視するとき皮層と中心柱は区分され，全面に維管束が散在する。特異なにおいがあり，味は極めて辛い。

横切片を鏡検するとき，外側よりコルク層，皮層，内皮，中心柱が認められる。皮層と中心柱は一層の内皮によって区分される。皮層及び中心柱は柔組織からなり，繊維束で囲まれた維管束が散在する。柔組織中には黄色の油様物質を含む油細胞が散在し，柔細胞中にはシュウ酸カルシウムの単晶が含まれ，でんぷんは糊化している。

必要に応じて，「カンキョウ」の確認試験を準用する。

（3）　ブシ　本品はほぼ倒円錐形で，長さ 15～30mm，径 12～16mm，又は縦ときに横に切断され，長さ 20～60mm，幅 15～40mm，厚さ 200～700μm，又は径 12mm 以下の不整な多角形に破砕されている。外面は淡褐色～暗褐色又は黄褐色を呈する。質は堅く，通例，しわはなく，切面は平らで，淡褐色～暗褐色又は黄白色～淡黄褐色を呈し，通常角質，半透明で光沢がある。弱い特異なにおいがある。

横切片及び縦切片を鏡検するとき，外側から擬上皮，一次皮層，内皮，二次皮層，形成層，木部が認められる。一次皮層には楕円形～楕円状四角形，短径 30～75μm，長径 60～150μm の厚壁細胞がある。内皮は接線方向に長い 1 層の細胞からなっている。形成層輪は星形又は不整の多角形～円形であり，木部の道管群は V 字形を呈する。二次皮層及び髄中に独立した形成層輪が認められるものもある。道管は孔紋，階紋，網紋又はらせん紋道管である。柔細胞中のでんぷん粒は糊化している。

必要に応じて，「ブシ」の確認試験を準用する。

純度試験　本品 1 包中のアコニチン（$C_{34}H_{47}O_{11}N$：645.75）の残存量は 0.01mg 以下である。

本品 1 包を粉末とし，その重量を精密に量り，これにメタノール 50mL を加え一夜放置した後，1 時間振とうし，ろ紙を用いてろ過する。残渣に再びメタノール 30mL を加え1時間振とうした後，前記ろ紙を用いてろ過する。またこの残渣をメタノール 30mL で 2 回洗い，全量を合わせ減圧下でメタノールをほとんど留去する。残留物に希塩酸 10mL を加え水浴上で加温溶解する。冷後，分液ろう斗に脱脂綿を用いてろ過し，水 10mL で 2 回洗う。ろ液を合わせ，これにアンモニア水（28）を加えてアルカリ性とする。これにクロロホルム 50mL を加えて良く振り混ぜた後に下層を分取する。この操作を 2 回繰り返した後，クロロホルムを合わせ，これに水 10mL を加え洗った後，クロロホルム層を分取し，無水硫酸ナトリウムを加えて脱水する。これをろ過し，減圧下で蒸発乾固する。残留物をクロロホルム 1mL に正確に溶かして試料溶液とする。

別にアコニチン 20mg を精密に量り，クロロホルム 10mL に溶かし正確にメスアップする。この溶液 1mL を正確に量り，10mL に正確に希釈し標準溶液とする。

試料溶液及び標準溶液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。あらかじめ薄層クロマトグラフ用シリカゲルを用いて 0.25mm の厚さに調製し活性化した薄層板に試料溶液0.3mL，標準溶液10μL 及び15μL を正確に塗布する。次にブタノール・酢酸・水（4： 1：5）の混合溶液の上層を展開溶媒として，約 10cm 展開しこれを風乾した後，噴霧用ドラーゲンドルフ試液を均等に噴霧するとき，試料溶液から得られるアコニチンに対応するスポットの濃さは標準溶液の 10μL を塗布した方から得られるスポットより濃いことはあっても，標準溶液の15μL を塗布した方から得られるスポットより濃くない。

（4）　ニンジン　外面は淡黄褐色～淡灰褐色を呈し，縦じわがあり，横断面は淡黄褐色を呈し，形成層の付近は褐色を呈する。特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後にやや苦い。

必要に応じて，「ニンジン」の確認試験を準用する。

乾燥減量　15%以下。

灰　　分　7%以下。

【483】　K263

成分及び分量又は本質	日本薬局方	シャクヤク	3.0g
	〃	カンゾウ	3.0g
	〃	ブシ	0.3～1.0g
		全　量	6.3～7.0g
製造方法	以上の切断又は破砕した生薬をとり，1 包として製する。		
用法及び用量	本品 1 包に水約 500mL を加えて，半量ぐらいまで煎じつめ，煎じかすを除き，煎液を 3 回に分けて食間に服用する。上記は大人の 1 日量である。15 才未満 7 才以上 大人の 2/3，7 才未満 4 才以上 大人の 1/2，4 才未満2 才以上　大人の 1/3，2 才未満　大人の 1/4 以下を服用する。		
効能又は効果	体力中等度以下で、冷えを伴うものの次の諸症：こむらがえり、筋肉のけいれん、胃痛、腹痛、腰痛、神経痛		
貯蔵方法及び有効期間	密閉容器		
規格及び試験方法	別記のとおり。		
備考	芍薬甘草附子湯		

規格及び試験方法

性　　状　本品は特異なにおいがある。

確認試験　本品 1 包を白紙上に広げ，各生薬を外観的に選別し，それぞれの生薬につき，次の試験を行う。

（1）　シャクヤク　外面は褐色～淡灰褐色を呈し，横断面はち密で淡灰褐色を呈し，木部には淡褐色の放射状の線がある。わずかに特異なにおいがあり，味は初めわずかに甘く，後に渋くてわずかに苦い。

必要に応じて，「シャクヤク」の確認試験を準用する。

（2）　カンゾウ　外面（周皮）は暗褐色～赤褐色で縦じわがあり，切断面は淡黄色で繊維質を呈する。横断面では，皮部と木部の境界はほぼ明らかで，放射状の構造を現わす。味は甘い。

横切片を鏡検するとき，皮付きカンゾウでは黄褐色の多層のコルク層とその内層に 1～3 細胞層のコルク皮層がある。皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲まれた厚膜で木化不十分な師部繊維群がある。木部には 3～10 細胞列の放射組織が黄色で巨大な道管と交互に放射状に配列し，道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細胞を伴い，ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある。柔細胞中にはでんぷん粒を含み，またしばしばシュウ酸カルシウムの単晶を含む。皮去りカンゾウでは周皮及び師部の一部を欠いている。

（3）　ブシ　本品はほぼ倒円錐形で，長さ 15～30mm，径 12～16mm，又は縦ときに横に切断され，長さ 20～60mm，幅 15～40mm，厚さ 200～700μm，又は径 12mm 以下の不整な多角形に破砕されている。外面は淡褐色～暗褐色又は黄褐色を呈する。質は堅く，通例，しわはなく，切面は平らで，淡褐色～暗褐色又は黄白色～淡黄褐色を呈し，通常角質，半透明で光沢がある。弱い特異なにおいがある。

横切片及び縦切片を鏡検するとき，外側から擬上皮，一次皮層，内皮，二次皮層，形成層，木部が認められる。一次皮層には楕円形～楕円状四角形，短径 30～75μm，長径 60～150μm の厚壁細胞がある。内皮は接線方向に長い 1 層の細胞からなっている。形成層輪は星形又は不整の多角形～円形であり，木部の道管群は V 字形を呈する。二次皮層及び髄中に独立した形成層輪が認められるものもある。道管は孔紋，階紋，網紋又はらせん紋道管である。柔細胞中のでんぷん粒は糊化している。

必要に応じて，「ブシ」の確認試験を準用する。

純度試験　本品 1 包中のアコニチン（$C_{34}H_{47}O_{11}N$：645.75）の残存量は 0.01mg 以下である。

本品 1 包を粉末とし，その重量を精密に量り，これにメタノール 50mL を加え一夜放置した後，1 時間振とうし，ろ紙を用いてろ過する。残渣に再びメタノール 30mL を加え 1時間振とうした後，前記ろ紙を用いてろ過する。またこの残渣をメタノール 30mL で 2 回洗い，全量を合わせ減圧下でメタノールをほとんど留去する。残留物に希塩酸 10mL を

加え水浴上で加温溶解する。冷後，分液ろう斗に脱脂綿を用いてろ過し，水 10mL で 2 回洗う。ろ液を合わせ，これにアンモニア水（28）を加えてアルカリ性とする。これにクロロホルム 50mL を加えて良く振り混ぜた後に下層を分取する。この操作を 2 回繰り返した後，クロロホルムを合わせ，これに水 10mL を加え洗った後，クロロホルム層を分取し，無水硫酸ナトリウムを加えて脱水する。これをろ過し，減圧下で蒸発乾固する。残留物をクロロホルム 1mL に正確に溶かして試料溶液とする。

別にアコニチン 20mg を精密に量り，クロロホルム 10mL に溶かし正確にメスアップする。この溶液 1mL を正確に量り，10mL に正確に希釈し標準溶液とする。

試料溶液及び標準溶液につき，薄層クロマトグラフ法により試験を行う。あらかじめ薄層クロマトグラフ用シリカゲルを用いて 0.25mm の厚さに調製し活性化した薄層板に試料溶液0.3mL，標準溶液10μL 及び15μL を正確に塗布する。次にブタノール・酢酸・水（4： 1：5）の混合溶液の上層を展開溶媒として，約 10cm 展開しこれを風乾した後，噴霧用ドラーゲンドルフ試液を均等に噴霧するとき，試料溶液から得られるアコニチンに対応するスポットの濃さは標準溶液の 10μL を塗布した方から得られるスポットより濃いことはあっても，標準溶液の15μL を塗布した方から得られるスポットより濃くない。

乾燥減量　15%以下。

灰　　分　7%以下。